This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

STANFORD
UNIVERSITY
LIBRARIES



IV, 281







Wagener del. Halle sculpsit Berol.

Oekonomisch = technologische

Encyklopädie,

oder

allgemeines System

der

Stats= Stadt= Haus= und Land= Wirthschaft,

und der ~~Kunst=~~ Geschichte,

in alphabetischer Ordnung;

von

D. Johann Georg Krünitz,

der Russisch= Kaiserl. freyen oekonomischen Gesellschaft zu St. Petersburg Ehrenglied, der kön. preuß. gelehrten Gesellsch. in Frankf. an der Oder Beysitzer, der Götting. deutschen Gesellschaft, der Oberlausitzer Bienengesellschaft, und der Leipz. oekonom. Soc. Ehren= Mitglied, wie auch der oekonom. patriot. Soc. in Schles. ordentliches Mitglied und Correspondent.

Neun und dreyßigster Theil,

von Kirg bis Kleib.

Nebst 4 Kupfertafeln auf ½ Bogen.

Mit Königl. Preußischen und Churfürstl. Sächsischen Privilegien.

Berlin, 1787.

bey Joachim Pauli, Buchhändler.

gen zahlt Rußland dem Chan 600 Rubel, und den Vornehmen von 300 bis 20. Dem Chan wird von den Ruſſen als einem regierenden Fürſten begegnet.

Die Kirgiſen wohnen, nach Art anderer nomadiſchen Völker Aſiens, in Filz-Gezelten oder Filz-Hütten, welche ſich von den im XXI. Th. S. 297. f. beſchriebenen, und Fig. 1262 abgebildeten, kalmückiſchen Kibitken in nichts unterſcheiden, als daß ſie viel geräumiger und reinlicher zu ſeyn pflegen, ſo, daß in einem ſolchen Gezelte oft mehr als 20 Menſchen ganz gemächlich zu ſitzen Raum haben (*). Ueberhaupt ſind die Kirgiſen in ihrem Geſchirre und am Leibe viel reinlicher, als die Kalmücken. Weil ſie durchgängig wohlhabend ſind und viel Vieh haben, ſo leben ſie nach ihrer Art ſehr gut, und ſind auch ziemlich wohl bekleidet. Faſt alles, was ſie dazu an gewirktem Zeuge und Manufactur-Kleinigkeiten nöthig haben, müſſen ſie von den Ruſſen, oder aſiatiſchen Karavanen, oder durch

Tracht der Sclaven und Aermern, iſt aus Sommer-Häuten der Antelopen mit dem Haare auswärts, zuſammen geſetzt; ein ſolcher Rock heißt Jirgak. Etwas vornehmer, und ſehr gewöhnlich iſt die ſo genannte Daka, welche aus Fellen ungeborner Füllen, verſchiedener Farbe, dergeſtalt zuſammen genähet wird, daß mitten auf dem Rücken und auf beyden Schultern die Mähnen zum Zierrath in die Näht geſetzt ſind. Einige tragen auch Sommer-Kleider aus ſehr wohl und ohne Haar gegärbten Ziegen-Fellen, welche Kaſhan genannt, und auch von den jaikiſchen Kaſaken, weil ſie weich und zugleich im Regen dauerhaft ſind, viel zur Kleidung gebraucht werden. Die Kirgiſen ſchneiden von den Ziegen-Fellen das Haar ab, feuchten dieſelben mit Waſſer an, und laſſen ſie aufgerollt an einem warmen Orte liegen, bis ſie zu ſtinken anfangen, und die Haar-Wurzeln los gehen; dieſe werden alsdann mit ſtumpfen Meſſern ausgekratzt, das gereinigte Fell etwas getrocknet, und darauf entweder in ſüße Milch, oder, wenn es dicke Felle ſind, in ſaure, geleget und darin 4 Tage gegärbet, täglich aber nochmahls aufgekratzt, um die Haut deſto beſſer zu öffnen. Endlich werden dieſe Felle im Schatten getrocknet, und mit Händen und Füßen durchgearbeitet, bis ſie ganz weich ſind; alsdann werden ſie geräuchert, wieder durchgewirket, und zuletzt mit einer gelbbraunen Farbe gefärbt. Solche verſchaffen ſich die Kirgiſen, indem ſie Wurzeln entweder von Rhapontik, oder von der auf der ganzen ſalzigen Steppe häufigen Statice tatarica, (die ſie Gelbwurz nennen,) in Alaun-Waſſer kochen. Einige ſollen auch Schaf-Fett unter die Farbe ſieden, um dieſelbe beſtändiger zu machen. Wenn die Farbe kalt iſt, ſoll ſie wie ein Brey ſeyn, womit ſie die Felle auf beyden Seiten einige Mahl beſtreichen und jedes Mahl trocknen, endlich aber nochmahls wirken und weich machen. Solche Felle können ſehr oft gewaſchen werden, ohne ihre angenehme

gen zahlt Rußland dem Chan 600 Rubel, und den Vornehmen von 300 bis 20. Dem Chan wird von den Ruſſen als einem regierenden Fürſten begegnet.

Die Kirgiſen wohnen, nach Art anderer nomadiſchen Völker Aſiens, in Filz-Gezelten oder Filz-Hütten, welche ſich von den im N. T. Th. S. 297. f. beſchriebenen, und Fig. 1262 abgebildeten, kalmückiſchen Kibitken in nichts unterſcheiden, als daß ſie viel geräumiger und reinlicher zu ſeyn pflegen, ſo, daß in einem ſolchen Gezelte oft mehr als 20 Menſchen ganz gemächlich zu ſitzen Raum haben (*). Ueberhaupt ſind die Kirgiſen in ihrem Geſchirre und am Leibe viel reinlicher, als die Kalmücken. Weil ſie durchgängig wohlhabend ſind und viel Vieh haben, ſo leben ſie nach ihrer Art ſehr gut, und ſind auch ziemlich wohl bekleidet. Faſt alles, was ſie dazu an gewirktem Zeuge und Manufactur-Kleinigkeiten nöthig haben, müſſen ſie von den Ruſſen, oder aſiatiſchen Karavanen, oder durch Räubereyen (**), anſchaffen; doch ſtehen ſie von letztern immer mehr ab, und fangen an, ſich auf den Tauſch-Handel zu legen. Unter ihnen werden keine zur Bequemlichkeit und Kleidung erforderliche Dinge verfertigt, als Pelze, Lederwerk, eine Art grober Camelote oder Armak, Filz-Decken von Schaf-Wolle, welche ſie mit bunter Wolle artig zu belegen wiſſen, allerley ledernes Geſchirr, und einige grobe Kleinigkeiten. Die Thier-Felle gärben ſie überhaupt wie die Kalmücken, mit ſaurer Milch, und daraus beſteht größten Theils die Kleidung der Männer. Man ſieht ſie aber im Sommer hauptſächlich dreyerley Arten von kurzen Ober-Kleidern aus Fellen tragen. Die gemeinſte Tracht

(*) Wenn es heiß iſt, nehmen die Kirgiſen und Kalmücken die Seiten-Decken von dem Gezelte ab, da denn daſſelbe vollkommen eine Sommer-Laube vorſtellt.

(**) Die Kirgiſen verſchonen ſelbſt das Ruſſiſche nicht, weswegen man ſich durch Gränz-Linien gegen ihre Einfälle verwahrt.

Tracht der Sclaven und Aermern, iſt aus Sommer-Häuten der Antelopen mit dem Haare auswärts, zuſammen geſetzt; ein ſolcher Rock heißt Jirgak. Etwas vornehmer, und ſehr gewöhnlich iſt die ſo genannte Daka, welche aus Fellen ungeborner Füllen, verſchiedener Farbe, dergeſtalt zuſammen genähet wird, daß mitten auf dem Rücken und auf beyden Schultern die Mähnen zum Zierrath in die Näht geſetzt ſind. Einige tragen auch Sommer-Kleider aus ſehr wohl und ohne Haar gegärbten Ziegen-Fellen, welche Kaſhan genannt, und auch von den jaikiſchen Kaſaken, weil ſie weich und zugleich im Regen dauerhaft ſind, viel zur Kleidung gebraucht werden. Die Kirgiſen ſchneiden von den Ziegen-Fellen das Haar ab, feuchten dieſelben mit Waſſer an, und laſſen ſie aufgerollt an einem warmen Orte liegen, bis ſie zu ſtinken anfangen, und die Haar-Wurzeln los gehen; dieſe werden alsdann mit ſtumpfen Meſſern ausgekratzt, das gereinigte Fell etwas getrocknet, und darauf entweder in ſüße Milch, oder, wenn es dicke Felle ſind, in ſaure, geleget und darin 4 Tage gegärbet, täglich aber nochmahls aufgekratzt, um die Haut deſto beſſer zu öffnen. Endlich werden dieſe Felle im Schatten getrocknet, und mit Händen und Füßen durchgearbeitet, bis ſie ganz weich ſind; alsdann werden ſie geräuchert, wieder durchgewirket, und zuletzt mit einer gelbbraunen Farbe gefärbt. Solche verſchaffen ſich die Kirgiſen, indem ſie Wurzeln entweder von Rhapontik, oder von der auf der ganzen ſalzigen Steppe häufigen Statice tatarica, (die ſie Gelbwurz nennen,) in Alaun-Waſſer kochen. Einige ſollen auch Schaf-Fett unter die Farbe ſieden, um dieſelbe beſtändiger zu machen. Wenn die Farbe kalt iſt, ſoll ſie wie ein Brey ſeyn, womit ſie die Felle auf beyden Seiten einige Mahl beſtreichen und jedes Mahl trocknen, endlich aber nochmahls wirken und weich machen. Solche Felle können ſehr oft gewaſchen werden, ohne ihre angenehme

gelbbraune Farbe zu verlieren. Sie brauchen eben dieſe Wurzeln, um Wolle zu färben; zur rothen Farbe aber bedienen ſie ſich der rechten Färber-Röthe, welche in einigen Niederungen am Jaik und in der Steppe wächſt, und von ihnen Kyſil-Bujaf genannt wird.

Sie haben einige Schmiede unter ſich, welche aber nur ſehr grobe Kleinigkeiten verfertigen; und dieſes iſt auch von Silber-Schmieden zu verſtehen, deren es einige unter ihnen geben ſoll. Dieſe Leute können nicht begreifen, wie die Kunſt bey den Europäern ſo hoch geſtiegen iſt, eine Näh-Nadel und Finger-Hüte zu machen. Alle ſolche feine Kleinigkeiten und viele andere Waren erhandeln ſie in Orenburg und andern Gränz-Plätzen. Weil ſie keine Münzen unter ſich haben, ſchätzen ſie alles nach Pferden oder Schafen; ihre Scheide-Münzen aber ſind Wölfe, Korſaken und Lämmer-Felle.

Die männliche Kleidung der Kirgiſen, Fig. 2087 *) beſteht, auſſer dem Ober-Kleide, gemeiniglich in baumwollenen Unter-Kleidern und Hemden von blauer Leinwand oder Kitaika, welche von oben bis unten wie ein Schlaf-Rock offen ſind, mit den Unter-Kleidern zuſammen geſchlagen, und um den Leib feſt gebunden werden. Ueber das Ober-Kleid gürten ſie ſich mit einem Riemen, woran gemeiniglich eine Pulver-Flaſche und ein Beutel mit Kugeln hängen, weil jetzt die meiſten wohlhabenden Kirgiſen Feuer-Gewehr zu führen pflegen (*). Ihre Sommer-Mützen ſind theils von Filz, oft mit Zeugen überzogen, bunt ausgenähet und mit Sammet gefüttert, oben coniſch, mit zwey brei-

(*) Einige Kirgiſen ſollen ſelbſt Pulver verfertigen. Sie ſammeln dazu den Salpeter auf alten Gaſtatten in der Steppe. Derſelbe ſoll ſo vortrefflich ſeyn, daß man ihn nur von der Erde waſchen, und hernach mit Schwefel und Kohlen vermiſchen darf. Den Schwefel aber bekommen ſie, wie ihr meiſtes Pulver, von den aſiatiſchen Karavanen.

breiten niederhängenden Klappen, wovon sie die eine aufzuschlagen pflegen. Winter-Mützen sind mit Pelz-Werke gefüttert, und haben vorn und hinten runde, auf den Seiten aber spitzige, niederhängende Klappen. Sie tragen sonst noch auf tatarische Art, eine schwarze bunt genähete Calotte auf dem kahl geschornen Kopfe. Die Stiefeln, welche die Reichen unter ihnen tragen, werden von den Bucharen verfertiget, und ziemlich theuer verkauft. Sie sind von körniger Esels-Haut sehr ungeschickt, und nach einem sonderbaren Muster, mit langen Hacken gemacht, an den Sohlen mit Zwecken beschlagen, oder gar mit Eisen eingefaßt, und überhaupt so unbequem, daß gewiß kein Europäer einen Schritt damit thun könnte ohne zu straucheln. Allein, die Kirgisen treten wenig auf ihre Beine, sondern sitzen beständig zu Pferde; daher man nicht Einen unter ihnen sieht, der gut zu Fuße wäre, und nicht krumme Beine hätte. Sonst sind sie gemeiniglich von mittlerer Größe; und die meiste Jugend, die man sieht, ist von Gesichte ziemlich angenehm, welches vielleicht von ihrer Vermischung mit kalmückischen und andern geraubten Weibern herkommt. Denn unter Bejahrten findet man viele fürchterliche, jüdische Gesichter, und, wegen der trägen Lebens-Art, sehr viele dicke ungestalte Körper. Sie lassen in der Jugend nur den Knebel-Bart stehen; Alte aber tragen Zwickel-Bärte am Kinne und den Mund-Winkeln, auf allerley Art; oder auch volle Bärte, wobey sie jedoch die Ober-Lippe und das Kinn glatt halten.

Die gemeine Tracht der kirgisischen Weiber, Fig. 2087[b], ist ein blaues Hemd, welches vorn zu ist, und worüber sie zu Hause weiter nichts anziehen; ferner: lange Beinkleider, Binden, womit sie die Füße umwickeln, platte Socken, und weiße oder bunte baumwollene Tücher, womit sie den Kopf vermummen. Diese machen den beständigen Kopf-Putz aus, welcher

geſtlich als eine Art von Wiſſenſchaft treibe, nennt ſich Faltſcha. Sodann gibt es eine Art Weiſſager, Jauruntſchi genannt, welche aus dem Schulterblatte eines Schafes künftige Dinge verkündigen, und auf alle Fragen Antwort wiſſen. Man ſagt, das Schulterblatt müſſe bloß mit einem Meſſer eingeſchabt, und nicht mit den Zähnen berührt ſeyn, weil es dadurch zur Zauberey untüchtig werden ſoll. Nachdem man dem Weiſſager eine Frage vorgelegt, oder derſelbe ſich etwas in Gedanken vorgeſetzt hat, legt er das Schulterblatt auf ein Feuer, und wartet ſo lange, bis die platte Stelle allerley Riſſe und Spalten bekommt; und aus dieſen Linien weiſſaget er. Dieſe Leute ſollen ſo geſchickt ſeyn, daß ſie die Entfernung eines abweſenden Menſchen zu beſtimmen unternehmen.

Man erzählt, es habe ein Mahl eine Partie Kalmücken, welche unter ſich einen Weiſſager dieſer Art hatten, einen anſehnlichen Raub an den Kirgiſen begangen. Eine Partie von dieſen, unter welcher ebenfalls ein Weiſſager war, machte ſich auf, um dem Feinde nachzujagen; allein der Kalmück verſtand ſeine Kunſt ſo gut, daß er ſeine Landsleute von der Ankunft der Kirgiſen zeitig benachrichtigte, und je mehr dieſe ſich näherten, deſto mehr zur Flucht antrieb. Da der kirgiſiſche Weiſſager merkte, daß er ſeinen Zweck nicht erreichen würde, ſoll er folgende Liſt gebraucht haben. Er ließ ſeine Kirgiſen die Pferde verkehrt ſatteln, und ſich umgekehrt darauf ſetzen. Dadurch ward der Kalmück irre gemacht; er ſahe auf ſeinem Knochen, daß die Kirgiſen umgekehrt wären, und rieth alſo ſeinen Gefährten mit der Flucht inne zu halten, dadurch wurden ſie eingehohlt, und von den Kirgiſen mit der gemachten Beute zu Gefangenen gemacht. Dieſe Erzählung hatte Hr. C. R. Pallas von den Kirgiſen ſelbſt.

Eine dritte Art Zauberer nennen ſie Bakſcha, und ſetzen in dieſelben ein großes Vertrauen. Wenn dieſe um Rath gefraget werden, ſo laſſen ſie zuerſt ein Pferd, Schaf, oder einen Bock, hergeben, welche, als zum Opfer beſtimmt, auserleſen, und ohne Fehler ſeyn müſſen.

breiten niederhängenden Klappen, wovon sie die eine aufzuschlagen pflegen. Winter-Mützen sind mit Pelz-Werke gefüttert, und haben vorn und hinten runde, auf den Seiten aber spitzige, niederhängende Klappen. Sie tragen sonst noch auf tatarische Art, eine schwarze bunt genähete Calotte auf dem kahl geschornen Kopfe. Die Stiefeln, welche die Reichen unter ihnen tragen, werden von den Bucharen verfertiget, und ziemlich theuer verkauft. Sie sind von körniger Esels-Haut sehr ungeschickt, und nach einem sonderbaren Muster, mit langen Hacken gemacht, an den Sohlen mit Zwecken beschlagen, oder gar mit Eisen eingefaßt, und überhaupt so unbequem, daß gewiß kein Europäer einen Schritt damit thun könnte ohne zu straucheln. Allein, die Kirgisen treten wenig auf ihre Beine, sondern sitzen beständig zu Pferde; daher man nicht Einen unter ihnen sieht, der gut zu Fuße wäre, und nicht krumme Beine hätte. Sonst sind sie gemeiniglich von mittlerer Größe; und die meiste Jugend, die man sieht, ist von Gesichte ziemlich angenehm, welches vielleicht von ihrer Vermischung mit kalmückischen und andern geraubten Weibern herkommt. Denn unter Bejahrten findet man viele fürchterliche, jüdische Gesichter, und, wegen der trägen Lebens-Art, sehr viele dicke ungestalte Körper. Sie lassen in der Jugend nur den Knebel-Bart stehen; Alte aber tragen Zwickel-Bärte am Kinne und den Mund-Winkeln, auf allerley Art; oder auch volle Bärte, wobey sie jedoch die Ober-Lippe und das Kinn glatt halten.

Die gemeine Tracht der kirgisischen Weiber, Fig. 2087[b], ist ein blaues Hemd, welches vorn zu ist, und worüber sie zu Hause weiter nichts anziehen; ferner: lange Beinkleider, Binden, womit sie die Füße umwickeln, platte Socken, und weiße oder bunte baumwollene Tücher, womit sie den Kopf vermummen. Diese machen den beständigen Kopf-Putz aus, welcher

Dſchaulok genannt wird. Zuerſt legen ſie ein 2 bis 3 Ellen langes Zipfel-Tuch über den Kopf, um welchen ſie die Haare in zwey Flechten wickeln. Die Zipfel des Tuches kreutzen ſie unter dem Kinne, und legen ſie wieder über den Kopf, wodurch der Hals vorn, ſo wie hinten von der herabhängenden Ecke des Tuches bedeckt wird. Darauf wird noch ein 4 bis 5 Ellen langer, in der Mitte faſt 2 Hände breiter, gefaltener Streifen, von eben dem Zeuge wie das Tuch, um die Scheitel des Kopfes alſo gewunden, daß beynahe ein cylindriſcher Turban daraus entſteht. Wenn ſie ſich beſſer angekleidet haben, iſt dieſer Dſchaulok von feinerm und hell geſtreiften Zeuge. Ueber das blaue Hemd ziehen ſie alsdann noch ein anderes Hemd, von ſeidenem, und wohl gar reichen, oder mit umächten Blumen gezierten buchariſchen Zeugen an, legen eine Schärpe, von eben dem Zeuge wie der Dſchaulok, um den Leib, und ziehen über alles noch einen weiten buchariſchen Schlaf-Rock oder Chalat an. Um auch die Brüſte recht ſorgfältig zu verdecken, pflegen ſie ein buntes oder ausgenähetes Tuch, welches den ganzen Oberleib bedeckt, über die Bruſt unter das Ober-Hemd auszubreiten.

Sie haben aber noch einen andern Schmuck, welcher Dſchadſchbau genannt wird, und in einem vielfachen Schweife beſteht, der am Hinterkopfe unter dem Dſchaulok angeheftet wird. Daran iſt erſtlich eine mehr als 3 E. lange Schleppe von bunt geſticktem Zeuge, welche wie ein Wimpel ſchmahl ausläuft, und dergleichen die Bucharen ganz fertige mitbringen. Dieſe wird unter der Leib-Binde durchgeſteckt. Darüber hängt bis in die Kniekehle ein doppelter, Daumens dicker mit Sammet überzogener Zopf, der am Ende mit großen Quaſten von ſchwarzer Seide verziert wird, und bey den Weibern getheilt iſt, und über die Schultern nach vorn geworfen, von Mädchen aber zuſammen geheftet auf dem Rücken getragen wird. Um dieſen

Zopf

Zopf hängt noch bis in die Kniekehle ein Schnur-Werk, mit allerley bunten Quasten, Korallen, Finger-Hüten, und anderm Klippwerke, herab. Dabey setzen sie auch wohl unter dem Dschaulok noch eine Schaube auf, welche am Gesichte herum mit allerley Silber-Blechen oder kleinen Münzen besetzt und behängt ist.

Die Kirgisen sind muhamedanischer Religion, welche sie, ihrem Vorgeben nach, schon aus Turkestan mitgebracht haben; und daher nehmen sie so viele Weiber, als sie bezahlen oder rauben können. Der Kalün, welcher für die Braut bezahlet werden muß, pflegt sich bey ihnen ziemlich hoch zu belaufen. Nach muhamedanischer Art kostet es Mühe, ihr Weibsvolk zu sehen zu bekommen. Die Reichern haben gemeiniglich für jede Frau ein besonderes Gezelt, und auch für sich ein abgesondertes. Sie sind in ihrem Glauben eifrig genug, dabey aber sehr unerfahren, weil sie sehr wenig muhamedanische Geistliche unter sich haben. Doch befindet sich jetzt ein Achun oder Ober-Priester bey der Horde, welcher mit dem Chan herum zu ziehen pflegt.

In ihrer Lebens-Art beobachten sie das muhamedanische Gesetz ziemlich genau. Sie essen z. B. kein unreines, verrecktes, hinkendes, oder sonst fehlerhaftes Thier; und von wilden Thieren nur die Antelopen, Steppen-Pferde und Hirsch-Arten. Aus solchem Fleische aber besteht ihre Haupt-Nahrung, ob sie sich gleich nunmehr auch an Mehl oder Grützwerk gewöhnen, und solches von den Russen gern eintauschen. Dabey ist ihr Getränk mehrentheils saure Milch, oder gegohrne, klare Pferde-Molken.

Je sparsamer bey der kirgisischen Nation die Geistlichkeit ist, desto zahlreicher und mannichfaltiger sind unter ihnen die Zauberer. Es gibt insonderheit deren fünferley. Eine Art, welche aus gewissen Büchern und aus den Gestirnen weissaget, und solches unent-

von der tatariſchen ebenfalls wenig unterſchieden, doch ſollen ſie eine höhere Ausſprache haben, und ſich vieler geblümten Redensarten zu bedienen gewohnt ſeyn.

Der eigenthümliche Reichthum der Kirgiſen, iſt die Viehzucht. Es ſind aber Pferde und Schafe ihr zahlreichſtes Vieh. Kamele beſitzen ſie in weit geringerer Anzahl, und mit Rindvieh ſind ſie am ſchlechteſten verſehen, weil es ſich im Winter ohne ordentliches Futter nicht wohl aus der Steppe erhalten kann. Sie gebrauchen aber das Rindvieh, wie die Kamele, zum Tragen des Haus-Geräthes, wenn ſie von einem Orte zum andern ziehen. Es gibt aber keine andere, als zweyhöckerige Kamele bey ihnen. Man pflegt dieſelben im Winter, und zwar im Febr., da ſie am brünſtigſten ſind, zu belegen. Die Stute iſt gewohnt ſich auf das Wort Tſuk auf die Knie niederzulaſſen; alsdann wird der Hengſt dazu geführt, welcher die Stute beſpringt, und ſich auf die hintern Knie dabey niederläſſet, mit den vordern aber ſteht. Siehe Th. XXXIII. S. 11. Man pflegt bey den reichen Kirgiſen die Kamele auch zu melken; ihre Milch ſoll bläulich, dick, und von Geſchmacke angenehm ſeyn. Die Kirgiſen halten dieſelbe für ſehr geſund; ſie ſoll auch geſäuert noch ſtärker, als die Pferde-Milch, rauſchen, und einen beſſern Branntwein geben, aber keinen Rahm ſetzen. Im Winter muß für die Kamele mehr, als für das übrige Vieh, geſorget werden. Man bedeckt ſie mit Filzen oder Schilf-Decken, und ſpannt auch wohl, wenn ſtrenge Kälte iſt, große Filze oder Schilf-Matten zwiſchen den Gezelten zu einem Schutz für ſie aus.

Die Pferde der Kirgiſen ſind wenig von den kalmückiſchen unterſchieden; doch pflegen ſie etwas höher von Wuchs zu ſeyn. An Wildheit und Flüchtigkeit ſind ſie jenen gleich, und ebenfalls gewohnt, ihr Futter den ganzen Winter unter dem Schnee hervor zu ſcharren, wovon zugleich dem übrigen Viehe das Weiden

er-

erleichteret wird. Doch pflegen die Kirgiſen auch wohl, wenn dieſer Schnee iſt, für das kleine Vieh den Schnee mit Schaufeln weg zu räumen. Ihre Pferde vertheilen ſie in Tabunen, bey deren jeder nur ein Hengſt gelaſſen wird, die überflüſſigen Hengſt-Füllen aber geſchnitten werden. Der Tabunen-Hengſt ſteht den Stuten wie ein Hirt vor, und hält ſie beyſammen. Wenn aber eine Stute ſich entfernt, und einen fremden Hengſt zugelaſſen hat, ſoll er dieſelbe nicht mehr in ſeinem Truppe leiden. Die Stuten werden gemeiniglich alle ſo beleget, daß die Füllen vom Febr. bis in den May fallen.

Die kirgiſiſchen Schafe ſind die größten und ungeſtalteſten von allem Woll-Viehe. Sie ſind höher als ein neu gebornes Kalb, und ſo ſtark und ſchwer, daß die ausgewachſenen, bey guter Jahrszeit, gemeiniglich zwiſchen 4 und 5 Pud wiegen. Sie ſehen, der Geſtalt nach, den indianiſchen Schafen etwas ähnlich, haben ſehr krumme Rammsköpfe, hervor ragende Unter-Lippen, große niederhängende Ohren, und öfters Warzen oder ſo genannte Haar-Glocken einzeln oder doppelt am Halſe. An ſtatt des Schwanzes tragen ſie ungeheure runde, polſterförmige, und von unten faſt ganz kahle Fett-Klumpen, welche bey ſtarken Schafen oft 30 bis 40 Pfund wiegen, und 20 bis 30 Pfund Talg geben; und durch dieſe unterſcheiden ſie ſich am meiſten von den indianiſchen Schafen. Sie haben übrigens eine filzige und ziemlich lange, aber inſonderheit am Hintertheile mit Haaren ſehr vermiſchte Wolle. Ihre Farbe iſt am gewöhnlichſten braun, oder braun-gefleckt, und nächſt dieſer iſt die weiße die gemeinſte. Die Widder ſind durchgängig gehörnt, und auch unter den Hammeln gibt es mehr gehörnte, als ungehörnte; ja, man findet einige, welche, wie die iſländiſchen, 4, 5 bis 6 Hörner bekommen. Die Widder werden zwar den ganzen Sommer in der Heerde gelaſſen, man bin-

det ihnen aber, vom April bis in den Oct., einen Filz um den Leib, damit ſie die Schafe nicht belegen können. Im Oct. gibt man ihnen die Freyheit, und ſolcher Geſtalt fallen die Lämmer alle im Frühlinge. Eben dieſes Mittels bedient man ſich auch bey den Stieren. Den ganzen Winter hindurch ſuchen die Schafe ihr Futter unter dem Schnee ſelbſt, und freſſen auch Schnee ſtatt des Getränkes, wobey ſie wenig abfallen, und im Frühlinge gar bald die vorige Feiſtigkeit wieder erlangen. Dazu trägt der kurze Winter, und dieſer Umſtand viel bey, daß der Schnee auf den häufigen Salz-Stellen der Steppe ſehr geſchwinde vergeht, und dieſe Thiere durch den Genuß des ſalzigen Erdreiches gleichſam gemäſtet werden. Vielleicht iſt dieſer Umſtand auch die Urſache, warum die orientaliſche Raße von Schafen bey den Kirgiſen und Kalmücken nach und nach durch überflüſſiges Fett ausgeartet iſt, und, an ſtatt der Schwänze, ſolche unbehülfliche Fett-Polſter bekommen hat, welche Ungeſtaltheit nunmehr, da ſie eingewurzelt iſt, ſich auch in andern Gegenden erhält, wenn man Widder und Schafe dieſer Art allein hält, und nicht vermiſcht. Die kirgiſiſchen Schafe werfen gemeiniglich zwey Lämmer. Seuchen ſind bey ihnen nicht bekannt, weil dieſes Vieh auf der Steppe völlig der Natur überlaſſen lebt. Die Vermehrung des Woll-Viehes iſt daher bey den Kirgiſen ungemein groß, und ihre Heerden ſind zahlreich. Eine gewöhnliche, aber nicht tödliche, Krankheit der kirgiſiſchen Schafe iſt, daß ſie im letzten Magen allerley aus Wolle oder zerkäueten Pflanzen-Theilen zuſammen gewirkte Ballen erzeugen, welche ſich mit einem ſchwarzen Lacke, ja wohl gar einer ſteinartigen Rinde, überziehen. Sonſt pflegen die Kirgiſen, wenn ein Vieh krankt, daſſelbe ohne weitere Umſtände zu tödten.

Unter ihren Schaf-Heerden halten dieſe Nomaden auch nicht wenig Ziegen, welche ſie nur der Milch und

Felle

Felle wegen erziehen. Diese haben, wie ihre Schafe, ein seltsames Ansehen, sind mehrentheils ungehörnt, an den Gliedern mit langen Haaren artig behangen, dabey gemeiniglich buntfleckig, und haben niederhängende Ohren.

Bey ihrem müßigen Hirten-Leben, ist die Jagd eine der gemeinsten Beschäftigungen der Kirgisen; wobey sie noch den Vortheil haben, daß sie die ihren Heerden gefährlichen Füchse und Wölfe los werden. Zur Jagd dieser Thiere bedienen sie sich abgerichteter Adler. Sie pflegen dieselben auch wohl zu Pferde auf der weiten Steppe zu jagen. Die Antelopen oder Saigaken, welche sie Akik nennen, halten sich im Winter meistens in schilfigen Gegenden auf; und weil sie sehr zart und leicht zu verwunden sind, stutzen die Kirgisen in einer kleinen Strecke das Schilf so hoch ab, daß die Spitzen desselben, die springenden Antelopen in den Leib verwunden müssen. Alsdann jagen sie diese Thiere nach solchen Stellen, und bemächtigen sich solcher Gestalt derselben gar leicht.

Die Kirgisen gelangen oft zu einem hohen Alter, und sind bis in ihre späteste Jahre munter und gesund. Ihre gemeinste Krankheiten sind: kalte Fieber, Husten, Engbrüstigkeit und Herzklopfen; auch die Lust-Seuche ist bey ihnen ziemlich stark eingerissen, und unter dem Nahmen Kurusaslan bekannt. Von bösartigen hitzigen Fiebern, die bey den Kalmücken so gefährlich sind, hat Hr. Pallas nichts erfahren. Aber mit den Pocken, welche sie Tschitschak nennen, werden sie nunmehr durch die Gemeinschaft mit den Europäern zuweilen angesteckt; sie fürchten diese Krankheit aber dergestalt, daß sie die Kranken, so bald sich Blatern äussern, verlassen, und ihnen zur Noth nur die Lebens-Mittel und Getränke von fern hinsetzen; nähert sich aber ein solcher Kranker ihren Wohnungen, so machen

sie

[redacted]

[redacted]

[redacted] daraus, mit Pfeilen auf [redacted] zu

[redacted] Beerdigung ihrer Todten werden entweder [redacted] gemacht, oder auch wohl über die Erde [redacted] eingeschlagen, mit Reisig ausgeflochten, und [redacted] nachdem der Körper in voller Kleidung hinein gelegt worden ist, mit Zweigen bedeckt, und die Erde darüber geschaufelt. Es wird aber dabey am Kopf-Ende, welches gegen Mitternacht sehen muß, ein kleiner Pfahl, dessen Ende bis in die Leichen-Kammer reicht, so lange aufrecht gehalten, bis der ganze Grab-Hügel fest geschlagen ist, da denn der Pfahl heraus gezogen wird, und also das Grab eine Oeffnung behält. In steinigen Gegenden trägt man einen Stein-Haufen über dem Körper zusammen. Man darf sich daher nicht verwundern, wenn man in allen Steppen eine Menge solcher Grab-Hügel findet, die noch täglich zunehmen muß. Sie beerdigen aber ihre Todte am liebsten und häufigsten um die Gräber gewisser unter ihnen für Heilige gehaltener Leute, bey alten Metscheten, und überhaupt an solchen Oertern, wo schon viele alte Gräber vorhanden sind.

P. S. Pallas Reise durch verschied. Provinzen des russ. Reichs, 1 Th. Kif. und L. 1776. 8. S. 326, fgg.

Kirkcaldy, ein königlicher Flecken in der Landschaft Fife (Fifeshire) in Süd-Scotland. Er besteht vornehmlich aus einer langen Gasse von einer Meile längst der Küste, und hat etwann 1600 Einwohner. Es gibt hier einige ansehnliche Kaufleute, welche wichtigen Handel treiben. Man sieht auch viel Getreide von hier nach England und Holland gehen. Andere senden Leinwand nach England, und lassen allerley Artikel, die das Land bedarf, wieder zurück kommen. Einige von den hiesigen Kohlen-Gruben am westlichen Ende des Fleckens, liegen so nahe an der See, daß man glauben sollte, sie liessen sich wegen der Fluth nicht bear-

erleichtert wird. Doch pflegen die Kirgisen auch wohl, wenn tiefer Schnee ist, für das kleine Vieh den Schnee mit Schaufeln weg zu räumen. Ihre Pferde vertheilen sie in Tabunen, bey deren jeder nur ein Hengst gelassen wird, die überflüssigen Hengst-Füllen aber geschnitten werden. Der Tabunen-Hengst steht den Stuten wie ein Hirt vor, und hält sie beysammen. Wenn aber eine Stute sich entfernt, und einen fremden Hengst zugelassen hat, soll er dieselbe nicht mehr in seinem Truppe leiden. Die Stuten werden gemeiniglich alle so beleget, daß die Füllen vom Febr. bis in den May fallen.

Die kirgisischen Schafe sind die größten und ungestaltesten von allem Woll-Viehe. Sie sind höher als ein neu gebornes Kalb, und so stark und schwer, daß die ausgewachsenen, bey guter Jahrszeit, gemeiniglich zwischen 4 und 5 Pud wiegen. Sie sehen, der Gestalt nach, den indianischen Schafen etwas ähnlich, haben sehr krumme Rammsköpfe, hervor ragende Unter-Lippen, große niederhängende Ohren, und öfters Warzen oder so genannte Haar-Glocken einzeln oder doppelt am Halse. An statt des Schwanzes tragen sie ungeheure runde, polsterförmige, und von unten fast ganz kahle Fett-Klumpen, welche bey starken Schafen oft 30 bis 40 Pfund wiegen, und 20 bis 30 Pfund Talg geben; und durch diese unterscheiden sie sich am meisten von den indianischen Schafen. Sie haben übrigens eine filzige und ziemlich lange, aber insonderheit am Hintertheile mit Haaren sehr vermischte Wolle. Ihre Farbe ist am gewöhnlichsten braun, oder braun-gefleckt, und nächst dieser ist die weiße die gemeinste. Die Widder sind durchgängig gehörnt, und auch unter den Hammeln gibt es mehr gehörnte, als ungehörnte; ja, man findet einige, welche, wie die ißländischen, 4, 5 bis 6 Hörner bekommen. Die Widder werden zwar den ganzen Sommer in der Heerde gelassen, man bin-

det

det ihnen aber, vom April bis in den Oct., einen Filz um den Leib, damit ſie die Schafe nicht belegen können. Im Oct. gibt man ihnen die Freyheit, und ſolcher Geſtalt fallen die Lämmer alle im Frühlinge. Eben dieſes Mittels bedient man ſich auch bey den Stieren. Den ganzen Winter hindurch ſuchen die Schafe ihr Futter unter dem Schnee ſelbſt, und freſſen auch Schnee ſtatt des Getränkes, wobey ſie wenig abfallen, und im Frühlinge gar bald die vorige Feiſtigkeit wieder erlangen. Dazu trägt der kurze Winter, und dieſer Umſtand viel bey, daß der Schnee auf den häufigen Salz-Stellen der Steppe ſehr geſchwinde vergeht, und dieſe Thiere durch den Genuß des ſalzigen Erdreiches gleichſam gemäſtet werden. Vielleicht iſt dieſer Umſtand auch die Urſache, warum die orientaliſche Raße von Schafen bey den Kirgiſen und Kalmücken nach und nach durch überflüſſiges Fett ausgeartet iſt, und, an ſtatt der Schwänze, ſolche unbehülfliche Fett-Polſter bekommen hat, welche Ungeſtaltheit nunmehr, da ſie einge-

Felle wegen erziehen. Diese haben, wie ihre Schafe, ein seltsames Ansehen, sind mehrentheils ungehörnt, an den Gliedern mit langen Haaren artig behangen, dabey gemeiniglich buntfleckig, und haben niederhängende Ohren.

Bey ihrem müßigen Hirten-Leben, ist die Jagd eine der gemeinsten Beschäftigungen der Kirgisen; wobey sie noch den Vortheil haben, daß sie die ihren Heerden gefährlichen Füchse und Wölfe los werden. Zur Jagd dieser Thiere bedienen sie sich abgerichteter Adler. Sie pflegen dieselben auch wohl zu Pferde auf der weiten Steppe zu jagen. Die Antelopen oder Saigaken, welche sie Akik nennen, halten sich im Winter meistens in schilfigen Gegenden auf; und weil sie sehr zart und leicht zu verwunden sind, stutzen die Kirgisen in einer kleinen Strecke das Schilf so hoch ab, daß die Spitzen desselben, die springenden Antelopen in den Leib verwunden müssen. Alsdann jagen sie diese Thiere nach solchen Stellen, und bemächtigen sich solcher Gestalt derselben gar leicht.

Die Kirgisen gelangen oft zu einem hohen Alter, und sind bis in ihre späteste Jahre munter und gesund. Ihre gemeinste Krankheiten sind: kalte Fieber, Husten, Engbrüstigkeit und Herzklopfen; auch die Lustseuche ist bey ihnen ziemlich stark eingerissen, und unter dem Nahmen Kurusaflan bekannt. Von bösartigen hitzigen Fiebern, die bey den Kalmücken so gefährlich sind, hat Hr. Pallas nichts erfahren. Aber mit den Pocken, welche sie Tschitschak nennen, werden sie nunmehr durch die Gemeinschaft mit den Europäern zuweilen angesteckt; sie fürchten diese Krankheit aber dergestalt, daß sie die Kranken, so bald sich Blattern äussern, verlassen, und ihnen zur Noth nur die Lebens-Mittel und Getränke von fern hinsetzen; nähert sich aber ein solcher Kranker ihren Wohnungen, so machen

sie

ren, Sir. 30, 10. 3) Von der natürlichen Sti
mancher Thiere, z. B. der Tauben, der Mewen,
Hühner, wenn sie einen Raub-Vogel sehen, wen
ihre Jungen locken, u. s. f. Die Turtel-Ta
kirren, wenn sie einander locken. Von der sanf
ängstlich klingenden Stimme der Tauben und ei
andern Vögel, ist im Hochd. das weichere girren
lich; obgleich Ezech. 7, 16. auch kirren in diesem
stande vorkommt: wie die Tauben in den Grün
die alle unter einander kirren.

2. Als ein Activum, vermittelst einer solchen
renden Stimme locken. 1. Eigentlich. So ki
die Hühner ihre Jungen, wenn sie solche zu eine
fundenen Speise locken, oder sie wegen eines gesehe
Raub-Vogels zu sich rufen. 2) In weiterer Bed
ung, durch vorgehaltene, oder hingelegte Speise
cken, in welchem Verstande die Jäger das Wild
kirren. Den Fuchs an einen bestimmten Ort
ren. Wo es aber auch aus Körnen entstanden
kann, welches gleichfalls in diesem Verstande
lich ist.

Daher die Kirrung, bey den Jägern, son
die Handlung des Kirrens, als auch der Ort, wo
man wilde Thiere kirret, wie auch die Lock-Sp
welche man dazu gebraucht. Ja, in weiterer Bed
ung wird es zuweilen für Speise überhaupt gebrau
So nehmen die Fasanen bey den Jägern ihre K
ung zu sich, wenn sie essen, oder sich äsen; wel
die Abstammung von Körnen zu bestätigen scheint.

3. Figürlich, für reitzen, locken, überhaupt, in
L. und der vertraulichen Sprech-Art.

2. Kirren, von kirre, zahm, zahm machen, im g.
und der vertraulichen Sprech-Art; wo aber auch
letzte Bedeutung des vorigen Zeitwortes Statt find

Kirrung, s. kurz vorher, auf dieser Seite.

Kirsche, eine Art des Stein-Obstes, welche in einer runden, gemeiniglich sehr saftigen Frucht an einem langen dünnen Stiele besteht, und die Frucht des **Kirsch-Baumes**, oder **Kirschen-Baumes**, welcher unter allem Stein-Obste am höchsten wächst, ist.

Der Nahme dieser Frucht lautet in den monseeischen Glossen mit versetztem r Chriesi, im Oberd. Kyrse, Kerse, Kerste, im Nieders. und Holländ. Karse, Kasse, Karsebeer, Kassebeer, zusammen gezogen Kasper, im Dän. und Schwed. Kirsebär, im Angels. Cyrse, im Franz. Cerise, im Ital. Ciregia, im Engl. Cherry, im mittlern Lat. Ciriegus, im Epirotischen Chiersy, im Alban. Kjersi, alle aus dem Lat. Cerasum, und Griech. Κερασος, indem das ganze westliche und nördliche Europa diesen Baum aus Italien bekommen hat. Nach dem Plinius (*), hat der römische Feldherr L. Lucullus, nach seinem Kriege mit dem Mithridates, zuerst im Jahre nach Erbauung der Stadt Rom 680, oder im 74sten Jahre vor der christl. Zeit-Rechnung, die Kirschen von Cerasum, oder Cerasuntis, einer Stadt in Pontus, in Klein-Asien, welche jetzt Chinisonda heißt, nach Rom gebracht; von da sind sie 120 Jahr hernach erst nach Brittanien gekommen; und die gemeine Meinung will, daß sie von dieser Stadt den Nahmen haben. Allein, in Griechenland war der Kirsch-Baum lange vorher bekannt; denn schon Diphilus Siphilus, der unter dem Lysimachius lebte, welcher einer von den Nachfolgern Alexander's des Großen war, erwähnt seiner (**); und da diese Frucht nicht in Klein-Asien, sondern in wärmern Ländern Asiens einheimisch ist, der Nahme sich auch schon in andern morgenländischen Sprachen findet, wie in dem persischen Keras, so ist glaublicher, daß gedachte Stadt von der Frucht den Nahmen habe, und daß dieser mit Korn, Kern, Hirse, entweder den Begriff der Runde, oder auch einer eßbaren Frucht überhaupt ausdrücke. Verwandt ist damit der Nahme der Kriechen,

(*) Cerasi ante victoriam Mithridaticam L. Luculli non fuere in Italia. Ad vrbis annum DCLXXX is primum vexit e Ponto, annisque CXX trans Oceanum in Britanniam vsque peruenere. *Plin.* Hist. L. 14. c. 25.

(**) *Athenæi* Deipnosoph. L. 2, p. 51.

ren, Sir. 30, 12. 3) Von der natürlich
machen Thiere, z. B. der T
Hühner, wenn sie einen Raub-Vogel seh
ihre Jungen locken, u. s. f. Die Tu
kirren, wenn sie einander locken. Vo
dergleich klingenden Stimme der Tau
andern Vögel, ist im Hochd. das wei
lich; obgleich Sach. 7, 16. auch kirr
stande vorkommt: wie die Tauben
die alle unter einander kirren.

2. Als ein Activum, vermittel
renden Stimme locken. 1. Ei
die Hühner ihre Jungen, wenn
fundenen Speise locken, oder si
Ruf-Zeichen zu sich rufen.
ung, durch vorgehaltene, ob
ren, in welchem Verstande
kirren. Den Fuchs an ei
ren. Wo es aber auch
kommen, welches gleichfall
lich ist.

Daher die Kirrung
die Handlung des Kir
man wilde Thiere ki
welche man dazu geb
ung wird es zuweil
So nehmen die J
rung zu sich, wen
die Abstammung

3. Figürlich,

...ers
...chwer,
...; daher
...n unter Ein
...Ausschließ
...Pflaumbaum)
... man aber im g. L.
eben

L. und der ver

2. Kirren, v

und der ver

sagte Bedeu

Kirrung.

und Aprikosen, Pflaumen,
Birnen nennen möchte;
Pflaumen-Geschlech-
Kirschen und Apri-
Baume, und den
Birnen und
werden, zu-
als wirk-
Geschlech-
chen unter-

igten Geschlech-
Der einblätterige,
ieste Einschnitte ab-
trägt 5 rundliche, ver-
ähnliche Blumenblätter,
ben, und umgibt den rundli-
gen Griffel sich mit einem teller-
endigt. Die rundliche Stein-
enthält eine gleichförmige Nuß.
Unter-Geschlechter, insonderheit Kir-
und Aprikosen, lassen sich durch ei-
schwer von einander unterscheiden.
diese von den Blättern, ehe sie noch hervor
oder von deren Lage in den Knospen, herge-
nommen, und diese bey den Kirschen an der Mitte zu-
sammen gebogen, conduplicata, bey den Pflaumen
aber aufgerollet, conuoluta, und mehr länglich, bey
den Aprikosen hingegen als herzförmige, beschrieben.
Hr. v. Münchhausen (*) aber nimmt das Unterscheid-
ungszeichen von dem Blüthstiele, und der äusserlichen
Beschaffenheit der Frucht. Kirschen, Pflaumen und
Aprikosen kommen zwar darin mit einander überein,
daß die Blumen und Früchte an einzelnen Stielen

(*) Im 3 Th. des Hausvaters, S. 339.

sitzen; die Kirschen aber haben einen langen Stiel, und ob gleich derselbe bey einigen Sorten kürzer ist, bleibt er doch länger als die Frucht; die Pflaumen haben durchgehends einen kurzen Stiel; und die Aprikosen, gar keinen. Die Frucht bey den Kirschen ist äusserlich glatt und glänzend ohne Staub; bey den Pflaumen mit einem feinen Staube bedeckt, und gleichsam gepudert; bey den Aprikosen, mit einem wollichten Wesen überzogen.

Man findet von Kirschen, in Ansehung der Frucht vielerley Sorten; und es ist nicht leicht zu bestimmen, welche davon als wirkliche oder beständige Arten, oder als Abänderungen und Spiel-Arten anzunehmen seyn möchten. Linné hat verschiedene wahre Arten bestimmt, alle aber bey uns in den Gärten vorkommende, dem Geschmacke, der Farbe, Gestalt und Größe nach unterschiedene Sorten mit einander vereinigt, und die Stamm-Mutter derselben Prunus Cerasus genannt. Die verschiedenen Sorten und Varietäten haben insgesammt folgenden Character.

1. Der Stamm und die Zweige aller Kirschbäume haben vier Rinden. Die erste, welche die andern alle bedeckt, ist zähe, stark und fest; die zweyte ist auch zähe, aber dünner, und nicht so hart, als die erste; die dritte ist sehr dünn, schwammig, und fast ohne Consistenz. Die Richtung der Fibern dieser drey Rinden geht über die Quere, und macht eine Zirkel- oder Spiral-Linie. Die vierte ist eine weiße, schwammige Substanz, deren Fibern nach der Länge der Zweige gerichtet sind.

2. Alle Kirschbäume haben drey Arten von Knöpfen oder Knospen: Holz-Knöpfe, Laub-Knöpfe, und Frucht-Knöpfe. Die Holz-Knöpfe sind nicht so dick, und spitziger als die andern, und stehen gemeiniglich am Ende der Zweige, welche nach der Stärke der Bäume derselben mehr oder weniger haben. Sie die-

Kirſche, eine Art des Stein-Obſtes, welche in einer runden, gemeiniglich ſehr ſaftigen Frucht an einem langen dünnen Stiele beſteht, und die Frucht des **Kirſch-Baumes**, oder **Kirſchen-Baumes**, welcher unter allem Stein-Obſte am höchſten wächſt, iſt.

Der Nahme dieſer Frucht lautet in den monſeeiſchen Gloſſen mit verſetztem r Chriesi, im Oberd. Kyrſe, Kerſe, Kerſte, im Niederſ. und Holländ. Karſe, Kaſſe, Karſebeer, Kaſſebeer, zuſammen gezogen Kaſper, im Dän. und Schwed. Kirſebär, im Angelſ. Cyrſe, im Franz. Ceriſe, im Ital. Ciregia, im Engl. Cherry, im mittlern Lat. Ciricgus, im Epirotiſchen Chiersy, im Alban. Kjersi, alle aus dem Lat. Ceraſum, und Griech. Κερασος, indem das ganze weſtliche und nördliche Europa dieſen Baum aus Italien bekommen hat. Nach dem **Plinius** (*), hat der römiſche Feldherr L. **Lucullus**, nach ſeinem Kriege mit dem **Mithridates**, zuerſt im Jahre nach Erbauung der Stadt Rom 680, oder im 74ſten Jahre vor der chriſtl. Zeit-Rechnung, die Kirſchen von Ceraſum, oder Ceraſuntis, einer Stadt in Pontus, in Klein-Aſien, welche jetzt Chiniſonda heißt, nach Rom gebracht; von da ſind ſie 120 Jahr hernach erſt nach Brittanien gekommen; und die gemeine Meinung will, daß ſie von dieſer Stadt den Nahmen haben. Allein, in Griechenland war der Kirſch-Baum lange vorher bekannt; denn ſchon **Diphilus Siphilus**, der unter dem **Lyſimachus** lebte, welcher einer von den Nachfolgern **Alexander's** des Großen war, erwähnt ſeiner (**); und da dieſe Frucht nicht in Klein-Aſien, ſondern in wärmern Ländern Aſiens einheimiſch iſt, der Nahme ſich auch ſchon in andern morgenländiſchen Sprachen findet, wie in dem perſiſchen Keras, ſo iſt glaublicher, daß gedachte Stadt von der Frucht den Nahmen habe, und daß dieſer mit **Korn**, **Kern**, **Hirſe**, entweder den Begriff der Runde, oder auch einer eßbaren Frucht überhaupt ausdrücke. Verwandt iſt damit der Nahme der **Kriechen**,

(*) Ceraſi ante victoriam Mithridaticam L. Luculli non fuere in Italia. Ad vrbis annum DCLXXX is primum vexit e Ponto, annisque CXX trans Oceanum in Britanniam vsque peruenere. *Plin.* Hiſt. L. 14. c. 25.

(**) *Athenæi* Deipnoſoph. L. 2. p. 51.

[redacted]

[redacted] Pflaumen, Holl. Cricke (*). [redacted] mischen, weil man den [redacted] Safte vermischt, ist endlich seltsam [redacted]

Sprichw. Nach braunen Kirschen steigt man hoch. Unter Kirschen wegen lässet man sich keine Mühe verdrießen. Ueberhaupt, eines Dinges wegen, das uns gut in den Augen stützt, lassen wir es uns schon sauer werden.

Mit großen Herren ist nicht gut Kirschen essen, denn sie pflegen einem Stängel und Steine in das Gesicht zu werfen, oder sie schießen mit Steinen, und werfen einem die Stängel an den Kopf. Vertraulicher Umgang mit den Großen der Erde hat seine bekannte Gefahren. Sie glauben immer, sich etwas vergeben zu haben, und rächen sich bey jeder Gelegenheit dafür. Dränge dich nicht zu ihrer Gesellschaft! Es kann Ausnahmen geben, aber die Regel bleibt. Insonderheit ist es, mit ihnen zu scherzen, bedenklich. Man kann sie nur zu leicht beleidigen; und sie sind eben nicht geneigt, Beleidigungen zu übersehen. Daher die trockne, aber wahre Bemerkung: Mit großen Herren ist nicht gut scherzen.

Verschiedene, im gem. Leben unterschiedene Bäume, insonderheit Aprikosen- Kirsch- und Pflaumen-Bäume, sind in Ansehung der Blüthe und Frucht dermaßen einander ähnlich, daß man dieselben schwer, oder gar nicht von einander unterscheiden kann; daher sie billig von den neuern Kräuter-Lehrern unter Ein Geschlecht gebracht worden sind, und, mit Ausschließung der andern, der Nahme Prunus (Pflaumbaum) allein beybehalten worden ist. Da man aber im g. L. eben

(*) Die große, schöne Kirsche ist ein ursprünglich asiatisches Gewächs. Die geringern Kirsch-Arten aber sind sicher einheimisch bey uns. Denn unser Landmann hat nicht allein einen eigenen Nahmen dafür, Kasselbeeren nähmlich und Quisselbeeren, sondern Plinius traf auch schon eine Kirschen-Art am Rheine an, die die asiatische Cerasum wohl noch nicht seyn konnte; und man findet sie auch wildwachsend in den Wäldern. Die fremde bessere Art haben indessen ohne Zweifel die Römer selbst schon unsern Vorwirthen bekannt gemacht und mitgetheilt, und die hörten den Nahmen wie Kerasum aussprechen, weil sie ihn Kersche, Kirsche, von je her [redacted] sprochen haben.

eben so wenig die Kirschen und Aprikosen, Pflaumen, als die Aepfel und Quitten, Birnen nennen möchte; so muß auch von jenen, mit dem Pflaumen-Geschlechte verwandten Arten, insonderheit Kirschen und Aprikosen, wie auch dem Lorbeerkirsch-Baume, und den Trauben-Kirschen, wie bey Aepfeln, Birnen und Quitten geschieht, besonders gehandelt werden, zumahl da Kirschen, Aprikosen und Pflaumen, als wirklich verschiedene Arten oder vielmehr Unter-Geschlechter angesehen, und durch merkliche Kennzeichen unterschieden werden können.

Der Kirschbaum hat mit den vereinigten Geschlechtern folgende Kennzeichen gemein. Der einblätterige, glockenförmige, in 5 stumpfe, vertiefte Einschnitte abgetheilte und abfallende Kelch, trägt 5 rundliche, vertiefte, ausgebreitete, einander ähnliche Blumenblätter, und 20 bis 30 Staubfäden, und umgibt den rundlichen Fruchtkeim, dessen Griffel sich mit einem tellerförmigen Staubwege endigt. Die rundliche Steinfrucht oder Beere enthält eine gleichförmige Nuß. Die vereinigten Unter-Geschlechter, insonderheit Kirschen, Pflaumen, und Aprikosen, lassen sich durch eigene Kennzeichen schwer von einander unterscheiden. Linné hat diese von den Blättern, ehe sie noch hervor brechen, oder von deren Lage in den Knospen, hergenommen, und diese bey den Kirschen an der Mitte zusammen gebogen, conduplicata, bey den Pflaumen aber aufgerollet, convoluta, und mehr länglich, bey den Aprikosen hingegen als herzförmige, beschrieben. Hr. v. Münchhausen (*) aber nimmt das Unterscheidungszeichen von dem Blüthstiele, und der äusserlichen Beschaffenheit der Frucht. Kirschen, Pflaumen und Aprikosen kommen zwar darin mit einander überein, daß die Blumen und Früchte an einzelnen Stielen

(*) Im 3 Th. des Hausvaters, S. 339.

sitzen; die Kirschen aber haben einen langen Stiel, und ob gleich derselbe bey einigen Sorten kürzer ist, bleibt er doch länger als die Frucht; die Pflaumen haben durchgehends einen kurzen Stiel; und die Aprikosen, gar keinen. Die Frucht bey den Kirschen ist äusserlich glatt und glänzend ohne Staub; bey den Pflaumen mit einem feinen Staube bedeckt, und gleichsam gepudert; bey den Aprikosen, mit einem wollichten Wesen überzogen.

Man findet von Kirschen, in Ansehung der Frucht vielerley Sorten; und es ist nicht leicht zu bestimmen, welche davon als wirkliche oder beständige Arten, oder als Abänderungen und Spiel-Arten anzunehmen seyn möchten. Linné hat verschiedene wahre Arten bestimmt, alle aber bey uns in den Gärten vorkommende, dem Geschmacke, der Farbe, Gestalt und Größe nach unterschiedene Sorten mit einander vereinigt, und die Stamm-Mutter derselben Prunus Cerasus genannt. Die verschiedenen Sorten und Varietäten haben insgesammt folgenden Character.

1. Der Stamm und die Zweige aller Kirschbäume haben vier Rinden. Die erste, welche die andern alle bedeckt, ist zähe, stark und fest; die zweyte ist auch zähe, aber dünner, und nicht so hart, als die erste; die dritte ist sehr dünn, schwammig, und fast ohne Consistenz. Die Richtung der Fibern dieser drey Rinden geht über die Quere, und macht eine Zirkel- oder Spiral-Linie. Die vierte ist eine weiße, schwammige Substanz, deren Fibern nach der Länge der Zweige gerichtet sind.

2. Alle Kirschbäume haben drey Arten von Knöpfen oder Knospen: Holz-Knöpfe, Laub-Knöpfe, und Frucht-Knöpfe. Die Holz-Knöpfe sind nicht so dick, und spitziger als die andern, und stehen gemeiniglich am Ende der Zweige, welche nach der Stärke der Bäume derselben mehr oder weniger haben. Sie

die-

In M. F. Ledermüllers Verſuch, bey angehender Frühlingszeit die Vergrößerungsgläſer zum nützlichen und angenehmen Zeitvertreib anzuwenden, Nürnb. 1764. f. enthält die 3te Ausgabe, den Anfang der Erklärung der 10 und 11 Tafel, welche die Kirſche mit ihrer Blüthe und Frucht, ſammt der Nachricht von der Bildung des Kernes, in der folgenden Ausgabe vorſtellt. Die 10 und 11 Tafel liefert die mikroſkopiſche Zergliederung der Blüthe der Kirſchen, und erklärt inſonderheit die Art der Entſtehung des Kernes und der Frucht.

5. Die Frucht des Kirſchbaumes iſt ſaftig, mit einer dünnen, ebenen und glatten Haut bedeckt. In derſelben findet man einen harten und holzigen Stein, welcher einen aus zwey Lappen und einem Keime beſtehenden Kern enthält. Die Größe, die Geſtalt, die Farbe, der Geſchmack ꝛc. der Frucht, ſind nach jeder Sorte verſchieden.

Ich werde die wirklich verſchiedenen und völlig beſtimmten Arten zuerſt anführen, und hernach von den veränderlichen Garten-Kirſchen handeln.

I. Die **Mahaleb-Kirſche, Mayalep, wohlriechender Kirſchbaum, Stein-Weichſel, Tintenbeere,** Ceraſus Mahaleb *Mill.* Ceraſus ſylueſtris amara, Mahaleb putata *Jo. Bauh.* et *du Ham.* Prunus Mahaleb, floribus corymboſis terminalibus, foliis ouatis *Linn.* Prunus Mahaleb, floribus corymboſis terminalibus, foliis ſubcordatis, petiolis glanduloſis *Duroi;* Fr. Le Mahaleb, Cerifier Mahaleb, Crenollier, Engl. The Mahaleb, Rock- or perfumed Cherry. Bisher hat man dieſen Baum auſſer Deutſchland, in Frankreich (inſonderheit im Herzogthume Barr bey der Stadt Saint Michel an der Maaß, in der Gegend eines Kloſters der Minoriten, welches den Nahmen St. Lucie führt, daher die Franzoſen das Holz Bois de Ste. Lucie nennen,) und in der Schweitz, als wildwachſend annehmen müſſen; da er aber von

Hrn.

Hrn. Rath Cranz (*) im Oeſtreichiſchen in der Gegend von Baden, und von Hrn. v. Bellheim, im J. 1765, in den Schiefer-Gebirgen an der Lahn, am Rhein und an der Moſel, beſonders in Feld-Hecken, in Menge gefunden worden iſt, kann man ihn mit Recht unter die deutſchen Gewächſe zählen. Die Blätter ſind ey- oder mehr herzförmig, vorn zugeſpitzt, hinten breit, dick und ſtark. Sie haben an 2 Zoll Länge, und an 1½ Z. Breite. Der Rand iſt fein ausgezackt. Beyde Flächen ſind von dunkelgrüner glänzender Farbe, und die untere iſt mit feinen Adern gezeichnet. Gemeiniglich ſind ſie überdies noch mit einigen kleinen Beuteln verſehen, ſo, daß ihre Figur im Ganzen den wilden Birnbaum-Blättern ſehr nahe kommt. Sie ſtehen theils zu 4 bis 5 Stück auf 1 Zoll langen, dünnen, grünen, mehrentheils mit zwey Drüſen beſetzten Stielen, theils in Büſcheln, theils einzeln wechſelweiſe an den Zweigen. Im Geſchmacke führen ſie etwas von bittern Mandeln mit ſich. Die Blumen ſind im May und Jun. anzutreffen; ſie ſind auf den Spitzen der Zweige traubenförmig befeſtigt. Die Blumendecke hat grüne, ovale, zurück gebogene Einſchnitte; die Blumenblätter ſind von weißer Farbe, und haben einen lieblichen Geruch. Die Frucht iſt eine ſchwarze glatte Beere, von ovaler zugeſpitzter, den gemeinen Holz-Kirſchen gleich kommender Geſtalt, in der Größe einer Erbſe, die einen bittern und unangenehmen Geſchmack hat, und deren Saft purpurfarbig iſt. Dieſe ſtehen gerade an einem Haupt-Stiele in die Höhe, und werden zu Ende des Jul. reif. Der Stein hat beynahe die Größe der Frucht, weil ihn wenig, und faſt unſchmackhaftes Fleiſch umgibt. Der Kern iſt von gutem Geruche, und etwas bitter. Die Rinde der Zweige iſt braun und glatt. Das Holz, welches, erwähnter Maßen, unter dem Nahmen St. Lucien-

Holz

(*) Stirp. Auſtr. Faſc. II. 60.

Holz verkauft wird, ist bräunlich, und hat im Anfange einen starken unangenehmen Geruch, wie unsere gemeine Trauben-Kirsche; je trockner es aber wird, desto mehr verliert sich derselbe, so, daß es zuletzt wohlriechend wird. Die von dû Hamel gelieferte Abbildung hat den Fehler, daß die Früchte nur parweise, und nicht natürlich traubenförmig, auch nicht scharf genug zugespitzt, vorgestellt sind.

Der Baum hält bey uns in freyem Lande aus, wächst in jedem, auch schlechtem steinigen Boden, und kann durch eingelegte Zweige, auch ohne Mühe durch die Beeren, vermehret werden. Man kann ihn auch auf Kirsch-Stämme pfropfen und oculiren. In der Schweitz wird der Stamm, wie Hr. v. Haller angibt, nur 6 F. hoch, und treibt die Aeste zwar gerade in die Höhe, aber buschig; dû Roi aber meldet, daß derselbe ein Strauch von mittlerer Größe werde, und höher zu wachsen scheine. Er wird am Rheine mit unter dem Schlag-Holze abgehauen. Unsere Winter schaden ihm nicht, und man kann auch nicht sagen, daß seine Blätter oder Zweige besonders von Insecten angefallen werden sollten. Weil die Vögel den Beeren nachgehen, dient er in Gehäge und Lust-Wälder, die zu solcher Absicht mit angelegt sind. Hr. v. Haller äussert die Muthmaßung, daß das Holz dieses Baumes mit dem Gregorius-Holze der Spanier, welches von dieser Nation wieder die Wuth so sehr gerühmt wird, einerley sey. Am Rheine nimmt man das Holz zu Wein-Pfählen, weil es länger, als anderes Holz, in der Erde dauern soll. Der vorzüglichste Gebrauch besteht aber wegen des Wohlgeruches in dessen Verarbeitung zu Kästchen, Vertäfelungen der Zimmer, u. d. m. Die Kerne der Frucht, welche unter dem Nahmen Magalep, oder Morgalep-Samen, in der Handlung geführt werden, sind etwas bitter von Geschmack, aber vom Geruche angenehm; es wird von denselben, wenn sie zerstoßen

stoßen worden sind, mit gemeinem oder Rosen-Wasser ein Wasser abgezogen, und dieses vornehmlich zu Verfertigung der wohlriechenden Seife gebraucht; auch werden die gestoßenen Kerne mit in den Teig zu wohlriechenden Seifen-Kugeln gemischt.

II. **Niedriger canadischer Kirschbaum**, Cerasus Canadensis, foliis lanceolatis glabris integerrimis, subtus caesiis, ramis patulis *Mill.* Cerasus pumila Canadensis, oblongo angulato folio, fructu parvo *Duham.* Prunus pumila, foliis angusto-lanceolatis serrulatis *Linn.* Fr. Cerisier nain a feuilles de Saule; Ragouminier, Nega, Minél *Duham.* Engl. Dwarf-Canada-Cherry, called Ragouminer, Nega, or Minel in Canada. Es wächst dieser niedrige Strauch in Canada, und also unter einem Himmels-Striche, mit dem der unsrige wohl in Vergleichung gebracht werden kann. Die Blätter sind länglich, ungefähr 3 Z. lang, und ½ Zoll breit, am Rande fein eingezackt, und auf kurzen Stielen befestigt. Beyde Flächen sind glatt und glänzend; die obere hat eine schöne grüne, und die untere eine meergrüne mehr bläuliche Farbe. Die Blumen kommen im May, mehrentheils zu 3 Stück neben einander hervor, und geben wegen ihrer häufigen Anzahl der Büsche ein artiges Ansehen. Die Blumendecke ist grün; die Blumenblätter sind weiß und klein, und die Staubbeutel gelb. Die Früchte sollen, nach Miller, in der Form den wilden Kirschen ähnlich seyn, im Geschmacke etwas Herbes haben, und im Jul. ihre Reife erhalten. In Harbke sind sie, wie Duroi meldet, noch alle Jahr abgefallen, so bald sie sich angesetzt hatten. Die äussere Rinde ist glatt, bey alten Zweigen braun, bey jungen Zweigen aber braunroth. Die Zweige sind dünn und biegsam.

Miller hat diesen Baum aus Kernen gezogen, die ihm Jüssieu aus Paris zugeschickt hatte. Nach seiner Angabe liegen auch die untern Zweige völlig in der Erde, trei-

treiben neue Wurzeln, und laſſen ſich als junge Pflanzen verſetzen. Dieſes hat Düroi bey dem Haupt-Stamme in Harbke nicht bemerkt; wohl aber, daß die Zweige tief an demſelben ſitzen, und ſich durch das Einlegen leicht vermehren laſſen. Seine Höhe iſt nicht beträchtlich. Miller gibt dieſelbe nur 4 Fuß an; Düroi aber hat dergleichen von 8 F. gezogen. Er breitet ſich ſehr in Seiten-Aeſte aus. Durch die Blätter, rothen Zweige und Blumen, zieret er ſeinen Platz; und weil die Vögel die Früchte aufſuchen ſollen, pflanzt man ihn in Frankreich in kleine Luſt-Wälder. Wegen der tief ſitzenden und biegſamen Zweige, könnte er auch niedrige lebhafte Hecken geben, wenn nur die Zweige nicht zu ſtark beſchnitten, ſondern mehr durch einander geflochten und mit einander verbunden würden.

In Canada wird der aus den Früchten gepreßte Saft hoch geſchätzt, und daraus ein gewürzhafter Eſſig zubereitet.

Andere ausländiſche Bäume, welche man auch gemeiniglich Kirſchen zu nennen pflegt, werden weiter unten vorkommen. Ich handle jetzt von der inländiſchen gemeinſten Art; dieſe iſt

III. Der **Holz-Kirſchbaum, Vogel-Kirſch-Baum, Wald-Kirſchbaum, wilde Kirſchbaum,** Cerafus major ſ. ſylueſtris fructu ſubdulci nigro colore ſufficiente *C. B.* Cerafus ſylueſtris fructu rubro & nigro *J. B.* Cerafus nigra, foliis ſerratis lanceolatis *Mill.* Cerafus major ſylueſtris, fructu cordato minimo ſubdulci, aut inſulſo *Duham.* Pronus avium, vmbellis ſeſſilibus, foliis ouato-lanceolatis, conduplicatis ſubtus pubescentibus *L.* Fr. Meriſier, Engl. The wild Cherry-Tree, the Mazzard. Deſſen Frucht heißt die **Holz-Kirſche, Holz-Weichſel, Karſebeere, Rasbeere, Resbeere, Roſerkirſche, Roſtebeere, Twieſelbeere, Vogel-Kirſche, wilde Kirſche, Wiſpelbeere, Wißbeere, Zwieſelbeere,** Cerafa acti-

ana

[illegible] Carduus tigris Tab. Der Baum wäch[s]
[illegible] xanischen Europa, und bey uns in
[illegible] Die Blätter sind an 4 F. lang, und
[illegible] Ende fein ſt weil zugeſpitzt, und ihr R
[illegible] Zähnen beſetzt. Die obere Fläch
[illegible] auf der untern aber fällt die F
[illegible] ſt weißlichen feinen Wolle, wei
[illegible] ſt überdies auch der Länge mit
[illegible] Die weiß[illegible] reihe nach den Seiten e
[illegible] deren Spitzen zu
[illegible] ſind. Die Stiele
[illegible] Die weiſſen Blumen erſcheinen e
[illegible] Farben nämlich im
[illegible] Die Kapſ. Frucht
[illegible] Die Samen werden
[illegible] Schwarz.
[illegible] Der Saam iſt weiß,
[illegible] Die Kapſ
[illegible] Die Zeit iſt
[illegible] ſchaften Se

Er lässet sich sehr leicht aus Kernen ziehen. Zu dieser Absicht lege man im Herbste Kerne von ganz reifen Früchten sofort in leichte Erde, 1 bis 1½ Z. tief, lasse die im folgenden Frühlinge hervor kommenden Pflänzchen 1 bis 2 Jahr stehen, pflanze sie dann mit verkürzter Pfahl-Wurzel, oben aber unverkürzt, in die Pflanz-Schule in 2½ F. weit von einander entfernte Reihen, und in den Reihen 1½ F. weit, ziehe sie hochstämmig mit einem 6 F. hohen Schafte, lasse sie dann rings umher eine Krone bilden, und pflanze sie endlich in Verzierungs-Plantagen von Wald-Bäumen u. d. gl.

Die jungen Stämme werden vor andern gewählt, wenn man durch Oculiren oder Pfropfen wohlschmeckendere Kirschen ziehen will, weil sie geschwinder wachsen, und länger dauern. Man säet sie deswegen in Baum-Schulen zu diesem Endzwecke aus; und dieses Verfahren ist besser, als wenn man sie aus den Wäldern nimmt und pflanzt. Diese Art verträgt so wenig, wie die andern Kirschbäume, das Abbrechen der Aeste und starke Beschneiden der Zweige, weil ihnen durch das auslaufende Gummi die Kraft benommen wird. Ist dieses Auslaufen noch nicht weit gegangen, so kann man den Zweig retten, wenn man die schadhafte Stelle ausschneidet, und mit Baum-Wachse oder Pech bedeckt. Die in gutem Grunde stehenden Kirschbäume sollen der Krankheit mehr unterworfen seyn.

Einer eigenen Art Raupen, welche sich auf den Vogelkirsch-Bäumen aufhält, wird weiter unten bey den Gartenkirsch-Bäumen Erwähnung geschehen.

Die Früchte locken viele Vögel, insonderheit Amseln und Krammetsvögel, herbey; und der Baum dient für Lust-Wälder, die er durch die Blumen und Früchte ziert.

Wenn die reifen Vogel-Kirſchen mit dem
zerſtoßen und in Branntwein gethan werden,
ſie ihm einen Pfirſich-Geſchmack mit.

Aus den mit den Kernen zerſtoßenen, und
Bier-Hefen in Gährung gebrachten Vogel-Ki
läſſet ſich durch die Deſtillation ein vortrefflicher Br
Wein bereiten. Wenn nähmlich die reifen Ki
von den Stielen abgezupfet ſind, werden ſie gan
geſtampfet, und in ein aufgeſchlagenes Faß g
hierauf wird ſo viel lauliches Waſſer gegoſſen,
die Kirſchen oben bedecke, und, wohl zugedeckt
Gährung an einen warmen Ort geſtellet. Der
lich ſpirituöſe Geruch ungefähr nach 14 Tagen w
gen, ob die Gährung vollkommen ſey. Wenn
3 oder 4 Metzen Kirſchen hat, wird alsdann un
Zeit 1 Metze Malz-Schrot mit laulichem Waſſ
gerührt, und hernach werden ungefähr 7 Maß
Waſſer darauf gegoſſen. Wenn dieſer Meiſch g
verkühlt iſt, werden demſelben die Hefen gegeben
dann wird, nach vollendeter Gährung, das Gut
Kirſchen geſchüttet, und ſogleich auf die Art und
wie der gemeine Korn-Branntwein, gebrannt.
das Rectificiren erhält man einen Spiritus, de
Franz-Branntweine faſt nichts nachgibt. Dur
Alter wird er angenehmer und ſtärker. Zuweilen
verfälſcht, indem man ihn aus Pflaumen deſt
Der unverfälſchte, mit Citronen-Safte, Zucke
heißem Waſſer vermiſcht, gibt ein Getränk, w
dem Punſche ziemlich nahe kommt.

Aus den Kirſchen wird inſonderheit in der Schw
Branntwein deſtilliert, den ſelbſt der an ſeine lec
queurs gewöhnte Franzoſe zu ſchätzen weiß, und m
chem der Schweitzer einen einträglichen Handel
Nach Andreä Beſchreibung, in ſeinen Briefen a
Schweitz, Zürich, 1776, gr. 4. S 301, wird der
tus daſelbſt auf folgende Weiſe, meiſtens aus friſche
auch aus trocknen, gemacht. Man nimmt ſo viel

einiglich schwarze, wilde Kirschen, als man will,
, und füllet damit ein Faß so weit, daß für die
Raum genug bleibt. Diese Kirschen stößt man
e mit einem großen Holze, nur in so weit, daß
zerquetscht werden, und läßet solche, ohne Wasser
nun, in dem Fasse gähren. Die Gährung ge-
ch dem das Gefäß mäßig warm steht, und die
ist, in 14 Tagen, auch 3 bis 4 Wochen. Bey
g müssen solche um den andern Tag umgerühret,
en stehenden immer wieder hinunter gedrückt,
uch, während der Gährung, mit einem Tuche
darüber, so gut als möglich, vermachet werden.
eichen der vollendeten Gährung ist, daß es ruhig
eht, das Dicke sich zu Boden gesetzt hat, und
klar ist. Hat man nun sogleich nicht Zeit zum
so schadet es nichts, und kann man es in dem
wohl vermacht, stehen lassen. Wenn man es
abzieht, so ist zu beobachten, daß man es, indem
kupfernen Blase anfängt zu kochen, nochmahls
ühre, um das Anbrennen zu verhüten. Was
t, hat die gehörige Güte, so lange es schön klar
as folgende, welches man Nachbrand nennt, ist
d schwach, und wird zu einer künftigen Destilla-
t, da es denn rectificirt übergeht und ungefähr

s trocknen Kirschen Spiritus zu erhalten, brü-
lche, nachdem damit ein Faß angefüllet worden
rmem Wasser an, daß es ½ Elle darüber stehe,
noch Raum genug zum Gähren bleibe. Dies
uweilen langsamer von Statten; sonst erfordert
Handhabung, wie mit den frischen Kirschen, und
Art zu destillieren.

en mit den Kernen zerstoßenen Kirschen und
tem Wasser, wird das so genannte schwarze
Wasser, Aqua cerasorum nigrorum, destil-
Man hat auch in den meisten Apotheken den
n Kirsch Syrupp, welcher, wegen seines
en Geschmackes, andern unangenehm schmek-
zeneyen zugesetzt wird.

Man hält die schwarzen Kirschen in den Krankheiten des Hauptes, in der Epilepsie, dem Schlage und der Lähmung, besonders für dienlich. Man gibt die frischen Früchte zu essen. Von den Kirschen wird in der Schweitz auch eine große Menge gedörret, und dient sodann dem Volke des Winters zu einer angenehmen und gesunden Speise. Den daraus destillierten Branntwein, Geist, oder Spiritus, preiset Faber beym Stottern und andern Fehlern der Sprache an, wenn man nähmlich den Mund zum öftern damit ausspühlt. Keßler versichert, daß ein vom Schlage Gerührter, die Sprache wieder bekommen habe, nachdem er dergleichen Kirsch-Branntwein getrunken hat. Das destillierte Kirsch-Wasser ist angenehm und erquikkend. Rajus meldet, daß dasselbe in England bey dem Frauenzimmer sehr beliebt, und wieder convulsivische Bewegungen, vornehmlich der Kinder, gebräuchlich sey. Allein, ungeachtet dasselbe ehemahls sehr häufig in Mixturen gebraucht wurde, und auch noch jetzt zuweilen gebraucht wird, so ist es doch vielen verdächtig; ja die englischen Apotheker-Bücher haben es ganz aus der Zahl der Arzeney-Mittel ausgestrichen, wegen der Aehnlichkeit, die es mit dem Wasser der Lorbeerkirsch-Blätter hat, wie sein Geschmack, Geruch, und von einigen Aerzten in Worcester bey Thieren angestellte Versuche, gezeigt haben. Man hat aber hierzu ein sehr gesättigtes Wasser genommen, welches noch dazu bloß aus den zerstoßenen Kirsch-Kernen destilliert war; denn aus 14 Pfund Kerne hat man nur 2 Pinten (32 Unzen) Wasser abgezogen (*). Die würtembergische Pharmacopöe befiehlt, den Kirschen die doppelte Menge Wasser zu zusetzen, und so viel Wasser abzuziehen, als [illegible] Kirschen genommen hat. Die schwedische Pharmacopöe [illegible]lässet nur so viel Wasser hinzu setzen, als erfor-

der-

derlich ist, das Anbrennen zu verhüten; sie bestimme hierzu gleiche Theile Kirschen und Wasser. Dieses in den Apotheken befindliche Wasser ist gemeiniglich so verdünnt, daß man nicht leicht befürchten darf, daß es zarten Kindern Convulsionen errege, wiewohl Mead (*) anderer Meinung ist. Tadelnswerth aber ist es, wenn man, statt der Kirschen, bittere Mandeln zu seiner Bereitung nimmt.

Die innere Rinde dieses Baumes unter den Rauch-Toback gemischt, ertheilt demselben einen angenehmen Geruch. Eingenommen, vertreibt sie die Wechsel-Fieber, und macht oft die China-Rinde entbehrlich. Die Rinde ist auch in der Färberey zu gebrauchen. Der mit der Rinde des Kirschbaumes angestellten Versuche zum Färben wird weiter unten Erwähnung geschehen.

In einigen asiatischen Provinzen des russischen Reiches, wo die Einwohner sehr mit Wanzen geplagt sind, räuchern sie die Stuben mit Vogelkirsch-Blüthen aus, welches ein untriegliches Mittel dawieder seyn soll.

Die alten Bäume liefern ein vortreffliches Holz zu Tischler und Drechsler-Arbeiten, welches eine feine röthliche Farbe, und vor dem gemeinen Kirschbaum-Holze den Vorzug hat. Kohl- und Brenn-Holz gibt es von geringer Güte; und im Wetter ist es von kurzer Dauer. Von jungen Bäumen macht man in Frankreich gute Faß-Reife.

Das Gummi oder Harz schwitzet von selbst aus der Rinde des Baumes aus, und sieht gelbröthlich aus. Linné schreibt dasselbe dem rothen sauern Kirsch-Baume zu; allein, es schwitzt häufiger aus diesem Waldkirsch-Baume aus. Weil es den Glanz und die Farbe des Goldes hat, wird es an einigen Orten in Nieder-Sach-

(*) De venenis. Opp. To. 2. p. 196.

ſen Katzen-Gold oder Katzen-Klar genannt. Dur
Waſſer läſſet ſich dieſes Gummi in einen Schleim au
löſen, und kommt in ſeinen Eigenſchaften ziemlich m
dem arabiſchen Gummi überein; es wickelt nähmli
die Schärfe ein, erweicht, macht ſchlüpfrig, und iſt
der Ruhr, Strangurie, Steinſchmerzen ꝛc. wirkſa
Man braucht es auch, die Haare damit wegzuätzen:
muß aber fein hellbraun und rein ſeyn.

IV. **Garten-Kirſchbaum**, Ceraſus vulgaris, f
liis ovato-lanceolatis ſerratis *Mill.* Ceraſus vulgar
fructu rotundo *Duham.* Prunus Ceraſus umbellis ſe
libus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis glab
L. Fr. le Cerifier; in der Provence Pichot. En
The common or Kentish Cherry. Deſſen Fruc
heißt die **gemeine** oder **Garten-Kirſche**. Li
gibt Europa allgemein als das Vaterland der Gart
Kirſchen an, ohne doch einen Theil deſſelben zu beſti
men. So viel wiſſen wir, daß ſie von den Römern
Italien, und von dort aus in unſere nördliche Geg
den gebracht ſind, es mag ſie nun Lucullus, (ſ. ob
S. 21,) oder ein Anderer, zuerſt bekannt gema
haben. Tournefort hat ſie um das ſchwarze Meer
den Wäldern wild gefunden.

Die Blätter ſind oval zugeſpitzt, auf beyden S
ten glatt, hellgrün, und am Rande ausgezackt.
Blatt-Stiel iſt mit zwey Drüſen beſetzt. Die B
men haben kurze Stiele. Die Früchte werden ku
rund und roth. Die äuſſere Haut iſt dick. Das Fle
iſt mit einem ſauern Safte angefüllt. Der Kern
etwas platt gedrückt. Die Zeit ihrer Reife fällt
der Mitte des Jun., bis zu Ende des Jul., ein.
Rinde des Stammes und der Aeſte iſt glänzend bra
Das Holz kommt in ſeiner Güte und Farbe mit d
von der vorigen Art überein.

Der Baum wächſt nicht ſehr in die Höhe,
der Wuchs der Zweige bleibt ſperrhaft.

Ob diese Kirsche die Stamm-Mutter aller übrigen in den Gärten vorkommenden Sorten von Kirschen sey, oder ob diese selbst aus der vorhergehenden dritten Art erzeuget, und nachher auf andere und mannichfaltige Weise verändert werden, oder ob vielmehr zwey ursprünglich verschiedene Arten anzunehmen, und beyde durch die Kunst in verschiedene Sorten ausgeartet seyn, lässet sich nicht füglich bestimmen. Linné nimmt das letzte an, dem auch v. Münchhausen beypflichtet, doch diese zwey Stamm-Arten noch mit zwey andern vermehrt, und die Glas-Kirsche, und weiße süße Kirsche nicht für Spiel- sondern Stamm-Arten ausgibt, wenigstens für solche, welche nicht unter einander ausarten, und z. B. aus Kernen von schwarzen Kirschen niemahls Bäume erzeuget werden, welche weiße Kirschen tragen. Zwischen den sauern und süßen Kirschen (*) muß auch um deswillen ein wahrer Unterschied Statt finden, weil man nicht füglich ein Auge von der einen, auf einen Stamm von der andern oculiren kann. Man muß vielmehr saure auf saure, und süße auf süße Kirsch-Stämme oculiren, wenn die Bäume ein gutes Ansehen und Wachsthum haben sollen. Doch sollen, nach Hrn. Past. Henne Erfahrungen, wie ich weiter unten anführen werde, süße Kirschen auf sauern Stämmen recht gut fortkommen, ob gleich das Gegentheil nicht Statt findet. Die süßen Kirschen werden im Holze allezeit dicker, und der darauf gepfropfte Zweig von einer sauern Kirsche wird gegen den übrigen Theil des Stammes kein Verhältniß haben; und eben so wird auf sauern Kirschen ein Zweig der süßen Art dicker und unförmlicher, als der Stamm, ausfallen. Es ist auch merkwürdig,

(*) Ein süßer Kirsch-Stamm unterscheidet sich von einem sauern dadurch, daß jener einen weißgrauen Schaft, hellgrüne, große, faltige, mehr längliche, dünne und sehr zackige Blätter; der saure hingegen einen dunkelgrauen Stamm, kleine, glatte, dicke, dunkle, und wenig, aber sehr regulär ausgezackte Blätter hat.

sen Katzen-Gold oder Katzen-Klar genannt. Durch Wasser lässet sich dieses Gummi in einen Schleim auflösen, und kommt in seinen Eigenschaften ziemlich mit dem arabischen Gummi überein; es wickelt nähmlich die Schärfe ein, erweicht, macht schlüpfrig, und ist in der Ruhr, Strangurie, Steinschmerzen ꝛc. wirksam. Man braucht es auch, die Haare damit wegzuätzen: es muß aber fein hellbraun und rein seyn.

IV. **Garten-Kirschbaum**, Cerasus vulgaris, foliis ovato-lanceolatis serratis *Mill.* Cerasus vulgaris, fructu rotundo *Duham.* Prunus Cerasus umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis glabris *L.* Fr. le Cerisier; in der Provence Pichot. Engl. The common or Kentish Cherry. Dessen Frucht, heißt die gemeine oder Garten-Kirsche. Linné gibt Europa allgemein als das Vaterland der Garten-Kirschen an, ohne doch einen Theil desselben zu bestimmen. So viel wissen wir, daß sie von den Römern in Italien, und von dort aus in unsere nördliche Gegenden gebracht sind, es mag sie nun Lucullus, (s. oben, S. 21,) oder ein Anderer, zuerst bekannt gemacht haben. Tournefort hat sie um das schwarze Meer in den Wäldern wild gefunden.

Die Blätter sind oval zugespitzt, auf beyden Seiten glatt, hellgrün, und am Rande ausgezackt. Der Blatt-Stiel ist mit zwey Drüsen besetzt. Die Blumen haben kurze Stiele. Die Früchte werden kugelrund und roth. Die äussere Haut ist dick. Das Fleisch ist mit einem sauern Safte angefüllt. Der Kern ist etwas platt gedrückt. Die Zeit ihrer Reife fällt von der Mitte des Jun., bis zu Ende des Jul., ein. Die Rinde des Stammes und der Aeste ist glänzend braun. Das Holz kommt in seiner Güte und Farbe mit dem [illegible] vorigen Art überein.

[illegible] Baum wächst nicht sehr in die Höhe, und [illegible] der Zweige bleibt sperrhaft.

Ob

Ob diese Kirsche die Stamm-Mutter aller übrigen in den Gärten vorkommenden Sorten von Kirschen sey, oder ob diese selbst aus der vorhergehenden dritten Art erzeuget, und nachher auf andere und mannichfaltige Weise verändert werden, oder ob vielmehr zwey ursprünglich verschiedene Arten anzunehmen, und beyde durch die Kunst in verschiedene Sorten ausgeartet seyn, lässet sich nicht füglich bestimmen. Linné nimmt das letzte an, dem auch v. Münchhausen beypflichtet, doch diese zwey Stamm-Arten noch mit zwey andern vermehrt, und die Glas-Kirsche, und weiße süße Kirsche nicht für Spiel- sondern Stamm-Arten ausgibt, wenigstens für solche, welche nicht unter einander ausarten, und z. B. aus Kernen von schwarzen Kirschen niemahls Bäume erzeuget werden, welche weiße Kirschen tragen. Zwischen den sauern und süßen Kirschen (*) muß auch um deswillen ein wahrer Unterschied Statt finden, weil man nicht füglich ein Auge von der einen, auf einen Stamm von der andern oculiren kann. Man muß vielmehr saure auf saure, und süße auf süße Kirsch-Stämme oculiren, wenn die Bäume ein gutes Ansehen und Wachsthum haben sollen. Doch sollen, nach Hrn. Past. Henne Erfahrungen, wie ich weiter unten anführen werde, süße Kirschen auf sauern Stämmen recht gut fortkommen, ob gleich das Gegentheil nicht Statt findet. Die süßen Kirschen werden im Holze allezeit dicker, und der darauf gepfropfte Zweig von einer sauern Kirsche wird gegen den übrigen Theil des Stammes kein Verhältniß haben; und eben so wird auf sauern Kirschen ein Zweig der süßen Art dicker und unförmlicher, als der Stamm, ausfallen. Es ist auch merkwürdig,

(*) Ein süßer Kirsch-Stamm unterscheidet sich von einem sauern dadurch, daß jener einen weißgrauen Schaft, hellgrüne, grobe, faltige, mehr längliche, dünne und sehr zackige Blätter; der saure hingegen einen dunkelgrauen Stamm, kleine, glatte, dicke, dunkle, und wenig, aber sehr regulär ausgezackte Blätter hat.

würdig, daß es keine weiße saure Kirschen gibt, da man doch sowohl schwarze, als rothe, oder braune, von beyderley Geschmacke hat. Ich werde zuerst die vier Haupt-Sorten, welche Hr. v. Münchhausen als so viele wirkliche Abarten annimmt, anführen, und hernach deren weitere Abweichungen angeben.

A. Schwarze süße Kirschen, davon es zweyerley Sorten gibt, als: a) weiche, saftige runde, mit einem runden Steine; diese nennt man schlechthin schwarze Kirschen, oder Weichseln, Kastebeer, Holl. Kriecken, Fr. Guignes, und scheinen von der dritten Art abzustammen. b) Lange, herzförmige, am Fleische härtere, mit einem länglichen Steine, welche man schwarze Herz-Kirschen, oder Knorpel-Kirschen, Fr. des Cerises d' Espagne oder Coeurets noirs, nennt.

B. Weiße Kirschen, welche ebenfalls diesen doppelten Unterschied zeigen, als: runde, welche schlechtweg weiße Kirschen, Fr. Cerises blanches, heißen, und lange herzförmige, welche man weiße Herz-Kirschen, oder Eyer-Kirschen, Fr. Coeurets blancs, oder, wenn sie bunt sind, Bigarreaux nennt. Die weißen Kirschen, welche gar nichts rothes haben, nennt man auch Wachs-Kirschen, weil sie die Farbe vom gelben Wachse haben. Von allen diesen Sorten werde ich weiter unten besonders handeln.

C. Saure Kirschen. Es gibt deren zweyerley Arten: 1. recht saure, von Einigen Emmerling oder Blader-Kirsche genannt. Wenn solche groß, dunkelroth oder schwarz und saftig sind, nennt man sie Morellen, Morillen, Marellen, Marillen, Amarellen, Amorellen (*), Holl. Moerellen. 2. Säuerlich

(*) Einige nennen auch die Herz-Kirschen, und Andere die so genannten Herzen Kirschen mit diesem Nahmen, welches aber ein Mißbrauch desselben ist. Der Nahme ist zunächst [illegible] Amarus, Amarella, welches aus Cerasum armeni-

lich ſüße Kirſchen, Fr. Griottes, welche dem Geſchmacke nach zu den angenehmſten gehören, und gleichſam das Mittel zwiſchen den ſauern Amarellen und der Glas-Kirſche ausmachen. Die Holländer nennen dieſe und alle weiche Kirſchen, Kerſſen. Der Amarellen wird weiter unter wieder Erwähnung geſchehen.

D. Glas-Kirſchen, L. Cerasus carne tenera & aquosa C. B. Cerasus Juliana L. Fr. Guindoliers. Die Frucht iſt hellroth, halb klar und faſt durchſichtig, rund, etwas platt gedrückt, mit einem weißen ſüßlichen Safte. Ich werde weiter unten ein mehreres davon ſagen.

Die Franzoſen pflegen den verſchiedenen Kirſchen-Sorten die Haupt-Benennung nach der äuſſerlichen Geſtalt derſelben zu geben, nach dem ſolche herzförmig oder rund, iſt. Zu den herzförmigen Kirſchen rechnen ſie: 1. die cultivirten Sorten des Merisier, oder Waldkirſch-Baumes, deren Früchte länglich, meiſt ſchwarz und von ſüßem Geſchmacke ſind; 2. die verſchiedenen Sorten des Guignier, deren Früchte ein zartes und wäſſeriges Fleiſch haben, und entweder roth, oder ſchwärzlich, oder roth und weiß, ſind; 3. die verſchiedenen Sorten des Bigareautier, oder Herzkirſch-Baumes. Zu den runden Kirſchen rechnen ſie: 1. die rothen und weißen Sorten des eigentlich ſo genannten Cerisier; 2. die Sorten des Griottier, wohin die ſauern, und die mehreſten ſäuerlich ſüßen Kirſchen gehören.

Ueberhaupt aber iſt man in Frankreich, ſelbſt in den Benennungen der Haupt-Arten der Kirſchen, nicht allemahl mit einander einig. Z. B. in Poitou heißt Guigne, was in Paris Cerise heißt; in Poitou heiß Cerise, was in Paris Merise heißt; in Poitou heißt Guindoux, was in Paris Griotte heißt. Daher iſt es, ſo lange die Arten und Varie-

armeniacum zuſammen gezogen ſeyn ſoll, weil dieſe Kirſchen zuerſt aus Armenien gekommen ſind. Henisch hat Amelbeer, und ſetzt dazu Cerasum Julianum. In einer Urkunde von 1300 beym du Fresne, wird Amarina ſchon von einer Art ſäuerlicher Kirſchen gebraucht, und in einem 1501 zu Rom gedruckten deutſchen und ital. Vocabularis heißt es: Cerase, Kyrſen, la marasche, die Wichlen (Weichſeln), le verte, die Ambreie.

auch zwergig, ziehen, und kam alſo in alle Gärten und Plantagen aufgenommen werden.

Man unterſcheidet hiervon auch die **Bouquet-Kirſche**, Cerasus ſativa, fructus rotundos acidos, ex pediculo plures ferens *Duham.* Fr. Cerisier à bouquet. Dieſes iſt eine andere Art von gefüllten Blumen. Denn an ſtatt, daß ſonſt in jeder Blume nur Ein Staubweg iſt, ſind hier verſchiedene, deren jeder ein beſonderes Eychen befruchtet, und von welchen zuweilen 2, 3 bis 5 an Einem Stiele zur Reife kommen. Sie wird auch **Trauben-Kirſche, Traubel-Kirſche, Träubel-Kirſche**, Fr. Ceriſe à grappes, genannt.

J. C. v. Henne, in Hameln, nennt ſie **Doppel-Kirſche**, und ertheilt davon im 10 St. der Hannov. gel. Anz. v. J. 1752, Col. 165, folgende Nachricht: „Ich verſtehe unter Doppel-Kirſche nicht einen ſolchen Kirſchbaum, welcher, wie die Doppel-Birn, zweyerley verſchiedene Kirſchen, zu zwey verſchiedenen Zeiten in Einem Jahre hervor bringt, ſondern einen ſolchen, der ſowohl einfache, als auch eine Menge doppelter Kirſchen erzielt, ſo, daß an einem einzigen Kirſch-Stängel, der doch nicht dicker, als ein anderer iſt, 2, 3, 4, 5, 6 und mehrere Kirſchen befindlich ſind.

„Um aber dieſen Baum mit ſeinen Früchten näher kennen zu lernen, ſo muß davon ferner bemerken, daß derſelbe zugleich mit der frühreifen Kirſche in der Blüthe ſteht, auch mit dieſer zu gleicher Zeit zur Reife gelangt.

„Wenn man nun von ſolchen Früchten welche abbrechen will, ſo ſieht man mit der größten Verwunderung, auſſer den einfachen Kirſchen, oder denen, da ein Stängel nicht mehr denn Eine Kirſche trägt, auch eine Menge von ſolchen Kirſchen, da an einem einzigen dünnen Kirſch-Stängel 2, 3, 4, ja zuweilen bis 9 Kirſchen ſich befinden, deren jede beynahe eben ſo groß, als eine einfache Kirſche iſt, und deren jede einen Kirſch-Kern enthält, dergeſtalt, daß man an einem einzigen Kirſch-Stängel gleichſam ein von der Natur formirtes Bouquet Kirſchen erblickt.

„Daß aber auf einem ſolchen Baume nicht wenige der Doppel-Kirſchen erzeuget werden, iſt daraus abzunehmen, weil beynahe der 6 oder 7te Theil aller auf dieſem Baume be-

Durchschnitte, der Länge nach mit einer merklichen Naht bezeichnet; die Haut ist dick und hellroth; das Fleisch weiß, wo es aber mit dem Steine verwachsen ist, röthlich; und der Saft sauer. Sie tragen häufig, wollen aber offen, und nicht durch andere Bäume beschattet stehen. Diejenigen Aeste, welche Früchte getragen haben, werden zu Ende des Jahres trocken, und fallen im Winter ab. Die Frucht ist nicht von großem Werthe; daher man diese Bäume nur der Seltenheit wegen in Plantagen und Gärten zieht, und durch Pfropfen oder Oculiren vermehrt.

2. Gefüllter Kirschbaum, oder Kirschbaum mit halbgefüllter Blume, Cerasus vulgaris duplici flore *Duham.* Fr. Cerisier à fleur semi-double, Engl. The double-flowering Cherry, double-blossomed Cherry, wird wegen der schönen großen und gefüllten Blüthen in Gärten unterhalten. Jede Blume besteht aus 15 bis 20 Blumenblättern, in deren Mitte sich jedoch noch viele Staubfäden mit ihren Staubbeuteln, an statt des Stämpels aber gemeiniglich kleine grüne Blättchen (folia stipulacea) zeigen. Diese sind gänzlich unfruchtbar; doch findet man auch einige mit vollkommenem Stämpel, und nach diesem folgen mittelmäßig große, hellrothe, eben nicht fleischige, und vom Geschmack saure Früchte. Der Stein ist alsdann glatt und herzförmig. Der gemeine Kirschbaum hat zur Zeit seiner Blüthe ein gefallendes, der mit gefüllten Blumen aber ein bezauberndes Ansehen, und macht mit seiner schwelgerischen Blüthe, welche so gefüllt als eine weiße Rose ist, und an dem ganzen Baume überall in Menge erscheint, auf die Einbildungskraft einen frappanten Eindruck. Hochstämmig, und in der Ferne gleicht er einem Ballen Schnee; und je mehr man sich ihm nähert, desto mehr Vergnügen gewährt sein Anblick. Am sichersten pflanzt man ihn durch das Pfropfen und Oculiren fort; und er lässet sich sowohl hochstämmig, als

auch

Wenn die reifen Vogel-Kirschen mit dem Kerne zerstoßen und in Branntwein gethan werden, theilen sie ihm einen Pfirsich-Geschmack mit.

Aus den mit den Kernen zerstoßenen, und durch Bier-Hefen in Gährung gebrachten Vogel-Kirschen, läßet sich durch die Destillation ein vortrefflicher Branntwein bereiten. Wenn nähmlich die reifen Kirschen von den Stielen abgezupfet sind, werden sie ganz klein gestampfet, und in ein aufgeschlagenes Faß gethan; hierauf wird so viel lauliches Wasser gegossen, daß es die Kirschen oben bedecke, und, wohl zugedeckt, zur Gährung an einen warmen Ort gestellet. Der säuerlich spirituöse Geruch ungefähr nach 14 Tagen wird zeigen, ob die Gährung vollkommen sey. Wenn man 3 oder 4 Metzen Kirschen hat, wird alsdann um diese Zeit 1 Metze Malz-Schrot mit laulichem Wasser eingerührt, und hernach werden ungefähr 7 Maß heißes Wasser darauf gegossen. Wenn dieser Meisch gehörig verkühlt ist, werden demselben die Hefen gegeben; alsdann wird, nach vollendeter Gährung, das Gut zu den Kirschen geschüttet, und sogleich auf die Art und Weise, wie der gemeine Korn-Branntwein, gebrannt. Durch das Rectificiren erhält man einen Spiritus, der dem Franz-Branntweine fast nichts nachgibt. Durch das Alter wird er angenehmer und stärker. Zuweilen ist er verfälscht, indem man ihn aus Pflaumen destilliert. Der unverfälschte, mit Citronen-Safte, Zucker und heißem Wasser vermischt, gibt ein Getränk, welches dem Punsche ziemlich nahe kommt.

Aus den Kirschen wird insonderheit in der Schweitz ein Branntwein destilliert, den selbst der an seine leckere Liqueurs gewöhnte Franzose zu schätzen weiß, und mit welchem der Schweitzer einen einträglichen Handel treibt. Nach Andreä Beschreibung, in seinen Briefen aus der Schweitz, Zürich, 1776, gr. 4. S. 301, wird der Spiritus daselbst auf folgende Weise, meistens aus frischen, doch auch aus trocknen, gemacht. Man nimmt so viel frische kleine,

kleine, gemeiniglich schwarze, wilde Kirschen, als man will, ohne Stiele, und füllet damit ein Faß so weit, daß für die Gährung Raum genug bleibt. Diese Kirschen stößt man in dem Fasse mit einem großen Holze, nur in so weit, daß die meisten zerquetscht werden, und lässet solche, ohne Wasser hinzu zu thun, in dem Fasse gähren. Die Gährung geschieht, nach dem das Gefäß mäßig warm steht, und die Partie groß ist, in 14 Tagen, auch 3 bis 4 Wochen. Bey der Gährung müssen solche um den andern Tag umgerühret, und die oben stehenden immer wieder hinunter gedrückt, das Faß auch, während der Gährung, mit einem Tuche und Deckel darüber, so gut als möglich, vermachet werden. Das beste Zeichen der vollendeten Gährung ist, daß es ruhig und stille steht, das Dicke sich zu Boden gesetzt hat, und oben alles klar ist. Hat man nun sogleich nicht Zeit zum Brennen, so schadet es nichts, und kann man es in dem Fasse, doch wohl vermacht, stehen lassen. Wenn man es dann aber abzieht, so ist zu beobachten, daß man es, indem es in der kupfernen Blase anfängt zu kochen, nochmahls darin umrühre, um das Anbrennen zu verhüten. Was nun abgeht, hat die gehörige Güte, so lange es schön klar kommt; das folgende, welches man Nachbrand nennt, ist schlecht und schwach, und wird zu einer künftigen Destillation gethan, da es denn rectificirt übergeht und ungefähr zur Hälfte.

Um aus trocknen Kirschen Spiritus zu erhalten, brühet man solche, nachdem damit ein Faß angefüllet worden ist, mit warmem Wasser an, daß es $\frac{1}{2}$ Elle darüber stehe, und dann noch Raum genug zum Gähren bleibe. Dies geht nur zuweilen langsamer von Statten; sonst erfordert es gleiche Handhabung, wie mit den frischen Kirschen, und eine gleiche Art zu destillieren.

Aus den mit den Kernen zerstoßenen Kirschen und hinzugesetztem Wasser, wird das so genannte schwarz Kirsch-Wasser, Aqua cerasorum nigrorum, destilliert. Man hat auch in den meisten Apotheken den schwarzen Kirsch Syrupp, welcher, wegen seines angenehmen Geschmackes, andern unangenehm schmeckenden Arzeneyen zugesetzt wird.

Man hält die schwarzen Kirschen in den Krankheiten des Hauptes, in der Epilepsie, dem Schlage und der Lähmung, besonders für dienlich. Man gibt die frischen Früchte zu essen. Von den Kirschen wird in der Schweitz auch eine große Menge gedörret, und dient sodann dem Volke des Winters zu einer angenehmen und gesunden Speise. Den daraus destillierten Branntwein, Geist, oder Spiritus, preiset Faber beym Stottern und andern Fehlern der Sprache an, wenn man nähmlich den Mund zum öftern damit ausspühlt. Keßler versichert, daß ein vom Schlage Gerührter, die Sprache wieder bekommen habe, nachdem er dergleichen Kirsch-Branntwein getrunken hat. Das destillierte Kirsch-Wasser ist angenehm und erquikkend. Rajus meldet, daß dasselbe in England bey dem Frauenzimmer sehr beliebt, und wieder convulsivische Bewegungen, vornehmlich der Kinder, gebräuchlich sey. Allein, ungeachtet dasselbe ehemahls sehr häufig in Mixturen gebraucht wurde, und auch noch jetzt zuweilen gebraucht wird, so ist es doch vielen verdächtig; ja die englischen Apotheker-Bücher haben es ganz aus der Zahl der Arzeney-Mittel ausgestrichen, wegen der Aehnlichkeit, die es mit dem Wasser der Lorbeerkirsch-Blätter hat, wie sein Geschmack, Geruch, und von einigen Aerzten in Worcester bey Thieren angestellte Versuche, gezeigt haben. Man hat aber hierzu ein sehr gesättigtes Wasser genommen, welches noch dazu bloß aus den zerstoßenen Kirsch-Kernen destilliert war; denn aus 14 Pfund Kerne hat man nur 2 Pinten (32 Unzen) Wasser abgezogen (*). Die würtembergische Pharmacopöe befiehlt, den Kirschen die doppelte Menge Wasser zu zusetzen, und so viel Wasser abzuziehen, als man Kirschen genommen hat. Die schwedische Pharmacopöe lässet nur so viel Wasser hinzu setzen, als erfor-

der-

(*) New Dispensatory, p. 366.

derlich ist, das Anbrennen zu verhüten; sie bestimme hierzu gleiche Theile Kirschen und Wasser. Dieses in den Apotheken befindliche Wasser ist gemeiniglich so verdünnt, daß man nicht leicht befürchten darf, daß es zarten Kindern Convulsionen errege, wiewohl Mead (*) anderer Meinung ist. Tadelnswerth aber ist es, wenn man, statt der Kirschen, bittere Mandeln zu seiner Bereitung nimmt.

Die innere Rinde dieses Baumes unter den Rauch-Toback gemischt, ertheilt demselben einen angenehmen Geruch. Eingenommen, vertreibt sie die Wechsel-Fieber, und macht oft die China-Rinde entbehrlich. Die Rinde ist auch in der Färberey zu gebrauchen. Der mit der Rinde des Kirschbaumes angestellten Versuche zum Färben wird weiter unten Erwähnung geschehen.

In einigen asiatischen Provinzen des russischen Reiches, wo die Einwohner sehr mit Wanzen geplagt sind, räuchern sie die Stuben mit Vogelkirsch-Blüthen aus, welches ein untriegliches Mittel dawieder seyn soll.

Die alten Bäume liefern ein vortreffliches Holz zu Tischler und Drechsler-Arbeiten, welches eine feine röthliche Farbe, und vor dem gemeinen Kirschbaum-Holze den Vorzug hat. Kohl- und Brenn-Holz gibt es von geringer Güte; und im Wetter ist es von kurzer Dauer. Von jungen Bäumen macht man in Frankreich gute Faß-Reife.

Das Gummi oder Harz schwitzet von selbst aus der Rinde des Baumes aus, und sieht gelbröthlich aus. Linné schreibt dasselbe dem rothen sauern Kirsch-Baume zu; allein, es schwitzt häufiger aus diesem Waldkirsch-Baume aus. Weil es den Glanz und die Farbe des Goldes hat, wird es an einigen Orten in Nieder-Sach-

(*) De venenis. Opp. To. 2. p. 196.

sen Katzen-Gold oder Katzen-Klar genannt. Durch Wasser lässet sich dieses Gummi in einen Schleim auflösen, und kommt in seinen Eigenschaften ziemlich mit dem arabischen Gummi überein; es wickelt nähmlich die Schärfe ein, erweicht, macht schlüpfrig, und ist in der Ruhr, Strangurie, Steinschmerzen ꝛc. wirksam. Man braucht es auch, die Haare damit wegzuätzen: es muß aber fein hellbraun und rein seyn.

IV. **Garten-Kirschbaum**, Cerasus vulgaris, foliis ovato-lanceolatis serratis *Mill.* Cerasus vulgaris, fructu rotundo *Duham.* Prunus Cerasus umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis glabris *L.* Fr. le Cerisier; in der Provence Piehor. Engl. The common or Kentish Cherry. Dessen Frucht, heißt die **gemeine** oder **Garten-Kirsche**. Linné gibt Europa allgemein als das Vaterland der Garten-Kirschen an, ohne doch einen Theil desselben zu bestimmen. So viel wissen wir, daß sie von den Römern in Italien, und von dort aus in unsere nördliche Gegenden gebracht sind, es mag sie nun Lucullus, (s. oben, S. 21,) oder ein Anderer, zuerst bekannt gemacht haben. Tournefort hat sie um das schwarze Meer in den Wäldern wild gefunden.

Die Blätter sind oval zugespitzt, auf beyden Seiten glatt, hellgrün, und am Rande ausgezackt. Der Blatt-Stiel ist mit zwey Drüsen besetzt. Die Blumen haben kurze Stiele. Die Früchte werden kugelrund und roth. Die äussere Haut ist dick. Das Fleisch ist mit einem sauern Safte angefüllt. Der Kern ist etwas platt gedrückt. Die Zeit ihrer Reife fällt von der Mitte des Jun., bis zu Ende des Jul., ein. Die Rinde des Stammes und der Aeste ist glänzend braun. Das Holz kommt in seiner Güte und Farbe mit dem von der vorigen Art überein.

Der Baum wächst nicht sehr in die Höhe, und der Wuchs der Zweige bleibt sperrhaft.

Ob

Ob diese Kirsche die Stamm-Mutter aller übrigen in den Gärten vorkommenden Sorten von Kirschen sey, oder ob diese selbst aus der vorhergehenden dritten Art erzeuget, und nachher auf andere und mannichfaltige Weise verändert werden, oder ob vielmehr zwey ursprünglich verschiedene Arten anzunehmen, und beyde durch die Kunst in verschiedene Sorten ausgeartet seyn, lässet sich nicht füglich bestimmen. Linné nimmt das letzte an, dem auch v. Münchhausen beypflichtet, doch diese zwey Stamm-Arten noch mit zwey andern vermehrt, und die Glas-Kirsche, und weiße süße Kirsche nicht für Spiel- sondern Stamm-Arten ausgibt, wenigstens für solche, welche nicht unter einander ausarten, und z. B. aus Kernen von schwarzen Kirschen niemahls Bäume erzeuget werden, welche weiße Kirschen tragen. Zwischen den sauern und süßen Kirschen (*) muß auch um deswillen ein wahrer Unterschied Statt finden, weil man nicht füglich ein Auge von der einen, auf einen Stamm von der andern oculiren kann. Man muß vielmehr saure auf saure, und süße auf süße Kirsch-Stämme oculiren, wenn die Bäume ein gutes Ansehen und Wachsthum haben sollen. Doch sollen, nach Hrn. Past. Henne Erfahrungen, wie ich weiter unten anführen werde, süße Kirschen auf sauern Stämmen recht gut fortkommen, ob gleich das Gegentheil nicht Statt findet. Die süßen Kirschen werden im Holze allezeit dicker, und der darauf gepfropfte Zweig von einer sauern Kirsche wird gegen den übrigen Theil des Stammes kein Verhältniß haben; und eben so wird auf sauern Kirschen ein Zweig der süßen Art dicker und unförmlicher, als der Stamm, ausfallen. Es ist auch merk-

(*) Ein süßer Kirsch-Stamm unterscheidet sich von einem sauern dadurch, daß jener einen weißgrauen Schaft, hellgrüne, große, faltige, mehr längliche, dünne und sehr zackige Blätter; der saure hingegen einen dunkelgrauen Stamm, kleine, glatte, dicke, dunkle, und wenig, aber sehr regulär ausgezackte Blätter hat.

lich ſüße Kirſchen, Fr. Griottes, welche dem Geſchmacke nach zu den angenehmſten gehören, und gleichſam das Mittel zwiſchen den ſauern Amarellen und der Glas-Kirſche ausmachen. Die Holländer nennen dieſe und alle weiche Kirſchen, Kerſſen. Der Amarellen wird weiter unter wieder Erwähnung geſchehen.

D. Glas-Kirſchen, L. Cerasus carne tenera & aquosa C. B. Cerasus Juliana L. Fr. Guindoliers. Die Frucht iſt hellroth, halb klar und faſt durchſichtig, rund, etwas platt gedrückt, mit einem weißen ſüßlichen Safte. Ich werde weiter unten ein mehreres davon ſagen.

Die Franzoſen pflegen den verſchiedenen Kirſchen-Sorten die Haupt-Benennung nach der äuſſerlichen Geſtalt derſelben zu geben, nach dem ſolche herzförmig oder rund, iſt. Zu den herzförmigen Kirſchen rechnen ſie: 1. die cultivirten Sorten des Mériſier, oder Waldkirſch-Baumes, deren Früchte länglich, meiſt ſchwarz und von ſüßem Geſchmacke ſind; 2. die verſchiedenen Sorten des Guignier, deren Früchte ein zartes und wäſſeriges Fleiſch haben, und entweder roth, oder ſchwärzlich, oder roth und weiß, ſind; 3. die verſchiedenen Sorten des Bigareautier, oder Herzkirſch-Baumes. Zu den runden Kirſchen rechnen ſie: 1. die rothen und weißen Sorten des eigentlich ſo genannten Ceriſier; 2. die Sorten des Griottier, wohin die ſauern, und die mehreſten ſäuerlich ſüßen Kirſchen gehören.

Ueberhaupt aber iſt man in Frankreich, ſelbſt in den Benennungen der Haupt-Arten der Kirſchen, nicht allemahl mit einander einig. Z. B. in Poitou heißt Guigne, was in Paris Ceriſe heißt; in Poitou heiß Ceriſe, was in Paris Meriſe heißt: in Poitou heißt Guindoux, was in Paris Griotte heißt. Daher iſt es, ſo lange die Arten und Varie-

armeniacum zuſammen gezogen ſeyn ſoll, weil dieſe Kirſchen zuerſt aus Armenien gekommen ſind. Henisch hat Amelbeer, und ſetzt dazu Cerasum Julianum. In einer Urkunde von 1300 beym du Freone, wird Amarina ſchon von einer Art ſäuerlicher Kirſchen gebraucht, und in einem 1501 zu Rom gedruckten deutſchen und ital. Vocabularis heißt es: Cerase, Kyrſen, la marasche, die Wichlen (Weichſeln), le verte, die Ambreie.

täten der Kirschen auf keine bestimmtere Weise, als bisher, aus einander gesetzt und characterisirt sind, eine unmögliche Sache, die deutschen und französ. Benennungen der Kirschen-Sorten mit der genauesten Richtigkeit auf einander zu reduciren.

Ausser den jetzt angeführten Sorten, gibt es auch noch einige, von welchen man gewiß behaupten kann, daß es wirkliche Spiel-Arten sind: als:

1. **Stets blühender Kirschbaum**, Cerasus semper florens. Cerasus racemosa hortensis *C. B.* Cerasus sativa. æstate continue florens ac frugescens *Duham.* Fr. Cerise à grappes, Cerisier de la Toussaint, oder de St. Martin, Cerisier tardif. Man findet an seinen Stämmen nur Holz- und Blumen-Knospen; die erstern treiben kleine Blätter-Knospen, welche dünn und nicht lang sind. Die Blätter sind klein, 2 Z. lang, 1 Z. breit, und von ovaler Gestalt. Ihr Rand hat theils einfache, theils doppelte runde Zähne. Die Farbe ist auf der untern Fläche hellgrüner, als auf der obern. Die Stiele sind etwas über ½ Z. lang. Die Frucht-Knospen treiben im Frühlinge zuerst kleine Aeste, unter deren erstern Blättern sich die kleinen Blumen-Knospen befinden. Diese kleine Aeste verlängern sich aber nachher beständig von Zeit zu Zeit, und liefern in der Folge Blumen und Früchte, so, daß man die letztern noch im Sept. antrifft. Die Abbildung im Duhamel (*) gibt einen einzelnen in Einem Jahre getriebenen Frucht-Ast über 6 Z. lang, und mit Blumen und Früchten besetzt, an. Die Kelch-Einschnitte sind lang, fein gezahnt, und erhalten, wenn die Blumenblätter abgefallen sind, eine lebhafte rothe Farbe. Die Blumenblätter sind weniger, als bey andern Arten, ausgebreitet. Die Blüthe erscheint zuerst im Jun., auf dünnen, öfters 3 Z. langen Stielen. Die Früchte sind rund, nicht groß, ein wenig über ½ Z. im Durch-

(*) Arbres fruitiers, To. 1. Pl. 7.

Durchschnitte, der Länge nach mit einer merklichen Naht bezeichnet; die Haut ist dick und hellroth; das Fleisch weiß, wo es aber mit dem Steine verwachsen ist, röthlich; und der Saft sauer. Sie tragen häufig, wollen aber offen, und nicht durch andere Bäume beschattet stehen. Diejenigen Aeste, welche Früchte getragen haben, werden zu Ende des Jahres trocken, und fallen im Winter ab. Die Frucht ist nicht von großem Werthe; daher man diese Bäume nur der Seltenheit wegen in Plantagen und Gärten zieht, und durch Pfropfen oder Oculiren vermehrt.

2. **Gefüllter Kirschbaum, oder Kirschbaum mit halbgefüllter Blume,** Cerasus vulgaris duplici flore *Duham.* Fr. Cerisier à fleur semi-double, Engl. The double flowering Cherry, double-blossomed Cherry, wird wegen der schönen großen und gefüllten Blüthen in Gärten unterhalten. Jede Blume besteht aus 15 bis 20 Blumenblättern, in deren Mitte sich jedoch noch viele Staubfäden mit ihren Staubbeuteln, an statt des Stämpels aber gemeiniglich kleine grüne Blättchen (folia stipulacea) zeigen. Diese sind gänzlich unfruchtbar; doch findet man auch einige mit vollkommenem Stämpel, und nach diesem folgen mittelmäßig große, hellrothe, eben nicht fleischige, und vom Geschmack saure Früchte. Der Stein ist alsdann glatt und herzförmig. Der gemeine Kirschbaum hat zur Zeit seiner Blüthe ein gefallendes, der mit gefüllten Blumen aber ein bezauberndes Ansehen, und macht mit seiner schwelgerischen Blüthe, welche so gefüllt als eine weiße Rose ist, und an dem ganzen Baume überall in Menge erscheint, auf die Einbildungskraft einen frappanten Eindruck. Hochstämmig, und in der Ferne gleicht er einem Ballen Schnee; und je mehr man sich ihm nähert, desto mehr Vergnügen gewährt sein Anblick. Am sichersten pflanzt man ihn durch das Pfropfen und Oculiren fort; und er lässet sich sowohl hochstämmig, als

auch

cater. Fällt in der Reife ein Regen ein, wovon a
re Kirschen faulen, so bleibt doch diese gesund.
Haut ist roth und glänzend. Einige Stücke, die
borgen und im Schatten gesessen haben, haben bla
the Flecken. Das Fleisch ist weißgelblich und zer
im Munde, ohne daß ein zähes Mark zurück bl
Der Saft hat zwar einen säuerlichen Geschmack,
cher aber, wenn die Kirsche nur recht reif geworden
nicht nur ganz erträglich ist, sondern auch von Lieb
bern des Sauern, den süßen vorgezogen wird.
Saft ist, wie bey der vorhergehenden rothen Oran
Kirsche, in Menge vorhanden. Die Steine sind
mittelmäßiger Größe, weiß, und sitzen fest am St
dergestalt, daß man beym Essen gemeiniglich das Fle
abstreift, und der Stein am Stiele sitzen bleibt.
aber die Kirsche überreif, so fällt sie bey dem Anrüh
vom Stiele, und der Stein bleibt in der Kirsche.
Zeit der Reife ist im Anfange des Jul., und wä
den ganzen Monath durch. Sie folgt gleich auf
Belser. Uebrigens kann man diesen Baum nach
lieben auf saure oder süße Stämme pfropfen; d
scheint er, auf süße gepfropft, dauerhafter und trag
rer zu seyn.

5. Rothe oder frühe Herz-Kirsche. Di
zur Classe der süßen gehörende Kirschbaum ist einer
ansehnlichsten von Gestalt. Er wächst sehr hoch,
starken zähen Zweigen. Er ist nur auf süße Stäm
zu pfropfen. Seine Jahrsschüsse sind sehr stark
dick, von brauner Farbe, mit einigen aschgrauen St
fen. Die Augen oder Knospen sind lang und ru
von mittelmäßiger Dicke, und endigen sich mit ei
Kegelspitze. Die Augenhalter stehen wohl herv
Die Blüthe öffnet sich nicht vollkommen. Die b
nen und zarten Blumenblätter sind $\frac{2}{3}$ Z. lang, und $\frac{1}{3}$
breit, ein wenig einwärts gekrümmt, und übrigens
eine Mäurer-Kelle gestaltet. Das Ende der Blät

befindlichen Kirſchen in doppelten Kirſchen beſteht, auch der Baum an und vor ſich ſehr fruchtbar iſt, und alle Jahre, faſt ohne Ausnahme, voller Kirſchen hängt, wenn gleich auf andern Kirſchbäumen keine, oder doch nur wenige Kirſchen zu ſehen ſind. Sonſt kömmt dieſe Kirſche mit der Größe, Form und Couleur der ſo genannten Bauern-Kirſche vollkommen überein, übertrifft aber die letztere weit am Geſchmacke und an zarter Haut, führt auch einen kleinern Kern, als die letztere, bey ſich. Die Verpflanzung geſchieht auf gewöhnliche Art."

Anmerkung von vier Kirſchen auf einem Stengel, ſ. im 36 Verſ. der breſl. Samml. v. Jun. 1726, S. 738.

Sigism. Greffii obſ. de Cerato pleniflora prolifera, ſ. in *Miſc. Nat. Cur.* A. 1673 & 1674, obſ. 95.

Emanu. Königs obſ. de ceraſis botryformibus, ſ. eb. daſ. Dec. II. A. IV. obſ. 31.

3. Die **Zwerg-Kirſche, Erd-Weichſel,** Ceraſus pumila, foliis ouatis eglanduloſis *Rupp.* iſt eine wilde Spiel-Art, und ſoll nach Matthioli Kräuterbuche, in welchem ſie unvollkommen auf der 75 Seite unter dem Nahmen Chamaeceraſus, abgezeichnet iſt, in den böheimiſchen Gebirgen, und nach Rupp bey Freyburg an der Unſtrut, wild wachſen. Sie iſt alſo als eine deutſche wilde Abart anzunehmen, die auch Hr. v. Leyſer (*) um Halle, und Gleditſch an vielen Orten in Thüringen, angetroffen hat. Die Blätter ſind über 2 Z. lang, länglich oval, am Rande fein gezahnt, und in ihrer Structur ziemlich dick. Sie haben eine hellgrüne glänzende Farbe, welche beſonders auf der obern Fläche merklich iſt, da hingegen die untere mit einem feinen Ader-Gewebe durchzogen und ein wenig blaſſer erſcheint. Die Blumen kommen im Anfange des Maymonathes hervor; ſie ſind auf dem Baume zwar häufig anzutreffen, aber nur halb ſo groß, als ſie ſonſt bey andern Kirſchbäumen zu ſeyn pflegen. Ungeachtet ſie aber ſo früh vor den übrigen blühen, ſo erfordern doch die kleinen runden rothen ſäuerlichen Früchte längere

(*) S. Flora Halenſis, p. 89.

gere Zeit zur Reife, und können erſt im Auguſt abgenommen werden. Sie ſitzen, in Betrachte der vielen Blumen, einzeln. Der Saft iſt klarlich rund und weiß. Die Zweige ſind dornigt, nicht über einen dünnen Bindfaden dick, und hängen auch der Erde hin. Die Rinde am Stamme fällt aus dem Grauen in das Bräunliche, und iſt wenig gerunzelt, an den Zweigen aber graulichwärzlich. Der Stamm ſelbſt bleibt niedrig, denn er wird nicht über 3 F. hoch.

Sollte man dieſes Bäumchen nicht lieber mit Hrn. v. Münchhauſen (*), und Gleditſch (**), für eine wahre Art halten? zumahl ſich ſolches in den aus Samen erzogenen Stämmen immerfort auf einerley Weiſe zeigt, und unveränderlich erhält. Im Garten erhält der Stock 6 bis 8 F. Höhe. Zum Pfropfen und Einlegen ſcheinen die Zweige zu dünn zu ſeyn; und

auf der Seite des Fruchtknotens gestanden, und von da sich mit einer Biegung in die Höhe gerichtet. Die Narbe ist tellerförmig, am Rande mit ungleichen Vertiefungen, auch scheint sie mir reitzbar zu seyn. Die Frucht wird im Sept. zeitig, ist klein, mit wenig Fleisch bedeckt, und von Farbe schwärzlich. Die Blätter sind zwar an den fruchtbaren Aesten so, wie sie du Roi beschrieben: aber jene des jährigen Triebes weichen von diesen etwas ab; denn ausserdem, daß sie viel größer, auch die Randzähne viel länger sind, haben sie 4, 6, auch oft noch mehrere Drüsen. Zudem ist ihr Blattstiel schön dunkelroth, da die an den fruchtbaren Aesten stehenden Blätter entweder ganz blaßrothe, oder gar grüne Blattstiele haben. Auch sind die Blätter des jungen Triebes von Baue viel dünner und hellgrüner, da die andern dichter und viel dunkelgrüner sind. Ob zwar die Blüthen an einem meist 2 gute Zoll langen Hauptstiele traubenförmig wachsen, so kommen doch in dem Zwischenraume des Winkels des letzten, oder der zwey letzten Blätter einzele Blüthen mit ihren Stielen zum Vorschein.

„Die Bäume sind mir aus Samen aufgegangen, und haben in kurzer Zeit einen ansehnlichen Wuchs erhalten, von mehr als 6 bis 8 Schuh. Ihr Wuchs ist daher nicht so unbeträchtlich, als ihn du Roi macht, und glaube ich, daß er zu einem hochstämmigen Kirschbaum erwachsen werde."

Und in den Beyträgen zur schönen Gartenkunst, (Mannh. 1782, 8.) S. 29: „Diese Bäume sind gegen unsere Kälte ganz unempfindlich, und dies Jahr übertrafen sie selbst die inländischen Bäume an Heftigkeit des Triebes. Denn den 7 Ostermon. hatten sie schon Blätter von der Länge eines Zolles; und die Blüthtrauben waren schon 2 Z. lang hervor gedrungen. Freylich hat die Kälte des 16 und 17 Ostermon. die Blüthen meist verstört, und nur wenige Kirschen sind zeitig geworden, aber dem Baume selbst konnte sie nichts anhaben."

4. Es soll auch **Kirschen ohne Steine oder Kerne** geben; dergleichen Varietät führt Tournefort an. Auch einige neuere Schriftsteller wollen dergleichen wahrgenommen haben. Eine **Methode, Kirschen und Pflaumen ohne Stein zu ziehen**, von

G.

G. L. W. findet man im 26 St. der Physik. Belust. (Berl. 1755, 8.) S. 1218, fgg. welche sich von einem Geistlichen, Camaldulenser Ordens, herschreibt. Man soll nähmlich, um Kirschen ohne Kern zu ziehen, auf einen Kirschbaum-Stamm, welcher etwann 2 Z. im Durchschnitt hat, 2 Pfropfreiser einander gegen über pfropfen. Hier kommt es nun hauptsächlich darauf an, daß alle beyde auch bekleiben. Wenn beyde Reiser bekleibet sind, lässet man solche bis zum Frühlinge des folgenden Jahres wachsen; und wenn die bequeme Zeit zum Pfropfen ist, schneidet man die obersten Gipfel von beyden Reisern ab, so, daß eines so hoch als das andere bleibt, spaltet das eine Pfropf-Reis oben auf; und nachdem man das andere keilförmig zugeschnitten hat, steckt man es in des erstern Spalt, dergestalt, daß Schale an Schale kommt, und verbindet die Zusammenfügung, wie gewöhnlich, mit Baum-Wachse. Zu Beförderung des Zusammenwachsens ist nöthig, daß die Pfropfreiser, wo sie oben beschnitten werden, von gleicher Stärke seyn; denn auf solche Art trifft die Schale von dem einen fein überall auf die Schale des andern. Wofern aber eines dicker und das andere schwächer ist, so ist dahin zu sehen, daß wenigstens auf einer Seite die Schale von beyden wohl zusammen stoße. In Fig. 2088 sind a und b die beyden einander gegen über gepfropften Reiser, wie sie in dem andern Jahre oben abgeschnitten, und bey c, auf gedachte Weise in einander gefüget worden sind. Wenn nun, nachdem diese letztere Operation geschehen ist, die beyden Reiser oben bey c zusammen gewachsen und bekleibet sind, schneidet man das eine Reis unter c, ungefähr bey d, und hernach bey b, ab; und es bleibt also das übrig gelassene, oben von c bis d sich herüber beugende Reis a stehen. Dieser soll in dem folgenden Jahre Kirschen geben, welche zwar inwendig

wendig einen kleinen weißen Kern, doch ohne harte Schale, haben.

In den Memoires de l'Acad. de Paris, v. J. 1704, S. 41, findet ſich ein ähnlicher Verſuch. Es erzählt daſelbſt Lemery, wie ein gewiſſer Liebhaber der Gärtnerey ein Pfropfreis von einem Pflaumbaume auf einen Quittenbaum gepfropfet, und als ſolches geſchehen, eben dieſes Pfropfreis gebogen, und deſſen Spitze an einem andern Orte eben dieſes Quittenbaumes eingepfropfet, und an beyden Enden mit Thone verwahret und verbunden hat, worauf das Reis an beyden Enden bekleibet iſt, und Zweige getrieben hat, welche Pflaumen getragen haben, die am Geſchmacke denjenigen gleich waren, wovon das Pfropfreis war genommen worden, mit dem Unterſchiede, daß diejenigen, welche aus der eingepfropften Spitze des Reiſes gekommen waren, keinen ordentlichen, ſondern einen ganz kleinen, aber ſehr harten Kern hatten, dergleichen man in den Weinbeeren findet, da hingegen die andern Pflaumen, welche aus dem ſtärkern Ende des Reiſes gewachſen waren, ihren gewöhnlichen Kern führten.

In eben dieſen Memoires, v. J. 1735, S. 373, wird angeführt, daß Hr. Marchand der kön. Geſellſch. d. Wiſſ. eine Art Pflaumen gezeigt habe, die keinen harten Kern, ſondern, ſtatt deſſen, einen Mandel-Kern ohne harte Schale hatten, welche auf einem Baume gewachſen ſind, der ſeit 20 Jahren dergleichen, und nie keine andere getragen habe, wobey zugleich erwähnt wird, daß man in einem Catalogus von dem Garten zu Leyden, der zu Ende des vor. Jahrh. von Paul Hermanns heraus gegeben worden ſey, eine Art von Kirſchbaum, unter dem Nahmen: Cerafus hortenſis fructu fine oſſiculis, fände. So findet man auch in den zu Paris im Druck heraus gegebenen Verzeichniſſen von allerley Obſtbäumen, als: in dem Catalogus der Karthäuſer, welche ſtarken Handel mit Obſt-Bäumen treiben, eine Art Pflaumbäume u. d. T. Prunes ſans noyau.

Nach dem Berichte im Journ. oeçon. v. Apr. 1761, S. 171, f. wollte ein Liebhaber der Gärtnerey und Naturkunde versuchen, ob das Mark in den Bäumen zu ihrer Fortpflanzung einiger Maßen etwas beytrüge, und nahm zu Anstellung seines Versuches einen jungen Kirschbaum, der aus dem Kerne hervor gewachsen war, noch in der Baumschule stand, und nur erst einen einzigen Sprößling getrieben hatte. In dem Frühlinge des folgenden Jahres, ehe noch der Saft in sehr starker Bewegung war, zu der Zeit, wenn man zu pfropfen pflegt, spaltete er diesen jungen Baum von dem obersten Ende seines Stammes, bis unten, wo die Wurzeln aus einander gehen, an dem Orte, wo das Mark sichtbar zu werden anfängt, mitten von einander. Aus diesen beyden ganz biegsamen Theilen des Baumes nahm er alles Mark mit einem zugespitzten Stückchen Holz, welches dergestalt zugeschnitten war, daß es in den kleinsten Canal, worin das markige Wesen eingehüllt sich befindet, genau paßte, heraus, wobey er die Vorsicht gebrauchte, daß dadurch die Wände der Mark-Röhre und die Ränder des Stämmchens nicht zu sehr bekratzet, folglich diese zarte Theile nicht beschädiget wurden, auch eine desto genauere Wieder-Vereinigung erfolgen konnte, und der Lauf der Säfte nicht gehindert wurde. Nachdem das Mark heraus genommen war, brachte er die beyden Theile wieder an einander, und befestigte sie vermittelst eines wollenen Bandes, welches er von unten an, um den Stamm herum führte. Indem er diese beyde Hälften zusammen brachte, um ein Ganzes darzustellen, verkleibte er die Fugen mit weichem Wachse, dergleichen die Former zur Verfertigung ihrer Modelle gebrauchen, und zuletzt fuhr er mit Umwickelung des Bandes bis oben hinauf fort. Als der Kitt eine vollkommene Festigkeit zu haben schien, wurde das Band abgeschnitten. Die Kirschstämme, welche diese gefährliche Operation aus-

halten

halten konnten, und zu wachsen fortfuhren, trugen, da sie zu ihrer natürlichen Größe und Stärke gelangten, **Kirschen ohne Kern**, oder vielmehr solche, die, anstatt des Kernes, nur etwas Weißes, ohne die geringste Dichte, hatten, von eben der Größe und dem Geschmacke, wie Kirschen von derselben Art. Weil aber solcher Baum keinen Keim in seinen Früchten hervor bringt, so kann er auch nicht wieder fortgepflanzet werden; daher denn folgt, daß das Mark in den Bäumen zur Fortpflanzung unentbehrlich sey. Es bekommen zwar die Zweige dieses neuen Baumes ihr markiges Wesen, wie die andern; nur ist dasselbe weit dichter, und breitet sich nicht so häufig in die Knospen oder Augen, wo die Frucht sich ernährt, aus, weil die in dem zartesten Alter vorgenommene Operation die Einrichtung seiner Werkzeuge verändert hat.

11 St. des N. Hamb. Magaz. Lpz. 1769, 8. S. 168, fgg.
Physik. ökon. Auszüge ꝛc. 10 B. 3 St. Stutg. 1770, 8. S. 391, f.
Preußische Sammler, 2 B. Königsb. 1775, 8. S. 1091, f.
J. S. Halle Magie, 1 Th. Berl. 1784, gr. 8. S. 309.

Der würzburgische Hof- und Residenz-Gärtner, Joh. Mayer, erzählt in seiner Pomona Franconica, 2 B. (Nürnb. 1779.) daß er sich die Mühe genommen habe, die Vorschriften, Kirschen ohne Kerne zu ziehen, zu versuchen, sie aber alle falsch gefunden habe.

Ausser diesen findet man noch eine große Anzahl Varietäten von Kirschen, insonderheit in Ansehung der Größe, Gestalt, und Farbe. Ich werde die vornehmsten derselben anzeigen, und zugleich einige der bereits oben erwähnten Sorten näher beschreiben.

1. **Die prager Muskateller, auch rothe Herz-Kirsche genannt.** Dieser Baum, ob er gleich ungemein süße Früchte trägt, gehört doch zu dem Geschlechte der sauern, theils, weil seine Rinde und Blätter den sauern Kirschbäumen ähnlich sind, theils, weil man ihn auch auf saure Stämme pfropfen kann, worauf er

Fädchen, welche um den Stämpel herum ſtehen, ſi
von ungleicher Länge. Kelch und Stiel ſind hellgrü
Aus einer Bluth-Knoſpe kommen wohl 6 bis 8 Bl
men hervor. Die Frucht iſt wie ein Herz geſtaltet,
dieſem viel ähnlicher, als die ſchwarze Herz-Kirſch
indem ſie am Ende, oder dem Stiele gegen über, ſpi
zuläuft. Auf einer Seite iſt ſie erhaben rund, auf d
andern etwas platter. Auf dieſer platten Seite iſt
mit einer ſichtbaren Naht verſehen, die, der Län
nach, vom Stiele an bis zur Spitze reichet. D
Frucht iſt beynahe 1 Z. lang, und da, wo ſie am br
teſten iſt, ¾ Z. dick. Der dünne Stiel iſt bey einig
1½, bey andern 2 bis 2½ Z. lang, und ſitzt in ein
weiten, eben nicht runzeligen Vertiefung. Dieſe Fruc
iſt bey einfallendem Regen-Wetter, zu der Zeit, da
reif werden ſollte, der Fäulniß mehr unterworfen, a
irgend eine andere, ob ſie gleich unter allen die härte
iſt. Die Haut iſt fein, glatt und glänzend, an d
Sonnen-Seite dunkelroth, an der Schatten-Se
hellroth, über und über aber mit dunkeln und hell
Flecken beworfen, welches ſie bunt, ſcheckig und ma
morirt macht. Auch finden ſich wohl weiße Tüp
darauf. Inſonderheit iſt die Naht bisweilen weißli
Das Fleiſch iſt unter allen Arten Kirſchen das feſteſ
und doch ungemein ſaftreich, weißlich, und mit ne
weißern Adern und Fibern durchwebet. Um den Ste
iſt es da, wo die Sonne hingetroffen hat, unter d
Haut röthlich. Der Saft iſt in Menge vorhande
Er hat eine blaßrothe Farbe, und iſt von ſehr erhab
nem und angenehmen Geſchmacke. Der Stein iſt läng
lich rund, von Farbe gelblich, welche zugleich in d
Fleiſchfarbige fällt. Er iſt über ½ Z. lang, ⅓ Z. od
etwas mehr, breit und dick. Die Zeit der Reife
entweder in der Mitte oder zu Ende des Jul., we
die vorhergehenden mehrentheils vorbey ſind.
thut auch wohl, daß man ſie nicht eher angreift.

Stiel ist nicht völlig 1 Z. lang. Die Blüthe öffnet sich nicht ganz, sondern ist einwärts gebogen, und wie die Unter-Tasse einer Thee-Schale gestaltet; die Blumenblätter sind nähmlich gleichsam ausgehöhlt, sehr dünn, ungefähr ⅔ Z. lang, und etwas weniger breit, am Ende wie ein Herz gestaltet. Die Frucht ist ein wenig länglich, auch etwas höckerig, und auf der einen breiten Seite mit einer sehr merklichen Naht versehen. Gar oft ist diese Naht auf beyden Seiten sichtbar. Ihrer Größe und Gestalt nach, ist sie einer gemeinen Haselnuß ähnlich; d. i. sie ist ⅔ Z. lang, und ½ Z. breit. Der Stiel ist 1½ Z. lang. Die Schale oder Haut ist von glänzender dunkelrother Farbe, worauf sich einige Ungleichheiten finden. Das Fleisch ist nicht so roth wie die Schale, sondern fällt in das Weißliche oder Fleischfarbige. Der Saft ist von überaus süßem Geschmacke, wenn man sie recht reif hat werden lassen, und er ist in Menge vorhanden; doch hat er nichts, das nach Muskaten schmeckt, nichts aromatisches bey sich, ob man ihn gleich delicat nennen muß. Die Steine sind nur ⅓ Z. lang, und ¼ Z. breit. Die Zeit ihrer Reife ist um Johannis; sie gehört also zu den frühesten Kirschen, welche gleich auf die wahre May-Kirsche folgt. Sie werden aber nicht auf ein Mahl reif, sondern man kann sie wohl 3 Wochen und länger, bis in den halben Jul., genießen.

Hr. Pastor Henne bekam einige Pfropfreiser geschickt, unter dem Nahmen Successions-Kirsche, mit dem Berichte, daß diese Art nach und nach blühete und Früchte brächte. Nachdem solche tragbar wurden, fand sich, daß es die eben jetzt beschriebene pragische Muskateller war.

Wer Raum in seinem Garten hat, thut wohl, daß er von dieser Art 3 bis 4 Bäume anpflanze. Denn es ist gar angenehm, um gedachte Jahrszeit Kirschen zu haben, da die andern Arten noch nicht genießbar sind.

chen. Unter allen Kirsch-Blättern sind diese am tiefsten ausgezackt; auch stehen einige Zähne weiter hervor, als andere. Sie sind ungemein runzelig, weil auf der obersten oder glatten Seite tiefe Furchen, und auf der untersten stark erhöhete Adern mit starken Seiten-Adern anzutreffen sind. Der Blattstiel ist an den Tragebüscheln 1, an den neuen Schüssen aber ¾ Z. lang. Die Blüthe öffnet sich gut, und hält 1¼ Z. im Diameter. Die Blumenblätter sind fast 1 Z. lang, unten sehr schmahl, und ein jedes Blatt scheint, als wenn es von dem andern ausgeschnitten wäre, am Ende aber stoßen sie doch zusammen, und ein Blatt ist daselbst ½ Z. breit. Die Frucht ist gemeiniglich vollkommen rund. Einige Stücke sind plattrund, von der Größe der großen Glas-Kirsche. Die Frucht sitzt nicht fest am Stiele: denn wenn man sie am Baume angreift, fällt sie in die Hand, und der Stiel bleibt am Zweige sitzen. Der Früchte sind gemeiniglich nicht viel, ob gleich der Baum stark geblühet hat. Die Haut oder Schale ist blaßroth, mit dunkelrothen marmorirten Flecken, welche verursachen, daß man sie bey ihrer größten Reife noch nicht für reif ansehen sollte. In einem heißen Sommer ist die Haut über und über roth. Das Fleisch ist weißroth oder fleischfarben, mit wenigem Marke, so, daß es ganz im Munde zergeht. Der Saft ist in ausserordentlicher Menge vorhanden. Er ist von einem delicaten säuerlich süßen Geschmacke. Die Steine sind von der ersten Größe, völlig wie die von der schwarzen spanischen oder großen Herz-Kirsche, sitzen aber nicht fest am Stiele. Ihre Farbe ist sehr weiß. Die Zeit der Reife ist zu Ende des Jul., und Anfang des Aug.; folglich gehört sie zu den Spät-Kirschen.

Die **schwarze Granien-Kirsche**, hat eben solches runzeliges Laub, welches noch feiner ausgezackt ist. Das Holz ist noch weit mürber. Die Frucht

ist

gehende Muskateller; sie ist aber größer und härter. Der Stiel ist 2 Z. lang. Die Haut oder Schale ist dunkelroth und glänzend. Einige Stücke, die etwas verborgen sitzen, bleiben auf der Schatten-Seite weiß und roth marmorirt, da doch die erste Seite schön roth ist. Das Fleisch ist weißlich, roth oder fleischfarben. Der Saft ist überaus süß und angenehm. Die Steine sind ziemlich groß, fast wie die von den schwarzen spanischen, haben eine weiße Farbe, und sitzen fester am Stiele als die vorhergehenden. Die Zeit der Reife ist zu Ende des Jun., und im Anfange des Jul. Sie gehört also zu den Früh-Kirschen, weil sie gleich auf die vorhergehende folgt, ja mit ihr fast zugleich kommt. Wegen ihrer Härte und Festigkeit schickt sie sich wohl zum Versenden.

3. Rothe Oranien-Kirsche. Dieser Baum hat ein sehr irreguläres Wachsthum, indem seine Zweige fast immer eine horizontale Richtung haben, und lieber in die Breite, als in die Höhe, gehen wollen. Sein äusserliches Ansehen ist also schlecht. Er gehört, wie die beyden vorhergehenden, zu den mittelmäßigen Bäumen. Er hat unter allen Kirschbäumen das mürbeste Holz. Man darf keinen Zweig beugen, sonst splittert er ab. Ob man ihn gleich auf saure und süße Stämme pfropfen kann, so gehört er doch eigentlich zur Classe der sauern. Er schickt sich auch gut an das Spalier. Seine Jahrstriebe sind von ungemeiner Länge und Dicke, daß man aus einem Jahrsschusse wohl 3 und mehr Pfropfreiser machen kann. Die Farbe ist aschgrau, mit braunen Streifen, wie die von der großen Glas-Kirsche. Die Augen sind rund und spitzig, und stehen etwas von dem Reise ab. Die Augenhalter sind gut zu sehen. Die Blätter sind vom Stiele bis zur Spitze 6 Z. lang, die scharfe Spitze, die allein 1 Z. ausmacht, mitgerechnet, und 3 Z. breit. Die Farbe ist dunkler grün, als an andern ihres glei-

chen. Unter allen Kirsch-Blättern sind diese am tie
sten ausgezackt; auch stehen einige Zähne weiter he
vor, als andere. Sie sind ungemein runzelig, we
auf der obersten oder glatten Seite tiefe Furchen, un
auf der untersten stark erhöhete Adern mit starken Se
ten-Adern anzutreffen sind. Der Blattstiel ist an de
Tragebüscheln 1, an den neuen Schüssen aber ¼
lang. Die Blüthe öffnet sich gut, und hält 1¼ Z. i
Diameter. Die Blumenblätter sind fast 1 Z. lon
unten sehr schmahl, und ein jedes Blatt scheint, a
wenn es von dem andern ausgeschnitten wäre, am E
de aber stoßen sie doch zusammen, und ein Blatt i
daselbst ½ Z. breit. Die Frucht ist gemeiniglich vo
kommen rund. Einige Stücke sind plattrund, von d
Größe der großen Glas-Kirsche. Die Frucht si
nicht fest am Stiele: denn wenn man sie am Baum
angreift, fällt sie in die Hand, und der Stiel bleibt a
Zweige sitzen. Der Früchte sind gemeiniglich nic
viel, ob gleich der Baum stark geblühet hat. D
Haut oder Schale ist blaßroth, mit dunkelrothen ma
morirten Flecken, welche verursachen, daß man sie b
ihrer größten Reife noch nicht für reif ansehen sollt
In einem heißen Sommer ist die Haut über und üb
roth. Das Fleisch ist weißroth oder fleischfarben, m
wenigem Marke, so, daß es ganz im Munde zergeh
Der Saft ist in ausserordentlicher Menge vorhande
Er ist von einem delicaten säuerlich süßen Geschmack
Die Steine sind von der ersten Größe, völlig wie d
von der schwarzen spanischen oder großen Herz-Ki
sche, sitzen aber nicht fest am Stiele. Ihre Farbe i
sehr weiß. Die Zeit der Reife ist zu Ende des Jul
und Anfang des Aug.; folglich gehört sie zu den Spä
Kirschen.

Die schwarze Oranien-Kirsche, hat eben s
ches runzeliges Laub, welches noch feiner ausgeza
ist. Das Holz ist noch weit mürber. Die Fruc

ist pechschwarz, groß, und von überaus delicatem aromatischen Geschmacke.

4. Große Glas-Kirsche. Dieser sehr blätterreiche Baum hat ein sehr lebhaftes Ansehen, und wächst zu einer ziemlichen Höhe, hat aber sehr mürbes Holz, welches beym Beugen leicht splittert. Er ist zwar nicht sehr tragbar, und itzt selten recht voll, ist aber doch werth angepflanzt zu werden. Seine Jahrs-Triebe sind lang und stark, von aschgrauer Farbe, mit dunkelbraunen Streifen vermischt. Die Knospen sind lang, und wie eine Rundspitze gestaltet. Die Träger derselben sind gut hervor stehend. Die Blätter sind 5 Z. lang, 3¼ Z. breit. Von der Mitte bis zur Spitze werden sie viel breiter, als sie von der Mitte bis zum Stiele sind. Auf der obern Seite sind sie sehr dunkelgrün und glänzend; auf der untern aber hellgrün. Ihre Auszackung am Rande ist ziemlich regulär. Der Blattstiel ist 1 bis 1½ Z. lang. Die Blüthe ist von 1 Z. im Durchschnitt. Diese Länge hat auch ein jedes der 5 Blumenblätter, und am Ende eine Breite von ½ Z. Die Blüthe erscheint nicht auf ein Mahl, sondern nach und nach. Die Frucht ist völlig kugelrund; einige Stücke aber scheinen einer etwas gedrückten oder platten Kugel ähnlich zu seyn, welche am äussersten Ende ein Grübchen haben, worin bisweilen noch ein übrig gebliebenes Stück vom Stämpel sitzt, welches beym Anrühren abfällt. Noch andere scheinen länger, als breit, zu seyn. Sie gehört zu der Kirsche zweyter Größe. Der Stiel hat seinen Sitz in einer glatten und von allen Runzeln befreyeten, nicht gar tiefen Höhle; er ist hellgrün, stark und dick, sehr gerade, aber kurz, ungefähr 1 Z. lang, daher auch diese Kirsche in Frankreich den Nahmen: Cerise à courte queue, bekommen hat. Unter allen Kirschen hält sich diese am längsten am Baume. Wenn sie schon überreif ist, fault sie doch nicht, sondern wird immer deli-

cater. Fällt in der Reife ein Regen ein, wovon a
re Kirschen faulen, so bleibt doch diese gesund.
Haut ist roth und glänzend. Einige Stücke, die
borgen und im Schatten gesessen haben, haben bla
the Flecken. Das Fleisch ist weißgelblich und zer
im Munde, ohne daß ein zähes Mark zurück bl
Der Saft hat zwar einen säuerlichen Geschmack,
cher aber, wenn die Kirsche nur recht reif geworden
nicht nur ganz erträglich ist, sondern auch von Lieb
bern des Sauern, den süßen vorgezogen wird.
Saft ist, wie bey der vorhergehenden rothen Oran
Kirsche, in Menge vorhanden. Die Steine sind
mittelmäßiger Größe, weiß, und sitzen fest am St
dergestalt, daß man beym Essen gemeiniglich das Fle
abstreift, und der Stein am Stiele sitzen bleibt.
aber die Kirsche überreif, so fällt sie bey dem Anrüh
vom Stiele, und der Stein bleibt in der Kirsche.
Zeit der Reife ist im Anfange des Jul., und wä
den ganzen Monath durch. Sie folgt gleich auf
Welser. Uebrigens kann man diesen Baum nach
lieben auf saure oder süße Stämme pfropfen; d
scheint er, auf süße gepfropft, dauerhafter und trag
rer zu seyn.

5. Rothe oder frühe Herz-Kirsche. Die
zur Classe der süßen gehörende Kirschbaum ist einer
ansehnlichsten von Gestalt. Er wächst sehr hoch,
starken zähen Zweigen. Er ist nur auf süße Stäm
zu pfropfen. Seine Jahrsschüsse sind sehr stark u
dick, von brauner Farbe, mit einigen aschgrauen St
fen. Die Augen oder Knospen sind lang und ru
von mittelmäßiger Dicke, und endigen sich mit ei
Kegelspitze. Die Augenhalter stehen wohl herv
Die Blüthe öffnet sich nicht vollkommen. Die di
nen und zarten Blumenblätter sind $\frac{2}{3}$ Z. lang, und $\frac{1}{2}$
breit, ein wenig einwärts gekrümmt, und übrigens
eine Mäurer-Kelle gestaltet. Das Ende der Blät

ist weniger herzförmig, wie an der prägischen Muskateller. Die Blätter sind sehr groß, und ihr Rand ist stark eingekerbt, auch das Eingekerbte noch einmahl ausgezackt. Unweit der Spitze, welche wohl 1 Z. lang ist, sind sie in der Mitte viel breiter, als unweit dem Stiele. Ihre Länge beträgt über 6, und die Breite 3 Zoll. Die obere Seite der Blätter ist dunkelgrün, mit etwas tiefen Furchen versehen; die untere aber hellgrün. Die mittelste Ader, welche das Blatt in zwey gleiche Theile theilt, steht auf dieser untern Seite stark hervor, wie ein halber Stab. Die Seiten-Adern, ungefähr 10 bis 12 an jeder Seite der Mittel-Ader, sind auch gut erhaben. Der Stiel ist über 1 Z. lang, und hat oben einen rothen Streifen. Die Blätter sind gemeiniglich nur halb ausgebreitet, und wie eine Rinne gestaltet. Die Frucht ist einem Herzen ähnlich, d. i. sie ist beym Stiele dicker, als an dem gegenüber stehenden Ende oder der Spitze, und hat zwey breite Seiten. Der Länge nach wird sie durch eine kleine Vertiefung, oder eine eben nicht merkliche Naht in zwey Hälften getheilt. Sie ist fast 1¾ Z. lang, und unweit dem Stiele auch so breit. Die Haut ist sehr fein, doch hin und wieder mit einigen Erhöhungen und Ungleichheiten versehen. Wenn sie recht reif ist, so ist ihre Farbe sehr dunkelbraun, ja fast schwarz. Das Fleisch ist blutroth. Der Saft ist von eben der Farbe. Der Geschmack ist, wenn man sie recht reif und schwarz hat werden lassen, ungemein süß, dem aber das Piquante fehlt. Die Steine sind dick, und sitzen fest am Fleische; von Farbe weiß, oder weißgelblich. Ihre Länge beträgt beynahe ½, und die Breite ⅓ Zoll. Die Zeit der Reife ist am Ende des Jun., oder im Anfange des Jul., und dauert bis in die Mitte dieses Monathes, auch wohl, wenn es nicht zu heiß ist, den ganzen Monath durch. Der Baum ist ungemein fruchtreich, und schlägt nicht leicht fehl.

6. Schwarze

cater. Fällt in der Reife ein Regen ein, wovo
re Kirschen faulen, so bleibt doch diese gesund.
Haut ist roth und glänzend. Einige Stücke,
borgen und im Schatten gesessen haben, habe
the Flecken. Das Fleisch ist weißgelblich mi
im Munde, ohne daß ein zähes Mark zur
Der Saft hat zwar einen säuerlichen Geschm
cher aber, wenn die Kirsche nur recht reif ge
nicht nur ganz erträglich ist, sondern auch
bern des Sauern, den süßen vorgezogen wi
Saft ist, wie bey der vorhergehenden roth
Kirsche, in Menge vorhanden. Die Ste
mittelmäßiger Größe, weiß, und sitzen fes
dergestalt, daß man beym Essen gemeinigl
abstreift, und der Stein am Stiele sitzen
aber die Kirsche überreif, so fällt sie bey
vom Stiele, und der Stein bleibt in der
Zeit der Reife ist im Anfange des Ju
den ganzen Monath durch. Sie sol
Velser. Uebrigens kann man diesen
lieben auf saure oder süße Stämme
scheint er, auf süße gepfropft, dauerh
rer zu seyn.

5. **Rothe oder frühe Herz-K**
zur Classe der süßen gehörende Kirsch
ansehnlichsten von Gestalt. Er wä
starken zähen Zweigen. Er
zu pfropfen. Seine Jahrsschüs
dick, von brauner Farbe, mit einig
fen. Die Augen oder Knospen
von mittelmäßiger Dicke, und
Kegelspitze. Die Augenhalter
Die Blüthe öffnet sich nicht voll
nen und zarten Blumenblätter
breit, ein wenig einwärts gekeh
eine Mäurer-Kelle gestaltet.

Kirschen, kaum den dritten Theil so viel. Man darf ihn nur allein auf süße Stämme pfropfen. Die Jahrs-Schüsse sind 1 bis 1½ F. lang, sehr dick, aschgrau, an der Spitze grüngelblich. Die Augen sind rund und spitzig, wie ein Kegel. Die Augenträger stehen gut hervor. Die Blätter, welche sehr runzelig, und am Rande wie eine Säge tief eingekerbt sind, haben an der auswendigen oder obern Seite eine etwas dunkle, an der inwendigen oder untern Seite aber eine blaßgrüne Farbe, sind 6 Z. lang, und 3½ Z. breit. Die Furchen darauf sind sehr tief, und die gegenüber stehenden Adern sehr erhaben. Die Blüthe hält 1 Z. im Diameter, ist herzförmig, und nicht wohl geöffnet. Die Blumenblätter sind ¾ Z. lang, und ½ Z. breit. Die Frucht ist zwar so groß als die vorhergehende schwarze spanische, aber nicht recht wie ein Herz gestaltet, sondern mehr rund als lang, aber doch nicht kugelrund, wie eine Glas- oder rothe Oranien-Kirsche, sondern mit einigen Erhöhungen und Hervorragungen versehen, die sie etwas eckig und höckerig machen. Der dünne Stiel ist gewöhnlich 1½ Z. lang, und sitzt in einer glatten, aber eben nicht tiefen Höhle. Die Haut oder äussere Schale zeigt an der Sonnen-Seite zweyerley Roth getüpfelt; auf der Schatten-Seite ist sie weißgelb, wie weißes Wachs. Das Fleisch ist weiß, saftig, und nicht so hart und fest wie die vorhergehende. Man muß sie, nachdem sie vom Baume genommen ist, sogleich essen; den andern Tag ist sie unschmackhaft und fleckig; daher schickt sie sich nicht so gut zum Versenden, als die vorhergehende schwarze spanische, oder späte Herz-Kirsche. Der Saft führt eine große Süßigkeit bey sich, von einem feinen, erhabenen und angenehmen Geschmacke. Der Stein ist weiß, von mittlerer Größe, und nicht so groß, als der von der schwarzen Herz-Kirsche. Die Zeit der Reife ist gewöhnlich in der Mitte des Jul.; doch kommt sie gemeiniglich

8 Tage

ge-früher, als die ſchwarze ſpaniſche. - Iſt der
mer naß und dabey kalt, ſo berſtet ſie auf, und
ckt wäſſericht. Wenn man die Steine zum Säen
Samen-Baumſchule legt, und davon ungepfropft
achſen läſſet, bekommt man neue gute Varietäten.
leichen Stämme wachſen geſchwinde, tragen bald,
nd weit dauerhafter, als die gepfropften. Ihre
te ſind zwar gemeiniglich etwas kleiner, als die
en Haupt-Sorten, aber eben ſo ſchmackhaft, und
ger.

. **Rothe ſpaniſche Kirſche,** Bigarreau rouge,
Baum hat ein unvergleichliches Anſehen. Er
n eben ſo zähes Holz, als der ſchwarze Herzkirſch-
n, und wächſt zu einer auſſerordentlichen Größe.
wird nur auf ſüße Stämme gepfropft. Seine
striebe ſind ſehr lang und ſtark, wie die vorher-
den. Ihre Farbe iſt hellbraun, und fällt am
in das Grüne. Die Knoſpen ſind groß, rund
ſpitzig. Die Knoſpenhalter ſind ſehr breit, und
ervor ſtehend. Die Blätter ſind ungemein groß,
Z. lang, und 3 Z. breit. Gegen die Spitze ſind
eiter, als gegen den Stiel, am breiteſten aber in
Mitte. Sie haben einen feinen, und ſehr ordent-
ingekerbten Rand. Die grüne Farbe der Blätter
was dunkler und ſchöner, als an den vorhergehen-
Die Adern ſitzen auch viel enger an einander,
ey jenen. Die meiſten (inſonderheit die Mittel-
) ſind da, wo ſie am dickſten ſind, roth, ſo wie
der dünne Stiel, welcher 1½ Z. lang iſt, eine rothe
e hat. Der Rand des Blattes iſt rund umher
s eingebogen, und verurſachet daher in der Mitte
Rinne. Die Blüthe öffnet ſich nur halb, und
m Durchmeſſer über 1 Z. Die Blumenblätter
¾ Z. lang, und ½ Z. breit, am Ende faſt rund.
Blumenſtiel iſt bey Oeffnung der Blume kaum
lang, wird aber nachher wohl 3 Z. lang. Die
Fäd-

Fädchen, welche um den Stämpel herum ſ-hen, von ungleicher Länge. Kelch und Stiel ſind hellg Aus einer Blüth-Knoſpe kommen wohl 6 bis 8 B men hervor. Die Frucht iſt wie ein Herz geſtalte dieſem viel ähnlicher, als die ſchwarze Herz-Kir indem ſie am Ende, oder dem Stiele gegen über, ſp zuläuft. Auf einer Seite iſt ſie erhaben rund, au andern etwas platter. Auf dieſer platten Seite i mit einer ſichtbaren Naht verſehen, die, der L nach, vom Stiele an bis zur Spitze reichet. Frucht iſt beynahe 1 Z. lang, und da, wo ſie am teſten iſt, $\frac{1}{2}$ Z. dick. Der dünne Stiel iſt bey ei $1\frac{1}{2}$, bey andern 2 bis $2\frac{1}{2}$ Z. lang, und ſitzt in e weiten, eben nicht runzeligen Vertiefung. Dieſe Fr iſt bey einfallendem Regen-Wetter, zu der Zeit, d reif werden ſollte, der Fäulniß mehr unterworfen, irgend eine andere, ob ſie gleich unter allen die här iſt. Die Haut iſt fein, glatt und glänzend, an Sonnen-Seite dunkelroth, an der Schatten-S hellroth, über und über aber mit dunkeln und h Flecken beworfen, welches ſie bunt, ſcheckig und m morirt macht. Auch finden ſich wohl weiße Tü darauf. Inſonderheit iſt die Naht bisweilen weiß Das Fleiſch iſt unter allen Arten Kirſchen das feſt und doch ungemein ſaftreich, weißlich, und mit weißern Adern und Fibern durchwebet. Um den S iſt es da, wo die Sonne hingetroffen hat, unter Haut röthlich. Der Saft iſt in Menge vorhan Er hat eine blaßrothe Farbe, und iſt von ſehr ang nem und angenehmen Geſchmacke. Der Stein iſt lich rund, von Farbe gelblich, welche zugleich in Fleiſchfarbige fällt. Er iſt über $\frac{1}{2}$ Z. lang, $\frac{1}{3}$ Z. etwas mehr, breit und dick. Die Zeit der Reif entweder in der Mitte oder zu Ende des Jul., a die vorhergehenden mehrentheils vorbey ſind. S thut auch wohl, daß man ſie nicht eher angreift,

bis die andern nicht mehr vorhanden ſind, wofern ein einfallendes Regen-Wetter ſolches nicht verbiethet. Dieſe Kirſche verdient mit Recht den Nahmen Knupper-Kirſche; denn ſie iſt weit härter als die ſchwarze ſpaniſche, und daher zum Verſenden die beſte.

9. **Wahre May-Kirſche**, Fr. Ceriſe precoce. Unter allen Kirſchbäumen iſt dieſer der kleinſte und unanſehnlichſte. Er iſt nicht viel größer als eine mittelmäßige Staude, hat ſchwache dünne Zweige, und wird höchſtens 4 Fuß hoch. Er iſt vielleicht der von den Alten genannte Cerafus pumila Macedonica. Er gehört zur Claſſe der ſauern, theils, weil ſeine Rinde weit ſchwarzer und brauner iſt, als die Rinde der ſüßen Kirſch-Stämme, die eine aſchgraue Rinde haben, theils, weil ſeine Früchte kugelrund ſind. Man kann ihn auf ſaure oder ſüße Stämme pfropfen. Die Pfropfreiſer bekleiben recht gut; man hält aber doch dafür, daß er auf ſauern Stämmen ein beſſeres Wachsthum habe. Seine Jahrsſchüſſe ſind kurz, und ſehr dünn wie ein Bindfaden, auf der Sonnen-Seite hellbraun, auf der gegenüber ſtehenden Seite graubraun. Die Knoſpen ſind zwar klein, etwas länglich, ſpitzig, und von dem Reiſe abſtehend; nach Proportion der dünnen Reiſer aber kann man ſie wohl dick nennen. Die Augenträger ſind kaum ſichtbar. Die Blätter ſind oberwärts und auf der glatten Seite dunkelgrün, auf der andern Seite aber hellgrün, dabey ſehr klein, indem die größten nur eine Länge von 3 Z., und eine Breite von keinem vollen Zoll, haben. Am breiteſten ſind ſie in der Mitte. Ihre Auszackung iſt ſehr fein. Unten haben ſie Adern, die nicht ſtark aufliegen, und oben ſind die Furchen eben nicht tief. Der Stiel iſt etwa ½ Z. lang. Die Blüthe hält im Durchſchnitte etwann 1 Z., oder etwas weniger. Die Blumen-Blätter ſind ſehr ſchmahl, ſchwach, und wie ein Löffel ausgehöhlt, mit runzelzigem Rande. Aus einer Knoſpe kommen 2 bis 3 Blu-

men hervor. Die Frucht ist klein, rund wie eine g
drückte Kugel, etwann ½ Z. hoch, und etwas breiter a
hoch. Der 1 Z. lange Stiel steckt in einer weiten u
tiefen Höhle. Am Ende der Frucht, dem Stiele gege
über, ist gleichfalls eine kleine Grube, worin gemeini
lich noch ein übrig gebliebenes Stück vom Stämp
sitzt, welches, wenn man es anrührt, sogleich abfäll
Von da aber geht eine Naht, welche um die Mitte d
Frucht erst recht sichtbar wird. Die Haut ist har
glatt und dunkelroth, wird aber mit Ende des Jun
glänzend schwarz. Das Fleisch ist weißlich roth, un
hat nicht gar vielen Saft. Wenn man die Kirsche
recht reif werden lässet, so hat das Fleisch eine dunke
rothe Farbe, wie die schwarze Back-Kirsche, ist abe
viel milder. Der Saft ist ziemlich sauer, wenn ma
sie gern früh und im May genießen will; wartet ma
aber bis in den halben Jun., und lässet sie recht re
werden, so hat der Saft eine angenehme Schärfe be
sich. Der Stein ist roth, und nach der Proportio
der Kirsche sehr groß. Es gibt aber auch eine Sorte
worin ein kleiner Stein ist. Der einen ihr Kern i
nicht viel größer, als eine mittelmäßige Linse. Di
Zeit der Reife sollte zwar gegen das Ende des Maymo
nathes seyn, aber selten kommt sie früher als die prag
ische Muskateller, weil die Witterung im May nich
allemahl die erforderliche Wärme schenkt.

10. **Große ungarische Kirsche.** Dieser Baum
hat fast einen solchen Wuchs, als die Welser. Er ha
wenige, aber lange und gerade Zweige, die mit viele
Blättern dicht besetzt und sehr buschig sind. Ueber
haupt gehört er nur zu den mittelmäßigen Bäumen,
hat aber doch ein sehr lebhaftes Ansehen. Man pfropf
ihn allein auf süße Stämme. Seine Jahrstriebe sind
lang und dick, wie die Reiser der Herz-Kirsche, von
Farbe aschgrau mit grüngelblichen Streifen. Die Augen
sind groß, rund und spitzig, etwas vom Reise abstehend,

wie

wie die Augen an den meisten Birnbaum-Reisern zu seyn pflegen. Die Augenträger stehen gut hervor. Die Blätter haben eine Gestalt, die denen von der schwarzen spanischen ähnlich ist, und eine Länge von 6 Z., mit einer Breite von 3½ Z. Er hat unter allen Kirsch-Bäumen die meisten Blätter. Diese sind sehr runzelig, am Rande tief ausgezackt, und das Ausgezackte ist noch einmahl eingekerbt. Viele haben einen zerfetzten Rand. Die Furchen auf der obersten oder dunkelgrünen Seite sind ungemein tief, und die Adern auf der gegenüber stehenden oder blaßgrünen Seite sind sehr erhaben. Der Blattstiel ist ½ Z. lang. Die Blüthe ist groß, und hält über 1 Z. im Durchschnitt. Die Blumenblätter sind sehr rein am Rande, ohne alle Kerben; am Ende aber sind sie wie zerrissen. Ihre Länge beträgt 1 Z., die Breite über ½ Z. Sie sind wohl geöffnet, und wie ein Löffel ausgehöhlt. Die Frucht gehört zu den Kirschen erster Größe, indem sie 1 Z. lang, und ¾ Z. dick ist. Ihre Gestalt ist der schwarzen spanischen, oder späten Herz-Kirsche ziemlich ähnlich, aber noch ein wenig größer. Es finden sich auf derselben eben solche Ungleichheiten. Der Stiel ist grün, und sitzt in einer glatten Grube, deren Rand etwas höckerig ist. Einige Stücke haben eine sichtbare Naht. Die Haut ist glänzend glatt, von dunkelrother Farbe, die zuletzt schwarz wird. Das Fleisch ist roth, mit dunkelrothen Adern durchwebt. Der Saft ist in Menge vorhanden, und verursacht einen gewissen aromatischen Geschmack, welcher diese Kirsche zu einer der süßesten und angenehmsten macht. Der Stein ist zwar von der Größe und Länge, wie der von der schwarzen spanischen, aber nicht so weiß, und viel glatter und dünner. Er ist fast ½ Z. lang, ¼ Z. breit, und ⅓ Z. dick. Die Zeit der Reife ist erst am Ende des Jul., und dauert bis in den August. Der Baum fängt spät an zu tragen, und bringt insgemein wenig Früchte, weil die

Blüthe von den geringsten Nacht-Frösten verdorben zu werden pflegt; in einem mäßig warmen Frühlinge aber sitzt er so voll, wie andere Bäume. Wegen des lieblichen Geschmackes seiner Früchte verdient er vor andern, unterhalten zu werden.

11. **Große Amarelle.** Dieser zur Classe der sauern gehörende Kirschbaum hat unter allen das stärkste Wachsthum, und sehr ansehnliches Holz und Laub. Er fängt zwar erst im 4 oder 5ten Jahre nach dem Pfropfen tragbar zu werden an, auch bringt er überhaupt nicht gar viele Früchte; indessen verdient er doch eben so wohl, wie andere Arten, wegen der Güte und des mannichfaltigen Nutzens seiner Früchte, daß er fleißig angepflanzet werde. Seine Jahrstriebe sind dünn, eben nicht lang, von dunkelbrauner mit Aschgrau vermischter Farbe. Die Knospen sind kurz, rund und spitzig, und haben gut hervor stehende Augenträger. Die Blätter sind an jungen, in starkem Wachsthume stehenden Bäumen 3 Z. lang, und $3\frac{1}{4}$ Z. breit; an alten Bäumen 5 Z. lang, und $2\frac{1}{2}$ Z. breit. Der fein ausgezackte Rand windet sich aus- und einwärts. Die Farbe ist oberwärts sehr dunkelgrün, und unterwärts hellgrün. Auf der untern Seite ist die Mittel-Ader sehr stark und erhaben, von welcher an jeder Seite 7 bis 9 starke Neben-Adern abgehen. Der Stiel ist 1 Z. lang. Die Blüthe ist von 1 Z. im Durchmesser. Eben so lang ist auch ein jedes der 5 Blumenblätter, welche die Gestalt eines Herzens haben. Die Frucht gehört zu den Kirschen erster Größe. Ihre Gestalt ist kugelrund, wie die große Glas-Kirsche. Der Stiel, welcher halb braun und halb grün ist, und nicht fest an der Frucht sitzt, hat eine Länge von $1\frac{1}{2}$ Z., und ist sehr dünn. Er sitzt in einer völlig glatten Höhle. Auf der gegenüber stehenden Seite, d. i. am Ende der Frucht, findet sich ein Grübchen. Die Haut ist glänzend glatt, von pechschwarzer Farbe, wenn man sie recht reif ha

wer

werden lassen. Das Fleisch ist blutroth, und mit Adern von eben der Farbe durchwebt. Der Saft ist in solcher Menge vorhanden, wie er nur bey einer recht saftigen Kirsche seyn kann, und verursachet, wenn die Früchte recht reif geworden sind, auf der Zunge einen weinsäuerlichen, nicht unangenehmen Geschmack. Der Stein ist von mittelmäßiger Größe, und hat, wie das Fleisch, eine blutrothe Farbe. Die Zeit der Reife ist am Ende des Jun., und im Anfange des Jul. Sie gehört also zu den frühesten Kirschen. Im Jun. ist sie zwar noch etwas zu sauer zum roh essen; aber zu Suppen, wenn kein Zucker gesparet wird, ist sie köstlich.

12. **Kirsche von der Natte.** Der Ursprung dieses zur Classe der sauern gehörenden Kirsch-Baumes, soll aus Holland seyn, wo er in dem Garten eines Grafen von der Natte zuerst gewachsen ist; wie denn die Holländer den Ruhm haben, daß man bey ihnen die meisten und rarsten Sorten von Kirschen antrifft, da hingegen in Frankreich wenig aus Kirschen gemacht wird. Der Baum erlangt eine ansehnliche Größe und Stärke, mit gerade auf stehenden häufigen Zweigen. Er trägt bald, reichlich, und alle Jahr. Man kann ihn, nach Belieben, auf saure oder süße Stämme pfropfen. Er hat zwar die Unart an sich, daß alle Jahr einige Spitzen der Zweige vertrocknen, welches übel steht, und die Mühe verursachet, solche abzuschneiden; indessen bleibt er doch ein ansehnlicher zweigreicher Baum. Seine Jahrsschüsse sind ziemlich lang, aber eben nicht dick. Ihre Farbe ist aschgrau und dunkelbraun; und man kann solche von den Jahrsschüssen der sauern Back-Kirschen, welche unter No. 15 beschrieben werden, nicht unterscheiden. Die Knospen sind rund und sehr spitzig; die Augenträger stehen gut hervor. Die Blätter sind 5 Z. lang, 2 bis $2\frac{1}{2}$ Z. breit, mit scharf gezacktem Rande. Sie sind dunkelgrün und glatt, mit nicht sehr tiefen Furchen. Die

Haupt-Ader in der Mitte auf der unrechten Seite ist sehr stark, von welcher auf jeder Seite 7 Neben-Adern abgehen. Der Stiel ist ¾ Z. lang. Die Blüthe öffnet sich wohl, und ist einem ausgehöhlten Löffel gleich. Im Durchschnitt hält sie 1 Z. Die Blumenblätter sind 1 Z. lang, und am Ende ½ Z. breit. Aus einer Knospe kommen etwa 6 bis 8 Blumen hervor. Die Frucht ist von mittelmäßiger Größe; ja einige Stücke, insonderheit, wenn der Baum eben nicht gar zu voll sitzt, kann man wohl zu den Kirschen erster Größe rechnen. Sie ist nicht völlig kugelrund, wie die vorhergehende große Amarelle, sondern etwas länglich. Am Ende findet sich eine kleine Grube, wo der Stämpel gesessen hat. Der 2 Z. lange Stiel ist dünn, sitzt nicht fest an der Frucht, und hat seinen Platz in einer glatten Vertiefung. Die Haut ist glänzend und pechschwarz. Das Fleisch ist blutroth, und färbet ausserordentlich stark. Der Saft ist in großer Menge vorhanden, und hat eine angenehme Säure bey sich. Der Stein ist von mittlerer Größe. Die Zeit der Reife ist zu Ende des Jul., und dauert bis in die Mitte des Auguſtes. Diese Kirsche ist insonderheit zum Backen im Dörr-Ofen vorzüglich schön.

13. Schwarze Forellen-Kirsche. Der Baum hat ein vortreffliches Ansehen, mit schönen wohl geordneten Zweigen und Laube. Er gehört zu der Classe der sauern, wie solches auch die schwarzgraue Rinde anzeigt. Man hat davon zwey Sorten, die dem Wachsthume und Laube nach einander völlig ähnlich sind. Die erste Art ist die so genannte Loth-Kirsche, die zwar sehr große, aber wenige Früchte trägt, auch spät zu tragen anfängt. Die zweyte Art hingegen sitzt alle Jahr voll, und der Baum fängt schon im zweyten Jahre nach dem Pfropfen zu tragen an, ob gleich die Früchte nur etwas kleiner, als die von der Loth-Kirche ausfallen. Diese zweyte Art ist den Obst-Liebhabern vorzüglich

lich zu empfehlen. Die Jahrstriebe sind sehr lang und dick, von aschgrauer und dunkelbrauner Farbe. Die Knospen sind rund, spitzig, und stärker als an andern Kirschbaum-Reisern. Sie stehen auch weiter von dem Reise ab, als andere. Die Augenhalter sind sehr sichtbar. Die Blätter sind 5 Z. lang; unweit der Spitze 2¾, und unweit dem Stiele 1½ Z. breit. Sie sind dunkelgrün, und glänzend glatt. Die Furchen auf der obern Seite sind eben nicht tief, auf der untern Seite aber liegen die Adern dick auf. Von der Mittel-Ader gehen auf jeder Seite 7 starke Neben-Adern aus. Der Rand ist sehr ordentlich und scharf ausgezackt. Der Stiel ist über 1½ Z. lang, daher sich die Blätter vom Winde leichter, als andere Kirsch-Blätter, bewegen. Die Blüthe hält über 1 Z. im Diameter. Die Frucht hat in der Größe den Rang vor allen andern Kirschen. Sie ist gewöhnlich 1 Z. lang, und hält ¾ Z. in der Dicke. Sie ist daher nicht recht kugelrund, sondern etwas länglich. Der Stiel ist 2½ bis 3 Z. lang, und sitzt so fest an den Zweigen, daß man bey dem Abbrechen immer etwas Rinde mit abreißt. Da, wo er in der Kirsche gesessen hat, hinterlässet er eine glatte Grube. Die Haut ist dunkel schwarzbraun und glänzend, oder, wenn man sie recht reif hat werden lassen, pechschwarz, zuweilen mit einigen Erhöhungen. Das Fleisch ist blutroth, mit eben dergleichen Adern durchwebt. Der Saft ist in Menge vorhanden, und verursachet nur bey denen, die was Süßes lieben, eine gar zu starke Säure, da hingegen den Liebhabern saurer Sachen solche gar angenehm ist, indem der Saft eine liebliche Schärfe bey sich führt. Der Stein ist, wie das Fleisch, blutroth, ½ Z. lang, und nach Proportion dick. Die Zeit der Reife ist im Anfange des Auguſtes, und dauert bis nach der Aernde; sie ist also eine der spätesten Kirschen. Uebrigens ist der Baum sehr tragbar, und man kann ihn auf saure

oder süße Stämme pfropfen. Zum Backen und Einm
chen hat diese Kirsche ihres gleichen nicht.

14. Schwefel-Kirsche, weiße Twieselbeer
Sie gehört zur Classe der süßen Stämme. Der Bau
wächst sehr hoch, mit langen geraden Zweigen, u
hat ein sehr zähes Holz, welches sich gut beugen läss
Die Jahrsschüsse sind von ziemlicher Länge und Stä
ke, und haben eine aschgraue, an der Spitze aber gel
liche Farbe. Die Augen sind rund, lang, kugelförmi
und stehen weit von dem Reise ab. Sie ruhen a
gut hervor stehenden Augenhaltern. Aus Einem Au
kommen oft 10 und mehr Blüthen hervor, woraus he
nach ein Büschel Kirschen wird. Die Blätter seh
denen von der Bigarreau sehr ähnlich; sie sind 6 Z. lan
3 Z. breit, stark am Rande eingekerbt, mit tiefen Fu
chen obenher, und starken Adern unterwärts. D
Blüthe ist wohl geöffnet, im Durchschn. 1 Z. bre
Die Blumenblätter sind $\frac{3}{4}$ Z. lang, und am Ende $\frac{1}{2}$
breit. Die Frucht ist (die wahre May-Kirsche au
genommen) eine der kleinsten Kirschen, und hat
Form einer Herz-Kirsche. Der Stiel ist 2 Z. lan
und hat seinen Sitz in einer glatten Grube. Die Ha
ist auf der einen Seite blaßgelb, und auf der ande
roth marmorirt; daher könnte man sie die kleine B
garreau nennen. Einige Stücke sind so durchsicht
daß man die Steine darin wahrnehmen kann. Ei
andere Art der Schwefel-Kirsche ist über und üb
gelb. Das Fleisch ist an derjenigen Seite, wo
Frucht gelb ist, inwendig weiß; und an der gegenüb
stehenden Seite, wo die Frucht von aussen marmor
ist, inwendig röthlich oder fleischfarben. Der Saft
in großer Menge vorhanden, und verursachet einen a
genehmen süßen Geschmack. Die Steine sind kle
und so weiß wie die Steine der Bigarreau. Die Z
der Reife ist um Mariä Heimsuchung, oder im Ansa
ge des Jul. Es reifen aber, weil der Baum st
kl

klettenvoll zu sitzen pflegt, immer einige nach, so, daß man sie wohl 3 Wochen über genießen kann. Von einigen wird sie die **Purgier-Kirsche** genannt; sie hat aber keine larierende Eigenschaft an sich.

15. **Saure Einmach- und Back-Kirschen, Leitzkauer Kirschen.** Die erste Benennung ist von ihrem mannichfaltigen nützlichen Gebrauche hergenommen; und die zweyte von dem adeligen Flecken und Kloster Leitzkau im Magdeburgischen, wo diese Kirschen in großer Menge anzutreffen sind. Der Baum hat einen starken Wuchs, und kann ein hohes Alter erreichen. Seine äussere Rinde ist weit dunkler grau, als anderer Kirschbäume ihre. Die Zweige sind, (die Haupt-Zweige, die den Baum formiren, ausgenommen,) überaus schwach, und haben stets eine niederwärts hangende Richtung, so, daß sie endlich, wenn man sie nicht abschnitte, bis auf die Erde hangen würden. Hat man nur erst ein Par solche Bäume, so kann man sie leicht von den Wurzel-Ausschüssen, welche häufig umher ausprossen, vermehren. Denn man hat nicht nöthig, solche zu pfropfen, sondern man hebt solche Ausschößlinge, da sie noch klein sind, mit einem Spaten aus, und pflanzt sie in die große Baumschule ordentlich in Reihen, so werden bald, wenn man sie nur alle Winter bey offenem Wetter fein ausschneitelt, ansehnliche Bäume daraus werden. Wenn dieser Baum eine Höhe von 6 bis 7 F. bekommen, und alsdann eine Krone hat, fängt er sogleich an zu tragen, und fährt alle Jahr damit fort. Die Jahrsschüsse sind dünn und kurz, so, daß man selten mehr als ein Pfropfreis machen kann; von Farbe dunkelaschgrau und braun. Die Augen haben eine Pyramidal-Figur, stehen gut vom Reise ab, und haben stark hervor stehende Augenstützen. Die Blätter sind von ausserordentlicher Dicke und Härte, von Farbe sehr dunkelgrün, glänzend glatt, und am Rande regulär ausgezackt.

zackt. Sie ſind 3 bis 3½ Z. lang, und 2½ Z. breit. Die Mittel-Ader iſt wie ein runder darauf geleimter hellgrüner Faden anzuſehen, von welchem 7 bis 8 dergleichen Neben-Adern abgehen. Der Stiel iſt nur ½ oder ½ Z. lang. Die Blüthe iſt von 1 Z. im Durchſchnitt; und eben ſo lang iſt auch ein jedes der 5 Blumenblätter, welche am Ende ¾ Z. breit ſind. Aus Einer Trage-Knoſpe kommen wohl 10 Blüthen hervor, daher der Baum zur Blüh-Zeit über und über weiß iſt. Die Frucht iſt von mittelmäßiger Größe. Ihre Geſtalt iſt völlig kugelrund. Einige ſind platt, und mehr breit als hoch. Der Stiel iſt 2½ Z. lang, und ſitzt in einer glatten Höhle. An dem gegen über ſtehenden Ende der glatten Vertiefung, wo der 2 Z. lange Stiel geſeſſen hat, trifft man oft eine kleine Grube an, wo der Stämpel zur Blüh-Zeit ſeinen Sitz gehabt hat. Die Haut iſt ſchwarzbraun, oder, wenn ſie recht reif geworden iſt, pechſchwarz und glänzend, an allen Orten gleich, ohne Hervorragungen oder Hügel. Das Fleiſch iſt blutroth, mit Adern von eben ſolcher Farbe durchwebt. Der Saft iſt zwar in Menge vorhanden, aber ſehr ſauer, auch wenn die Frucht recht reif iſt; daher dient ſie nicht zum roh eſſen. Die Steine ſind klein, und haben eine blutrothe Farbe. Wenn ſolche nebſt der Frucht in einem Mörſer zerquetſchet werden, dienen ſie zum Kirſch-Brantwein, und haben auch ihren Nutzen in der Wirthſchaft; aber zum Pflanzen oder Legen in die Samen-Baumſchule ſind ſie nicht ſo gut als andere Kirſch-Steine, denn ſie wachſen ſehr langſam, und die daher gezogenen Stämme ſind dünn. Daher iſt es am beſten, ſolche durch Wurzel-Ausſchüſſe zu vermehren, oder ſie auf wilde Stämme zu pfropfen. Die Zeit der Reife iſt im Auguſt. Iſt die Hitze alsdann nicht zu ſtark, ſo kann man ſolche wohl 3 Wochen genießen, und zu allerley Gebrauche anwenden.

16. Brüſ

16. **Brüsselsche Bruyn.** Diese Kirsche ist niederländischen Ursprunges. Der Baum ist unter allen Kirschbäumen hier zu Lande der unansehnlichste. Er wird selten über 12 F. hoch. Wenn er diese Höhe erreicht hat, beugen sich seine dünne schwarzgraue Zweige von allen Seiten her niederwärts, daß er oben rund wie eine Kugel wird. Sein Wachsthum ist wie das Wachsthum des Borstorfer-Apfelbaumes; nur in der Dauer ist er ihm nicht gleich, denn er wird nicht sehr alt, sondern nach 20 Jahren fängt ein Zweig nach dem andern an abzusterben. Dem ungeachtet verdient er, wegen seiner Tragbarkeit, und wegen des delicaten Geschmackes seiner Früchte, gezogen zu werden. Seine Jahrstriebe sind sehr dünn, und eben so kurz als die von der sauern Back-Kirsche. Ihre Farbe ist dunkelgrau. Die Augen stehen ziemlich von dem Reise ab, sind kurz, aber sehr spitzig, und haben stark hervor stehende Augenthalter, worauf sie ruhen. Die Blätter wachsen einzeln, und machen eben kein sonderliches Ansehen, weil sie nicht einmahl die Zweige bedecken können; so wenig sind ihrer. Ihre Farbe ist auf der obern Seite dunkelgrün, und auf der untern hellgrün. Sie werden gar oft von dem Auswurfe einiger Insecten befallen, und schmutzig. Sie sind 3 Z. lang, und 2 Z. breit. Die Auszackung des Randes ist nicht tief, und ziemlich regulär. Der Blattstiel ist $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ Z. lang. Die Blüthe ist wohl geöffnet, im Diameter 1 Z. breit, und die Blumenblätter sind auch 1 Z. lang, am Ende $\frac{1}{2}$ Z. breit. Die Frucht gehört zu den Kirschen der zweyten Größe. Der Gestalt nach ist sie kugelrund, wie die große Amarelle. Nach Hrn. v. Münchhausen hat sie die merklichste Naht(*). Der Stiel

(*) Allein, da sich diese nicht daran findet, so versteht er gewiß dadurch eine ganz andere Art Kirschen. Mir sind nur drey Kirschen bekannt, die eine sehr merkliche Naht haben, nähmlich: die pragische Muskateller, die Velser, und die rothe span-

Stiel iſt 2 Z. lang, und ſehr dünn. Die Haut i dunkelbraun, faſt ſchwarz, und ſehr glänzend. Wen der Baum von Inſecten befallen iſt, ſind die Früch wie mit ſchwarzem Staube beſtreuet, bleiben klein un unſchmackhaft. Das Fleiſch iſt dunkelroth, wie d der großen Amarelle. Der Saft iſt in großer Men vorhanden, und verurſachet auf der Zunge einen wei ſäuerlichen, hoch feinen und köſtlichen Geſchmac Die Steine ſind von mittlerer Größe, und blutrot Die Zeit der Reife iſt im Auguſt, und ſie gehört al zu den Spät-Kirſchen.

17. October-Kirſche, wird an ſich nicht g groß, und iſt von keinem beſondern Geſchmacke. D Baum blühet von der Zeit, da die Kirſchen überhau zu blühen anfangen, bis zum Sept. fort, da man i deſſen den Sommer durch immerfort reife Kirſchen b in den Oct. auf dem Baume antrifft, der Baum mö auch an einem Orte des Gartens ſtehen, wo er wolle.

Dühamel, in ſeiner Abh. von den Obſtbäume nach Hrn. Oelhafen v. Schöllenbach Ueberſetz. 1 T Nürnb. 1775, gr. 4. S. 115, fgg. theilt die Kirſchbäu in zwo Claſſen. Die erſte begreift die Kirſchbäume m herzförmiger, und die zweyte die mit runder Frucht um ſich.

I. Die Haupt-Sorten der erſten Claſſe, ſind die M riſiers, die Guigniers, und die Bigarreautiers.

1. Meriſiers.

a) Ceraſus maior ſylueſtris, fructu cordato minimo, ſu dulci aut iuſulſo. Meriſier à petit fruit. Wild Kirſchbaum mit kleiner ſüßlicher oder auch u ſchmackhafter Frucht.

b) Ceraſus maior ſylueſtris, flore pleno; Ceraſus mai ac ſylueſtris, multiplici flore, H. R. P. Meriſier flo

ſpaniſche. Ob es eine von den erſten beyden ſey, iſt ungew weil Hr. v. M. viel zu kurz iſt, und keine einzige vollſtänd Beſchreibung eines gewiſſen Obſtes geliefert hat.

fleur double. Wilder Kirſchbaum, mit gefüllter Blüthe.

c) Ceraſus maior ſylueſtris, fructu cordato, nigro, ſubdulci; Ceraſus maior ac ſylueſtris, fructu ſubdulci, nigro colore inficiente C. B. Meriſier à gros fruit noir. Wilder Kirſchbaum, mit großer ſchwarzer Frucht.

2. Guigniers.

a) Ceraſus maior hortenſis, fructu cordato, nigricante, carne tenera & aquoſa; Guignier à fruit noir. Herzkirſch-Baum mit ſchwarzer Frucht.

b) Ceraſus maior hortenſis, fructu cordato minore, nigricante, carne aquoſa & ſubdulci; Guignier à petit fruit noir. Herzkirſchbaum mit kleiner ſchwarzer Frucht.

c) Ceraſus maior hortenſis, fructu cordato, partim albo, partim rubro, carne tenera & aquoſa; Guignier à gros fruit blanc. Herzkirſchbaum mit großer weißer Frucht.

d) Ceraſus maior hortenſis, fructu cordato rubro, ſerotino, carne tenera & aquoſa; Guignier à fruit rouge tardif; Guigne de fer, ou de St. Gilles; Herzkirſche mit ſpäter rother Frucht. Eiſerne oder St. Egidien-Kirſche.

e) Ceraſus maior hortenſis, fructu cordato nigro, ſplendente, carne tenera, aquoſa & ſapidiſſima; Guignier à gros fruit noir luiſant; Herzkirſchbaum mit großer, ſchwarzer, glänzender Frucht.

3. Bigarreautiers.

a) Ceraſus maior hortenſis, fructu cordato maiore, ſature rubro, carne dura ſapidiſſima; Bigarreautier à gros fruit rouge; Bigarreautier mit großer rother Frucht.

b) Ceraſus maior hortenſis, fructu cordato maiore, hinc albo, inde dilute rubro, carne dura ſapida; Bigarreautier à gros fruit blanc; Bigarreautier mit großer weißer Frucht.

c) Ceraſus maior hortenſis, fructu cordato minori, hinc albo, inde dilute rubro, carne dura dulci; Bigarreautier à petit fruit hâtif; Bigarreautier mit kleiner frühzeitiger Frucht.

d) Ce-

d) Ceraſus maior hortenſis, fructu cordato minori rubr carne dura dulci; Bigarreautier à petit fruit rouge hâ tif; Bigarreautier mit kleiner rother frühzeitige Frucht.

e) Ceraſus maior hortenſis, fructu cordato medio, carne du ra ſapida; Bigarreautier commun; Gemeiner B garreautier.

II. Die Claſſe der Kirſchbäume mit runder Frucht begreift 1. alle Sorten und Varietäten derjenige Kirſchbäume, deren Früchte in Paris eigentlic Ceriſes genannt werden; 2. einige Sorten, welch von der erſten Claſſe etwas, mehr aber von de zweyten an ſich haben.

a) Ceraſus pumila, fructu rotundo minimo acido praecocio ri; Ceriſier nain à fruit noir rond précoce; Zwerg Kirſchbaum mit runder frühzeitiger Frucht.

b) Ceraſus ſativa, fructu rotundo medio, rubro, acido, prae coci; Ceriſier hâtif; Frühzeitiger Kirſchbaum.

c) Ceraſus vulgaris, fructu rotundo; Ceriſier commun fruit rond; Der gemeine Kirſchbaum mit runde Frucht.

d) Ceraſus vulgaris, duplici flore Lob. Ceraſus multiflor fructum edens Ger. Ceriſier à fleur ſemi-double Kirſchbaum mit halbgefüllter Blume.

e) Ceraſus vulgaris, fructu pleno ſterili; Ceriſier à fleu double; Kirſchbaum mit gefüllter Blüthe.

f) Ceraſus vulgaris, fructu rotundo, nucleo fragili, an Ce raſus hortenſis, fructu ſine oſſiculis? H. L. B. Ceriſe noyau tendre; Kirſche mit mürbem Kerne.

g) Ceraſus ſativa multifera, fructu rotundo medio, ſatur rubro; Ceriſier très fertile; Ceriſier à trochet Sehr fruchtbarer Kirſchbaum; Kirſchbaum mi Bündeln von Früchten.

h) Ceraſus ſativa, fructus rotundos acidos, vno pedicul plures ferens; Ceriſier à bouquet; Kirſchbaum mi einem Bouquet von Früchten, oder mit mehrer Früchten auf dem nähmlichen Stiele.

i) Ceraſus ſativa, aeſtate continua florens ac frugescens Ceriſier de la Touſſaint, de la St. Martin, tardif; Aller heiligen- oder St. Martins-Kirſchbaum; ſpäte Kirſchbaum.

k) Cera-

k) Ceraſus ſativa, fructu rotundo maiori, acute & ſplendide rubro, brevi pediculo; Cerifier de Montmorency à gros fruit; Gros Gobet; Gobet à courte queue; Kirſch-Baum von Montmorency, mit großer Frucht; Großer Gobet; Gobet mit dem kurzen Stiele.

l) Ceraſus ſativa, fructu rotundo magno, rubro, grate acidulo; Cerifier de Montmorency; Kirſchbaum von Montmorency.

m) Ceraſus ſativa, fructu rotundo maiore, dilutius rubro, gratiſſimi ſaporis vix aciduli; Cerifier à gros fruit rouge - pâle; Kirſchbaum mit großer bleichrother Frucht.

n) Ceraſus ſativa paucifera, fructu rotundo magno pulchre rubro, ſuaviſſimo; an Ceraſa Hispanica Lob. & Ger.? Cerifier de Hollande; Coulard; holländiſcher Kirſchbaum.

o) Ceraſus ſativa, fructu rotundo magno, partim rubello, partim ſuccineo colore; Cerifier à fruit ambré, à fruit blanc; Kirſchbaum mit gelber Frucht, mit weißer Frucht.

p) Ceraſus ſativa, fructu rotundo magno, nigro, ſuaviſſimo; Griottier.

q) Ceraſus vulgaris, fructu rotundo parvo, atro-rubente, ſubacri & ſubamaro, ſerotino; Cerifier à petit fruit noir; Groſſe Ceriſe à Ratafia; Kirſchbaum mit kleiner ſchwarzer Frucht. Große Ratafia-Kirſche.

r) Ceraſus vulgaris, fructu rotundo, minimo, atro rubente, acri & amaro, ſerotino; Cerifier à très-petit fruit noir; Petite Ceriſe à Ratafia; Kirſchbaum mit ſehr kleiner ſchwarzer Frucht. Kleine Ratafia-Kirſche.

s) Ceraſus ſativa, fructu rotundo, maximo, è rubro nigricante, ſuaviſſimo; Griottier de Portugal; Portugieſiſcher Griottier.

t) Ceraſus ſativa, fructu ſubrotundo, magno, e rubro nigricante, acido; Griottier d'Allemagne; Griotte de Chaux; Groſſe Ceriſe de M. le Comte de Ste. Maure; der deutſche Griottier; die Griotte von Chaux.

u) Ceraſus ſativa multifera, fructu rotundo, magno, è rubro nigricante, ſuaviſſimo; Royale; Cherry - Duke; die königliche Kirſche.

v) Ceraſus ſativa multifera, fructu ſubcordato, magno, è rubro nigricante, ſuaviſſimo; Ceriſe-Guigne.

Um

Um gute Früchte zu bekommen, kann man solche auf wilde Stämme oculiren, pfropfen, oder absäugen; oder man zieht gute Stämme aus Kernen; oder man lässet sich die beliebigen Arten aus Baumschulen kommen.

Wer eine **Kirsch-Baumschule** anzulegen Lust hat, kommt am geschwindesten dazu durch wilde oder Twieselbeer-Stämme. Zwar kann man sich dergleichen Stämme auch von Kirsch-Kernen, (Kirsch-Steinen) zuziehen; denn wenn solche bey Zeiten im Herbste, oder gar schon im Anfange des Augustes geleget werden, pflegen sie schon im Anfange des künftigen Aprils aufzugehen; aber es darf nur ein starker Nacht-Frost kommen, so sind sie, wie die Gurken und Schmink-Bohnen, schwarz. Ist hingegen der Frühling bis in den halben Jun. warm, so hat man, wenn sie nur gut aufgegangen sind, hernach nichts mehr zu befürchten; sie werden geschwinde stark, und alsdann haben sie einen solchen Vorzug vor den wilden Stämmen, als die Apfelkern-Stämme vor den wilden oder Holzopfel-Stämmen. Denn man kann sie schon im ersten Herbste verpflanzen, da sie alsdann die meisten eines Fingers Dicke haben. Sie werden, wie die Apfel- und Birn-Stämme, eine Reihe $2\frac{1}{2}$ F. von der andern, und ein Stamm 1 bis $1\frac{1}{2}$ F. von dem andern, gepflanzt. Nachdem sie in der großen Baumschule 2 Jahr gestanden haben, und überhaupt 3 Jahr alt sind, können sie insgesammt gepfropfet werden, wenn sie nicht schon im dritten Sommer oculirt sind. Bey dem Versetzen der jährigen Stämmchen aus der Samen-Baumschule in die große Baumschule, kann man in der Samen-Baumschule allemahl einen guten Fuß von einander ein Stämmchen stehen lassen, welche man schon im folgenden Sommer oculiren kann. Allein, weil die von Kirsch-Steinen aufgegangenen Bäumchen sehr leicht erfrieren, so ist es sicherer, wenn man zugleich

eine

eine Baumschule von wilden Stämmen anlegt. Oder, man sucht Sprößlinge von sauern Kirschbäumen, welche häufig bey der Wurzel alter Stämme auszuschlagen pflegen, und die ohnedies gemeiniglich weggeworfen werden, zu bekommen. Diese werden nun z. B. im Herbste 1787 in die große Baumschule gepflanzt, nicht tiefer, als sie gestanden haben. Im folgenden Jahre lässet man sie fort wachsen, und hält sie von Unkraut rein, so kann man diejenigen, welche stark getrieben haben, im Frühlinge 1789, oder gewiß im folgenden Jahre, pfropfen, wofern man sie nicht schon im Jul. 1789 hat oculiren wollen. Kurz, man lege alle Jahr eine Menge Kirschsteine, und pflanze zugleich viele wilde Stämme. Wenn gleich alsdann die von Kernen aufgegangenen Stämmchen erfrieren, so ist der Verlust eben nicht groß; bleiben sie, so ist es desto besser, wenn man dabey noch eine Menge Twieselbeer-Stämme hat.

Bey Sammlung der Kirsch-Steine zum Säen, ist es gut, eine jede Sorte besonders aufzuheben, und hernach in besondere Reihen zu legen, so weiß man hernach beym Versetzen in die große Baumschule, welche Stämme von sauern, und welche von süßen sind, um sich nachher im Pfropfen darnach zu richten; denn einige Stämme kann man an der Rinde nicht gut erkennen, zu welcher Art sie gehören. Insonderheit ist gut, daß man die Steine der weißen spanischen Kirsche (Bigarreau) auf ein Beet allein legt, und die davon aufgewachsenen Stämme hernach ungepfropft verpflanzt. Diese wachsen geschwinde, und tragen bald. Ihre Früchte sind zwar etwas kleiner, aber eben so schmackhaft, und häufiger. Aus den Steinen von schwarzen Herz-Kirschen aber wachsen gemeiniglich nur Twieselbeeren; diese müssen gepfropfet werden.

Aus vorstehenden Beschreibungen der Sorten Kirschen erhellet, daß einige Kirschbäume sich auf saure

Das starke Beschneiden vertragen die Kirschbäume nicht gut, denn es gibt zum Auslaufen des so genannten Harzes Gelegenheit, wodurch die Bäume geschwächet werden. Man muß dergleichen Stellen, wo das Harz häufig ausfließt, sorgfältig ausschneiden, und mit Baum-Wachs oder Pech bedecken, wodurch der Ast noch auf einige Zeit erhalten werden kann. Daher auch nicht füglich anzurathen ist, Hecken von Kirsch-Bäumen zu ziehen. Es wachsen dieselben zwar gut, werden aber selten viele Früchte geben. Gleditsch hält den Kirschbaum überhaupt zu Hecken für unschicklich. Denn da sie unter dem Stein-Obste am wenigsten, zumahl wenn sie noch jung sind, den Schnitt vertragen, trauern sie lange darnach, werden davon schwach, und vergehen bald. Hat man ja an Kirschbäumen zu schneiden, so muß es im Herbste nach dem Abfallen der Blätter geschehen, zu welcher Zeit der Saft dieser Bäume zur Ruhe kommt, und daher nicht so leicht Gummi in der Folge austreibt, wie solches im Sommer bey starken Aesten sogleich geschieht. Bey dem Beschneiden der Spalier-Kirschbäume muß man die jungen Triebe nicht wegnehmen, weil die Frucht-Augen dieser Bäume meistentheils an den äusersten Enden der Zweige ansetzen. Auch müssen die kurzen Sprossen, welche aus zwey- und dreyjährigem Holze treiben, sorgfältig beybehalten werden, weil sie die meisten Früchte ansetzen. Im May hat man darauf Acht, daß, wo etwa ein leerer Platz an der Wand ist, einige daran stehende starke Zweige abgekürzet werden, damit sie zwey oder mehr Schüsse treiben, und mit solchen die Wand bedecken.

In nassem Boden kommt kein Kirschbaum fort. In mäßig nassem und niedrigen Boden hält der saure Kirschbaum aus, der süße aber weit weniger, welcher in frischem Sand-Boden am besten wächst, wie in der Mittelmark, besonders um Berlin und Potsdam, die

Mahl die Verſicherung von den angegebenen Sorten geben will. Doch hindert es nicht, wenn man ſich etwa ein Mahl geirret hätte; denn nach zwey Jahren hat man von ſeinen gepfropften Bäumen ſchon Früchte, und ſo ſieht man dann die Sorte; zu geſchweigen, daß man die mehreſten Sorten ſchon an dem Laube erkennen kann.

Die beſte Pfropfzeit iſt, wenn der Winter aufhört, es ſey im Febr. oder März. Diejenigen Bäume, welche niedrig gepfropft ſind, und ganz unten ausſchlagen, werden zu Zwergbäumen an das Spalier gezogen, zu welchen Spalieren man gern die Mitternacht-Seite nimmt. Zu dieſen Zwergbäumen ſchicken ſich durchaus keine ſpaniſche oder Herz-Kirſchen, ſondern die pragiſche Muskateller, Velſer, rothe und ſchwarze Oranien-Kirſche, ſchwarze Forellen-Kirſche, brüſſelſche Brunn, u. d. gl.

An ſtatt des bey dem Pfropfen ſonſt gewöhnlichen Baum-Wachſes, kann man, nach dem Vorſchlage des Hrn. Propſtes Pratje (*), auch eine andere Materie, die weit wohlfeiler iſt, vielleicht mit beſſerm Erfolge, gebrauchen. Dieſe beſteht aus Harz und Pech. Man ſetzt ſolches in einem Topfe auf das Feuer, daß es ſchmelze, und beſtreicht ſodann vermittelſt eines Pinſels die Stelle, wo das Reis eingeſetzt iſt, wie auch das oberſte Ende des Reiſes; doch muß man ſich hüten, daß es nicht zu heiß aufgebracht werde. Dieſe Methode iſt, nach ſeinem Urtheile, der andern vorzuziehen, weil dieſe Materie allenthalben beſſer anſchließt, und nicht die geringſte Feuchtigkeit zuläſſet. Sollte etwa ein Pfropfreis verſagen, ſo kann man, wenn der Stamm gut geblieben iſt, ihn im Sommer noch oculiren.

(*) In ſeiner Anleit. zur Anlegung, Wartung und Erhaltung eines Obſtgartens, Gött. 1781, 8. S. 265, f.

Bäume, um solcher willen versetzen. Lässet man sie ruhig stehen, so werden sie desto eher zum Oculiren stark genug werden.

Weil der Wind die Kirschen nicht abschütteln kann, schicken sich die Kirschbäume sehr gut am Rande der Gärten, und an hohen und freyen Plätzen. Der Landmann sollte billig diesen Baum häufiger ziehen, und ihn am Rande der Straßen und Wege hin pflanzen, um an gebackenen Kirschen in hitzigen Krankheiten zugleich eine Arzeney und ein Labsal zu haben.

Zum Treiben, hat man 4 bis 5 Sorten Kirschen nähmlich: die rothe May-Kirsche, die prager Muskateller, die kleine schwarze und große May-Kirsche das ganze Geschlecht der kleinen Glas-Kirsche, und die glimmende oder frühe schwarze weiche spanische Kirsche. Diese 5 Sorten können auf verschiedene Art getrieben werden, nähmlich: 1. in Treib-Häusern 2. in Treib-Kasten mit Lohe; 3. in Talut-Mauern welche Canäle zum Heitzen haben; und 4. in freyen Lande, mit Ueberbauung schon lange im Lande stehender Bäume, welche man auch zwey Mahl in einen Jahre treiben kann.

Was die doppelte May- und Muskateller-Kirsch anbelangt, so müssen die Häuser 8 F. weit, hinten 8 und vorn 4 F. hoch seyn, und die Fenster bis über den Gang an das Wetter-Dach reichen. Will man sie ganz früh haben, so wird mit Ausgange des Dec. oder zu Anfange des Jan., geheitzet. Die tragbaren jungen Bäume werden, nach der Proportion und Höhe des Hauses, in viereckige Kasten, welche im Boden mit 5 oder 6 Löchern, 1 Z. groß, versehen sind, um die man mit Scherben-Stücken belegt, gepflanzet nach der Linie längst dem Hause hingestellet, und zwar die niedern vorn, und die höhern hinten. Sollten einige Zweige oben an die Fenster stoßen, so biegt man

vortrefflichsten Bäume dieser Art im Sand-Boden gefunden werden.

In Ansehung der sauern Stämme, hat Hr. Pastor Germershausen aus langer Erfahrung bemerkt, daß die in schwarzem niedrigen Boden erzogenen Bäume stark wachsen und blühen, aber wenig oder gar nicht tragen. Dieserhalb hat er dergleichen Bäume von dem hohen Flämige, wo sie auf einem dürren Lehm-Boden sehr häufig erwachsen, und sehr fruchtbar sind, gehohlt, und sie bey sich gepflanzt, welche in dem dortigen niedrigen Boden nicht nur gut fortgehen, sondern auch eben so wohl, als in ihrem Vaterlande, tragen.

Der Hausvater, 4 B. Lpz. 1785, 8. S. 375.

Zwischen den hochstämmigen Kirschbäumen muß man keine andere Frucht-Bäume pflanzen, weil sie unter und neben ihnen nicht wohl anschlagen. Der saure Kirschbaum wächst zwar nicht so hoch, als der süße; allein, seine Wurzeln laufen weit umher, und entziehen den andern Bäumen die Nahrung.

Hr. P. Germershausen mußte dieserhalb eine sehr schöne Kirsch-Hecke eingehen lassen, die an der einen Seite ein schlechtes unansehnliches Gehäge, wovon sie noch 8 Fuß abstand, bedecken mußte, auf der Seite nach dem Innern des Gartens zu aber immer gegrabenes Land zu Küchen-Gewächsen und andern Bäumen hatte. Auf der Seite des Gehäges, da der Raum zwischen demselben und der Hecke nie gegraben wurde, und nur zum Grastragen bestimmt, und die Westnord-Seite war, liefen die Wurzeln wenig hinein. Auf der andern gegenüber stehenden Seite aber gingen die Wurzeln der Hecke, wie er solches bey dem Nazolen fand, an die 20 F. weit umher, und zwar nur flach unter der Erde, weshalb die Küchen-Gewächse nur mäßig geriethen, die Pflaumbäume aber gar nicht fort wollten. Die Birnbäume hielten sich gut, weil sie älter waren, und mit den Wurzeln mehr in die Tiefe gehen. Aber die Apfelbäume zagten doch auch, und es wurde ihnen nicht eher nebst den Pflaumbäumen geholfen, als bis die Hecke ausgerottet war.

Da die Kirschbäume eben keine sonderliche Pfahl-Wurzel treiben, darf man sie eben nicht, wie andere

völlig am Steine arbeiten, welches ihr schwerster Stand ist, wobey man sie vor Erkältung bewahren muß; doch ist hauptsächlich darauf zu sehen, ob die mehresten Früchte groß oder klein sind, und man muß allemahl, wenn man viel Früchte haben will, das Heitzen darnach einrichten. Sind der großen Früchte die mehresten, so hält man 30 Gr. Wärme; sind aber der kleinen die mehresten, so behält man nur 25 Grad. Die Zeit, da sie am Steine arbeiten, dauert 4 Wochen; in dieser Zeit stehen die Früchte beynahe still, alsdann aber vergehen keine 14 Tage, so sind sie um ein Merkliches größer, und bekommen, nach der grünen, eine gelbliche Farbe, worauf einige schon in 14 Tagen reif sind, und im März oder April gegessen werden können. Will man es aber mit Hitze zwingen, und dieselben gern früher reif haben, so läuft man Gefahr, nicht viel Früchte zu bekommen.

Die prager Muskateller-Kirsche verlangt ähnliche Behandlung, und kann etwas mehr Kühle vertragen, daher sie in den Loh-Treib-Kasten und Treib-Mauern gut ist. Diese Loh-Treib-Kasten zu den Kirschen, haben eine Weite von 6 F., sind hinten 6, und vorn 3 F. hoch; die Grube ist $4\frac{1}{2}$ F. weit, $1\frac{1}{2}$ F. Rabatte an der hohen Wand, wo die Bäume stehen. Diese wird mit Dielen, 2 F. in der Erde, und 1 F. über der Erde, gegen die Wurzeln, ausgeschalet, damit die Wurzeln nicht von der Hitze beschädiget werden. Die Wände können von Mauer-Steinen oder doppelten Dielen verfertiget werden. Wenn die Bäume gehörig geschnitten sind, kann man unten eine Lage Pferde-Mist, und oben genugsame Lohe darauf thun, nach dem man die Kirschen früh haben will. Die Lohe wird in 8 Tagen durch den Mist erwärmt seyn, und durch ihren Dampf die Stämme der Bäume, ohne daß sie mit Mose bewunden werden dürfen, hinlänglich anfeuchten. Die Luft-Klappen werden eben so, wie

bey

bey den Pfirsich-Kasten, angebracht. Ist es ein sonnenreicher Winter, so gibt das Eingebrachte 5 bis 6 Wochen so viele Wärme von sich, als die Kirschen gebrauchen. Nach der Zeit aber, besonders wenn die Kälte groß ist, wird ausserhalb des Kastens ein Umschlag von warmen Pferde-Miste gemacht, welcher nicht allein die Bäume wurzelnd macht, sondern auch das inwendige Eingebrachte wieder erwärmt. Mit diesen Umschlägen muß man fortfahren, damit die Früchte bey dem Steinsetzen, die meiste und beste Wärme erhalten. Sollte auch dieselbe bey dem Sonnenscheine 30 Gr. übersteigen, so hat man nichts zu befürchten, wenn man sich nur der Luft stärker bedient, welche den Blüthen und Früchten gar nicht schädlich ist. Sollten sie aber eben zu der Zeit in Blüthe gekommen seyn, wenn lange trübes Wetter gewesen wäre, und sie keinen Sonnenschein gehabt hätten, so ist es höchst nöthig, Schatten zu machen, sonst fallen die Blüthen ab. Man muß dieselben sodann nur immer nach und nach wieder an die Sonne gewöhnen, und wenn die Bäume von dem Dufte, gleichsam wie vom Thaue, belegt sind, die Sonne darauf scheinen lassen. Hierbey kann man es nicht so geschwinde versehen, als mit dem Heitzen in den Treib-Häusern, weil die Hitze und Kälte nicht so schnell abwechseln, und den Früchten eine zu starke Veränderung verursachen. Auf diese Art hat man im März und April ebenfalls reife Kirschen.

Man kann auch neben der schwarzen und rothen May-Kirsche, die große und kleine Montmorency zugleich treiben, welche aber, besonders die letztere, 14 Tage später reif werden, wodurch man aber auch die Kirschen länger haben kann.

Die dritte Art, Kirschen zu treiben, ist: in Talut-Mauern (*), welche Canäle zum Heitzen haben.

(*) Talut bedeutet die Schräge, welche die Fenster von Mittag gegen Mitternacht abweichen.

Die Talut-Mauern sind von 7 bis 10 F. und noch höher, unten 5 F. weit; die Fenster stehen 3 F. talut. Oben ist ein Wetter-Dach, 2 bis 3 F. breit, mit Ziegeln oder getheerten Bretern bedeckt. Der Canal kann 1, 2, auch 3 Mahl an der Mauer über einander, so lang, als sie ist, oder in Quartiere, zu 40 bis 50 F. lang, davor entlang gehen. Er ist von Back-Steinen verfertigt, und mit doppelten Dach-Ziegeln gedeckt. Jeder Canal muß im Lichten 15 Z. hoch, und 9 Z. breit seyn, damit der Rauch seine Spielung erhalte, und der Zug nicht gehindert werde. Will man nun frühe oder späte Früchte haben, so muß man einen Theil nach dem andern, nähmlich den ersten im Dec., den zweyten im Jan., den dritten im Febr., zu heitzen anfangen. Es wird einerley Behandlung erfordert, nur daß die ersten Theile, welche man früh heitzen will, mehr Mühe erfordern, um die Natur in den ersten Winter-Monather nachzuahmen, weil die Kälte größer, als bey den spätern, ist. Folglich kann im Febr. mit halb so vieler Feuerung die nöthige Wärme von 30 Gr. gegeben werden. Luft kann man hierbey nicht anders, als durch die Fenster geben, worin besondere Scheiben, als kleine Thüren, mit Blech angebracht werden; denn wenn man oben oder hinten Luft geben wollte, würde man zu viel Wärme verfliegen lassen, und unnöthiges Holz verbrennen. Die Bäume stehen vorn an den Fenstern, werden wie Spalier-Bäume gezogen, gehen mit ihren Wurzeln unter der Schwelle durch, welche man im Winter mit aufgelegtem Pferde-Miste vor der Kälte sichert, und zum Treiben behülflich ist. Hierin kann man Pfirsichen, die sich gut treiben lassen, und Aprikosen beysammen, hernach May-Kirschen, prager Muskateller, Montmorency, und frühe schwarze spanische, gebrauchen; letztere wird beynahe mit der prager reif, die Montmorency aber etwas später. Die Kirsch-Sorten vertragen in den Talut-Mauern einerley Wartung,

ung, besonders diejenigen, welche spät geheitzet werden. Sollten die Bäume bey trübem Wetter aufgeblühet seyn, so ist es ebenfalls nöthig, daß man bey starkem Sonnenscheine die Strahlen durch Reisholz oder Matten breche, und sie nur allmählich wieder an die Sonne gewöhne. Hat man aber das Glück, daß die Sonne gut scheint, wenn die Früchte am Steine arbeiten, so kann man sich viele Früchte versprechen, nur muß man mit dem Heitzen am Tage etwas nachlassen, damit die Pori an den Bäumen nicht verschrumpfen, sonst fallen die Früchte ab. In diesem Treib-Behältnisse kann man zugleich die schönsten Erdbeeren mit treiben, wenn solche nur vor dem Schimmel verwahret werden.

Um Kirschen auf die vierte Art, nähmlich im freyen Lande durch das Ueberbauen, zu treiben, sucht man einen im Garten stehenden Baum aus, von der doppelten May- oder der Muskateller, auch der schwarzen weichen spanischen Herz-Kirsche, welcher gesund und von ziemlicher Größe, dabey auch mit genugsamen Trage-Knospen versehen ist. Dieser Baum wird hinten, nähmlich gegen Mitternacht zu, ganz, gegen Morgen und Abend aber nur halb, bebauet, und gegen Mittag 5 F. hoch von der Erde, alles mit doppelten Bretern verwahret, gut mit Lehm verschmiert, und mit Mos verstopft, das übrige wird mit Fenstern vermacht, da die gegen Mittag gerade und schräge über den Baum zu liegen kommen, so, daß die halbe Decke aus Fenstern, und die andere Hälfte aus Bretern besteht. Die Zweige, welche in die Höhe stehen, können unter die Fenster weg gebogen werden; dürfen aber nicht, wenn sie etwa hinderlich wären, abgeschnitten werden. Diese werden zuerst blühen, und bey starker Kälte, zumahl wenn sie am Steine arbeiten, leicht abfallen, zuweilen aber geben sie auch die besten Früchte. Ueberhaupt muß das Haus nicht größer seyn, als der Baum es erfordert. Ein solches Behältniß kann man

im Jan. zu heitzen anfangen, wenn man zu Ende des März, oder im Anfange des Apr., reife Früchte haben will. Der Ofen wird an der Hinter-Wand angelegt, im Hauſe freyſtehend, von Ziegel-Steinen, mit einer den Rauch ausführenden eiſernen Röhre; oder man legt den oben ſtark gewölbten Ofen drauſſen an, und läſſet den Rauch durch über einander laufende Canäle an der Hinter-Wand im Hauſe zwey auch drey Mahl über einander weg laufen, ehe der Rauch hinaus fährt. Die letztere Art iſt beſſer und ſicherer beym Heitzen, aber auch koſtbarer. Das Heitzen wird auf vorbeſchriebene Art verrichtet, und die Grade der Wärme, nach verſchiedenen Zeiten, auf eben die Weiſe erhalten. Auf dieſe Art kann man von einem ſolchen Baume Früchte in Menge erhalten; und weil nun ſchon der April kommt, wo es mit dem Luftgeben nicht mehr ſo gefährlich iſt, ſo kann man an den nachwachſenden, oder zuletzt durchge-

Steinsetzen eine Wärme von 30 Gr., mit der Sonne, verschaffen. Auf diese Art kann man zwey Mahl von einem Baume ärnden, und zwar die zweyte Lieferung im Dec. reif haben; nur ist die zweyte nicht in solcher Menge, als die erste. Ein solcher Baum hält es aber nicht länger, als 2 Jahr, aus. Wird er aber des Jahrs nur ein Mahl getrieben, so kann er wieder zu Kräften kommen, und man kann ihn wohl 10 bis 12 Mahl überbauen, und die schönsten Kirschen erhalten, wenn man ihn allezeit 1 oder 2 Jahr vorher ruhen lässet.

J. J. Salzmanns holländische Frühtreiberey, Berl. 1783, 8. S. 63, ſgg.

Wie überhaupt allen jungen Bäumen vom Ungeziefer nachgestellet wird, so ist auch der Kirschbaum von dieser Seite her, manchen Anfällen ausgesetzt. Insonderheit pflegt sich ein kleines Insect auf die Knospen der Pfropfreiser zu setzen, und solche anzufressen. Will man nun seine Arbeit nicht vergeblich angewandt haben, so muß man die Reiser oftmahls genau durchsehen, das Thierchen mit einer Nadel sorgfältig abnehmen, etwas ganz dünn aus einander gezogenes Baum-Wachs um die Knospen kleben, und sie also in Sicherheit setzen.

Auch die Ameisen setzen den Kirschbäumen sehr zu. Sie pflegen die Blätter der jungen Schößlinge mit ihren Samen oder Eyern zu beschmeißen, und die Blätter zusammen zu ziehen. Sie legen an der untern Seite des Blattes an, überziehen dieses und die benachbarten des Gipfels mit einer kleberigen Feuchtigkeit, daß das Wachsthum des Schößlinges auf hört. Geschieht dieses an allen Schößlingen eines jungen und nicht lange gesetzten Kirschbaumes, so kommt er nicht nur sehr zurück, sondern muß auch, zumahl bey heißer Witterung, wohl gar ausgehen. Um den Schaden, den die Ameisen anrichten können, zu verhüten, windet

man

man um den Stamm etwas Hede (Werg), darüber sie nicht kommen. Einige pflegen im Frühlinge Kerbel um den Baum zu säen, in der Meinung, daß die Ameise den Geruch desselben nicht vertragen könne.

Es pflegen sich auch besonders Wanzen auf den Kirsch- wie auf den Pfirsich-Bäumen, aufzuhalten.

Cph. Jac. Trew obs. de cimicibus malis perniciae et cerasi, ſt. im Commerc. litt. Nor. 1734. hebd. 4ª, n. 2. S. 361—363.

Auf den Vogelkirsch-Bäumen findet man eine besondere Raupe, welche Degeer die rauche, schwarze, gesellige Vogelkirschen-Raupe mit kurzen weißen Haaren, welche letztere auf beyden Seiten einen gelben Streif formiren, nennt (*). Nach Rösels Bemerkungen (**) legt das Weibchen der aus diesen Raupen kommenden Schmetterlinge schon im Jul. seine Eyer, die noch im Anfange des Augustes von der Sonne ausgebrütet werden. So bald die Räupchen ausgekrochen sind, machen sie um das Blatt, worauf sie sitzen, ein weißes flaches Gespinnst, worunter sie so lange bleiben, bis das Blatt verzehrt ist; alsdann begeben sie sich sammt dem Gespinnste nach einem andern, und machen es eben so. Dieses treiben sie so lange, bis die kalten Nächte einbrechen, und die Blätter fallen wollen. Alsdann bereiten sie sich ihr Winter-Quartier, da sie nähmlich ihr bisheriges Wohnhaus, sowohl von innen als auch aussen, überziehen, und die Blätter dergestalt anhängen, daß sie sammt den übrigen nicht abfallen (***). Hierin bleiben sie den ganzen Winter ohne Nahr-

(*) S. Dessen Abhandlungen zur Gesch. der Insecten, nach der Uebersetz. des Hrn. P. Göze, 1 B. 2 Quart. Lpz. 1776, gr. 4.) S. 21, fgg.

(**) 1 B. Tagv. 2te Cl. S. 16.

(***) Ein wachsamer Gärtner hat also besonders im Febr., wenn die Raup-Zeit kommt, nach diesen zurück gebliebenen, und gemeiniglich im Gipfel der Bäume sitzenden, zusammen gesponnenen Blättern zu sehen. Denn das sind die eigentlichen Raupen-Nester, worin diese Feinde der Obstbäume, als in einem Winterhalle wohnen.

Nahrung liegen, und leiden nicht den geringsten Schaden von Kälte, Schnee, Wind und Regen, bis der Frühling erscheint, und die ersten Blätter hervor kommen, da sie denn sofort auch bey der Hand sind, und ihre vorige Lebensart zum größten Nachtheil der ausschlagenden und blühenden Obstbäume, aufs neue wieder anfangen.

Mit der Häutung dieser Raupen hat es eben die Bewandtniß, als mit andern; sie lassen aber allezeit die alte abgeworfene Haut in ihrem Gespinnste liegen. Bey Tage kriechen sie, wie alle Tagvögel-Raupen, ihrem Futter nach, des Nachts aber setzen sie sich meistens alle zusammen. Wenn sie früh wieder ihrer Nahrung nachziehen, pflegt eine davon die Bahn, nähmlich ein Gespinnst zu machen, auf welchem die andern insgesammt nachfolgen, nicht anders, als wie eine Heerde Schafe ihrem Leit-Hammel oder Anführer auf dem Fuße nachgeht. Sind sie nun an Ort und Stelle gekommen, so geht es über den grünen Zweig her. Während dieser Arbeit machen sie hin und wieder ein Gespinnst, woran sie leicht zu erkennen, und zu vertreiben sind. Folglich fressen sie immer in Gesellschaft, und so lange, bis sie sich zum letzten Mahl gehäutet haben. Je größer sie werden, je mehr zerstreuen sie sich auf dem ganzen Baume, den solche Heere in kurzer Zeit kahl machen können.

Im 3 B. der Hist. et Commentation. Academiae elect. scient. & elegant. litterar. Theodoro-Palatinae, Manhem. 1775, 4. S. 106, fgg. liefert Hr. J. D. Flad die Naturgeschichte des Kirsch-Wurmes und der daraus entstehenden Fliege, m. Abbild. Es ist dieser Wurm doch eigentlich nicht des Linné Musca Cerasi; auch schreibt ihr L. fälschlich den Aufenthalt in den Kirsch-Kernen zu, da sie sich nur allein in dem Fleische der Kirschen aufhält; denn der Wurm in den Kirsch-Kernen verwandelt sich nicht in eine Fliege, son-

dern

dern in einen Rüssel-Käfer; besser kommt des Linné Musca solstitialis mit Hrn. F. Fliege überein. Der Wurm findet sich nur in den süßen Kirschen; selten in den schwarzen sauern Kirschen, wenn sie überreif sind; nie aber in den hellrothen sauern, auch nicht in den frühen, noch in den Wald-Kirschen. Das Ey wird nahe bey dem Stiele hinein geleget, so, daß man keine Oeffnung sehen kann. Wenn der Wurm seine Vollkommenheit erreicht hat, begibt er sich nahe bey dem Stiele aus der Kirsche heraus, verbirgt sich in die Erde, und verwandelt sich daselbst in eine Puppe von schwefelgelber Farbe, woraus nach 10 Monathen, nähmlich im May des folgenden Jahres die schöne Fliege hervor kommt. Die Fliege hat über den Flügeln 3 schwarze Quer-Streifen, und das oberste Ende der Flügel ist am äussern Rande auch schwarz. Oben auf dem Brust-Schilde ist ein gelber Fleck. Redi und Reaumür haben diese Fliege fehlerhaft beschrieben und abgebildet.

Daß Kirschbäume auch an den Wurzeln von Würmern beschädiget werden können, beweiset folgende Bemerkung, im 22 St. des Wittenb. Wochenbl. v. J. 1772, S. 182. „Ein Freund in der Nähe sahe vor ein Par Jahren, daß auf seinem Weinberge einer der besten großen Herzkirschbäume, von der Dicke einer halben Elle, einsmahls im Sommer, da er voll Kirschen hing, sehr trauerte. Die Blätter verwelkten, und die bereits gefärbten Kirschen kamen nicht zu ihrer Größe und rechten Reife. Er ließ den Baum untersuchen, und konnte keinen Fehler, weder an dem Stamme noch an der Wurzel, finden. Im folgenden Frühjahre schlug er zwar noch aus, ging aber endlich ein. Er ließ also den Baum heraus bringen, und da fanden die Arbeitsleute unten bey der Stamm-Wurzel eine große weiße Erd-Made, eines starken Daumens dick und lang, mit einem rothen Kopfe, die derjenigen gleich, welche Frisch (Beschr. von Insecten, 5 Th. Tab. I. Fig. 1.) vorstellt, und die eigentlich die große Holz-Made ist, woraus der große schwarze Horn-Käfer wird. Dieser Wurm hatte nun die untere Stammwurzel des Baumes

mes rundum beraget, und dadurch wahrscheinlich den Untergang desselben verursachet".

Die Zeit der Reife von allen Kirschen, fällt bey uns von der Mitte des Jun., bis Ende des Julius. Die frühe May-Kirsche ist die erste; und wenn sie an einer Mauer gezogen wird, kann man sie schon zu Anfange des Jun. essen. Die schwarze Herz-Kirsche, und die groote Princes, sind die letzten. Um Kirschen lange zu haben, muß man einige Bäume schattig und gegen Norden setzen; man muß aber dazu wohltragende Arten nehmen.

Auf manchen Bäumen gelangen die Kirschen, je länger, je ungleicher, zur Reife. Vielleicht wäre es möglich, die gleichzeitige Reifung der Kirschen zu befördern, wenn man sich bey dem Abnehmen derselben verhalten wollte, wie bey der Einsammlung anderer Baum-Früchte, wo man nähmlich alles rein abliese, und keine Frucht zurück lässet. Wollte man es mit den Kirschen eben so machen, (und dieses liesse sich an einem oder ein Par Bäumen zuerst versuchen,) so würden vielleicht die Frucht-Knospen für das künftige Jahr gleichmäßiger gebildet, und alle gleichzeitig treiben, da sie sonst zum Theil von den noch unreif stehen gebliebenen an ihrer Entwickelung und ihrem Wachsthume verkürzet und verhindert werden.

Unter allen Garten-Früchten haben die Kirschen die meisten Nachstellungen, theils von Vögeln, theils von Menschen. Wer nahe bey einem Walde wohnt, hat von den Kirsch-Finken seine Last, welche um der Kerne willen aus den Kirsch-Steinen, das Fleisch der Kirschen auf die Erde fallen lassen, und auf solche Art großen Schaden thun. Dieser Vogel fängt damit an, sobald die Kirschen sich ein wenig färben. Ein einziger Kirsch-Fink thut an Einem Tage mehr

Schaden, als ein ganzes Schock Sperlinge, oder andere kleine Vögel, welche das Fleiſch der Kirſchen erſt alsdann eſſen, wenn ſie weich und reif werden. Man muß die Kirſch-Finken mit Schlingen und Dohnen wegfangen, weil ſie ſehr gut zu eſſen ſind, indem ſie, wo ſie häufig ſind, und wenn ſie einmahl ihre Lieblings-Speiſe gekoſtet haben, durch das Schießen ſich nicht verſcheuchen laſſen.

Diejenigen, welche mitten im Lande wohnen, ſind mit Sperlingen geplagt, welche dem Fleiſche der Kirſchen eben ſo ſehr, wie die Kirſch-Finken dem Kerne, nachgehen. Das beſte Mittel, ſolche von den Kirſch-Bäumen abzuhalten, iſt das Schießen. Man ſucht ſich zwar durch einen Popanz (ein Scheuſal, eine Scheuche,) gegen dieſelben zu ſchützen; einen Tag hilft er wohl, weil er ſich aber nicht bewegen kann, ſo wird ſeine Ohnmacht von ihnen bald erkannt, und die Sperlinge ſetzen ſich oben darauf. Andere wollen ſich durch eine kleine Wind- und Klapper-Mühle helfen, welche die Sperlinge aber auch bald gewohnt werden, und, wenn ſie ſich ſatt gefreſſen haben, darauf ausruhen. Nicht zu gedenken, daß zu der Zeit oft ſtilles Wetter iſt, und kein Wind wehet.

Die Stadt Wolodimer, oder Wladimir, in Groß-Rußland, welche vor Alters der großfürſtliche Wohnſitz geweſen iſt, hat auſſerordentlich viele Kirſch-Gärten (*), welche rund um die Stadt angelegt ſind, und deren Product die einzige Nahrung der Einwohner iſt, indem ſie meiſt ganz Moskau mit dieſer Obſt-Art verſorgen. Die Garten-Beſitzer haben eine Art großes Klapperwerk, als ein Gerüſt auf Rüſt-Stangen, erfunden, auf welchem ein kleiner Knabe Schildwache ſteht, und bey dem Einfalle der Vögel, auf einem

(*) Indeſſen iſt nun, nach Hrn. C. R. Pallas Berichte, in der Cultur der Frucht eben nicht weit gekommen, und hat faſt durchgängig nur 2 Sorten, welche blos viel größer, als gemeine Vogel-Kirſchen, ſind. Der Liebhaber Garten-Bau hält einige verſuchte ausländiſche Arten, welche auch ziemlich fortkommen.

einem oder andern Baum, sogleich die Stricke zieht, welche nach diesem Baume hin gehen, und dadurch zugleich das Klappern erreget. Lepechin (*) ertheilt von diesem künstlichen Klapperwerke, welches Fig. 2c89 abgebildet ist, folgende Nachricht: „Zween oder drey benachbarte Gärten halten einen eigenen Wächter, für welchen ein hohes Gerüst auf 4 Rüst-Stangen errichtet ist, welches Kljätschuga heißt. Die Höhe ausgenommen, kommt es in der Haupt-Anlage mit dem Leiter-Gestelle überein, dessen sich die Glaser bedienen, wenn sie in hohen Gemächern Fenster-Schriben von aussen einsetzen müssen, oder wie man bey uns (**) bey den Bergen der Butter-Woche zu haben pflegt, nur aber schmähler und oben spitziger zusammen laufend. Nahe am obern Ende des Gerüstes ist ein Boden von Bretern eingesetzt, worauf die Schildwache sitzt, welche die von allen Kirschbaum-Büschen hierher gezogenen Stricke zur Hand hat. Die entfernten Enden dieser Stricke werden an ein Stacket angemacht; und 1½ oder 2 Arschinen (Ellen) von dem Orte, wo der Strick angemacht ist, wird ein Bret von der Länge einer Arschine, und drüber, an den Strick gebunden. An das Bret werden eine Menge hölzerne kleine Kügelchen oder Klöppel mit Bindfaden befestigt. Wenn nun der Wächter Vögel auf einem Baume erblickt, schüttelt er an dem von daher zu seinem Gerüste gezogenen Stricke; dadurch kommt das Bret mit seinen Klappern in Bewegung, und macht ein solches rasselndes Getöse, daß die Vögel davon verscheuchet werden. Diesen Wächter-Dienst können kleine Jungen verrichten, die noch zu keiner andern Arbeit zu brauchen sind. Auch fällt dem Besitzer bey dem Preise der Kirschen in hiesigem Bezirke der Aufwand nicht schwer, dergleichen Maschinen und Schild-Wachen zu halten, sondern ist ihm vielmehr sehr einträglich. Man muß es aber sehr gewohnt seyn, um diese Klapper-Musik ohne Verdruß ertragen zu können".

(*) Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des rußischen Reiches, in den Jahren 1768 und 1769, aus dem Russ. übersetzt von M. Hase, 1 Th. (Altenb. 1774, 4.) S. 8, f.

(**) Nähmlich zu St. Petersburg. Man bauet in der Butter-Woche vor der Fasten hölzerne Berge, welche so eingerichtet werden, daß man von denselben mit Schlitten herab fahren kann.

Das sicherste Mittel bleibt also das Schießen. Man muß aber gleich damit anfangen, wann die Kirschen nur eben anfangen sich zu färben. Wartet man, bis schon einige reif sind, und haben sie solche einmahl gekostet, so sind sie schwer abzuschrecken, insonderheit wenn sie Zeit gehabt haben, ihre dummdreiste Jungen zu diesem Diebstahl anzuführen. Durch dieses frühzeitige Schießen werden sie dermaßen scheu, daß sie sich hernach nur bisweilen in die Spitzen der Bäume setzen, und erst lange, weit und breit umsehen, ehe sie anzubeißen sich unterstehen.

Wer jedoch junge tragbare Bäume in seiner Baum-Schule, oder in seinem Garten nur 1 oder 2 Kirsch-Bäume hat, kann diese Diebe dadurch abhalten, wenn er rund umher ein Par Dutzend Dohnen mit Haar-Schleifen, worin die Krammetsvögel gefangen werden, anhängt, auch in der Spitze des Baumes, wo die meisten Kirschen sitzen, einige Schleifen von weißen und schwarzen Pferde-Haaren anzubringen sucht. Wer mit einem Förster oder Jäger bekannt ist, kann dergleichen Dohnen leicht auf etliche Wochen geliehen bekommen.

Nach Hrn. Past. Germershausen Versicherung lässet der Sperling die Kirschbäume nur dann unbesucht, wenn sie von aussen herum mit blauen Fäden umzogen werden. Ein Ring oder Umzug wird in der Spitze des Baumes, der zweyte in der Mitte, und der dritte um die untersten Zweige des Baumes herum geschlungen und befestiget. Sind die Kirschbäume zu hoch, so nimmt man 3 oder 4 Hopfen-Stangen, in welchen, nach nur besagtem Abstande, querdurch Pflöcke in ausgebohrten Löchern geschlagen sind, und setzt solche Stangen, auf deren Pflöcken der blaue Faden angezogen ist, um den Baum so herum, daß sie nach der Spitze schräg zulaufen. An der ersten Stange wird der Faden, ehe sie in die Erde eingestoßen wird, fest angebunden, worauf er vermittelst einer eigenen leichten Stange, an deren Spitze ein Oehr von Bindfaden befestigt, und wodurch der blaue Faden vom Anfange an durch-

durchgezogen worden ist, um die übrigen Stangen und Etagen fortgeführet, und zuletzt mäßig straff angezogen und verbunden wird. Der arglistige Vogel, dem der, von der grünen Farbe der Blätter stark abstechende blaue Faden sehr in die Augen fällt, sieht solchen für eine Schlinge an, daß er daher in den Baum nicht hinein geht.

Wieder böse Buben und Diebe, wird wohl kein anderes Mittel dienlich seyn, als daß man, wie bey anderm Obste zu geschehen pflegt, des Nachts einen treuen Wächter bestelle, der etwa alle zwey Stunden einen Schuß thue, und damit seine Gegenwart zu erkennen gebe.

Zu folgendem Verwahrungs-Mittel, welches, nach Hrn. Past. Henne Erzählung, jemand im Braunschweigischen gebrauchte, wird man wohl nicht leicht Belieben tragen. Dieser hatte nur 2 Kirschbäume, die zwar recht voll saßen, aber doch nicht so viel werth waren, solche des Nachts zu bewachen. Da ihm nun von dem einen Baume in einer Nacht alle Kirschen gestohlen waren, und er befürchtete, die Diebe würden in der folgenden Nacht wiederkommen, gab er seine übrige Kirschen zum voraus verloren, nahm einen Eimer, that eine gute Portion Theer hinein, goß viel Wasser darüber, rührte es stark um, und besprützte, vermittelst einer Hand-Sprütze, alle Blätter, Zweige und Früchte damit, daß der Baum über und über naß wurde. In derselben Nacht gegen den Morgen steigen 2 Diebe auf diesen Kirschbaum, ihm seine Früchte zu rauben. Beym Pflücken und Einsammeln in den offenen Busen und Hemd, kommt den einen Dieb ein Appetit an, ein Par Kirschen zu kosten, und er sagt zu seinem Compagnon: Wanne! wanne! et mott düße Nacht en ßlim Dau e fallen sien! Aber, wie erstaunte er nicht, als er zu Hause gewahr wurde, daß der böse Thau sein ganzes Hemd mit Theer besudelt hatte! Er kam nicht wieder.

Bey der von Geoffroy angestellten chemischen Untersuchung, haben 5 Pfund spanische Kirschen, welche von den Kernen geschieden, und aus einer Retorte destilliert worden, 3 Unzen, 7 Drachm. und 42 Gran unschmackhafte und nicht riechende, kaum merklich salzigte und kaum merklich alkalische Feuchtigkeit; 1 Pfund, 8 U. und 4 Dr. klare, fast nicht schmeckende

und riechende, kaum merklich saure Feuchtigkeit; 2 Pfund, 8 U., 2 Dr. und 12 Gr. erst klare, endlich braunröthliche, offenbar saure und herbe Feuchtigkeit; 2 U. und 36 Gr. braunröthliche, und mit flüchtigem urinösen Salze begabte Feuchtigkeit, nebst 2 Dr. dicken Oehl, wie ein Extract, gegeben. Die in der Retorte übrig gebliebene schwarze Masse hat 4 U. und 6 Dr. gewogen, welche, nachdem sie calcinirt worden, 3 Dr. und 48 Gr. braunröthliche Asche zurück gelassen haben, woraus durch das Auslaugen 2 Dr. und 24 Gr. fixes, bloß alkalisches Salz gezogen wurden. Der Verlust der Theile hat in der Destillation 4 U. 1 Dr. und 54 Gr., in der Calcination aber 4 U. 2 Dr. und 24 Gr. betragen. Die Kirschen haben also ein weinsteinartiges Salz, welches mit vielem dicken Oehle verwickelt ist.

Die Glas-Kirschen geben in der chemischen Untersuchung weniger Oehl, als die spanischen; sie enthalten also ein wesentliches weinsteinartiges Salz, welches mit vielem Wasser verdünnt ist.

Bey der chemischen Untersuchung der rothen sauern Kirschen, welche ebenfalls Geoffroy angestellt hat, sind von 5 Pfund reifen Kirschen, welche von den Kernen geschieden, und aus einer Retorte destilliert worden, 2 Pf. 24 Gr. klare, nicht riechende und schmeckende, kaum merklich salzichte Feuchtigkeit; 1 Pf. 4 U. 7 Dr. 36 Gr. klare, etwas bittere, wie gestoßene Kirschkerne schmeckende, kaum merklich säuerliche Feuchtigkeit; 1 Pf. 2 U. 6 Dr. 30 Gr. erst säuerliche, etwas herbe, hernach offenbar saure und bitterliche Feuchtigkeit; 1 U. 2 Dr. röthlichbraune, saure und salzichte Feuchtigkeit, nebst 2 Dr. 36 Gr. dickes Oehl, wie ein Syrupp, übergegangen. Die in der Retorte übrig gebliebene schwarze Masse hat 4 U. 36 Gr. gewogen, welche, nachdem sie calcinirt worden, 4 Dr. 42 Gr. Asche zurück gelassen haben, woraus durch das Auslaugen 1 Dr. 56 Gr. fixes, bloß alkalisches Salz gezogen wurden. Der Verlust der Theile hat in der

De-

ter-Säure, wurde bleichroth niedergeſchlagen, und durch mehrere Salpeter-Säure wieder aufgelöſet. 5) Eine gleiche Zink-Auflöſung ward braunroth, und durch mehrere Salpeter-Säure etwas heller. 6) Die Auflöſung des freſſenden Sublimates wurde bleichroth niedergeſchlagen.

4. Aus dieſen verſchiedenen Niederſchlägen ſieht man ſehr deutlich, daß nicht allein die Säure des Kirſch-Saftes, ſondern auch das Farbeweſen zugleich wirkt, indem es ſich an die metalliſchen Kalke anlegt, und ihnen verſchiedene Farben ertheilt. Wahrſcheinlicher Weiſe iſt der Grund dieſer färbenden Materie in den brennbaren Theilen des Kirſch-Saftes zu ſuchen. Daß hier aber auch zugleich die Wirkung einer freyen Säure mit in Betrachtung komme, braucht weiter nicht bewieſen zu werden, beſonders da ich dieſelbe in der Folge rein darſtellen werde.

Zerlegung des Kirſch-Saftes.

Zweyter Verſuch. 5. Gleich nach Zerreibung der Kirſchen miſchte ich 2 Unzen derſelben in einer Retorte mit eben ſo viel ſchwacher Salpeter-Säure, und ließ dieſe einige Tage wohl verwahrt ſtehen (*). Als ich ſie hierauf bey gelindem Lampen-Feuer zur Deſtillation einlegte, ſchäumte die Miſchung etwas, und es erhoben ſich rothe Dämpfe, welche in die Vorlage übergingen. Nachdem die Miſchung zum Kochen kam, wurden die Dämpfe häufiger; die Flüſſigkeit hatte ihre Farbe verloren, war gänzlich hell, und auf der Oberfläche ſchwammen einige harzige Theile. Ich unterbrach hierauf die Deſtillation, und ließ alles erkalten.

6. Das, was in der Vorlage übergegangen war, war nichts als phlogiſtiſirte Salpeter-Säure; von verſüßter war nichts zu entdecken, auſſer daß ſie die Guajac-

(*) Ich hatte bey dieſem Verſuche zugleich die Abſicht, den von Hrn. B. A. Crell gemachten Vorſchlag zu prüfen, ob der brennbare Geiſt in den Pflanzen-Säften vor der Gährung befindlich ſey, wo ich alsdann eine dem verſüßten Salpeter-Geiſte ähnliche Flüſſigkeit erhalten haben müßte; der Erfolg entſprach aber der Vermuthung nicht; denn es war auch nicht der geringſte Geruch von verſüßter Säure zu bemerken.

Tinctur blau färbte, welches mir aber eine jede andere phlogistisirte Salpeter-Säure eben so gut verrichtet. Die Flüssigkeit in der Retorte war noch mit viele Salpeter-Säure verbunden. Um die harzigen Theile welche darauf schwammen, davon abzusondern, wurde sie durch Druck-Papier filtrirt. Das Filtrirte stellte ich hierauf in einem flachen Gefäße zum Verdunsten in warmen Sand, wobey sich aber die Salpeter-Säure nicht gut abscheiden wollte.

„Dritter Versuch. 7. Weil ich vermuthen konnte, daß in dieser Flüssigkeit ein Theil dephlogistisirte Weinstein-Säure (Zucker-Säure) befindlich seyn möchte, wollte ich versuchen, sie vermittelst der Kalk-Erde davon zu scheiden. Zu dem Ende vermischte ich die sämmtliche Flüssigkeit mit 2 Unzen destillierten Wasser, und legte in diese Mischung ein längliches ganzes Stückchen Kreide, welches sich darin mit vielem Brausen auf löste; theils blieb sie aufgelöset, theils fiel sie aber als ein weißes Pulver zu Boden, und ich konnte dieses als einen mit der Pflanzen-Säure erzeugten Selenit ansehen. Nachdem auf diese Art alles mit der Kreide gesättigt war, goß ich die obere klare, aus Salpeter-Säure und Kalk-Erde bestehende Auflösung ab, und laugte den erdigen Rückstand einige Mahl mit destilliertem Wasser aus. Diesen Rückstand, welcher getrocknet 3 Drachmen wog, mischte ich mit 2 Dr. concentrirter Vitriol-Säure, welche ich vorher mit 6 Th. destilliertem Wasser verdünnet hatte, und setzte diese Mischung einige Zeit in die Wärme; es wollte sich aber keine Weinstein-Säure entdecken, sondern sie schien darin schon als ganz fertige Zucker-Säure vorhanden zu liegen, und konnte also nicht durch Vitriol-Säure geschieden werden.

„Vierter Versuch. 8. Man sieht sehr wohl, daß ich bey der Zerlegung des Kirsch-Saftes auf diesem Wege meinen vorgesetzten Endzweck nicht würde erreicht haben, und ich schlug daher zu mehrerer Bequemlichkeit folgenden Weg ein. Um meinen Kirsch-Saft von dem mehresten dabey befindlichen Wasser zu befreyen, gab ich 2 Pfund davon in eine Retorte, und destillierte so viel herunter, daß ich 8 Unzen Rückstand behielt; dieser war ein dicker rother Saft, welcher jetzt merklich saurer schmeckte, als vorher. Was in die Vorlage

über-

übergegangen war, hatte nichts Geistiges bey sich, und war für mich ein deutlicher Beweis, daß mein Saft nicht die geringste Gährung erlitten hatte.

„9. Diesen erhaltenen Rückstand übergoß ich in derselben Retorte mit 8 Unzen schwacher, aber sehr reiner Salpeter-Säure, und setzte sie offen in warmen Sand. Die Mischung stieß gleich häufige Dämpfe aus, brauste heftig, wobey sie ihre rothe Farbe verlor, und hellgelb wurde; nun legte ich eine geräumliche Retorte vor, und destillierte die Salpeter-Säure, welche sich bey dieser Mischung befand, mehrentheils herüber.

„10. Nach dem Erkalten sahe der Rückstand in der Retorte wieder etwas braun aus, betrug am Gewicht ungefähr 4 Unzen, und am Boden der Retorte schienen sich erdige Theile abgesetzt zu haben. Als diese Retorte einige Stunden an einem kalten Orte gestanden hatte, fand sich der erdige Bodensatz nicht allein vermehrt, sondern er schien auch mit kleinen Salz-Krystallen durchwebt zu seyn. Um diesen Satz genauer untersuchen zu können, lösete ich alles bey gelinder Wärme in derselben Retorte wieder auf, goß die Flüssigkeit in ein Zucker-Glas, und fand nach zwey Tagen, da es in der Kälte gestanden hatte, die schon erwähnten Erscheinungen am Boden des Glases, welcher nehmlich mit kleinen länglichen Krystallen besetzt war. Ich goß die darüber stehende Flüssigkeit ab, und brachte sie zum weitern Verdunsten in gelinde Wärme, wo ich denn, nach dem Erkalten, noch etwas von solchen Krystallen erhielt. Dieses Verdunsten wiederhohlte ich so oft, bis sich in der Kälte nichts mehr daraus krystallisirte.

„11. Anfangs glaubte ich, daß die Zucker- oder Weinstein-Säure im Kirsch-Safte, zum Theil mit alkalischen Salze vereinigt, als Weinstein-Rahm vorhanden liegen würde. Daß sich also hier die Salpeter-Säure mit dem alkalischen Salze verbunden, und einen Salpeter erzeuget haben würde, wofür ich denn diese erhaltene Krystallen anfangs erkannte; dieses mußte aber erst durch Versuche weiter entschieden werden.

„Fünfter Versuch. 12. Um mich von der Natur dieser erhaltenen Krystallen genauer zu überzeugen, brachte

ich

Tinctur blau färbte, welches mir aber eine jede andere phlegistisirte Salpeter-Säure eben so gut verrichtet. Die Flüssigkeit in der Retorte war noch mit vieler Salpeter-Säure verbunden. Um die harzigen Theile, welche darauf schwammen, davon abzusondern, wurde sie durch Druck-Papier filtriet. Das Filtrirte stellte ich hierauf in einem flachen Gefäße zum Verdunsten in warmen Sand, wobey sich aber die Salpeter-Säure nicht gut abscheiden wollte.

„Dritter Versuch. 7. Weil ich vermuthen konnte, daß in dieser Flüssigkeit ein Theil dephlogistisirte Weinstein-Säure (Zucker-Säure) befindlich seyn möchte, wollte ich versuchen, sie vermittelst der Kalk-Erde davon zu scheiden. Zu dem Ende vermischte ich die sämmtliche Flüssigkeit mit 2 Unzen destillierten Wasser, und legte in diese Mischung ein längliches ganzes Stückchen Kreide, welches sich darin mit vielem Brausen auf löste; theils blieb sie aufgelöset, theils fiel sie aber als ein weißes Pulver zu Boden, und ich konnte dieses als einen mit der Pflanzen-Säure erzeugten Selenit ansehen. Nachdem auf diese Art alles mit der Kreide gesättigt war, goß ich die obere klare, aus Salpeter-Säure und Kalk-Erde bestehende Auflösung ab, und laugte den erdigen Rückstand einige Mahl mit destilliertem Wasser aus. Diesen Rückstand, welcher getrocknet 3 Drachmen wog, mischte ich mit 2 Dr. concentrirter Vitriol-Säure, welche ich vorher mit 6 Th. destilliertem Wasser verdünnet hatte, und setzte diese Mischung einige Zeit in die Wärme; es wollte sich aber keine Weinstein-Säure entdecken, sondern sie schien darin schon als ganz fertige Zucker-Säure vorhanden zu liegen, und konnte also nicht durch Vitriol-Säure geschieden werden.

„Vierter Versuch. 8. Man sieht sehr wohl, daß ich bey der Zerlegung des Kirsch-Saftes auf diesem Wege meinen vorgesetzten Endzweck nicht würde erreicht haben, und ich schlug daher zu mehrerer Bequemlichkeit folgenden Weg ein. Um meinen Kirsch-Saft von dem mehresten dabey befindlichen Wasser zu befreyen, gab ich 2 Pfund davon in eine Retorte, und destillierte so viel herunter, daß ich 8 Unzen Rückstand behielt; dieser war ein dicker rother Saft, welcher jetzt merklich [illegible] schmeckte, als vorher. Was in die Vorlage über-

übergegangen war, hatte nichts Geistiges bey sich, und war für mich ein deutlicher Beweis, daß mein Saft nicht die geringste Gährung erlitten hatte.

„9. Diesen erhaltenen Rückstand übergoß ich in derselben Retorte mit 8 Unzen schwacher, aber sehr reiner Salpeter-Säure, und setzte sie offen in warmen Sand. Die Mischung stieß gleich häufige Dämpfe aus, brauste heftig, wobey sie ihre rothe Farbe verlor, und hellgelb wurde; nun legte ich eine geräumliche Retorte vor, und destillierte die Salpeter-Säure, welche sich bey dieser Mischung befand, mehrentheils herüber.

„10. Nach dem Erkalten sahe der Rückstand in der Retorte wieder etwas braun aus, betrug am Gewicht ungefähr 4 Unzen, und am Boden der Retorte schienen sich erdige Theile abgesetzt zu haben. Als diese Retorte einige Stunden an einem kalten Orte gestanden hatte, fand sich der erdige Bodensatz nicht allein vermehrt, sondern er schien auch mit kleinen Salz-Krystallen durchwebt zu seyn. Um diesen Satz genauer untersuchen zu können, lösete ich alles bey gelinder Wärme in derselben Retorte wieder auf, goß die Flüssigkeit in ein Zucker-Glas, und fand nach zwey Tagen, da es in der Kälte gestanden hatte, die schon erwähnten Erscheinungen am Boden des Glases, welcher nehmlich mit kleinen länglichen Krystallen besetzt war. Ich goß die darüber stehende Flüssigkeit ab, und brachte sie zum weitern Verdunsten in gelinde Wärme, wo ich denn, nach dem Erkalten, noch etwas von solchen Krystallen erhielt. Dieses Verdunsten wiederhohlte ich so oft, bis sich in der Kälte nichts mehr daraus krystallisirte.

„11. Anfangs glaubte ich, daß die Zucker- oder Weinstein-Säure im Kirsch-Safte, zum Theil mit alkalischen Salze vereinigt, als Weinstein-Rahm vorhanden liegen würde. Daß sich also hier die Salpeter-Säure mit dem alkalischen Salze verbunden, und einen Salpeter erzeuget haben würde, wofür ich denn diese erhaltene Krystallen anfangs erkannte; dieses mußte aber erst durch Versuche weiter entschieden werden.

„Fünfter Versuch. 12. Um mich von der Natur dieser erhaltenen Krystallen genauer zu überzeugen, brachte

ich

ich einige davon unter ein Mikroskop, wo ich aber die reguläre Bildung des Salpeters nicht erkannte; auch entdeckte dies der Geschmack nicht, ob man schon diesen nicht sehr in Anschlag bringen konnte, weil diese Krystallen äusserst bitter schmeckten. Als ich den ganzen Vorrath meines Salzes, mit destilliertem Wasser übergossen, in die Wärme stellte, löseten sich die Salz-Theile auf, und es schied sich ein ziemlicher Theil einer weißen Erde ab.

„Sechster Versuch. 13. Nachdem diese Erde von der übrigen Flüssigkeit abgeschieden, ausgesüßt und getrocknet worden war, war es eine weiße lockere Erde, ohne allen Geschmack. In Salpeter-Säure löste sie sich nicht auf, noch weniger bemerkte man einiges Brausen. Vor dem Blase-Rohre fing sie ruhig an zu glühen, ohne Dämpfe auszustoßen; und wurde auch sonst nicht weiter verändert.

„Aus diesen, nebst mehrern Versuchen, welche ich mit dieser Erde angestellt habe, kann ich mir noch keinen Begriff von ihrer wirklichen Natur machen. Ob sie als ein wahrer oder zufälliger Bestandtheil des Kirsch-Saftes anzusehen ist, dies lässet sich so leicht nicht entscheiden, so leicht es auch im Gegentheil seyn würde, wenn es eine mit Weinstein-Säure verbundene Kalk-Erde gewesen wäre. Eine Erde, welche Beaumé (*) bey Untersuchung der Tamarinden fand, und welche derselbe für eine glasachtige Erde hält, welche weiter untersucht zu werden verdiene, scheint mit dieser sehr viel Aehnliches zu haben. Mehrere Versuche damit anzustellen, war mir nicht möglich, da der ganze Vorrath nur 20 Gran betrug. Daß diese Erde, wenn sie sich in dem Kirsch-Safte als Kalk-Erde befunden, etwas Vitriol-Säure aus der Salpeter-Säure hätte annehmen, und sich damit in wirklichen Selenit verwandeln können, kann ich nicht glauben, weil ich von der Reinigkeit meiner gebrauchten Salpeter-Säure zu sehr überzeugt bin.

„Siebenter Versuch. 14. Es war mir nun noch die (§. 12.) übrig behaltene salzige Flüssigkeit zu untersuchen

(*) Elemens de Pharmacie theoretique & pratique. (Paris 1770) p. 164.

Das übrige noch fehlende muß ſowohl den wäſſerigen Theilen, als auch der (§. 9.) entwichenen Luft zugeſchrieben werden. Vielleicht iſt die Entdeckung dieſer erhaltenen Beſtandtheile in den ſauern Kirſchen manchen Aerzten nicht unangenehm, weil ſie eben daraus auf ſeine Wirkſamkeit einige Folgen ziehen können; ſonſt ergibt es ſich aber von ſelbſt, daß es nicht rathſam ſeyn würde, ſich die Zucker-Säure daraus zu verfertigen. Dies war indeſſen auch nicht meine Abſicht; denn dieſe ging bloß dahin, meine Meinung über die Natur der Pflanzen-Säure zu beſtätigen."

Eben Deſſ. Verſuch einer Erklärung über die Natur und Entſtehung des brennbaren Geiſtes, aus der Unterſuchung der Kirſchen-Säure hergeleitet, ſt. in Crell's chem. Annalen, 8 St. 1785, S. 115, fgg.

Die Kirſchen werden auf verſchiedene Art genutzet; und da man dieſelben in ihrem friſchen Zuſtande nicht lange erhalten kann, auf mancherley Weiſe zubereitet. Die weißen Kirſchen, auch die weichfleiſchigen ſchwarzen, kann man faſt nicht anders, als roh zu eſſen, nutzen. Die Glas-Kirſchen ſchicken ſich vorzüglich zum Einmachen mit Zucker, weil ſie nicht nur ſehr groß und fleiſchig ſind, ſondern auch eine helle Farbe haben, welche den Confitüren ein angenehmes Anſehen gibt. Zum Einmachen mit Eſſig, gebraucht man gemeiniglich die Morellen, wozu ſich aber die rechten ſauern beſſer ſchicken. Dieſe werden auch, ſo wie die ſchwarzen Herz-Kirſchen, im Ofen gedörret, oder gebacken. Auch wird aus den ſauern der Kirſch-Saft, Kirſch-Wein, Branntwein, und ein abgezogenes Waſſer, bereitet.

Wenn man nicht vielerley Arten hat, oder haben kann, vermengt man ſie, wenn man ſie roh zum Nachtiſch aufſetzt, öfters unter einander, ſchwarze und rothe, harte und weiche, runde und Herz-Kirſchen. Hat man aber die Menge von jeder Art, ſo ſetzt man ſie, jede beſonders, lieber auf eigenen Aſſiet-

ten

Säure auf diese Masse goß, und sie wieder davon abzog, erhielt ich auch diese alsdann in der Kälte, größtentheils als Zucker-Säure krystallisirt.

„18. Um sie besser zu reinigen, und von der anklebenden Salpeter-Säure zu befreyen, wurden alle erhaltene Krystallen wieder in destilliertem Wasser aufgelöset, und nach und nach durch Verdünsten und Krystallisiren wieder daraus gewonnen. Ich erhielt hierbey 5 Drachmen ganz reine Zucker-Saure in ziemlich großen Krystallen angeschossen. Ob ich schon diese Säure, als ein Fällungs-Mittel gegen verschiedene Auflösungen versucht, und dadurch ihre Gleichheit mit einer, aus dem Zucker geschiedenen, Säure bestimmt habe: so verspare ich doch die Bekanntmachung der Resultate, und werde sie alsdann in einer besondern Tabelle mit aufstellen, wenn ich alle übrige Pflanzen-Säfte werde durchgearbeitet haben. Folgendes will ich hier nur noch anführen, um wenigstens einige Haupt-Eigenschaften der Zucker-Säure an meinen Krystallen zu beweisen, und daß sie nicht mehr

erste geschieht, indem die angenehme Säure des Kirsch-Saftes die Speichel-Drüsen zum Zusammenziehen reizt, wovon sie ihren Saft in die Höhle des Mundes ergießen, und dadurch die lechzende Zunge erquicken, und den trocknen Gaumen benetzen. Diese Stillung des Durstes hat etwas sehr vorzügliches bey der Hitze, weil dadurch der Körper nicht mit zu viel flüssigen Sachen überhäuft, und solcher Gestalt entweder noch mehr in Schweiß, oder in trocknere Hitze gebracht wird. Hierzu kommen aber noch die andern Vortheile, welche die Kirschen zu gleicher Zeit gewähren, indem sie auf die angenehmste Weise den Durst löschen. Sie dämpfen durch eine ganz besondere kühlende Empfindung die Wallung des erhitzten Geblütes, und besänftigen die unruhigen Lebens-Geister, welche auf das Herz und die Adern losstürmen, und in diesem wilden Aufruhre weder die Neigungen nähren, noch die Nerven, die unserer Freyheit zu Gebothe stehen sollen, stärken. Der wohlthätigste Nutzen des Kirsch-Saftes ist indessen die zusammenziehende Kraft, welche seine Säure in unsern Säften äussert, und wodurch sie, gleichsam als ein erkältendes Wesen, die durch die Hitze allzu sehr aufgelöseten flüssigen Theile des menschlichen Körpers verdichtet, und in einer solchen Mischung erhält, daß sie der Fäulniß nicht Preis stehen, welche sonst augenblicklich bereit ist, sie zu zerstören.

Die süßen Kirschen haben vor den sauern große Vorzüge, weil sie angenehmer schmecken, nicht zu stark abkühlen, und der Brust und dem Magen zuträglicher sind. Da ihr Saft mehr wässerig, als schleimig, ist, so blähen sie wenig, und sind ein leichtes Obst, wovon man ziemlich viel ohne große Beschwerde essen kann. Man gibt sie den meisten Kranken mit Vortheil, und sie haben in ihrer vorzüglichen auflösenden und verdünnenden Kraft, beynahe den ersten Rang unter den süßen Früchten. Ja, darin kann man die süßen Kirschen

und die guten Weintrauben, den Erdbeeren, und andern, wegen ihrer auflösenden Kräfte so berühmten, weinsäuerlichen Früchten, völlig gleich schätzen. Sie lariren leicht, wenn man sie in Menge genießt. Uebrigens muß es, wenn man dieses Obst genießen will, nicht im Uebermaße geschehen, weil es nichts in sich enthält, was den Magen stärken könnte, ausser den Kernen, welche wir gemeiniglich nicht mit genießen. Zuweilen sind Kirschen von ziemlich großen Würmern verdorben, die sich in ihrer Substanz sehr wohl befinden; und ob gleich der Genuß dieser Thiere, unter so vielen andern Würmern, die wir fast täglich speisen, wenig Schaden thun würde: so ist es doch ekelhaft, es zu wissen, oder von ungefähr zu entdecken.

Personen, die sehr geschwinde essen, zumahl Kinder, **verschlucken gern Kirschen** und andere Früchte **mit den Steinen.** Das ist bekannt. Aber wie bekannt es auch ist, so geschieht es doch noch alle Tage. Also ist es nicht überflüssig, Aeltern daran zu erinnern, daß sie bey solchen Gelegenheiten auf die kleinen Kirschen-Fresser Acht haben, wenigstens zu einer Zeit, da solche Früchte viel genossen werden, sich vergewissern lassen, daß ihnen die Natur alle Tage ihre gewöhnliche Wohlthat wiederfahren lässet. Denn die hartnäckigsten Leibes-Verstopfungen, zuweilen mit heftigen Bauchgrimmen verknüpft, sind nur gar zu oft die Folgen jener Unvorsichtigkeit. Der Kranke ist noch immer glücklich, wenn solche fremde lästige Körper nicht gar in dem Blind-Darme stecken bleiben, sondern doch noch weiter vorrücken. Man rühmt mit Recht in solchen Fällen das Castor-Oehl (Ol. Ricini), zumahl mit Manna versetzt. Doch kann man sich im Nothfall mit frischem Lein-Oehle behelfen. Ein Klystier von diesem Oehle mit Zucker ist auch sehr dienlich, den Abgang dieser harten Gäste zu erleichtern.

Zuweilen hat dieſer Abgang große Schwierigkeiten. In dem Journal de Medecine findet man die Geſchichte einer alten Frau, die eine Legion Kirſch-Steine bey ſich hatte. Es mußte eine beſondere Batterie angeleget werden, dieſes Corps zum Capituliren zu bringen, da es denn unter Anführung von ſechs Pflaum-Steinen ausmarſchierte. Aber, wir haben ſo gar Beobachtungen von Kirſch-Steinen, die ſo lange in den erſten Wegen liegen geblieben ſind, daß ſie zu keimen angefangen haben. Ein Leib-Wundarzt des Fürſten von Salm-Salm erzählt eine ſolche Geſchichte in jenem Journal.

Warnehmung von der betrübten Wirkung der aus Unvorſichtigkeit verſchlungenen Pflaumen- und Vogelkirſchen-Steine, von H. Marteau de Grandvilliers, ſt. in der aus dem Franz. überſ. Sammlung auserleſ. Wahrnehm. ꝛc. 7 B. 1 St. Straßb. 1761. 8. S. 19 — 28.

Jul. Chriſt. Pfaffii obſ. de inteſtino colo, à capiolis ceraſorum nucleis, poſt hernize incarceratae repoſitionem deglutitis, in ſcroto perforato, feliciterque iterum conſolidato, ſt. in *Nov. Act. phyſ. med. Acad. Caſ. N. C.* To. II. Norimb. 1757, 4. obſ. 12, S. 41 — 51.

Car. Stahpartii van der Wiel obſ. de ceraſorum nucleis in inteſtino colo per ſex circiter menſes latentibus, ſt. in Deſſen Obſſ. rarior. Cent. I. Leidæ, 1727, 8. obſ. 64, S. 273 — 275.

Conr. Ludw. Walthers Obſ. von einer Verſtopfung von Kirſchkernen, ſt. in Deſſen ſonderbaren Bemerkungen, Frf. und L. 1761, 8. Obſ. 12, S. 42, f.

Carl White Beobachtung von Kirſchkernen, die in den Gedärmen zurück geblieben, aus Deſſen Caſes in Surgery with remarks, Lond. 1770, 8. S. 23, ſt. im 4 St. der Samml. auserleſ. Abhandl. z. Gebr. prakt. Aerzte, Lpz. 1774, gr. 8. S. 175 — 179.

Schwarze ſaure Kirſchen, laſſen ſich wie die ſchwarzen Heidelbeeren (ſ. Th. XX, S. 743, f.) friſch aufbehalten.

Die friſchen, inſonderheit ſauern, Kirſchen können als ein auflöſendes Mittel denjenigen empfohlen werden, welche mit langwierigen Krankheiten beſchwert ſind, die von einer Verſtopfung der Eingeweide ihren Urſprung haben. v. Swieten rühmt ſolche wieder die Melancholie und andere dergleichen Krankheiten, und

befiehlt, solche so häufig zu genießen, bis ei
dadurch erreget wird, welcher auch nicht z
ist. Bey hitzigen Fiebern geben solche au
eine Kühlung, und ein nützliches Getränk.

Die Stängel oder Frucht-Stiele,
nicht unangenehm schmeckenden Aufguß,
der eingewurzelten Catarrh dienlich ist.

Den **Kirsch-Kernen** schreibt man ei
bende Kraft zu; daher man dieselben bey d
Weh und bey unterdrücktem Urin, die Nie
Grieße und Schleime zu befreyen, für di
Man bereitet aus denselben Emulsionen.
auch das aus diesen Kernen ausgepreßte
eben diese Zufälle angepriesen.

Die Schola Salernitana preiset die Kirs
der Maßen:

Si cerasum comedas, tibi confert grandia
Expurgat stomachum, nucleus lapidem
Hinc melior toto corpore sanguis inest.

Arnoldus Villanovanus setzt aus der Erfahr
daß die Leber der Sperlinge um die Zeit der rei
viel größer, als zu andern Zeiten des Jahre
werde; daher schließt er, weil die Sperlinge
Kirschen häufig fressen, daß der Saft derselb
stärken, und gut Geblüt machen könne.

Da die Kirschen im frischen Zustande k
Obst sind, so hat man verschiedene Metho
angenehme Obst zu **nassen und trocknen C**
zu **gebrauchen**, erfunden. Da aber in so
fitüren die eigentlich so genannten sauern Kir
gemeinen sowohl, als auch die Amarellen,
Geschmack hervor bringen, so werden diese,
Glas-Kirschen, fast nur allein, die süßen
oder gar nicht, eingemacht.

Zuweilen hat dieser Abgang große Schwierigkeiten. In dem Journal de Medecine findet man die Geschichte einer alten Frau, die eine Legion Kirsch-Steine bey sich hatte. Es mußte eine besondere Batterie angeleget werden, dieses Corps zum Capituliren zu bringen, da es denn unter Anführung von sechs Pflaum-Steinen ausmarschierte. Aber, wir haben so gar Beobachtungen von Kirsch-Steinen, die so lange in den ersten Wegen liegen geblieben sind, daß sie zu keimen angefangen haben. Ein Leib-Wundarzt des Fürsten von Salm-Salm erzählt eine solche Geschichte in jenem Journal.

Wahrnehmung von der betrübten Wirkung der aus Unvorsichtigkeit verschlungenen Pflaumen- und Vogelkirschen-Steine, von H. Marteau de Grandvilliers, st. in der aus dem Franz. übers. Sammlung auserles. Wahrnehm. ꝛc. 7 B. 1 St. Straßb. 1761, 8. S. 19 — 28.

Rud. Christ. Pfeffil obs. de intestino colo, à capiosis cerasorum nucleis, post herniae incarceratae repositionem deglutitis, in scroto perfurato, feliciterque iterum consolidato, st. in *Nov. Act. phys. med. Acad. Caes. N. C.* To. II. Norimb. 1757, 4. obs. 12, S. 41 — 51.

Car. Stahrtii van der Wiel obs. de cerasorum nucleis in intestino colo per sex circiter menses latentibus, st. in Dessen Obss. rarior. Cent. I. Leidæ, 1727, 8. obs. 64, S. 273 — 275.

Conr. Ludw. Walthers Obs. von einer Verstopfung von Kirschkernen, st. in Dessen sonderbaren Bemerkungen, Frf. und L. 1761, 8. Obs. 12, S. 42, f.

Carl White Beobachtung von Kirschkernen, die in den Gedärmen zurück geblieben, aus Dessen Cases in Surgery with remarks, Lond. 1770, 8. S. 23, st. im 4 St. der Samml. auserles. Abhandl. z. Gebr. prakt. Aerzte, Lpz. 1774, gr. 8. S. 175 — 177.

Schwarze saure Kirschen, lassen sich wie die schwarzen Heidelbeeren (s. Th. XX, S. 743, f.) frisch aufbehalten.

Die frischen, insonderheit sauern, Kirschen können als ein auflösendes Mittel denjenigen empfohlen werden, welche mit langwierigen Krankheiten beschwert sind, die von einer Verstopfung der Eingeweide ihren Ursprung haben. v. Swieten rühmt solche wieder die Melancholie und andere dergleichen Krankheiten, und

befiehlt, solche so häufig zu genießen, bis ein Durchfall dadurch erreget wird, welcher auch nicht zu verstopfen ist. Bey hitzigen Fiebern geben solche auch abgekocht eine Kühlung, und ein nützliches Getränk.

Die Stängel oder Frucht-Stiele, geben einen nicht unangenehm schmeckenden Aufguß, welcher wieder eingewurzelten Catarrh dienlich ist.

Den Kirsch-Kernen schreibt man eine urintreibende Kraft zu; daher man dieselben bey dem Nieren-Weh und bey unterdrücktem Urin, die Nieren von dem Griese und Schleime zu befreyen, für dienlich hält. Man bereitet aus denselben Emulsionen. Es wird auch das aus diesen Kernen ausgepreßte Oehl wieder eben diese Zufälle angepriesen.

Die Schola Salernitana preiset die Kirschen folgender Maßen:

Si cerasum comedas, tibi confert grandia dona:
Expurgat stomachum, nucleus lapidem tibi tollit;
Hinc melior toto corpore sanguis inest.

Arnoldus Villanovanus setzt aus der Erfahrung hinzu, daß die Leber der Sperlinge um die Zeit der reifen Kirschen viel größer, als zu andern Zeiten des Jahres, befunden werde; daher schließt er, weil die Sperlinge alsdann die Kirschen häufig fressen, daß der Saft derselben die Leber stärken, und gut Geblüt machen könne.

Da die Kirschen im frischen Zustande kein Dauer-Obst sind, so hat man verschiedene Methoden, dieses angenehme Obst zu nassen und trocknen Confitüren zu gebrauchen, erfunden. Da aber in solchen Con- [illegible] die eigentlich so genannten sauern Kirschen, die [illegible]nen sowohl, als auch die Amarellen, den besten [illegible]mack hervor bringen, so werden diese, nebst den [illegible]-Kirschen, fast nur allein, die süßen aber wenig [illegible] gar nicht, eingemacht.

Unter

Unter den verschiedenen Arten, saure Kirschen einzumachen, sind folgende die gebräuchlichsten. Es werden die ansehnlichsten Kirschen, die recht fleischreich sind, genommen. Von diesen werden die Stiele dergestalt abgeschnitten, daß etwa der dritte Theil davon an den Kirschen sitzen bleibe. Zu diesen Kirschen wird weißer Zucker gestoßen, und sodann durchgesiebet, daß die gröbern Stückchen zurück bleiben, welche sodann noch nachgestoßen und auch durchgesiebet werden. Die Proportion des Zuckers zu den Kirschen, muß ein Drittel des Gewichtes der Kirschen seyn. Wenn z. B. 2 Pfund Kirschen eingemachet werden sollen, wird dazu 1 Pfund feiner durchgesiebter Zucker erfordert. Nach solcher Zubereitung wird eine Handvoll Kirschen in eine Pfanne über Kohlfeuer gethan. Die Pfanne wird beständig vermittelst des Pfannen-Stieles umgeschüttelt, damit die Kirschen nicht anbrennen. Sobald die Kirschen in der Pfanne zu knirschen anfangen, wird ein Löffel voll von dem durchgesiebten Zucker nebst einer Handvoll Kirschen hinzu gethan, und unter öfterm Umschütteln hiermit so lange fortgefahren, bis alle Kirschen und Zucker hinein sind, worauf die Pfanne so lange geschüttelt wird, bis eine Brühe oder Suppe hervor gekommen ist. Wenn man hierauf die Kirschen noch ein wenig so lange hat kochen lassen, bis sie gar sind, werden sie mit einer Schaum-Kelle behutsam heraus geschöpfet, daß die Suppe wieder zu den übrigen in der Pfanne ablaufen könne. Wenn die Kirschen in ein Zucker-Glas eingelegt worden sind, lässet man die Suppe noch zu einem dicken Syrupp einkochen. Dieser wird hernach laulich über die Kirschen gegossen. Wenn alles ganz kalt geworden ist, wird das Glas mit Wachs-Papiere, und darüber noch mit weißem Papiere fest zugebunden. Sollte der Syrupp nachher (weshalb zum öftern nachzusehen ist,) sich entlassen und

dünn werden, muß er ein oder einige Mahl umgekocht werden, bis er auf beständig gesteht.

Will man Kirschen, wie die meisten andern Früchte, einmachen, so wird zuvörderst der Zucker nach gewöhnlicher Art gekocht und geläutert, bis er völlig spinnt. Bey dieser Verfahrungs-Art nimmt man Kirschen und Zucker in völlig gleichem Gewichte. Die an dem Stiele verkürzten Kirschen werden zu dem Zucker gethan, und so lange gesotten, bis sie ganz kraus werden. Alsdann nimmt man sie mit dem Schaum-Löffel heraus, so, daß das Flüssige zu dem Zucker ablaufe. Wenn die Kirschen heraus sind, muß der Zucker so lange kochen, bis er völlig wie eine Gallerte gestehe. Wenn man ihn hierauf hat laulich werden lassen, wird er zu den Kirschen geschüttet. Sollte sich dieser Syrupp einst entlassen, muß er wieder umgekochet werden.

Eine andere Art, die Kirschen mit Zucker einzumachen. Zu 1 Pfund schwarze Kirschen nimmt man 1 Pfund geriebenen feinen Zucker; zu rothen aber etwas weniger. Die Kirschen werden mit dem Zucker schichtweise in eine Pfanne gethan, so, daß unten und oben eine Schicht Zucker ist. Alsdann presset man andere Kirschen durch, und gießt von dem Safte so viel über die Kirschen in der Pfanne, daß sie von dem aufgegossenen Safte bedeckt seyn. Wenn man die Kirschen hierauf ein Mahl hat sieden lassen, deckt man ein Tuch darüber, lässet sie 10 oder 12 Stunden stehen, und hernach wieder sieden, bis sie klar sind. Sollte der Saft noch zu dünn seyn, muß derselbe, nach dem Herausnehmen der Kirschen, noch so lange gekochet werden, bis er die gehörige Dicke erlangt hat. Wenn er hernach kalt geworden ist, wird er zu den Kirschen gethan.

Noch eine andere Art. Es werden, nach Gutdünken, Kirschen in einem großen Mörser gestoßen;

alsdann wird der Saft ausgepresset, welchen man so lange stehen lässet, bis er sich gesetzt hat, worauf er abgekläret, und mit so viel Zucker zum Feuer gesetzt wird, daß die damit einzumachenden Kirschen süß genug davon werden können. Dieser mit Zucker vereinigte Kirsch-Saft muß wohl geschäumet, und so lange gekochet werden, bis er wie eine Gallerte gesteht. Auch kann man, wenn es gefällt, Nelken und Zimmet mit hinein thun. Wenn dieser Saft stark genug gekocht ist, lässet man ihn kühl werden. Die einzumachenden Kirschen werden mit dem abgekühlten Safte auf Feuer gesetzt, und ganz langsam gesotten, bis sie schrumpfig werden. Alsdann nimmt man sie heraus, und lässet das Nasse aus der Schaum-Kelle zu dem übrigen Safte ablaufen. Nach völlig heraus genommenen Kirschen wird der Saft bis zur gehörigen Dicke eingekocht, und, nachdem er laulich geworden ist, über die Kirschen in dem Aufbewahrungs-Gefäße gegossen. Sollte der Syrupp in der Folge sich entlassen, oder wässerig werden, muß er, wie gewöhnlich, umgekochet werden.

Eine gute Art, die so genannten Faß-Kirschen einzumachen, ist folgende. Man schüttet in ein kleines, recht dicht gemachtes Fäßchen von den besten Morellen, mit kurz abgeschnittenen Stielen, schichtweise, und allemahl dazwischen fein zerstoßenen und ausgesiebten Zucker. Bey dem Einfüllen muß das Faß öfters gerüttelt werden, damit die Zwischenräume darin angefüllet werden. Auf ein Faß von 6 bis 7 Quart, rechnet man 4 Pfund Zucker, auch in kleine Stücke gebrochenen Zimmet und Nelken, von jedem 1 Quent. Wenn das Faß voll ist, nachdem die unterste und oberste Schicht von Zucker gemacht worden ist, lässet man es 14 Tage lang offen liegen. Nach ein Par Tagen gerathen die Kirschen in heftige Gährung. Das Faß muß alsdann täglich einige Mahl gerühret werden.

Nach 14 Tagen wird das Faß gespündet. Da die solcher Gestalt eingelegten Kirschen nicht nach Jedermannes Geschmack sind, indem sie fast schmecken, als wenn sie mit Branntwein eingemacht wären: so ist es besser, wenn man den Zucker vorher läutert, und so übergibt; da man denn das Faß sogleich spünden und fest verpichen muß, damit es keine Luft erhalte. Man kehrt es sodann alle Tage einmahl das unterste zu oberst, und füllet, wenn ein Faß angebrochen worden ist, die Kirschen lieber in mehrere Gläser.

Nächst dem, daß man die Kirschen mit bloßem Zucker einmacht, pflegt man sie auch in Zucker und Essig zugleich einzulegen.

Die eine Art ist diese: Man nimmt schwarze reife Kirschen, und drückt sie durch ein Haartuch, nachdem sie von Stielen und Steinen entledigt worden sind. Der ausgedrückte Saft muß eine Nacht im Keller in einer Bouteille aufgehoben werden. Am folgenden Tage nimmt man schöne reife schwarze Kirschen, schneidet die Stiele so kurz ab, daß man sie nur anfassen kann; wäget zu 1 Pfund Kirschen 2 Pf. Zucker ab, lässet diesen mit einem Drittel von jenem Safte und $\frac{2}{3}$ Essig gelinde, unter beständigem Abschäumen, kochen, und darauf in einem irdenen Gefäße erkalten. Die Kirschen werden inzwischen in Gläser, mit etwas dazwischen gestreueten Nelken, gefüllet, der kalte Zucker wird überher gegossen, und sodann werden die Gläser mit Blasen fest zugebunden.

Eine andere Art, Essig-Kirschen einzumachen, ist folgende. Es werden in ein Glas schichtweise, erst geriebener Zucker, und alsdann schwarze saure reife Kirschen ohne Stiele, bis das Glas voll ist, geleget. Hierauf wird stark abgekochter und wieder kalt gewordener Wein-Essig überher gegossen, das Glas mit Papier zugebunden, mit einer Nadel hin und wieder Löcher durchgestochen, und das Glas eine Zeit lang an

die

tes Kirsch-Fleisch nennt. Wenn von den Kirschen die Steine heraus gemacht worden, nimmt man zu 1 Pf. Kirschen, ¾ Pf. Zucker, welcher vorher ein wenig gekocht werden muß. In diesen Zucker thut man die Kirschen, und lässet sie darin gar sieden. Wenn dieselben hernach mit der Schaum-Kelle heraus genommen werden, muß man das Flüssige davon zu dem Zucker rein ablaufen, und den Zucker, wenn alle Kirschen heraus sind, zur gehörigen Consistenz einsieden lassen. Sodann werden die Kirschen in ein Glas gethan, und der abgekühlte Zucker wird überher gegossen. Sollte der Zucker in der Folge wässericht werden, so muß man ihn wieder umkochen. Einige pflegen auch die Steine der Kirschen aufzuklopfen, die Kerne heraus zu nehmen, solche zuletzt in den einsiedenden Zucker zu werfen, und ein Par Mahl mit aufsieden zu lassen. Diese gar gekochte Kerne werden mit den Kirschen vermenget und eingeleget, woraus ein angenehmer Geschmack entsteht.

Eine andere Art, das Kirsch-Fleisch einzumachen, ist folgende. Es werden aus reifen schwarzen Kirschen die Stiele zugleich mit den Steinen behend heraus gezogen, daß die Kirschen nicht zerquetschet werden, sondern ganz bleiben. Aus andern Kirschen gleicher Art wird der Saft ausgepresset, und mit so vielem Zucker gekocht, als man glaubt, daß es süß genug seyn könne. Wenn dieser Saft abgenommen und verkühlt ist, werden die Kirschen hinein gethan, und allmählich damit gesotten, bis sie gar sind. Von den mit der Schaum-Kelle heraus genommenen Kirschen lässet man das Flüssige zu der Suppe laufen, worauf diese zur gehörigen Dicke einsieden muß. Wenn dieser Syrup genug verschlagen ist, wird er über die Kirschen in dem Glase ausgegossen. Wofern er sich entlassen und noch wässern sollte, muß er wieder umgekochet werden.

Das eingemachte Kirsch-Fleisch wird sowohl an sich selbst als Confect angesehen und gegessen, als auch zur Fülle in Frucht-Torten gebraucht.

Ausser

wird, nachdem er zuvor verschlagen ist, überher gegossen. Der oben stehende Schaum muß abgenommen werden.

Um süße Faß-Kirschen zu haben, nimmt man harte spanische Kirschen, ehe sie völlig reif geworden sind, und drehet ihnen die Stiele so behend aus, daß kein Saft ausfließe. Die Kirschen werden in ein über und über gebundenes Fäßchen gethan, und, wenn man will, etwas Nelken, Zimmet und Muskatenblumen, alles gröblich zerstoßen, dazwischen gestreuet. Man nimmt hierauf Zucker, nach Proportion des Fäßchens, läutert ihn, und schäumet ihn fleißig beym Kochen, daß er wie ein ordinärer fließender Syrupp werde. Dieser Syrupp wird, nachdem man ihn hat abkühlen lassen, über die in das Fäßchen gelegten Kirschen gegossen, daß sie davon eben bedecket werden. Hierauf stellt man die Kirschen an einen kühlen Ort, und sieht nach einigen Tagen darnach, so werden sie einen lieblichen Saft bekommen haben. Sollte aber der Saft gar zu dünn werden, und daher zu befürchten seyn, daß er zu säuern anfangen möchte, so muß man fein gestoßenen Zucker hinzu streuen. Dieser Saft kann theils Fieber-Patienten löffelweise gegeben, oder es kann auch in der Geschwindigkeit ein Kirsch-Wein daraus bereitet werden, wenn davon unter Wein oder Wasser gemischet wird. Diese Kirschen müssen beständig unter dem Safte gehalten werden. Wenn daher Saft, zur Labung, oder zum Kirsch-Wein, davon genommen wird, muß man so viel Kirschen heraus nehmen, als der Abg des davon genommenen Saftes erfordert, damit e Kirschen von Safte entblößt liegen. Diese Kirn werden zum Confect auf die Tafel gegeben.

Bey den jetzt erwähnten Arten, Kirschen einzumachen, werden die Steine oder Kerne in den Kirschen gelassen. Man pflegt aber auch Kirschen ohne Steine oder Kerne einzumachen, welche man eingemach-

tes

tes Kirsch-Fleisch nennt. Wenn von den Kirschen die Steine heraus gemacht worden, nimmt man zu 1 Pf. Kirschen, ½ Pf. Zucker, welcher vorher ein wenig gekocht werden muß. In diesen Zucker thut man die Kirschen, und lässet sie darin gar sieden. Wenn dieselben hernach mit der Schaum-Kelle heraus genommen werden, muß man das Flüssige davon zu dem Zucker rein ablaufen, und den Zucker, wenn alle Kirschen heraus sind, zur gehörigen Consistenz einsieden lassen. Sodann werden die Kirschen in ein Glas gethan, und der abgekühlte Zucker wird überher gegossen. Sollte der Zucker in der Folge wässericht werden, so muß man ihn wieder umkochen. Einige pflegen auch die Steine der Kirschen aufzuklopfen, die Kerne heraus zu nehmen, solche zuletzt in den einsiedenden Zucker zu werfen, und ein Par Mahl mit aufsieden zu lassen. Diese gar gekochte Kerne werden mit den Kirschen vermenget und eingeleget, woraus ein angenehmer Geschmack entsteht.

Eine andere Art, das Kirsch-Fleisch einzumachen, ist folgende. Es werden aus reifen schwarzen Kirschen die Stiele zugleich mit den Steinen behend heraus gezogen, daß die Kirschen nicht zerquetschet werden, sondern ganz bleiben. Aus andern Kirschen gleicher Art wird der Saft ausgepresset, und mit so vielem Zucker gekocht, als man glaubt, daß es süß genug seyn könne. Wenn dieser Saft abgenommen und verkühlt ist, werden die Kirschen hinein gethan, und allmählich damit gesotten, bis sie gar sind. Von den mit der Schaum-Kelle heraus genommenen Kirschen lässet man das Flüssige zu der Suppe laufen, worauf diese zur gehörigen Dicke einsieden muß. Wenn dieser Syrupp genug verschlagen ist, wird er über die Kirschen in dem Glase ausgegossen. Wofern er sich entlassen und noch wässern sollte, muß er wieder umgekochet werden.

Das eingemachte Kirsch-Fleisch wird sowohl an sich selbst als Confect angesehen und gegessen, als auch zur Fülle in Frucht-Torten gebraucht.

Ausser



Will man Kirsch-Saft mit Zucker bereiten, so setzt man reife saure Kirschen, nachdem die Stiele abgerupfet worden sind, in einem Kessel auf das Feuer, damit sie zerkochen. Damit sie nicht anbrennen, rührt man sie mit einem Holze fleißig um, bis sie alle zerplatzt sind, und von den Steinen los gehen. Man reibet die also zubereiteten Kirschen durch einen Durchschlag, daß die Steine zurück bleiben, und kocht den Saft, unter stetem Umrühren, ohne zugethanes Wasser. Zucker wird nur nach Proportion so viel hinzu gethan, als man den Saft mehr oder weniger süß haben will. Man lässet den Saft so lange kochen, bis er zu einem dicken Brey wird, und wenn er erkaltet ist, steif steht und sich schneiden lässet. Darauf füllet man ihn in einen steinernen Topf, und verwahrt ihn an einem trocknen Orte, so hält er sich einige Jahre. Sollte er sich verdünnen, so muß er wieder umgekochet werden. Sollte er aber schimmelig werden wollen, so setzt man den Topf ein wenig in einen Backofen, nachdem das Brod heraus genommen worden ist, so wird er wieder gut.

Will man Kirsch-Saft mit zerstoßenen Kirsch-Kernen ohne Zucker haben, so verfährt man folgender Maßen. Die Kirschen werden, nach voriger Vorschrift in einem Kessel gekocht, und der Saft wird durch einen Durchschlag getrieben. Die zurück gebliebenen Steine werden klein gestoßen, in einem besondern Gefäße, mit ein wenig angegossenem Kirsch-Safte, ein Par Mahl aufgekocht, sodann durch ein leinenes Tuch gezwungen und durchgekläret, hierauf mit dem übrigen Kirsch-Safte zusammen gethan, und dick eingekocht. Dieser eingekochte Saft, (dessen Probe ist, daß er nach dem Erkalten gestehe, und sich schneiden lasse,) wird in steinernen Töpfen aufbehalten.

Man

Noch besser verfährt man, wenn man die Kirschen ein wenig drückt und mit den Händen zerknirscht, und darauf dasjenige, was nicht durch das Sieb laufen will, durch einen Beutel von fester Leinwand presset. Die Häute der Kirschen, und was übrig bleibt, werden in einem Mörser zerstoßen, und sodann auch durchgedrückt. Zu 1 ℔ Kirschen wird ½ ℔ Zucker gethan, und die Masse wird bis zu ihrer völligen Dicke eingesotten.

Hierauf macht man längliche Walzen, oder Nudeln davon, legt sie auf Schieferſteine, und trocknet sie in einer warmen Stube. Will man den Geschmack verändern, so kann man Himbeer-Saft zu dem Kirsch-Safte hinzu thun, wodurch man einen so genannten parfumirten Geschmack hervor bringen kann. Es passen aber die Säfte von sauren Kirschen und von Himbeeren weit besser, als von Johannisbeeren, welche letztern unter dem Kirsch-Safte keine so angenehme Wirkung thun. Nur bey süßen Kirschen kann man Johannisbeer-Saft untermengen. Denn da die süßen Kirschen an und vor sich matt sind, so wird der Geschmack durch den zugesetzten Johannisbeer-Saft reitzender. Die Kerne werden zu den Pasten nicht mit genommen, wie bey einigen Kirsch-Säften geschieht. Da die Steine aus den Kirschen zuvor heraus gezogen werden, ehe das Fleisch gepresset wird, hat man den rechten Handgriff davon sich zu merken, welcher dieser ist: Die Kirschen werden mit den Spitzen zweyer Finger gedrückt, mit der andern Hand aber fasset man den Stängel an, und zieht ihn nach sich, wodurch sich die Steine, ohne Zerquetschung des Fleisches leicht heraus ziehen lassen.

Um **Kirsch-Wein** zu bereiten, werden recht reife saure Kirschen von ihren Stielen entlediget, die heraus genommenen Steine aber in einem Mörser für sich allein zerstoßen; worauf Kirschen und Steine nebst etwas Nelken und Zimmet in ein reines Säckchen gethan, und durch das Spund-Loch in ein Faß gehänget werden. Das Faß wird hierauf mit Wein gefüllet.

Auf

Mahl durch ein Haartuch laufen; thut sodann ungefähr zu 1 Quart Saft, 1 Pfund fein gestoßenen weißen Zucker, rührt ihn so lange, bis er völlig zergangen ist, und füllet den Saft in recht reine und ausgetrocknete Bouteillen. Man thut in jede ein Par Nelken, und ein Stückchen Zimmet, pfropfet sie recht zu, verpicht sie, und setzt sie in den Keller in Sand.

Oder, man nimmt auf 1 Quart ausgepreßten Kirsch-Saft, 1¾ Pf. Zucker; Zimmet und Cardamomen, von jedem ½ Loth; Nelken, ⅛ Loth, und bittere Mandeln, 2 Loth. Die Mandeln werden mit dem Kirsch-Safte gut zerstoßen, durch ein wollenes Tuch gedrückt; sodann in diesem der Zucker aufgelöset, der Zimmet, die Cardamomen und Nelken hinzu geschüttet, und alles gelinde ein Mahl aufgekocht, hernach durch ein wollenes Tuch gegossen, und wenn es erkaltet ist, in reine trockne Bouteillen gefüllt, gut verstopft, und im Keller aufgehoben. Von diesem Extracte, welches sich Jahre lang hält, kann man nach Belieben zu aller Zeit mehr oder weniger unter Franz-Wein mischen, wenn man Kirsch-Wein haben will.

Da die Kirschen unter allen Obst-Früchten im eingemachten Zustande fast durchgängig gar sehr beliebt sind, so stehen auch die davon bereiteten Pasten gleichfalls in vorzüglichem Werthe. Man nennt aber Pasten allerley Säfte von Früchten, welche in der Absicht so stark eingesotten werden, daß man Küchlein daraus formiren, oder allerley Figuren darein drücken könne. Um **Kirsch-Pasten** zu verfertigen, drückt man die reifen Kirschen durch ein Haarsieb oder Haartuch, und zerstößt die Häute in einem Mörser. Dieses Zerstoßene lässet man wieder durch ein Tuch oder Haarsieb gehen, setzt es zum Feuer, lässet es bis zur Hälfte einsieden, und thut ½ Pf. Zucker zu jedem Pfunde dieses Saftes, worauf er so lange gesotten wird, bis er gleichsam zu einem dicken Teige geworden ist.

Noch

Tuch, und löset kalt 6 bis 8 Pf. weißen Mittel-Zucker in derselben auf. Wenn er aufgelöset ist, thut man 1 Loth Zimmet, eben so viel Cardamomen, und ½ Loth Nelken hinzu, und lässet es zusammen in einem wohl bedeckten Gefäße ein Mahl mit einander aufkochen, hernach erkalten, und schüttet es so zum Weine. Alsdann schüttelt man die ganze Mischung einige Mahl gut unter einander, lässet sie noch 12 Stunden ruhig im Keller zusammen stehen, und presset dann in leinenen Beuteln alles gut aus. Hierauf gießt man den Wein so oft durch reine wollene Tücher, bis er ganz klar ist; füllet ihn dann sogleich auf reine trockne Bouteillen, pfropft sie fest zu, und legt sie im Keller auf die Seite. Wofern dieser Wein nach einiger Zeit wieder trübe werden sollte, kann er durch Filtriren wieder klar gemacht werden, so wird er, auf neue trockne Bouteillen gefüllt, wieder lange Zeit dauern.

Diese Methode hat vor der gewöhnlichen, wo der Wein viele Wochen über den Kirschen und dem Zucker stehen, und zusammen gähren muß, den Vortheil einer geschwindern Bereitung, einer längern Dauer, und daß er mehr den angenehmen Kirschsaft-Geschmack behält, als jener, bey welchem er schon zerstört ist. Nur ist dieß sehr wohl zu bemerken, daß die Kirschen, alle Gefäße, Beutel und Tücher recht trocknen, die Bouteillen ganz voll seyn, und daß die Pfropfen aufs beste schließen müssen. Fremde Nässe befördert das leichtere Verderben, so wie der Zutritt der Luft den Wein leicht in Gährung bringt, welche hier verhindert werden muß.

Kirsch-Wein, zu welchem keine zerstoßene Kirsch-Steine genommen sind, hat einen weniger angenehmen und weniger kräftigen Geschmack. Man kommt aber diesem kräftigen Geschmacke sehr nahe, wenn im Frühlinge junge Schößlinge von den sauern Kirschbäumen, etwa eine Handvoll, genommen, und ein Par Maß rother Wein darüber gegossen werden. Man wirft in diesen Aufguß etwas Zucker, und lässet es 12 Stunden

Auf eine andere Art verfährt man also: Man hebt ein Par Kannen aus dem Fasse, hängt hernach das Säckchen leer darein, und schüttet die Kirschen mit dem Gewürze sacht hinein, bindet es alsdann oben zu, füllet darauf das Faß mit Wein wieder voll, und lässet es eine Weile darin hängen. Nach dieser Verfahrungs-Art kann man die Kirschen, wenn das Spund-Loch sehr klein ist, am bequemsten hinein bringen.

Wenn bey Verfertigung dieses Kirsch-Weines die Steine von dem Fleische nicht getrennet werden, so sprützt der Saft zu sehr umher, und es geht davon zu viel verloren.

Den Zimmet muß man niemahls weglassen. Dieses Gewürz macht es hauptsächlich, daß der Kirsch-Wein dauert.

Schlechter Wein taugt nicht zum Kirsch-Weine; er muß gut und stark seyn. Auch muß man nicht allzu große Gefäße zum Kirsch-Wein nehmen, indem er nicht allzu lange Dauer hat, besonders wenn nur geringe schwache Weine dazu genommen worden sind.

Wenn von Anfange der Bereitung des Kirsch-Weines Zucker dazu genommen worden ist, hat der Wein desto weniger Dauer. Will man daher diesen Wein süß haben, so thut man am besten, daß der Zucker erst in die Portion des abgezapften Kirsch-Weines, welche an demselben Tage getrunken werden soll, hinein gethan werde. Man kann auch fein gestoßenen Zucker neben dem Weine aufsetzen, und davon, nach Belieben, den in die Gläser eingeschenkten Wein versüßen.

Ein auf folgende Art bereiteter Kirsch-Wein hält sich über ein Jahr lang gut. Man nimmt auf einen Anker Franz-Wein 20 berl. Maß, oder, welches einerley ist, zwey Drittel so viel, ohne Stiele, mit den Steinen zerquetschte oder zerstoßene saure Kirschen, schüttet beydes zusammen in ein Faß, aus dem man es bequem wieder heraus schöpfen kann. Nachdem dieses 24 Stunden zusammen gestanden hat, zerstößt man 2 Pfund bittere Mandeln mit 2 bis 3 Maß Kirsch-Wasser, drückt diese Mandel-Milch durch ein wollenes

Tuch, und löset kalt 6 bis 8 Pf. weißen Mittel-Zucker in derselben auf. Wenn er aufgelöset ist, thut man 1 Loth Zimmet, eben so viel Cardamomen, und ½ Loth Nelken hinzu, und lässet es zusammen in einem wohl bedeckten Gefäße ein Mahl mit einander aufkochen, hernach erkalten, und schüttet es so zum Weine. Alsdann schüttelt man die ganze Mischung einige Mahl gut unter einander, lässet sie noch 12 Stunden ruhig im Keller zusammen stehen, und presset dann in leinenen Beuteln alles gut aus. Hierauf gießt man den Wein so oft durch reine wollene Tücher, bis er ganz klar ist; füllet ihn dann sogleich auf reine trockne Bouteillen, pfropft sie fest zu, und legt sie im Keller auf die Seite. Wofern dieser Wein nach einiger Zeit wieder trübe werden sollte, kann er durch Filtriren wieder klar gemacht werden, so wird er, auf neue trockne Bouteillen gefüllt, wieder lange Zeit dauern.

Diese Methode hat vor der gewöhnlichen, wo der Wein viele Wochen über den Kirschen und dem Zucker stehen, und zusammen gähren muß, den Vortheil einer geschwindern Bereitung, einer längern Dauer, und daß er mehr den angenehmen Kirschsaft-Geschmack behält, als jener, bey welchem er schon zerstört ist. Nur ist dieß sehr wohl zu bemerken, daß die Kirschen, alle Gefäße, Beutel und Tücher recht trocknen, die Bouteillen ganz voll seyn, und daß die Pfropfen aufs beste schließen müssen. Fremde Nässe befördert das leichtere Verderben, so wie der Zutritt der Luft den Wein leicht in Gährung bringt, welche hier verhindert werden muß.

Kirsch-Wein, zu welchem keine zerstoßene Kirsch-Steine genommen sind, hat einen weniger angenehmen und weniger kräftigen Geschmack. Man kommt aber diesem kräftigen Geschmacke sehr nahe, wenn im Frühlinge junge Schößlinge von den sauern Kirschbäumen, etwa eine Handvoll, genommen, und ein Par Maß rother Wein darüber gegossen werden. Man wirft in diesen Aufguß etwas Zucker, und lässet es 12 Stunden

also stehen. Der Wein bekommt hiervon sowohl einen angenehmen Geschmack, als auch eine diuretische (urintreibende) Kraft. Man kann diese junge Schößlinge, so lange sie noch grün und weich, und noch nicht holzig sind, im Frühlinge sammeln und auftrocknen, hierauf aber sie zu aller Zeit fein zerschneiden, und den vorgedachten Wein-Aufguß nach Belieben machen.

Man kann auch, bereits erwähnter Maßen, von dem oben beschriebenen Kirsch-Extracte mit Weine eine Vermischung machen. Dieser Kirsch-Wein wird noch kräftiger, wenn man den so eben beschriebenen Wein-Aufguß mit dazu nimmt.

In Rußland, wird ein **Kirsch-Meth** bereitet, wie Himbeeren-Meth; s. Th. XXIII, S. 543.

Um **Kirsch-Branntwein**, oder **Kirsch-Ratafia**, zu machen, stößt man schwarze saure Kirschen mit den Kernen, thut sie in ein Glas, gießt Franz-Branntwein überher, und lässet es einige Tage stehen, rüttelt es aber fleißig um. Wenn der Branntwein alle Kraft aus den Kirschen gezogen hat, wird er abgegossen, und die Kirschen werden ausgedrückt. Alsdann gießt man den Branntwein über frisch gestoßene Kirschen, und verfährt wie vorher. Endlich nimmt man frisch abgepflückte Kirschen, schneidet die Stiele kurz ab, thut sie in eine Bouteille, gießt jenen Branntwein darüber, schüttet nach Belieben geläuterten Zucker hinzu, und verwahrt es zum Gebrauch.

Auf eine kürzere Art, thut man die gestoßenen Kirschen in einen steinernen Topf, mit Zucker und ein wenig Zimmet, gießt Franz-Branntwein darüber, lässet es 8 Tage an einem kühlen Orte stehen, reibt alsdann alles durch ein Haartuch, und verwahrt das Durchgelaufene in wohl verstopften Bouteillen.

Eine ganz andere Art Kirsch-Branntwein erhält man, wenn Branntwein über die Kirschen abgezogen wird. Das in der Schweitz gewöhnliche Verfahren,

Mittel-Mann auf dem Lande aber pflegt wohl, zum eigenen Tisch-Gebrauche, unter solches Mus, beym Dickkochen desselben, Zimmet, Nelken, Zucker (oder Honig) ꝛc. zu thun. Oder, es wird auch erst bey jedesmahligem Tisch- oder Speise-Gebrauche nach Belieben gewürzet. Wenn das Kirsch-Mus steif genug gekocht ist, kann es, zur Dauer, in Gläsern oder Gefäßen von Stein-Gut aufbewahret werden. Es wird aber, mit Zucker versüßt, wie das Pflaum-Mus, auf Brod oder Semmel gestrichen, und gegessen; oder zu Tunken, Soßen an Speisen, und zur Füllung der Torten und mancherley andern Gebackenen, angewendet.

Der in den Apotheken befindliche saure Kirsch-Syrupp, Syrupus ceraforum acidorum, unterscheidet sich von dem Muse (Rob) bloß durch seine mehrere Flüssigkeit, und hat übrigens dieselbe Annehmlichkeit und Kräfte.

Zu einem Kirsch-Kuchen, werden ¼ Pf. geschmolzene, dann abgeklärte, hierauf aber so lange gerührte Butter, bis sie kalt und wie ein Brey geworden ist, ferner ½ Pf. klein geriebene süße Mandeln, 2 bis 3 in Milch geweichte Milchbrode, Zucker nach Gutdünken, ein wenig Salz, Zimmet, Muskatenblüthe, und 16 vorher wohl geschlagene Eyer, durch einander gerührt, und dann nach Gutdünken so viel Kirschen, als dazu nöthig seyn können, von den Stängeln befreyet. Wenn die Kirschen hinzu gethan sind, hört das Umrühren auf, damit sie nicht vermusen. Der Kuchen kann in einer eingeschmierten Form, oder in einem blechernen Ringe, oder in einer Torten-Pfanne gebacken werden. Bey dem Herausnehmen aus der Form oder der Pfanne, muß man ihn mit einem dünnen Messer, wo man hinkommen kann, so viel möglich lösen, damit er desto besser heraus gehe.

Milch- oder Semmel-Brode wählt man zu diesem und vielen andern Gebrauche, weil man die Krume wohl zu-

sam-

sind; nachdem man die Stiele davon abgerissen hat, thut man die Stiele in einen Mörser, und stößt sie mit den Steinen zugleich recht durch. Nachher gießt man den Aquavit darauf, läßet es 24 Stunden stehen, rüttelt es alle 3 Stunden um, und thut es in einen Helm, um 1 Maß Spiritus daraus zu ziehen. Ferner thut man etwas Syrupp von feinem und geläuterten Zucker hinzu, damit der Marasquin desto durchsichtiger werde.

Von frischen sauern Kirschen, wird ein Wasser zum Getränke ausgepresset. Man verfährt dabey, wie mit den Johannisbeeren; s. Th. XXX, S. 590.

Von dem destillierten Kirsch-Wasser, s. oben, S. 35, f.

In den Apotheken hat man das Kirsch-Mus, Rob cerasorum nigrorum, welches der mit Zucker zur gehörigen Dicke gekochte Kirsch-Saft ist, und welches man sowohl des angenehmen Geschmackes, als auch der oben angeführten Kräfte wegen, gemeiniglich Mixturen, die aus Mittel-Salzen bestehen, zusetzt. Zu beyden Absichten ist dasselbe mit Ptisanen zu verbinden.

In der Haushaltung werden die frischen Kirschen als Mus zur Speise gekocht. Man nimmt gute reife, saure Kirschen, befreyet sie von ihren Stielen, bringt sie in dem Kessel über das Feuer, und rührt sie, um ihr Anbrennen zu verhüten, besonders auf dem Boden des Kessels mit einer langen hölzernen Kelle um. Wenn sie durch und entzwey gekocht sind, werden sie durch einen Durchschlag oder durch ein Draht-Sieb über ein Gefäß durchgedrückt oder durchgerieben, damit Saft und Fleisch durchgehe, die Steine aber zurück bleiben. Das solcher Gestalt Durchgetriebene muß nun unter stetem Umrühren in dem Kessel wieder aufkochen, bis es die Steife eines Dauer-Muses erlangt hat. Die Landleute, welche das Kirsch-Mus zum Verkauf in die Stadt bringen, pflegen es nicht zu würzen. Der

darunter, bäckt ihn im Ofen, oder in der Pfanne, ſtreuet Zucker darauf, und gibt ihn zu Tiſche.

Man macht auch Kirſch-Kuchen von gebackenen (gedörreten) Kirſchen, wovon ich weiter unten ſprechen werde.

Zu einer **Kirſch-Torte**, nimmt man 2½ Pf. Kirſchen, welche von den Steinen entledigt ſind, 3 geſtoßene Zwiebacke, ¾ Pf. Zucker, 1 Loth geſtoßenen Zimmet, vermengt es, thut es in den Teig, und ein Stückchen Butter oben darauf, und bäckt es.

Eine andere Art. Wenn man den Teig angefertigt hat, ſtreuet man auf den Boden Zucker, legt eine Schicht Kirſchen darauf, dann wieder eine Lage Zucker, und eine Lage Kirſchen, bis es voll iſt, und bäckt die Torte in dem Ofen.

Oder: Man läſſet die Kirſchen, nach abgeſonderten Steinen, mit einem guten Theile Zucker, in einer Caſſerole oder Pfanne ein wenig kochen, daß der Saft heraus gehe. Die Kirſchen werden ſodann mit einem Schaum-Löffel heraus genommen, die Suppe oder der Saft aber mit ein wenig geſtoßenem Zwieback, geſtoßenem Zimmet, und klein gehackter Citronſchale, etwas kurz und dick eingekocht, alsdann die Kirſchen wieder dazu gethan, und hingeſetzt, daß ſie abkühlen, und hernach in einem feinen Teige zu einer Torte verfertigt.

Zu Torten nimmt man die gemeinen ſchwarzen ſauern Kirſchen, welche aber recht reif, groß und fleiſchreich ſeyn müſſen. Man ißt die Kirſch-Torten ſowohl warm, als auch kalt. Eine kalte, findet die meiſten Liebhaber.

Eine **Torte von eingemachten Kirſchen**, wird, wie die von Johannisbeeren, (ſ. Th. XXX, S. 589. f.) bereitet.

Zu einer Kirſchmus-Torte, thut man Kirſchmus in eine Schüſſel, gießt etwas Wein daran, würzt es mit Zucker, Nelken und Citronſchale, rührt dieſes un-

unter einander, füllt es in einen mürben oder Blätter-Teig, macht die Torte fertig, und verfährt damit, wie gewöhnlich.

Zu einer **Kirsch-Suppe** werden recht reife, saure Kirschen genommen, mit Wasser und klein gestoßenem Zimmet gekocht, und über geröstetes Brod, oder auch Semmel, in die Schüssel gegossen.

In Gegenden, wo die Kirschen selten sind, ist dieses eine Gast-Suppe. Einige thun auch noch Zucker darein. Am tauglichsten zu einer solchen Suppe ist die brüsselsche Brayn, weil sie gut quillt. An heißen Sommer-Tagen ißt man sie lieber kalt als warm.

Auch **von trocknen oder gebackenen Kirschen** wird Suppe bereitet. Man theilt die Kirschen in zwey Theile, davon der eine trocken, mit den Steinen klein gestoßen, und mit etwas braunem Mehle vermengt, zu dem andern Theile der in Wasser kochenden Kirschen gethan wird. Dieses aber geschieht so, daß die zerstoßenen Kirschen in einen Durchschlag geschüttet, kochendes Wasser darauf gegossen, abgeseihet, und die Steine zurück gelassen werden müssen. Sodann muß man noch etwas Wein, fein geschnittene Citron-Schale, Zucker, Zimmet und Cardamomen, daran thun, die Suppe über geröstetes Brod oder geröstete Semmelscheiben gießen, und von der Suppe durchziehen lassen, ehe sie zu Tische gebracht wird. Diese Gast-Suppe kann ebenfalls kalt gegessen werden, und wird mit klein gestoßenem Zimmet überstreuet.

In einigen Häusern verfährt man mit den frischen Kirschen eben so, daß man sie alle mit einander zerstößt, und wie die trocknen Kirschen kocht. Diese Verfahrungsart aber will nicht allen gefallen, und wird nur Köchen oder Köchinnen überlassen. Denn da die sauern Kirschen schon zur Aernde-Zeit reif sind, so ist jene Art alsdann zu mühsam.

Wo sehr viel saure Kirschen wachsen, pflegt man solche, wie sie vom Baume kommen, zu kochen, und

darunter, bäckt ihn im Ofen, oder in der Pfanne, ſtreuet Zucker darauf, und gibt ihn zu Tiſche.

Man macht auch Kirſch-Kuchen von gebackenen (gedörreten) Kirſchen, wovon ich weiter unten ſprechen werde.

Zu einer **Kirſch-Torte**, nimmt man 2½ Pf. Kirſchen, welche von den Steinen entledigt ſind, 3 geſtoßene Zwiebacke, ¾ Pf. Zucker, 1 Loth geſtoßenen Zimmet, vermengt es, thut es in den Teig, und ein Stückchen Butter oben darauf, und bäckt es.

Eine andere Art. Wenn man den Teig angefertigt hat, ſtreuet man auf den Boden Zucker, legt eine Schicht Kirſchen darauf, dann wieder eine Lage Zucker, und eine Lage Kirſchen, bis es voll iſt, und bäckt die Torte in dem Ofen.

Oder: Man läſſet die Kirſchen, nach abgeſonderten Steinen, mit einem guten Theile Zucker, in einer

kalt geworden iſt, mit dem Meſſer ganz aufheben laſſen, oder breit von dem Schaum-Löffel abfallen. Sodann hebt man ſie vom Feuer, und thut ſie, wenn ſie etwas erkaltet iſt, in Gefäße. Zuletzt fährt man mit weißem Papiere daruber hin, damit der durch das Eingießen entſtandene kleine Schaum wegkomme, und deckt ſie zu, aber nicht eher, als bis ſie ganz kalt iſt.

Um 1 Kanne Kirſch-Eis, Kirſch-Gefrornes, oder Kirſch-Glace, zu machen, werden 1½ Pf. Kirſchen ohne Stiele und Steine in einer irdenen Schüſſel zerquetſcht, 1½ Kannen Waſſer dazu gegoſſen, und die Kirſchen recht wohl darunter vermiſcht. Hernach treibt man ſie durch ein Sieb, und thut ½ Pf. Zucker hinein. Sobald der Zucker zerſchmolzen iſt, bringt man ſie, nach der im XVI Th. S. 616, ertheilten Anweiſung, in eine Eis-Büchſe, daß der Syrupp auf dem Eiſe gerinne.

Kirſch-Marzipan. Man ſtößt 1 Pf. abgebrühete ſüße Mandeln, und thut ½ Pf. reife Kirſchen dazu, welche vorher zerquetſcht und durch ein Sieb getrieben ſind. Die Kirſchen werden noch ein Mahl mit den Mandeln geſtoßen, damit ſie ſich völlig mit einander vermengen. Ferner läſſet man 1 Pf. Zucker nach großer Feder-Art ſieden, ſchüttet ihn unter die Mandeln und Kirſchen, und ſetzt alles zuſammen auf ein gelindes Feuer, bis der Teig ſo trocken wird, daß er nicht mehr am Gefäße anklebt. Hernach nimmt man ihn heraus auf einen Bogen Papier, und läſſet ihn kalt werden; thut ihn ſodann noch ein Mahl, nebſt dem Weißen von 3 friſchen Eyern, in einen Mörſer, ſtößt ihn eine gute Viertelſtunde, und ſchüttet, unter dieſer Arbeit, noch etwas fein geſtoßenen Zucker dazu. Alsdann ſchneidet man den Marzipan in der Größe und Geſtalt, wie man ihn haben will, und läſſet ihn in einem mäßig geheitzten Ofen backen.

Endlich trocknen, pflegt man auch Kirſchen zu dörren, oder zu backen, welches entweder an **Sonne, oder** in Backöfen geſchieht. Bey dem **cken müſſen** die Kirſchen mit ihren Stielen in den **gebracht wer**den, weil die unverſchloſſene Oeffnung **Stieles** vielen Saft vergeblich würde weglau **laſſen.**

Von den friſchen ſauern Kirſchen, gilt die M gemeiniglich 4 Ggr. Wenn man ſie an der So trocknet, werden aus 3 Metzen abgeſtielter Kirſ nur 2 Metzen; jede derſelben aber wird gern mit Gr. bezahlt; folglich hat man bey den getrockne auf jede Metze 6 Gr. Profit.

Die gebackenen Kirſchen, werden, wie die geba nen Pflaumen, gekocht, und zum Braten gege Um des beſſern Geſchmackes willen, kocht man ſie fein geſchnittener oder gehackter Citronſchale, und üb ſtreuet ſie, bey dem Anrichten, mit Zucker. Zuwe beſtreuet man ſie auch dünn mit länglichen ſehr fein ſchnittenen Streifchen von friſcher Citronſchale.

Von gedörrten Kirſchen macht man auch Kuc und Suppe. Von letzterer, ſ. oben, S. 137. **Kirſch-Kuchen** zu machen, ſiedet man die gedörr Kirſchen in Zucker und Wein; nimmt etwas Me macht es mit Sahne, Eyern, Zucker und Zimmet rührt es wohl, thut die Kirſchen darein, und bäckt entweder in Schmalze, oder gießt es in eine For und bäckt es im Ofen. Nach dem Backen ſtreuet m Zucker darauf.

Mit der **Rinde des Waldkirſch-Baumes** hat **Siefert** verſchiedene Verſuche zum Färben angeſte um zu erfahren, in wie weit ſolche zum Färben nützl gebrauchet werden könne. Es ſind folgende die v nehmſten.

1. Die von diesem Baume abgezogene Rinde nimmt auf der innern Seite, die am Holze liegt, bald darauf eine gelbe Farbe an, bey dem völligen Abtrocknen aber eine ziemlich braune. Das bloße kalte Wasser an die Rinde gegossen, gab ohne weitere Wärme eine sehr bitter schmeckende, nicht ganz helle, röthlichgelbe Brühe. Eine Vermischung derselben mit Laugen-Salzen verwandelte sie in eine dunkel blutrothe durchsichtige Farbe. Die sauern Körper hingegen machen sie blasser und trüber. Denn die mit den gummösen nicht genau vereinigten, und besonders hier trübe machenden harzigen Theile werden von den Laugen-Salzen genau aufgelöset, und das Mengsel wird ganz durchsichtig, von den sauern Körpern aber nie. Diese Brühe färbte ohne Zusatz sehr schwach, sie gährte schon nach 24 Stunden, und ward trübe. Ein gelbes Pulver zeigte sich alsbald auf dem Boden, und oben eine gelbe erdige Haut, neben dem verlornen bittern Geschmacke und vorigen Geruche, daher sie also auch noch schwächer färbte. Die im May von eben diesem Baume gesammelte Wurzel schien besser zu färben, weil sie nicht nur äusserlich, sondern auch, bey dem Abtrocknen, auf der innern Seite am Holze dunkelbraun aussahe. Die von der abgespühlten, getrockneten, klein geschnittenen, in kaltem Wasser eingeweichten, und mit kochendem Wasser aus der Wurzel ausgezogene Brühe gährte nicht so bald, wie jene vom Stamme mit kaltem Wasser. Zwey Pfund Rinde gaben eine braunrothe, durchsichtige, bittere, anziehende Brühe von 6 ℔.

2. Ein Theil Sode-Lauge machte 8 Theile Brühe dunkler, als sie vorher war; doch das Papier wurde davon nur sehr blaßgelb gefärbt. Der 2 Stunden lang darin eingeweichte wollene Zeug ward dunkelgelb, oder vielmehr etwas bräunlich, und trocken schmutzig gelb, wobey das Wasser noch viel weggenommen hatte, und der Zeug schwach und schlecht gefärbt zurück blieb.

3. Ein Theil kaustische Arsenik-Lauge färbte schon 8 Theile Brühe besser braun, ohne allen Niederschlag, auch das Papier und den Zeug viel stärker, und besser bräunlich gelb, wenn er gleich trocken schwach schien.

Nach

Endlich pflegt man auch Kirſchen zu dörren, zu trocknen, oder zu backen, welches entweder an der Sonne, oder in Backöfen geſchieht. Bey dem Backen müſſen die Kirſchen mit ihren Stielen in den Ofen gebracht werden, weil die unverſchloſſene Oeffnung des Stieles vielen Saft vergeblich würde weglaufen laſſen.

Von den friſchen ſauern Kirſchen, gilt die Metze gemeiniglich 4 Ggr. Wenn man ſie an der Sonne trocknet, werden aus 3 Metzen abgeſtielter Kirſchen nur 2 Metzen; jede derſelben aber wird gern mit 12 Gr. bezahlt; folglich hat man bey den getrockneten, auf jede Metze 6 Gr. Profit.

Die gebackenen Kirſchen, werden, wie die gebackenen Pflaumen, gekocht, und zum Braten gegeſſen. Um des beſſern Geſchmackes willen, kocht man ſie mit fein geſchnittener oder gehackter Citronſchale, und über-

1. Die von diesem Baume abgezogene Rinde nimmt auf der innern Seite, die am Holze liegt, bald darauf eine gelbe Farbe an, bey dem völligen Abtrocknen aber eine ziemlich braune. Das bloße kalte Wasser an die Rinde gegossen, gab ohne weitere Wärme eine sehr bitter schmeckende, nicht ganz helle, röthlichgelbe Brühe. Eine Vermischung derselben mit Laugen-Salzen verwandelte sie in eine dunkel blutrothe durchsichtige Farbe. Die sauern Körper hingegen machen sie blasser und trüber. Denn die mit den gummösen nicht genau vereinigten, und besonders hier trübe machenden harzigen Theile werden von den Laugen-Salzen genau aufgelöset, und das Mengsel wird ganz durchsichtig, von den sauern Körpern aber nie. Diese Brühe färbte ohne Zusatz sehr schwach, sie gährte schon nach 24 Stunden, und ward trübe. Ein gelbes Pulver zeigte sich alsbald auf dem Boden, und oben eine gelbe erdige Haut, neben dem verlornen bittern Geschmacke und vorigen Geruche, daher sie also auch noch schwächer färbte. Die im May von eben diesem Baume gesammelte Wurzel schien besser zu färben, weil sie nicht nur äusserlich, sondern auch, bey dem Abtrocknen, auf der innern Seite am Holze dunkelbraun aussahe. Die von der abgespühlten, getrockneten, klein geschnittenen, in kaltem Wasser eingeweichten, und mit kochendem Wasser aus der Wurzel ausgezogene Brühe gährte nicht so bald, wie jene vom Stamme mit kaltem Wasser. Zwey Pfund Rinde gaben eine braunrothe, durchsichtige, bittere, anziehende Brühe von 6 ℔.

2. Ein Theil Sode-Lauge machte 8 Theile Brühe dunkler, als sie vorher war; doch das Papier wurde davon nur sehr blaßgelb gefärbt. Der 2 Stunden lang darin eingeweichte wollene Zeug ward dunkelgelb, oder vielmehr etwas bräunlich, und trocken schmutzig gelb, wobey das Wasser noch viel weggenommen hatte, und der Zeug schwach und schlecht gefärbt zurück blieb.

3. Ein Theil kaustische Arsenik-Lauge färbte schon 8 Theile Brühe besser braun, ohne allen Niederschlag, auch das Papier und den Zeug viel stärker, und besser bräunlich gelb, wenn er gleich trocken schwach schien.

Nach

Nach dem zweymahligen Durchziehen wurde der Zeug genug gefärbt; er behielt auch die Farbe nach dem Waſchen, doch ohne Glanz. Ein Theil kauſtiſche Arſenik-Lauge färbte 4 Theile Brühe nicht ſtärker, als das erſte und zweyte Mahl.

4. Ein Theil würfelichter Alaun, mit 4 Th. Brühe gemiſcht, gab ein citrongelbes, etwas trübes Mengſel, welches den wollenen Zeug hell ſchwefelgelb färbte, merken aber etwas ſchwächer, wieder das Waſchen auch noch etwas wegnahm. Mit 5 Th. Brühe zu 1 Th. ätzger Alaun-Lauge, gab nicht viel, und noch weniger die Lauge von gepulvertem Alaun mit dieſer Brühe.

5. Ein Theil weinſteinige Gränſpan-Lauge, und 4 Th. Brühe, gab ein mildes grasgrünes Mengſel, mit einem niederfallenden grünlichen Pulver, welche den Zeug eben ſo färbte, aber wacker, anfangs gelblich grün, und auch ſchöner.

6. Ein Theil Lauge von gemeinem Vitriol, mit 5 Th. Brühe, gab ein dunkel ſchwarzbraunes Mengſel, wel-

blieb auch nach dem Waschen sehr dauerhaft und glänzend.

11. Ein Theil Lauge von Arsenik-Vitriol, und 8 Th. Brühe, gab ein schwefelgelbes halb trübes Mengsel ohne Niederschlag, welches den Zeug sehr schwach gelb färbte, auch nach zweymahligem Eintauchen, wobey das Waschen auch etwas wegnahm.

12. Vier Theile Brühe, zu 1 Th. weißen Vitriol, färbte den Zeug stark genug dunkel mäusefahl, wovon das Wasser etwas gefärbet wurde.

13. Ein Theil weinsteinige Ocher-Lauge, zu 4 Th. Brühe, färbte den Zeug stark gelblich braun, wovon das Waschen etwas weggenommen hatte, und der Zeug nicht unangenehm lederfarbig wurde.

14. Das Mengsel No. 5 und 6, mit einander vermischt, färbte den wollenen Zeug grünlich schwarz, wovon das Waschen dem Zeuge nicht viel genommen hatte, indem er nachher besser aussahe, als No. 6.

15. Das Mengsel No. 7, mit so viel kaustischer Lauge gemischt, daß es dunkel blutroth wurde, färbte den Zeug braunroth, nach dem Waschen aber aschgrau röthlich.

16. Weinsteinige Eisen-Lauge mit gemeinem Vitriol zu gleichen Theilen gemischt, und 1 Th. davon zu 4 Th. Brühe, gab ein schwarzes, in das Grüne fallende Mengsel, welches den Zeug anders, als No. 6 und 7, färbte, auch nach dem Waschen sehr dunkelgrau.

17. Gießt man auf die mit siedendem Wasser nach No. 1. ausgezogene Wurzel, zur völligen Bedeckung so viel Pottaschen-Lauge, und lässet es in der warmen Luft stehen, so zieht die Lauge noch viel Färbendes heraus, und wird damit schwarzbraun. Gießt man in das vorige Mengsel No. 16, von dieser Brühe eben so viel, als vorher Eisen-Lauge, hinein, so entsteht ein braunrothes dickliches Mengsel, nebst vielem braunrothen Präcipitate, weil die Pottaschen-Lauge das Eisen von seinen Säuren trennt. Der wollene Zeug wurde davon besonders gefärbt ohne Glanz, und zwar nach dem Waschen grau in das Gelbliche. Wegen des Niederschlages muß man alles sich setzen lassen, und das Helle abgießen, sonst hängt sich der Schlamm an den Zeug, und fleckt denselben.

18. Als das Mengſel No. 8. auf gleiche Art mit der Pottaſchen-Laugen-Brühe gemiſcht wurde, ward es dunkelbraun, und der mit dem Mengſel No. 8 gefärbte Zeug wurde heller zimmetfarben gefärbt, als No. 10; es blieb auch nach der Wäſche die Farbe noch ſtark genug, und auch glänzend.

19. Weinſteinige Eiſen-Lauge, mit gleichen Theilen weinſteiniger Ocher-Lauge gemiſcht, und davon 1 Theil zu 4 Th. Brühe, gibt ein blutrothes Mengſel, welches den Zeug röthlich färbt, und das nach dem Waſchen noch bleibt, nebſt einem beſſern Glanze als No. 7. Man muß aber dieſes Mengſel friſch gebrauchen; denn vom langen Stehen fällt etwas Eiſen nieder, da es denn nicht mehr ſo gut färbt.

20. Die aufgelöſeten Mittel-Salze, vitrioliſirtes Weinſtein-Salz, Salpeter, Koch-Salz und Salmiak, auf verſchiedene Art mit der Brühe von Kirſchbaumwurzel-Rinde gemiſcht, gaben keine merklich beſſere Farben.

21. Die Lauge von der auf der Wurzel-Rinde geſtandenen Brühe fängt endlich an zu gähren, wirft Blaſen, riecht und ſchmeckt anders, und bekommt eine gelbe Haut. Setzt man aber hierauf 1 Loth an der Luft zerfallenen Kalk zu 1 ℔. dieſer Brühe, rührt alles wohl um, und läſſet es alsdann 6 bis 8 Stunden ruhen, ſo wird der Zeug eben wie No. 18 gefärbt, und noch lebhafter.

22. Als dieſe Farben von der Wurzel-Rinde 14 Täge im Sonnenſchein gehangen hatten, zeigte ſich No. 2 kaum merklich anders. No. 3, war mehr bräunlich geworden, und ſahe beſſer aus als vorher. No. 4 und 6, waren auch dunkler geworden; wie auch No. 5, die ſchlechter ausſahe. No. 7, war ſchmutzig, und ſich gar nicht ähnlich. No. 8, war dunkler, und der Zeug ſtärker gefärbt, aber mit beſſerm Anſehen, als vorher. No. 9, war ſehr dunkel, und faſt braun geworden, No. 10 hingegen etwas heller. Bey No 11 zeigte ſich mehr Farbe als zuvor, und ſahe beſſer aus, faſt Chamois. No. 12, war viel dunkler geworden, als No. 13, welches doch noch gut ausſahe. No. 14, blaſſer und ſchlechter als vorher, doch noch beſſer als No. 6. Auſſer dem Glanze hatte No. 15 von ſeiner Farbe we-

nig

nig verloren; es sahe viel besser aus, als No. 7. Bey No. 16 hatte sich das Dunkelgraue in das Schwarze verloren. No. 17, war kaum blasser geworden. No. 18, war weder heller noch dunkler geworden, aber nicht mehr glänzend. No. 19, war kaum merklich blasser geworden. No. 21, hatte an der Farbe und am Glanze etwas verloren, sahe aber besser aus als No. 18 und 20.

Diese Rinde hielt in Ansehung der Farbe, welche der gemeine Vitriol mit ihr machte, gleichsam das Mittel zwischen der Bruchweiden- und der Quittenbaum-Rinde. Denn gleiche Theile Vitriol zu gleich starker Farbe-Brühe von der Kirschbaumwurzel-Rinde, färbte den Zeug mehr schwarz als grünlich; mehr grün aber als schwarz, die Brühe von der Quittenbaum-Rinde. Und so kam die Farbe von der Bruchweiden-Rinde der braunen Farbe näher, als die von der Quittenbaum-Rinde.

Wie Kirschen nach der Natur zu mahlen seyn, lehrt Hr. M. Prange, in seiner Schule der Mahlerey, (Halle, 1782, gr. 8.) S. 97.

* * *

Die Benennung Hecken-Kirsche, führen:

I. Eine Art Garten-Kirschen, welche in Italien wild wachsen, in Deutschland aber in Hecken gezogen werden, und kleine, unschmackhafte, rothe Kirschen tragen, deren allemahl zwey an Einem Stiele beysammen stehen.

II. Zwey von Tournefort unterschiedene Geschlechter, nähmlich: Chamaeceraſus, und Xyloſteum, welche aber billig, wie Hr. v. Haller und Ludwig gethan haben, mit dem dritten, dem Caprifolium, verbunden, oder, nach Linné, alle drey zu der Lonicera gebracht werden können. Der Umstand, daß bey der Hecken-Kirsche allemahl zwey Blumen, und nachher zwey Beeren auf einem gemeinschaftlichen Stiele stehen, gibt zwar nicht ein eigentliches Gattungs-, jedoch ein

ſolches Zeichen ab, woraus man die dahin gehörigen Arten merklich unterſcheiden kann. Der kleine Kelch ſteht auf dem Fruchtkeime, und iſt fünffach eingekerbet. Des Blumenblattes kurze Röhre verbreitet ſich in 5 rückwärts geſchlagene, zuweilen ungleiche Einſchnitte, wovon öfters einer tiefer, als die übrigen, zerſchnitten iſt. Fünf Staubfäden umgeben den Griffel mit einem kopfigen Staubwege. Die Beere iſt mit dem Kelche beſetzt, und zweyfächerig. Die Arten ſind folgende:

1. **Die gemeine oder wollichte Hecken-Kirſche, Ahlbaum, Ahlkirſche, Beinholz, Brechweide, Fiddelrümpchen, Flühkirſche, Fospiepen, Hundsbaum,** (im gem. L. Hundebaum,) **Hundo-Kirſche, Läuſebaum, Purgier-Kirſche, Röhrholz,** falſche Schießbeere, **Sellenholz, Sölenholz, Sprötzern, Stretzern, Teufelskirſche, Teufels-Marterholz, Tobacksröhrchenholz, Vogelbeere,** rothe **Vogelkirſche, Waldrinde, Walpurgismaye, Walpurgisſtrauch, Welpermay, Wolbermei, Wolbertmay, Wolpermay, Wolpertsmay, Zaunkirſche, Zäunling, Zweckholz,** Chamaecerafus dumetorum fructu gemino rubro *C. B. du Ham.* Xyloſteum *Dod.* Caprifolium foliis ovatis, acuminatis, ſubhirſutis, baccis gemellis *Hall.* Lonicera Xyloſteum, pedunculis biflоris, baccis diſtinctis, foliis integerrimis pubescentibus *Linn.* Fr. Chamaecerifier des haies, Engl. Dwarf Cherry, the Fly Honeyſuckle, wächſt in dem kältern Theile von Europa, und in ganz Deutſchland, von ſelbſt häufig in einem kühlen, gemäßigt feuchten und guten Grunde, unter den hohen Klippen und Bergen, in hohen Gebüſchen, auch ſonſt in Schlag-Hölzern, auf den Hügeln, und wird ſonſt auch weit und breit verſchleppt, durch die Frucht, daß ſie in Hecken, an den Landſtraßen, Zäunen, auf alten Mauern, Ruinen, und andern offenen Plätzen, die

dem Pfluge und der Cultur nicht unterworfen sind, nicht selten zu finden ist. Es ist ein sechs- bis achtfuziger dauerhafter, öfters aber nur niedriger Strauch, mit sehr geraden, aufrecht wachsenden langen Schüssen. In Vermischung mit andern Arten, breitet er sich in dauerhaften lebendigen Hecken regelmäßig aus, dabey er mit seinen Wurzeln oder seiner Brut nicht ausläuft, auch keine Lücken macht. Die Wurzel ist holzig, hart, lebhaft und dauerhaft, wird ziemlich alt, und treibt ihre Loden sehr schnell, gerade und hoch. Die äussere Rinde des alten Holzes ist weiß oder weißgrau, und des jungen Holzes roth, dabey etwas haarig. Die Blätter stehen in einzelen Paren einander gegen über, sind 3 Z. lang und 1½ Z. breit, rundlich oder mehr oval, mit einer feinen Spitze auslaufend, völlig ganz, oberwärts hellgrün, unterwärts mehr weißlich grün, an beyden Flächen aber wollicht anzufühlen. Die Blumen sind nicht viel über ½ Z. lang, von schmuzig weißer Farbe; sie erscheinen im May, und auf 1 Z. langen dünnen Stielen stehen allezeit zwey derselben neben einander. Die Früchte sind kleine rothe Beeren, welche den Kirschen etwas ähnlich sind, und im Aug. oder Sept. reif werden, wovon zwey mit ihren untern und gegen einander gekehrten Enden zusammen gewachsen sind, die eine aber etwas kleiner als die andere ist. Jede enthält 3 bis 6 platte zugespitzte Samenkörner. Die Vögel streuen die Beeren in den mit Holzungen bewachsenen Gegenden theils in genugsamer Menge aus, theils besamen alte Stämme ihre Stellen von selbst, so, daß man sie ohne besondere Cultur im erforderlichen Falle ausheben lassen kann. Man kann diese und die folgenden Arten durch Samen, oder auch Ableger vermehren, welche sehr leicht Wurzeln schlagen. Der Strauch verträgt das Beschneiden gern. Weil er im Frühlinge blühet, nimmt er seinen Platz in Lustwäldern ein. Man setzt ihn auch, zu An-

lockung der kleinen Vögel, die den Beeren nachgehen, in die Gehäge. Auch lassen sich daraus gute niedrige Hecken ziehen.

Die auf diesem Strauche besonders abwechselnden Insecten, bestehen in folgenden bey uns bekannten Gattungen. 1. Die Blattwickler-Motte mit dem rothbraunen Kreutzstreife, Phalaena tortrix; Xyloſtella *Linn.* Syſt. Nat. ed. X. p. 531, n. 209; hat ihren Stand auf diesem Strauche in den Vorhölzern und Hecken. 2. Die aschgraue HeckenKirschen-Motte, mit einem weißen zackigen Flecke, Phalaena Tinea; Xyloſtella *Linn.* l. c. p 538, n. 265; auf diesem Strauche um die Hügel. 3. Die weißliche Wald-Motte mit gekrümmten Flügeln, wovon die obern am innern Rande einen schwarzen Punct haben, Phalaena Tinea; Nemorella *Linn.* l. c. p. 536, n. 247; auf allerley vermischten Gesträuche, an den Hecken in Vorhölzern; besonders auch auf diesem Strauche. 4. Die braune Felder- oder Finger-Motte, mit ästigen zwey- und dreytheiligen Flügeln, Phalaena Alucita; didactyla *Linn.* l. c. p 542, n. 301; mit der folgenden Art in Vorhölzern, auf der Hecken-Kirsche, an den Hügeln. 5. Die weiße Feder-Motte, mit fünftheiligen Flügeln, Phalaena Alucita; pentadactyla *Linn.* l. c. p 542, n 304; hält sich in allerley Hecken und Gesträuche um die Vorhölzer, auf den wilden Stachel- und Johannis-Beeren, Hecken-Kirschen ꝛc. auf. 6. Der walzenförmige blaue Blattsauger, Chryſomela tridentata *Linn.* l. c. p. 374, n. 49; hält sich mit den zwey letztern Motten-Arten in gedachtem Gesträuche auf.

Das Holz ist weiß und fest. Aus den Aesten werden Tobacks-Röhren und Schuh-Zwecke gemacht. Auch dienen dieselben zu Lade-Stöcken für die Jägerey. Es ist auch als Brenn-Holz sehr gut, auch wegen der Asche.

Die

Die Blumen werden häufig von den Bienen besuchet.

Die Beeren purgieren, und erregen, häufig genossen, Erbrechen, werden aber in der Arzeney nicht gebraucht.

In Kamtschatka sollen die Beeren schwarz, und fast so groß wie Kirschen, auch süß und wohlschmeckend seyn. Die Einwohner gebrauchen solche, um den Bärenklau zum Branntweinbrennen in Gährung zu bringen. Ueber die Rinde des Strauches ziehen sie auch diesen Branntwein ab, um demselben einen angenehmen Geschmack zu geben.

2. **Die herzförmige oder tatarische Hecken-Kirsche**, Chamaecerasus fructu gemino rubro, foliis glabris cordatis *Bauh. Amman.* Lonicera tartarica, pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis cordatis obtusis *Linn.* Fr. Chamaecerisier de Tartarie, Engl. The tartarian Honeysuckle. Die Blätter dieser in der Tatarey wachsenden Hecken-Kirsche, sind herzförmig, ungezahnt, glatt, neben einander stehend, oben meergrün, auf der untern Fläche heller von Farbe, und mit einem Gewebe von Adern versehen. Die Länge der größten Blätter beträgt an 3 Z., so wie die Breite $1\frac{1}{4}$; gemeiniglich sind sie aber nur $1\frac{1}{2}$ Z. lang, und 1 Z. breit. Ihre Stiele sind kaum $\frac{1}{8}$ Z. lang. Aus dem Blätter-Winkel kommen im Jun. die ungefähr $\frac{1}{2}$ Z. langen Blumen hervor, welche auf 1 Z. langen, dünnen Stielen zu 2 Stück neben einander befindlich sind, und unter sich 2 schmahle, ungezahnte, zugestumpfte, grüne Neben- oder Deck-Blätter haben, die nicht abfallen. Diese Blumen sind fleischfarbig; das obere Blatt hat 3 Einschnitte, das untere aber keine. Nach dem Verblühen bleiben zwey gekrönte Beeren zurück, die im Anfange grün sind, und zur Zeit ihrer Reife im Aug. roth, und von der Größe einer Erbse werden. Die Zweige sind zähe, allezeit

zweyfach getheilt. Die äussere Rinde an den ältern, ist weißlich und glatt.

Der Strauch wird auf 7 bis 8 F. hoch. Er lässet sich durch eingesenkte Zweige leicht vermehren, welche man zuweilen schon in dem zweyten Jahre mit genugsamen Wurzeln ausheben und verpflanzen kann. Man kann sie auch durch Samen fortpflanzen. Durch die Menge der Blumen, und durch die gute Farbe ihrer Blätter, nimmt sich diese Hecken-Kirsche wohl aus; sie treibt einen dicken Busch, und verträgt unsere härtesten Winter. Solcher guten Eigenschaften wegen, ist sie zu festen, niedrigen Hecken zu empfehlen, zumahl da sie das Beschneiden leidet.

Nach Gmelin's Versicherung, destillieren die Russen aus dem Holze der Hecken-Kirschen, ein dichtes, schwarzes, bey kalten Geschwulsten sehr wirksames Oehl zum äusserlichen Gebrauch. In eben diesem Lande bedient man sich desselben auch innerlich, in der Lust-Seuche, im Scorbut, in der Krätze, und in allen Krankheiten, die von unreinem Blute herrühren.

3. **Die schwarze Hecken-Kirsche,** Chamaecerasus alpina, fructu nigro gemino *Bauh.* Lonicera nigra, pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis ellipticis integerrimis *Linn.* Man findet sie in der Schweitz und in Frankreich wild. Ihr Stamm wird selten über 5 F. hoch, und treibt sehr zarte, glatte und purpurrothe Aeste, deren Gelenke von einander entfernt sind. Ihre Blätter stehen oft zu zwey einander gegen über, wenn sie noch jung sind; sie sind zottig, haben einen ganz glatten Rand, und eine Spur von Falten; daher es oft scheint, als wenn sie sägenartig gezahnt wären. Ihre Blatt-Ansätze sind oval-lanzenförmig. Die Blatt-Decken bestehen aus zwey vertrockneten Schuppen, und drey andern in die Quere gestellten Blättchen. Ihre Blumen zeigen sich im May, und haben einen ziemlich breiten Kelch, und eine röheige

Krone.

Krone. Die Beere iſt ſchwarz, wird im Aug. reif, und hat gemeiniglich 5 Samen. Sie liebt, wie die gemeine Art, einen naſſen Boden, und kann entweder aus abgeſchnittenen Zweigen, oder aus dem Samen, gezogen werden; dieſer liegt gemeiniglich ein Jahr lang in der Erde, ehe er aufgeht, und muß im Herbſte geſäet werden. Die Aeſte ſchneidet man im Herbſte ab, und ſetzt ſie ſogleich in eine ſchattige Rabatte; von dieſer im folgenden Herbſte in eine Pflanzſchule; und von dieſer nach 2 Jahren dahin, wo ſie bleiben ſollen.

4. Die **glattblätterige Hecken-Kirſche**, Lonicera pedunculis biſloris, baccis diſtinctis, foliis oblongis glabris *Linn.* wächſt auf den pyrenäiſchen Gebirgen; auch hat man ſie in Canada gefunden. Ihr Stamm wird an 4 F. hoch, und theilt ſich ohne beſtimmte Ordnung in viele aus einander geſperrte Aeſte. Ihre längliche, glatte Blätter ſtehen einander gegenüber. Ihre weiße Blumen zeigen ſich im Apr. auf zarten Stielen. Man kann ſie, wie die vorhergehende, fortpflanzen, und muß ſie eben ſo behandeln.

5. Die **verwachſene rothe Hecken-Kirſche, Alpen-Heckenkirſche**, Chamaecerafus alpina, fructu rubro gemino, duobus punctis notato *C. B. du Ham.* Xyloſteum cerafifolium *Rivin.* Lonicera baccis biſloris concretis, floribus bilabiatis *Royen.* Lonicera pedunculis biſloris, foliis ovatis acutis integris *Sauvag.* Lonicera alpigena, pedunculis biſloris, baccis coadunatis didymis, foliis ovato lanceolatis *Linn.* Fr. Chamaecerifier des Alpes à fruit rouge & jumeau. Engl. the red-berried upright Honeyſuckle. Sie wächſt auf den ſchweitzeriſchen und pyrenäiſchen Gebirgen wild. Die Blätter kommen im Frühlinge ſehr zeitig hervor, und ſind größer als bey den übrigen Arten. In einem guten Boden werden ſie an 5 Z. lang, und 2 Z. breit. Sie ſind oval, an beyden Enden zugeſpitzt, und an dem etwas ausgeſchweiften Rande mit

einzelen, feinen, kurzen Haaren besetzt. Ihre obere Fläche ist mit der untern gleich dunkelgrün; doch besitzt die letztere eine besondere Glätte und einen vorzüglichen Glanz. Auf ihr läuft auch der 5 Z. lange hellgrüne Blattstiel, als eine dicke mit kleineren Seiten-Aesten versehene Ader erhaben hin, und formiret auf der obern Fläche Vertiefungen. Die Blumen werden im May allezeit aus den einander gegen über stehenden Blättern, zu 2 Stück, auf einem gemeinschaftlichen, etwas über 1 Z. langen, grünen Stiele mit zusammen gewachsenen Blumen-Decken angetroffen. Diese Blumen haben 1 Z. Länge, und eine braunrothe Farbe. Die beyden Beeren sind ebenfalls mit einander verbunden, und nur oberwärts abgesondert; sie werden bey ihrer Reife roth, sind mit zwey schwarzen Puncten gezeichnet, und erhalten die Größe einer guten Erbse. Die Anzahl der in ihnen befindlichen Samenkörner würde sich auf 12 Stück belaufen, wenn sie reif würden, es erlangen aber kaum deren drey ihre gehörige Vollkommenheit.

Die Wartung und Vermehrung geschieht, wie bey der ersten Art. In einem guten Boden bleibt sie allezeit eine niedrige Staude, welche nicht über 3 F. hoch wird, und einen dicken holzigen Stamm hat, dessen äussere Rinde sich von allen Zweigen gern losblättert. Wegen dieses niedrigen Wuchses, und weil sie früh Blätter und Blumen treibt, dient sie in Pflanzungen zur Abwechselung.

Die Beeren erregen, zu 8 Gran genommen, Erbrechen, und geben für arme Leute ein wohlfeiles Mittel ab.

6. **Die verwachsene blaue Hecken-Kirsche,** Chamaecerasus montana, fructu singulari coeruleo *C. B. Pin. Ham.* Lonicera coerulea, pedunculis bifloris, baccis coadunato-globosis, stylis indivisis *Linn. Fr.* Chamaecerisier à fruit bleu, Engl. The single blue-

blue - berried upright Honeyſuckle. Sie wächſt in Oeſtreich und in der Schweitz. Die Blätter ſind eyförmig, am Ende zugeſtumpft, und bey dem Ausbrechen auf beyden Flächen und an dem ungezahnten Rande mit feinen Haaren beſetzt, die aber, ſo bald ſie älter und feſter werden, nicht mehr anzutreffen ſind. Sie kommen büſchelweiſe an den Zweigen gegen einander über hervor, und ſind hellgrün, durchſichtig, und mit einem feinen Gewebe von Adern durchzogen. Die Stiele ſind ſehr kurz. Die Blumen erſcheinen aus den Blätter-Büſcheln im May, allezeit 2 Stück auf einem kurzen gemeinſchaftlichen Stiele, und weichen darin von den vorhergehenden ab, daß beyde nur Einen Knopf oder Frucht-Keim haben, aus welchem eine runde Beere wird, die von zwey ſchmahlen Neben-Blättern unterſtützt iſt. Dieſe Blumen ſind nicht viel über 1 Z. lang, von Farbe blaßgelb, und in ihren Einſchnitten regelmäßiger, als die übrigen dieſer Gattung. Das Mark der reifen blauen Beeren iſt purpurfarbig, und die Anzahl der darin enthaltenen ovalen platt gedrückten Samen ſteigt bis auf 12 Stück.

Die äuſſere Rinde der brüchigen Zweige iſt braunroth und glatt. Die Höhe des Strauches beträgt ſelten über 4 F.; doch wächſt er ziemlich buſchig auf, ſo, daß er nebſt den häufigen Blumen ein gutes Anſehen gibt, und daher auch zur Mannichfaltigkeit in Pflanzungen und Gärten dient. Von einem beſondern Nutzen iſt bis jetzt nichts bekannt.

Hr. Forſtrath v. Burgsdorf führt in ſeiner Anleitung zur ſichern Erziehung und zweckmäſſigen Anpflanzung der einheimiſchen und fremden Holz-Arten, welche in Deutſchland und unter ähnlichem Klima im Freyen fortkommen 2 Th. (Berl. 1787, gr. 8.) S. 138, noch folgende Arten an:

Die baleariſche Hecken-Kirſche, Lonicera balearica, Fr. Chamaecerifier de Minorca, Engl. The

Minorca Honeyſuckle. Dieſe Art iſt von Gordon und Dormer in ihren Pflanzenverzeichniſſen bekannt gemacht, aber noch nicht beſchrieben worden. Sie verlangt einen beſchützten Stand, und in der Jugend Bedeckung.

Die ſcharlachrothe Hecken-Kirſche, Lonicera coetines, Fr. Chamaecerisier à fruit écarlate, Engl. The ſcarlet berried Honeyſuckle. Dieſe Sorte iſt von Loddiges bekannt gemacht, aber auch noch nicht beſchrieben worden.

Die weiß blühende amerikaniſche Hecken-Kirſche, Lonicera glauca, Fr. Chamaecerisier à feuilles bleuâtres, Engl. The Honeyſuckle with bluiſh green leaves. Hr. v. B. führt dieſe ihm unbekannte Sorte unter Autorität des Prof. Ludwig auf, welcher den Hill dabey citiret.

* * *

Die Lorbeer-Kirſche, oder Kirſch-Lorbeer, iſt die Frucht des Kirſch-Lorbeerbaumes, deſſen Frucht einer Kirſche gleicht, die Blätter aber mit den Lorbeer-Blättern einiger Maßen überein kommen.

Die Claſſe der Lorbeer-Kirſchbäume begreift zwey ſchöne immergrüne Bäume für Verzierungs-Plantagen.

1. Gemeiner Kirſch-Lorbeerbaum, Cerasus folio laurino, Laurus maiori folio ſplendente, (weil deſſen Blätter die übrigen Arten des Lorbeerbaumes an Größe und Glanz übertreffen,) Lauro Cerasus *da Ham.* Padus Laurocerasus *Mill.* Prunus (Lauro-Cerasus) floribus racemoſis, foliis ſempervirentibus dorſo biglanduloſis *Linn.* Fr. Lautier Cerise, Engl. The common Laurel-tree. Dieſer Baum wächſt am ſchwarzen Meere wild, und iſt im J. 1576 zuerſt aus Klein-Aſien nach Europa gebracht worden. Er wächſt 20 und mehr F. hoch, faſt ganz von unten auf ſehr äſtig,

äſtig, mit ſtark grünen Schüſſen. Die immergrünen Blätter ſind oval oder länglich, an 5 bis 6 Z. lang, und 2 bis 3 Z. breit. Ihr Bau iſt dick, wie bey den Pomeranzen-Blättern, und ſie haben an dem nach unten umgebogenen Rande weit aus einander ſtehende Zähne. Ihre obere Fläche iſt glänzend und dunkelgrün, die untere in der Farbe etwas matter; nach Linné gegen den Stiel hin mit 2 braunen Drüſen beſetzt, die aber von Hrn. v. Münchhauſen zu 4 Stück bemerkt worden ſind. Düroi hat ſie gar zu 3 Par auf ihnen angetroffen. Die Stiele ſind dick und von grüner Farbe. Die jungen Blätter pflegen ſich etwa den 10 März zu öffnen, und vor der Mitte des Apr. ganz ausgebrochen zu ſeyn. Die Blumen ſind weiß, klein, kommen im Apr. in länglichen Büſcheln hervor, und hinterlaſſen faſt runde, fleiſchige, ſehr ſchwarze Beeren, von ungefähr ½ Z. im Durchmeſſer, welche im Sept. oder im Anfange des Oct. reif werden, aber nicht gut zu eſſen ſind; ſie enthalten einen zerbrechlichen, ovalen, etwas zugeſpitzten und gefurchten Stein. Die Rinde der jungen Aeſte iſt grünlich, und häufig mit erhabenen Warzen beſetzt, bey den ältern aber braun.

Man findet in den Gärten zwey Varietäten: mit gelb- und mit weiß-geſtreiften Blättern, welche ein feines Anſehen haben, aber leicht wieder in die grüne Farbe einarten.

Dieſe Art, nebſt ihren beyden Abarten, gehört zu den ſchönſten immergrünen Bäumen in der ganzen Natur. Sie iſt von ſchönem ungezwungenen Wuchſe, gleichwie auch ihre das ganze Jahr über bleibende Blätter ſonderbar groß und zierlich ſind; iſt auch ſehr dauerhaft, und kommt in England in einer jeden Lage fort.

2. **Portugieſiſcher Kirſch-Lorbeerbaum,** Lauro-Cerasus luſitanica minor *du Ham.* Padus luſitanica *Mill.* Prunus luſitanica, floribus racemoſis, foliis

lijs sempervirentibus eglandulosis *Linn.* Engl. Portugal-Lorbeel. Kommt aus Portugal und Pensylvanien; wächst 12 bis 15 F. hoch, mit einer sehr ästigen und vollen Krone, und röthlichen jungen Zweigen. Die Blätter sind länglich oval, dick, dunkelgrün, ohne Drüsen, immergrün. Die Blumen, in lockern Trauben, klein, weiß, kommen im Jun. hervor, und hinterlassen rundliche schwarze Beeren, welche im Herbste reif werden.

Diese beyde Arten sind edle immergrünende Pflanzen, die zwar gewöhnlich als Sträuche angesehen werden, eigentlich aber Bäume sind, besonders die gemeine Art, welche in ihrem Vaterlande Trapezunt, und in den südlichen Ländern von Europa, zu einem großen Baume erwächst, und von welcher man z. B. in Italien ganze Wälder antrifft. Sie kommen aber auch beyde in England gut fort, erlangen in manchen Gegenden eine beträchtliche Größe, und sind, weil sie das ganze Jahr durch, ein vortrefflich grünes und schönes Ansehen haben, eine große Zierde unserer Lust-Gebüsche und anderer Plantagen. Sie sind beyde so dauerhaft, daß sie nur selten von der Witterung Schaden leiden, und daß höchstens ihre junge Schüsse und ihre äussere Blätter in sehr strengen Wintern erfrieren. Sie kommen in jedem Boden und in jeder Lage fort, besonders aber die gemeine Art, welche fast allenthalben, und so gar unter dem Schatten der Bäume, und gegen Wände gepflanzt, gut gedeihet. Sie sind beyde sehr vortreffliche Gegenstände für alle Verzierungs-Plantagen und Wildnisse, vornehmlich zwischen andern immergrünen Bäumen oder Sträuchen; machen jedoch auch vor der Fronte solcher Plantagen, welche im Winter unbelaubt sind, einen sehr schönen Effect. Gruppen und Pflanzungen von dem gemeinen Kirsch-Lorbeerbaume auf Rasenstücken, in Parks, oder im Aufsongrunde, nehmen sich gleichfalls gar vortrefflich aus;

und

und da derselbe fast in jeder Lage gut fort kommt, und einen sehr schnellen Wuchs hat, so kann man mit ihm auch eine sehr unangenehme Garten-Befriedigung, z. B. alte nackte Mauern, oder einen andern unansehnlichen Gegenstand, verbergen; er nimmt sich, in allen diesen Fällen, mit seinen edeln, großen, immergrünen Blättern zu allen Jahrszeiten sehr schön aus.

Man pflanzt ihn auch bisweilen zu Verzierungs-Hecken; nur muß man solche nicht mit der Schere beschneiden, weil sonst seine schöne große Blätter verstümmelt, und ihrer Schönheit beraubt werden würden; man muß vielmehr alles an ihm nöthige Beschneiden mit dem Messer verrichten, um die Blätter ganz zu lassen; und dann macht eine solche Hecke ein sehr vortreffliches Ansehen.

Weil dieser Baum, wenn er gehörig gezogen wird, eine beträchtliche Stärke erlangt, so schickt er sich auch sehr gut zu Alleen ꝛc. und in Nutzholz-Pflanzungen, und verdient demnach sowohl zum Vergnügen, als auch zum Nutzen, gepflanzet zu werden. In immergrünen Wildniß-Quartieren muß er also einer der vornehmsten Bäume seyn; auch können große Wege mit ihm verzieret werden, wie auch einige besondere Alleen, z. B. solche, die auf einen Tempel, oder auf ein Gewächs-Haus, oder auf ein Gebäude in großen Gärten, führen; denn zu solchen Alleen, die zu der Fronte eines Land-Sitzes eines Güter-Besitzers führen, möchte er sich eben nicht schicken. Und gleichwie er auch in solche Pflanzungen, die zu Nutz-Holze bestimmt sind, in Menge gepflanzt werden mag, so schickt er sich auch sehr gut zu Unter-Holze, weil er sehr gut unter der Traufe anderer Bäume fort kommt. Und ob sich gleich manche andere Holz-Arten zu Unter-Holze weit besser schicken, so kann man doch, um die Wälder zu verzieren, auch ihn in einer geringen Anzahl dazu aufnehmen, zumahl an der Aussen-Seite umher,

und

und längſt den Seiten der Reit-Wege, weil er im Sommer, vermittelſt der ihm eigenthümlichen grünen Farbe ſeiner Blätter, die Mannichfaltigkeit des Laubes vermehrt, und im Winter, wenn die übrigen Bäume von ihrem Laube entkleidet ſind, mit ſeinen immergrünen Blättern einen herrlichen Effect macht. Seinen Beeren gehen die Amſeln, die Krammets- und andere Geſang-Vögel ſo ſtark nach, daß ſie ſich da, wo dieſer Baum in Menge gepflanzt iſt, häufig aufhalten, und den Luſtwandler mit ihrem Geſange unterhalten. Sein Holz iſt zwar nicht ſo hart, wie das Holz mancher anderer Bäume; dem ungeachtet aber iſt es zu den meiſten Drechsler-Arbeiten von großem Werthe, und wird auch von den Tiſchlern und Kaſten-Machern ſehr geſucht.

Die Pflanzungs-Zeit der beyden Kirſchlorbeer-Arten, ſind die Monathe Oct. bis zum Anfange des Aprils; wiewohl der Oct. und Nov. die beſte Zeit dazu ſind.*

Die Fortpflanzung kann ſehr leicht durch Samen, und durch abgeſchnittene Zweige geſchehen; letztere aber iſt die bequemſte, und daher auch die allgemeinſte Methode.

Was die Fortpflanzung aus Samen betrifft, ſo pflegen um den Anfang des Oct. die Beeren ganz ſchwarz, und alſo völlig reif zu ſeyn. Man ſäe ihn alsdann ſogleich in leichte Erde, ½ oder höchſtens beynahe 1 Z. tief; gebe ihnen gegen ſehr heftigen Winter-Froſt mit Tonnen-Reifen und Matten eine Bedeckung; und umſtecke das Beet auch, um die Gewalt kalter Winde zu brechen, und ſowohl Samen als auch Matten zu ſchützen, mit einer Hecke von Scorpionkraut-Büſchen, wobey man viel ſicherer geht, als bey einer Bedeckung mit langem Streu-Strohe, weil dieſes, wenn es nach geendigtem Froſte ſofort wieder abzunehmen verſäumt wird, die alsdann gewöhnlich erfolgende

Regen

Regen-Nässe an sich hält, wodurch das Samen-Beet oft so naß wird, daß die ganze Aussaat verloren geht. Wenn das Beet nach dieser Vorschrift gegen starken Frost geschützet, und die Bedeckung bey gelinder Witterung jedes Mahl sofort wieder abgenommen wird, so pflegen die Pflanzen im Frühlinge hervor zu keimen. Diese halte man dann beständig rein, begieße sie bey trockner Witterung gehörig, und im folgenden Herbste oder Frühlinge, wenn die Witterung sich gesetzt hat(*), pflanze man sie auf 2 bis 3 Jahr, oder, bis man ihrer bedarf, in die Pflanz-Schule, in 2 F. von einander entfernte Reihen, und in den Reihen selbst 1½ F. weit von einander. Solche aus Samen gezogene Stämme nehmen gewöhnlich einen aufrechtern Wuchs an, und treiben auch selten so viele Seiten-Zweige, als die aus abgeschnittenen Zweigen.

Weil indessen die Erziehung aus Samen, aller angewandten Sorgfalt ungeachtet, oft fehl schlägt, auch die Anschaffung der Beeren, und die Verwahrung derselben gegen die Vögel, viele Mühe macht, so pflegt man sie lieber aus abgeschnittenen diesjährigen jungen Schüssen zu erziehen. Diese schlagen sehr leicht Wurzeln, und werden bald gute Pflanzen, zumahl wenn sie am Fuße 1 Z. lang altes Holz haben, wiewohl dieses nicht ganz unumgänglich nothwendig ist. Man stecke im Aug. oder Sept. solche abgeschnittene junge Schüsse, zu 10, 12 bis 18 Z. lang, nachdem man, so weit sie in die Erde kommen, ihre untere Blätter zuvor abgestreift hat, in 6 Z. weit von einander entfernte Reihen,

zu

(*) Nach Hanbury aber nicht schon im Herbste, weil sie sonst im Winter von dem Froste gröstentheils aus der Erde gehoben werden, und ohnedies, weil sie in ihrem ersten Jahre noch nicht sehr dauerhaft sind, leicht erfrieren, wofern sie nicht noch vermittelst umher gesteckter Sarzionkraut-Büsche geschützet werden, sondern erst im Frühlinge, wenn die üble Witterung vorüber ist.

zu ⅔ ihrer Länge, auf eine Rabatte, welche, damit die gesteckten Zweige nicht von den Winden los gerüttelt, und am Bewurzeln gehindert werden mögen, in Schutze liegen, auch eine schattige Lage unter einer nördlichen Mauer, oder doch den größten Theil des Tages von großen Bäumen Schatten haben muß, weil die Sonne sonst bald alle Feuchtigkeit ausziehen, und die gesteckten Zweige zu Grunde richten würde, wofern man sie nicht beständig wässerte und beschattete; aus welcher Ursache auch das Stecken der Zweige nur bey regnerischer oder feuchter Witterung vorgenommen werden darf. Wenn solche Stecklinge bey erfolgender trockner Witterung gehörig begossen werden, pflegen sich die im Aug. gesteckten meistens noch vor den Winter, die übrigen aber doch im folgenden Sommer, zu bewurzeln, und müssen dann in solchem Sommer bey trockner Witterung fleißig begossen, und in dem dann folgenden Herbste, da sie Schüsse von 1 F. hoch und darüber gethan zu haben pflegen, oder auch erst in dem nachher folgenden Frühlinge, sowohl jene als diese behutsam aufgenommen, in die Pflanzschule in weit von einander entfernte Reihen verpflanzet werden, um erst die zur förmlichen Verpflanzung nöthige Stärke zu gewinnen. In der Pflanzschule kann man die jungen Stämme nach Belieben entweder buschig, oder strauchig, oder hochstämmig, ziehen.

Zur Anlegung einer Plantage des gemeinen Kirsch-Lorbeerbaumes, muß der Boden mit dem Pfluge zubereitet, und die jungen Stämme in 3 F. weit von einander entfernte Gruben gepflanzet werden. Man muß sie aber nicht schon sogleich, als sie sich zu berühren anfangen, verdünnen, sondern sie dann erst noch 2 bis 3 Jahr unverdünnet fort wachsen lassen, damit sie sich einander zu regulären Stämmen in die Höhe drängen. Wenn man nachher mit dem Verdünnen den Anfang macht, muß solches anfangs nur erst sparsam

sam geschehen, und vorerst nur hier und da ein etwa schwacher Stamm weggenommen werden, um den andern stärker schießenden Stämmen mehr Raum zu geben, weil sonst die Kälte auf ein Mahl zu stark eindringen, und die ganze Plantage, wo nicht gar zu Grunde richten, doch im Wachsthume sehr aufhalten würde; und in der Folge muß, bis zu der Zeit, da die ganze Plantage endlich abgetrieben werden kann, mit dem Verdünnen mit Ueberlegung fortgefahren werden. Nach Hanbury's Bemerkungen, ist der gemeine Kirsch-Lorbeerbaum nur dann in Gefahr zu erfrieren, wenn eine dichte Plantage auf ein Mahl dermaßen verdünnet wird, daß die Kälte plötzlich in dieselbe eindringen kann; auf kalten und freyen Plätzen aber einzeln stehend, pflegt selten ein Baum zu erfrieren.

In England ist dieser Baum schon so einheimisch, daß er daselbst fast in jedem Boden und in jeder Lage gut fort kommt, und daß man mit Sicherheit auf jedem beliebigen Platze eine Plantage davon anlegen kann. Unter unserm Himmelsstriche aber hält derselbe nicht so gut aus, als in England, und leidet in jedem Winter, wenn er gleich noch so beschützt steht. In den kalten Wintern von 1766 und 1767, sind in Harbke, alle Stämme bis auf die Wurzel abgestorben; und ob sie gleich, wie Duroi meldet, aus den Wurzeln von neuem treiben, werden sie doch zärtlicher, und bleiben zuletzt ganz zurück. Aus Samen gezogene, und einige Jahre in Töpfen gehaltene Pflanzen, dauern unsere Winter, trotz aller Witterung, aus. Auch der portugiesische dauert unsere Winter gut aus; er verlangt nur eine Bedeckung und einen beschützten Ort.

Neuere Versuche von dem guten Erfolge mit dem Kirsch-Lorbeerbaume, meldet Hr. A. A. Medikus, in seinen Beytr. zur schönen Gartenkunst, (Mannh. 1782, 8.) S. 93, fgg. „Der Kirschlorbeerbaum ist ein Strauch, an „dessen Angewöhnung ich nicht mehr zweifle. Diese durch

„seine herrliche und große Blätter sich ganz vorzüglich „auszeichnende Staude hat mir anfänglich gar nicht zu „Glücke schlagen wollen, da ich sie, ohne auf ihren Anbau „weiter Mühe zu verwenden, in das Freye versetzte. Ich „sahe also, daß sie mehrere Sorgfalt erheische, und habe „im J. 1779 zur nämlichen Zeit und auf das nämliche Gar„tenbett, wo die 13 Granatbäume hingepflanzet worden, „auch 4 Kirschlorbeerbäume hingesetzt, und die nämliche „Aufmerksamkeit auf sie, wie auf die Granatbäume, ver„wendet. Unter dieser Pflege haben sie einen unerwarte„ten Wuchs gehabt. Den schönsten davon habe ich diesen „Winter uneingebunden stehen lassen. Bey der strengsten „Kälte waren seine Blätter ganz dunkelgrün, und er hat „sich bis in die äussersten Spitzen ganz ausserordentlich er„halten, und dies Frühjahr schon eine Menge Schuh lan„ger Sommerlatten getrieben. Die andern mit Stroh „ganz eingebundenen Kirschlorbeerbäume sind zwar auch „bis in die Spitzen meist frisch gewesen, aber ihre Blätter „waren gelblich und schwächlich; selbst die Stämme haben „bis jetzt noch nicht den kraftvollen mächtigen Trieb des er„stern. Ich habe hieraus, wie auch aus mehrern Erfahr„ungen, gesehen, daß das Umwinden mit Stroh den Bäu„men mehr schädlich, als nützlich, sey. Denn diese Arbeit „wird gewöhnlich zu einer Zeit vorgenommen, wenn der „Saft noch nicht gänzlich zurück getreten ist. Die Beweg„ung fehlt alsdann diesen in dem engen Strohhause (denn „ich lasse gewöhnlich das Stroh nicht um den Baum, son„dern um Reife, die an eingesteckte Stangen befestigt sind, „anlegen,) befindlichen Stauden; wodurch wahrscheinlich „das Zurücktreten des Saftes gehindert wird, der hernach „in den Aesten stocket, Schimmel erzeugt, und das Erkran„ken oder gar das Absterben der Aeste befördert. Desto „wesentlicher ist, vorzüglich in den erstern Jahren, der Um„satz mit Dung, weil der Stamm selten Noth leidet, wenn „die Wurzel von der eindringenden Kälte nicht beleidiget „wird; eine Eräugniß, so bey den jungen und schwamm„ichten Wurzeln der erstern Jahre gar leicht möglich ist, „hingegen bey dem Erstarken derselben, und bey ihrem „tiefen Dringen alle Jahr weniger nothwendig wird, bis „sie endlich dieser Vorsorge auch gar nicht mehr „bedürfen."

Diese

Dieſe Gedanken des Hrn. R. R. **Medikus**, haben ſeine Erfahrungen im Winter $\frac{1781}{1782}$ noch mehr erweitert und berichtigt. S. eb. daſ. S. 221, und 351.

Gemeiniglich wird der **Kirſch-Lorbeerbaum** unter der Orangerie zur Abwechſelung aufgeſtellet.

Sowohl die **Blumen**, als auch die **Blätter**, ſchmecken wie bittere Mandeln oder Pfirſich-Kerne. Die Blätter ſind ſaftig, und auch ſehr bitter. Mit den Fingern zerrieben, riechen ſie wie gedachte Kerne. Gepülvert erregen ſie, wiewohl langſam, ein ſo ſtarkes Nieſen, daß ſelbſt diejenigen, die wegen des ſtets währenden Gebrauches vom Schnupf-Tobacke nicht mehr nieſen, doch durch dieſelben zum Nieſen gebracht werden. Man pflegt dieſe Blätter, nachdem ſie etliche Mahl entzwey gebrochen worden ſind, in Milch zu kochen, oder in heiße Milch zu werfen, um ihr den gewürzhaften Geſchmack derſelben mitzutheilen; auch dem Thee, Kaffe, und andern Speiſen, denen man Milch oder Sahne hinzu zu ſetzen pflegt, ſucht man durch dieſe Blätter einen angenehmen Kern- oder Mandel-Geſchmack zu geben, daher ſolche insgemein **Mandel-Blätter** genannt werden. Hin und wieder in Deutſchland, z. B. in Franken, herrſcht dieſe Gewohnheit noch. Ja, ſelbſt das von ihnen abgezogene Waſſer, iſt in England von Hausmüttern und Köchen verſchiedenen Speiſen zugeſetzt worden. Auch iſt es daſelbſt häufig geſchehen, daß Trinker den Branntwein mit dem vierten Theile des deſtillierten Lorbeerkirſchbaum-Waſſers vermiſcht haben (1). Einige haben dieſes Waſſer ſtatt des Kirſch-Waſſers verkauft (2). Einige haben mit den Beeren dieſes Baumes Weingeiſt imprägnirt, um dadurch eine Art Ratafia zu machen (3).

(1) *Madden* in Philoſ. Tranſact. Vol. 37. p. 85.

(2) *Bayliet*, der Verf. der Pract. Eſſays on medical ſubjects, p. 33.

(3) *Mortimer*, in Philoſ. Tranſact. l. c. p. 173.

Doch gilt dieses von dem Kerne der Frucht, welcher den Geschmack der Blätter hat; denn der fleischige Theil der Frucht ist unschädlich, und wird von Vögeln gern gefressen. Was die Vermischung mit der Milch betrifft, so wird man bald aus der Folge sehen, daß die Milch, mit der 1 oder 2 Blätter dieses Baumes gekocht worden, beträchtliche Unordnungen angerichtet hat (4). Der Weingeist aber besitzt das Vermögen, dieses Gift zu entkräften, nicht; und ob gleich ein und der andere Schluck Branntwein, welcher durch dieses Gift angemacht ist, nicht sofort den Tod bringt, so ist es doch ausgemacht, daß sein fortgesetzter Gebrauch die Gesundheit schwächt und den Tod beschleunigt. Ein Mann und seine Frau, die einige Jahre hindurch alle Morgen ein oder einige Quentchen Branntwein, der mit den Beeren dieses Baumes angemacht war, getrunken hatten, starben beyde an der Lähmung, nachdem sie einige Zeit vorher die Sprache verloren hatten (5).

Man hatte in voller Sicherheit die Blätter und Früchte dieses Baumes, des angenehmen Geschmackes wegen genossen, bis von ungefähr Erfahrungen bey den Menschen, und mit Fleiß angestellte Versuche bey Thieren, zeigten, daß diese Blätter ein Gift besitzen, welches wenig andern Giften in Ansehung seiner Heftigkeit weicht. Zu Dublin fing man im J. 1728 an, giftige Eigenschaften in ihnen zu vermuthen, weil daselbst zwey Frauen kurz nachher starben, als sie das von diesen Blättern abgezogene Wasser getrunken, welches ihnen die Magd als ein herzstärkendes Mittel gebracht hatte. Die eine von diesen hatte innerhalb einer Stunde ungefähr 10 Quent und 2 Scrupel von demselben genommen; nach vorhergegangenen Magen-Beschwer-

den

(4) *Ingenhouss* Experiences sur les Vegetaux, p. 233. not.

(5) Mortimer, Trans. D.

den und Verlust der Sprache, starb sie, ohne vorher Erbrechen, oder Lariren und Convulsionen zu leiden. Die andere, um durch ihr eigenes Beyspiel die Unschädlichkeit dieses Wassers zu zeigen, nahm zuerst 2 Löffel voll davon; allein, kaum hatte sie sich nieder gesetzt, als sie ohne Klagen und Convulsionen starb. Eine andere Frau hatte etwas mehr, als einen Löffel voll, von demselben genommen, ohne den geringsten Schaden, weil sie sich eines Brech-Mittels bedient hatte, die Gefahr abzuwenden. Ein Jüngling, der aus Versehen, statt einer Ptisane, aus einer Flasche, darin Kirschlorbeer-Wasser war, getrunken hatte, dessen Quantität sich aber nicht bestimmen lässet, bekam gleich darauf die heftigsten Magen-Schmerzen, und starb (6). Eine die Menschheit entehrende That war es, daß der engländische Hauptmann Donellan einen seiner Verwandten, einer ansehnlichen Erbschaft wegen, durch dieses Wasser tödtete. Er hatte, in dieser schändlichen Absicht, einer Mixtur dieses Wasser heimlich zugegossen; der Erfolg davon war, daß der Jüngling gleich ½ Stunde nachher, nachdem Convulsionen, starr sehende Augen, fest verschlossene Kinnbacken und Schaum vor dem Munde vorher gegangen waren, starb (7). Durch eben dieses Gift, welches aus einer großen Menge destillierten Kirschlorbeer-Wassers, durch wiederhohlte Destillationen, in einer Pinte (d. i. 16 Unzen) concentrirt war, brachte der berüchtigte D. Price in London, welcher sich rühmte, lebendiges Queckſilber in Gold verwandeln zu können, zu Anfange des Augustes 1783, in seinem Laboratorio, aus Verdruß, seine Kunst verschmähet zu sehen, sich selbst um das Leben, indem er die Pinte dieses concentricten Wassers ausgetrunken hatte.

(6) Madden, a. ang. O.

(7) London Chronicle, 1781, n. 3797.

Nach dem Inhalte eines Schreibens aus London, v. 30 Sept. 1783, an Hrn. Prof. Lichtenberg in Göttingen, hielt ſich D Price vom Nov. 1782 an, bis zu Ende des Jan. 1783, in London auf, und ſtand, ſeines Verſuches wegen, mit Sir Joſ. Banks und Andern in Unterhandlung. Man ſetzte ihm ſtark zu, ſo, daß er endlich verſprach, den Verſuch zu wiederhohlen, zugleich aber ſuchte er von den dortigen Chemiken Nachrichten von hermetiſchen Proceſſen zu erhalten, z. B. von den Verſuchen Conſtantini's, den die deutſchen Alchemiſten recht gut kennen, von Marggraf's Verſuch, Silber aus Queckſilber vermittelſt der Phosphor-Säure zu ziehen, von Wenzel's Zerlegung der Metalle, u. ſ. w. Im Jan. ging er nach Guilford wo er zu Hauſe war, wahrſcheinlicher Weiſe um zu laboriren; denn einem ſeiner Freunde, der ihn nach ſeinem Hauſe lud, um einige Zeit bey ihm zu zubringen, ließ er wiſſen, er könne nicht, weil er auf 6 Wochen ſehr wichtige Geſchäfte habe. Dieſe ganze Zeit nun über bemerkten die Leute, die um ihn waren, öfters Zorn und Gemüths-Unruhe an ihm. Er drückte ſein Erſtaunen darüber aus, daß das Publicum



Um die Thee-Zeit (*) forderte er der Magd das Lorbeer-Waſſer ab, und ein Trinkglas; ſie brachte beydes, aber nur ein kleines Glas; er forderte hierauf ein groſſes, einen Tümmler. Dieſes geſchah oben im Hauſe. Bald hierauf kam er die Treppe herunter, und brachte die Bouteille und das Glas, leer und rein ausgeſpühlt, gab ſie dem Mädchen, und ging wieder hinauf. Dieſe folgte ihm, und bemerkte, daß er taumelte. Sie lief nach Hülfe; allein, ehe dieſe noch ankommen konnte, fand man ihn ſchon todt auf ſeinem Bette.

Göttingiſches Magazin der Wiſſ. und Litterat. 3 Jahrg. 6 St. 1783. 8. S. 886, ſqq.

Dieſes ſo ſchnell wirkende Gift, und die Art, wie es dieſe Wirkung äuſſert, war der genaueſten Unterſuchung der Naturforſcher höchſt würdig. Man hat auch zu dieſer Abſicht Verſuche, hauptſächlich mit vierfüßigen Thieren angeſtellt. Die meiſten hierwon haben wir dem berühmten Madden (8), Nicholls (9), Langriſh (10), Vater (11), du Hamel (12), Rattray (13), und noch neuerlich dem ſcharfſinnigen Fontana (14), zu danken. Die meiſten dieſer Verſuche

(*) Bey den Engländern bald nach dem Mittag-Eſſen, gewöhnlich um 5 Uhr.

(8) Am ang. O.

(9) Beym Mead.

(10) Phyſical experiments upon brutes; in order to diſcover a ſafe and eaſy method of diſſolving the ſtone in the bladder by injections. To which is added a courſe of experiments with the Lauro-Ceraſus, in order to inveſtigate its effects on animal bodies, when given in ſuch ſmall doſes as not to kill &c. by *Browne Langriſh*. Lond. 1746. 8.

(11) Diſſ. de Lauroceraſi indole venenata, exemplis hominum & brutorum eius aqua enecatorum confirmatur. Vitemb. 1737, 4 B. Eb. Deſſ. Progr. de olei animalis efficacia contra hydrophobiam, & veneno Lauroceraſi, 1740.

(12) Traité des Arbres & Arbuſtes, To. 1, p. 347.

(13) Im London Chronicle, 4. aug. O. S. 316.

(14) In Philoſ. Tranſact. Vol. LXX. P. 1, p. 210. ſqq. Ferner in Deſſen Traité ſur le vénin de la vipere, ſur les poiſons americains,

sind mit dem von den Blättern abgezogenen Wasser angestellet worden, welches, je gesättigter es ist, desto mehr Kräfte hat; wozu wiederhohlte Oestillation oder Cohobation, über jedes Mahl neue und gehörig trockne und klein geschnittene Blätter, besonders geschickt ist. Ein solches Wasser ist anfänglich milchtrübe; wenn man von ihm das Oehl, welches zugleich durch den Helm mit übergeht, getrennt hat, wird es so klar, wie anderes Wasser. Drey Maß Wasser enthalten ungefähr 1 Quent schweres Oehl, welches wie Baum-Oehl gefärbt ist, und in dem Wasser zu Boden fällt, aber durch das Schütteln sich mit dem Wasser vereinigt. Dieses Wasser wird weit schädlicher, und bringt desto gewisser den Tod, wenn es auf einem Dampf-Bade destilliert wird. Es ist eine sinnreiche Vermuthung des Fontana, daß dieses Wasser vielleicht durch wiederhohlte Cohobation die Gestalt eines concentrirten Oehles annähme, in der es alle andere Gifte an Kraft übertreffen würde. Ein großes Gewicht erhält diese Meinung durch den Versuch des Nicholls, welcher durch 10 Tropfen dieses röthlichen Oehles, einen Hund binnen einer halben Stunde tödtete. Der Aufguß der Blätter ist zwar auch giftig, aber bey weitem nicht so sehr, so daß von demselben eine weit größere Quantität erforderlich war, ehe die Zufälle, die ich nachher noch beschreiben werde, entstanden, und das Thier dennoch nachher sich wieder erhohlte. Auch der aus den Blättern gepreßte Saft ist schwächer; doch tödten wiederhohlte Doses von demselben.

Das aus den Blättern destillierte Wasser tödtet nicht allein Thiere, die ein warmes Blut führen, als: Hunde, von verschiedenem Alter und Beschaffenheit, mit denen man die meisten Versuche angestellt hat; Pferde,

rains, sur le Laurier-Cerise, & sur quelques autres poisons vegetaux &c. à Florence 1781, 4. To. 2, von S. 125 an.

Pferde, Kaninchen und Tauben, sondern auch diejenigen Thiere, die ein kaltes Blut haben, die es so gar, wieder die Wirkungs-Art der übrigen Gifte, schneller tödtet, als die erstern; insonderheit hat man hierin mit Aalen Versuche gemacht. Schneller und wirksamer äussert es zwar seine schädliche Wirkungen, wenn es durch den Mund genommen, als wenn es durch andere Wege in den thierischen Körper gebracht wird. Nicht viel geringer aber sind doch die Zufälle, wenn es durch den After eingesprützt wird. Meistens äussert es seine Wirkungen in den Muskeln, die zuerst krampfhafte Bewegungen erleiden, und darauf paralytisch erschlaffet werden. Daß die mehrere oder wenigere Menge des Wassers, seine Stärke, und die Größe des Thieres, in den Wirkungen Veränderungen verursache, wird man um so leichter einsehen, da dieses der Fall fast bey allen Giften ist, die durch den Mund genommen werden. Wird dieses Wasser nur in geringer Quantität gegeben, so verursacht es bald stärkere, bald schwächere Convulsionen, die zuweilen selbst den Kopf nach dem Schwanze zurück ziehen; die hintern Glieder verlieren darauf das Vermögen sich zu bewegen; eben dies geschieht nachher mit den vordern Gliedern, das Thier kriecht daher taumelnd umher; später verliert der Hals und Kopf das Bewegungs-Vermögen, welche Theile hingegen von einer Seite zur andern beweget werden. Unter diesen Umständen behält es doch das Gesicht, Gehör, und die Bewegung der Glieder, wenn sie gestochen oder gedrückt werden. Einige Thiere erbrechen sich, andere purgieren, oder harnen häufig. Unter diesen Umständen ist ihr Athemhohlen erschwert. Gibt man dieses Wasser in größerer Quantität, so erfolgt kurz darauf der Tod, ohne daß Convulsionen vorher gehen, und der Körper scheint erschlafft zu seyn. Dieses Gift wirkt so schnell, daß es kaum in den Magen gekommen zu seyn scheint, wenn das Thier sich

schon übel befindet. Ein Hund von mittlerer Größe starb nach einer halben Minute, als man ihm 2 Unzen dieses Wassers eingab. Kaninchen, auch von mittlerer Größe, erlitten nach 30 Secunden Convulsionen, und starben während einer Minute, als man ihnen nur 2 Theelöffel voll dieses Wassers in den Hals gegossen hatte. Eine Taube crepirte sogleich, als man ihr ½ Quent dieses cohobirten Wassers eingeflößt hatte. Ein Eßlöffel voll ist hinreichend, einen großen Hund zu tödten. Eine alte Stute warfen 1½ Pinten dieses Wassers nieder, und sie crepirte binnen 15 Minuten an Convulsionen, nachdem sie vorher verschiedene Mahl versucht hatte, auf die Füße zu kommen, welches ihr doch aber nur mit den Vorderfüßen gelingen wollte, weil die hintern gelähmt waren. Etwas länger lebte ein anderes Pferd, welches fast dieselbe Quantität dieses Wassers erhalten hatte, doch litt es dieselbe Lähmung der Beine. Hieraus läßet sich gewisser Maßen die Quantität dieses Wassers, in der es schädlich wird, bestimmen. In sehr kleiner Dosis ist es unschädlich; z. B. nur ein Tropfen schadet auch einem kleinen Thiere nicht. Thiere, welche durch dieses eingegebene Wasser crepirt sind, in deren Magen findet man nicht die geringsten Spuren einer Entzündung, er ist vielmehr mit einem zähern Schleime überzogen. Ihre Blut-Adern strotzen vom Blute, die Lungen sind entzündet, die harte Hirnhaut und der rindige Theil des Gehirns, sind gleichfalls mit Blute angefüllt, die Puls-Adern hingegen sind leer. Dieses sind die vornehmsten und beständigen Erscheinungen. Die Beschaffenheit des Blutes ist hingegen in den todten Körpern nicht immer dieselbe. Zuweilen hat man es coagulirt gefunden. Ein ander Mahl hat man es in seinem natürlichen Zustande gefunden. Bey einigen hat man das Blut so flüssig gefunden, daß es selbst die Lymphe in ihren Gefäßen gefärbt hat. Die Flüssigkeit

Dieſe Gedanken des Hrn. R. R. Medikus, haben ſeine Erfahrungen im Winter $\frac{1781}{1782}$ noch mehr erweitert und berichtigt. S. eb. daſ. S. 221, und 351.

Gemeiniglich wird der Kirſch-Lorbeerbaum unter der Orangerie zur Abwechſelung aufgeſtellet.

Sowohl die Blumen, als auch die Blätter, ſchmecken wie bittere Mandeln oder Pfirſich-Kerne. Die Blätter ſind ſaftig, und auch ſehr bitter. Mit den Fingern zerrieben, riechen ſie wie gedachte Kerne. Gepülvert erregen ſie, wiewohl langſam, ein ſo ſtarkes Nieſen, daß ſelbſt diejenigen, die wegen des ſtets währenden Gebrauches vom Schnupf-Tobacke nicht mehr nieſen, doch durch dieſelben zum Nieſen gebracht werden. Man pflegt dieſe Blätter, nachdem ſie etliche Mahl entzwey gebrochen worden ſind, in Milch zu kochen, oder in heiße Milch zu werfen, um ihr den gewürzhaften Geſchmack derſelben mitzutheilen; auch dem Thee, Kaffe, und andern Speiſen, denen man Milch oder Sahne hinzu zu ſetzen pflegt, ſucht man durch dieſe Blätter einen angenehmen Kern- oder Mandel-Geſchmack zu geben, daher ſolche insgemein Mandel-Blätter genannt werden. Hin und wieder in Deutſchland, z. B. in Franken, herrſcht dieſe Gewohnheit noch. Ja, ſelbſt das von ihnen abgezogene Waſſer, iſt in England von Hausmüttern und Köchen verſchiedenen Speiſen zugeſetzt worden. Auch iſt es daſelbſt häufig geſchehen, daß Trinker den Branntwein mit dem vierten Theile des deſtillierten Lorbeerkirſchbaum-Waſſers vermiſcht haben (1). Einige haben dieſes Waſſer ſtatt des Kirſch-Waſſers verkauft (2). Einige haben mit den Beeren dieſes Baumes Weingeiſt imprägnirt, um dadurch eine Art Ratafia zu machen (3).

(1) *Madden* in Philoſ. Tranſact. Vol. 37, p. 85.

(2) *Bayliss*, der Verf. der Pract. Eſſays on medical ſubjects, p. 33.

(3) *Mortimer*, in Philoſ. Tranſact. l. c. p. 173.

Doch gilt dieses von dem Kerne der Frucht, we
den Geschmack der Blätter hat; denn der flei
Theil der Frucht ist unschädlich, und wird von V
gern gefressen. Was die Vermischung mit der
betrifft, so wird man bald aus der Folge sehen, da
Milch, mit der 1 oder 2 Blätter dieses Baume
kocht worden, beträchtliche Unordnungen angeri
hat (4). Der Weingeist aber besitzt das Verm
dieses Gift zu entkräften, nicht; und ob gleich ein
der andere Schluck Branntwein, welcher durch d
Gift angemacht ist, nicht sofort den Tod brin
es doch ausgemacht, daß sein fortgesetzter Gebrau
Gesundheit schwächt und den Tod beschleunigt.
Mann und seine Frau, die einige Jahre hindurch
Morgen ein oder einige Quentchen Branntwein,
mit den Beeren dieses Baumes angemacht war,
trunken hatten, starben beyde an der Lähmung,
dem sie einige Zeit vorher die Sprache verloren
ten (5).

Man hatte in voller Sicherheit die Blätter
Früchte dieses Baumes, des angenehmen Geschm
wegen genossen, bis von ungefähr Erfahrungen be
Menschen, und mit Fleiß angestellte Versuche
Thieren, zeigten, daß diese Blätter ein Gift bes
welches wenig andern Giften in Ansehung seiner
igkeit weicht. Zu Dublin fing man im J. 1728
giftige Eigenschaften in ihnen zu vermuthen, weil
selbst zwey Frauen kurz nachher starben, als sie das
diesen Blättern abgezogene Wasser getrunken, wel
ihnen die Magd als ein herzstärkendes Mittel geb
hatte. Die eine von diesen hatte innerhalb einer S
de ungefähr 10 Quent und 2 Scrupel von demse
genommen; nach vorhergegangenen Magen-Besch

(4) *Ingenhousz* Experiences sur les Vegetaux, p. 233. not.
(5) Mortimer, a. ang. O.

en und Verluſt der Sprache, ſtarb ſie, ohne vorher
rbrechen, oder Laxieren und Convulſionen zu leiden.
Die andere, um durch ihr eigenes Beyſpiel die Un-
hädlichkeit dieſes Waſſers zu zeigen, nahm zuerſt 2
öffel voll davon; allein, kaum hatte ſie ſich nieder ge-
ßt, als ſie ohne Klagen und Convulſionen ſtarb. Ei-
e andere Frau hatte etwas mehr, als einen Löffel voll,
on demſelben genommen, ohne den geringſten Scha-
n, weil ſie ſich eines Brech-Mittels bedient hatte, die
efahr abzuwenden. Ein Jüngling, der aus Verſe-
n, ſtatt einer Ptiſane, aus einer Flaſche, darin
irſchlorbeer-Waſſer war, getrunken hatte, deſſen
uantität ſich aber nicht beſtimmen läſſet, bekam gleich
rauf die heftigſten Magen-Schmerzen, und ſtarb (6).
ine die Menſchheit entehrende That war es, daß der
gländiſche Hauptmann Donellan einen ſeiner Ver-
ndten, einer anſehnlichen Erbſchaft wegen, durch
eſes Waſſer tödtete. Er hatte, in dieſer ſchändlichen
bſicht, einer Mixtur dieſes Waſſer heimlich zugegoſ-
n; der Erfolg davon war, daß der Jüngling gleich $\frac{1}{2}$
tunde nachher, nachdem Convulſionen, ſtarr ſehende
ugen, feſt verſchloſſene Kinnbacken und Schaum vor
m Munde vorher gegangen waren, ſtarb (7). Durch
en dieſes Gift, welches aus einer großen Menge de-
llierten Kirſchlorbeer-Waſſers, durch wiederhohlte
eſtillationen, in einer Pinte (d. i. 16 Unzen) concen-
irt war, brachte der berüchtigte D. Price in London,
elcher ſich rühmte, lebendiges Queckſilber in Gold
rwandeln zu können, zu Anfange des Auguſtes 1783,
n ſeinem Laboratorio, aus Verdruß, ſeine Kunſt ver-
hmähet zu ſehen, ſich ſelbſt um das Leben, indem er
e Pinte dieſes concentricten Waſſers ausgetrunken
atte.

(6) Madden, a. ang. O.
(7) London Chronicle, 1781, n. 3797.

schon übel befindet. Ein Hund von mittlerer Größe starb nach einer halben Minute, als man ihm 2 Unzen dieses Wassers eingab. Kaninchen, auch von mittlerer Größe, erlitten nach 30 Secunden Convulsionen, und starben während einer Minute, als man ihnen nur 2 Theelöffel voll dieses Wassers in den Hals gegossen hatte. Eine Taube crepirte sogleich, als man ihr ½ Quent dieses cohobirten Wassers eingeflößt hatte. Ein Eßlöffel voll ist hinreichend, einen großen Hund zu tödten. Eine alte Stute warfen 1½ Pinten dieses Wassers nieder, und sie crepirte binnen 15 Minuten an Convulsionen, nachdem sie vorher verschiedene Mahl versucht hatte, auf die Füße zu kommen, welches ihr doch aber nur mit den Vorderfüßen gelingen wollte, weil die hintern gelähmt waren. Etwas länger lebte ein anderes Pferd, welches fast dieselbe Quantität dieses Wassers erhalten hatte, doch litt es dieselbe Lähmung der Beine. Hieraus läßet sich gewisser Maßen die Quantität dieses Wassers, in der es schädlich wird, bestimmen. In sehr kleiner Dosis ist es unschädlich; z. B. nur ein Tropfen schadet auch einem kleinen Thiere nicht. Thiere, welche durch dieses eingegebene Wasser crepirt sind, in deren Magen findet man nicht die geringsten Spuren einer Entzündung, er ist vielmehr mit einem zähern Schleime überzogen. Ihre Blut-Adern strotzen vom Blute, die Lungen sind entzündet, die harte Hirnhaut und der rindige Theil des Gehirns, sind gleichfalls mit Blute angefüllt, die Puls-Adern hingegen sind leer. Dieses sind die vornehmsten und beständigen Erscheinungen. Die Beschaffenheit des Blutes ist hingegen in den todten Körpern nicht immer dieselbe. Zuweilen hat man es coagulirt gefunden. Ein ander Mahl hat man es in seinem natürlichen Zustande gefunden. Bey einigen hat man das Blut so flüssig gefunden, daß es selbst die Lymphe in ihren Gefäßen gefärbt hat. Die Flüssigkeit

Um die Thee-Zeit (*) forderte er der Magd das Lorbeer-Waſſer ab, und ein Trinkglas; ſie brachte beydes, aber nur ein kleines Glas; er forderte hierauf ein groſſes, einen Tümmler. Dieſes geſchah oben im Hauſe. Bald hierauf kam er die Treppe herunter, und brachte die Bouteille und das Glas, leer und rein ausgeſpühlt, gab ſie dem Mädchen, und ging wieder hinauf. Dieſe folgte ihm, und bemerkte, daß er taumelte. Sie lief nach Hülfe; allein, ehe dieſe noch ankommen konnte, fand man ihn ſchon todt auf ſeinem Bette.

Göttingiſches Magazin der Wiſſ. und Litterat. 3 Jahrg. 6 St. 1783. 8. S. 886. ſqq.

Dieſes ſo ſchnell wirkende Gift, und die Art, wie es dieſe Wirkung äuſſert, war der genaueſten Unterſuchung der Naturforſcher höchſt würdig. Man hat auch zu dieſer Abſicht Verſuche, hauptſächlich mit vierfüßigen Thieren angeſtellt. Die meiſten hiervon haben wir dem berühmten Madden (8), Nicholls (9), Langriſh (10), Vater (11), du Hamel (12), Rattray (13), und noch neuerlich dem ſcharfſinnigen Fontana (14), zu danken. Die meiſten dieſer Verſuche

(*) Bey den Engländern bald nach dem Mittag-Eſſen, gewöhnlich um 5 Uhr.

(8) Am ang. O.

(9) Vom Mead.

(10) Phyſical experiments upon brutes; in order to diſcover a ſafe and eaſy method of diſſolving the ſtone in the bladder by injections. To which is added a courſe of experiments with the Lauro-Ceraſus, in order to inveſtigate its effects on animal bodies, when given in ſuch ſmall doſes as not to kill &c. by *Browne Langriſh*. Lond. 1746. 8.

(11) Diſſ. de Laurocerafi indole venenata, exemplis hominum & brutorum ejus aqua enecatorum confirmatur. Vitemb. 1737. 4. B. Eb. Deſſ. Progr. de oleo animalis efficacia contra hydrophobiam, & veneno Laurocerafi, 1740.

(12) Traité des Arbres & Arbuſtes, To. 1. p. 347.

(13) Im London Chronicle, a. ang. O. S. 326.

(14) In Philoſ. Tranſact. Vol. LXX. P. 1. p. 210. ſqq. Ferner in Deſſen Traité ſur le vénin de la vipere, ſur les poiſons americains,



Pferde, Kaninchen und Tauben, sondern auch diejenigen Thiere, die ein kaltes Blut haben, die es so gar, wieder die Wirkungs-Art der übrigen Gifte, schneller tödtet, als die erstern; insonderheit hat man hierin mit Aalen Versuche gemacht. Schneller und wirksamer äussert es zwar seine schädliche Wirkungen, wenn es durch den Mund genommen, als wenn es durch andere Wege in den thierischen Körper gebracht wird. Nicht viel geringer aber sind doch die Zufälle, wenn es durch den After eingesprützt wird. Meistens äussert es seine Wirkungen in den Muskeln, die zuerst krampfhafte Bewegungen erleiden, und darauf paralytisch erschlaffet werden. Daß die mehrere oder wenigere Menge des Wassers, seine Stärke, und die Größe des Thieres, in den Wirkungen Veränderungen verursache, wird man um so leichter einsehen, da dieses der Fall fast bey allen Giften ist, die durch den Mund genommen werden. Wird dieses Wasser nur in geringer Quantität gegeben, so verursacht es bald stärkere, bald schwächere Convulsionen, die zuweilen selbst den Kopf nach dem Schwanze zurück ziehen; die hintern Glieder verlieren darauf das Vermögen sich zu bewegen; eben dies geschieht nachher mit den vordern Gliedern, das Thier kriecht daher taumelnd umher; später verliert der Hals und Kopf das Bewegungs-Vermögen, welche Theile hingegen von einer Seite zur andern beweget werden. Unter diesen Umständen behält es doch das Gesicht, Gehör, und die Bewegung der Glieder, wenn sie gestochen oder gedrückt werden. Einige Thiere erbrechen sich, andere purgieren, oder harnen häufig. Unter diesen Umständen ist ihr Athemhohlen erschwert. Gibt man dieses Wasser in größerer Quantität, so erfolgt kurz darauf der Tod, ohne daß Convulsionen vorher gehen, und der Körper scheint erschlafft zu seyn. Dieses Gift wirkt so schnell, daß es kaum in den Magen gekommen zu seyn scheint, wenn das Thier sich

wegung des Herzens in einem eben getödteten Thiere anfängt schwach zu werden. Dem sey wie ihm wolle, so lässet es sich doch nicht erklären, warum es hauptsächlich schädlich wird, wenn es durch den Mund in den thierischen Körper gebracht wird, da doch eine beträchtliche Wunde ihm weit mehrere Einsauge-Gefäße biethet, als der Mund oder Magen. Die giftigen Eigenschaften dieses Baumes verhindern deswegen nicht, daß seine den Sonnen-Strahlen ausgesetzte Blätter nicht eine gesunde Luft ausdunsten sollten.

Ich muß auch derjenigen Mittel gedenken, die ein Vermögen besitzen, dieses Gift zu entkräften. Ich habe bereits oben angeführt, daß viele Menschen diese Blätter, in Verbindung mit der Milch, ohne Schaden gebraucht haben. Ohne Zweifel haben die meisten von ihnen so wenig von diesem Gifte bekommen, daß sie seine schädliche Eigenschaften nicht hat angreifen können. Es haben auch Einige mit demselben angemachten Branntwein ohne Schaden getrunken. Man traue aber der Vermischung mit Milch nicht, es sey nun, daß dieses Gift durch seine Menge schädlich wird, oder daß eine besondere Disposition des Körpers zugleich mit Schuld hat. Ein Arzt und sein Stuben-Genoß tranken ein Maß Milch, darin 3 oder 4 Blätter dieses Baumes eingeweicht waren, mit Thee aus; die Folge war, daß der Freund des Arztes, der von einem gehabten Fieber noch schwach war, ohnmächtig wurde und zu Boden fiel; der Arzt selbst aber litt heftige Angst und Schwindel. So ward auch ein Hund, nach ½ Unze Kirschlorbeer-Wasser, taumelnd, bekam Krämpfe und so gar den Opisthotonus; durch die Milch wurde er zwar erleichtert, er crepirte aber doch nach vorher gegangenem Erbrechen und Purgieren. Dennoch gebe ich zu, daß die Milch unter den bis jetzt versuchten Gegen-Giften das vorzüglichste ist. Ein Hund, dem man dieses Wasser gegeben hatte, wurde durch

den

den Gebrauch der Milch völlig wieder hergeſtellet (15). Der ausgepreßte Saft dieſer Blätter konnte, wegen der Vermiſchung mit Milch, ungeachtet er ſchon Convulſionen und beſchwerliches Athemhohlen verurſacht hatte, dennoch einen Hund nicht tödten. Auch ein anderer Hund, dem man dieſes concentrirte Waſſer, mit Milch vermiſcht, gegeben hatte, crepirte nicht; vielleicht aber rettete ihn das erfolgte Erbrechen. Ein anderes Gegen-Gift ſcheint ein ſtarker Salmiak zu ſeyn, der einen Hund, welcher bereits die heftigſten Convulſionen hatte, des Gebrauches aller ſeiner Glieder beraubt, und dem Tode ſehr nahe war, indem man ihm denſelben vor die Naſe hielt und auch in kleiner Quantität eingab, wieder zu ſich ſelbſt brachte, und durch wiederhohlte Anwendung deſſelben völlig wieder herſtellte. Doch kann man von einem einzigen Verſuche nicht mit Gewißheit ſchließen. Aus eben dieſer Urſache kann man auch bis jetzt noch nicht das Baum-Oehl zu dieſer Abſicht anpreiſen, welches zwar einem Hunde, zu 1 Unze eingegeben, das Leben und die Geſundheit wieder gab, da ihm 3 U. deſtilliertes Kirſchlorbeer-Waſſer Convulſionen verurſachet, und ihn dem Tode ſehr nahe gebracht hatten; einen andern hingegen, dem doch weniger von dieſem Waſſer gegeben war, konnte es nicht vom Tode erretten.

Cpn. *Maxim. Cnopſii* obſ. de foliorum lauroceraſi ſine noxa euidenti hauſto infuſo, ſt. im *Commerc. litter. Nor.* A. 1733, hebd. 26, p. 201.

Extract of a Letter from *John Rutty* to Dr. Mortimer, dated at Dublin, May 17. 1732, concerning the poiſon of Laurel-Water, ſt. in den *Philoſ. Tranſact.* Vol. XLI. P. 1, No. 452, for Jan. F. & March 1739, S. 63, f.

Von der Schädlichkeit der Laurus- oder ſo genannten Mandel-Blätter, ſt. im 4 St. der Stuttg. Select. phyſ. oecon. 1751, 8. S. 349 — 351.

Erfahrungen von der Schädlichkeit der Blätter des Kirſchlorbeer-Baums, aus dem Journ. oecon. Nov. 1752, S. 45, fgg. überſ. ſt. im 5 St. des 1 Th. des gemeinnütz. Nat. und Kunſt-Ma-

gaz.

(15) *Rutty*, in Philoſ. Tranſact. Vol. 37, p. 100.

gaz. Berl. 1763, 8. S. 597 — 601, und im 24 St. des 6 Th. der neuen Auszüge ꝛc. Frf. und Mannh. 1767, 8. S. 374 — 379.

Von dem Kirschlorbeerbaumwasser, aus *Mead's* account of poisons, p. 275, f. übers. st. im 12 Th. der ökon. physical. Abhandl. Lpz. 1757, 8. S. 808 — 823.

Von der Wirkung des Kirschlorbeerwassers, s. Hrn. Hofr. Baldinger neues Magaz. für Aerzte, 7 B. 6 St. S. 519, f.

Nur sehr wenige haben bis jetzt das Kirschlorbeer-Wasser in der Arzneykunst angewandt. Es ist auch zu wünschen, daß diejenigen, welche kühne Nachahmer zu seyn pflegen, bey dem Gebrauche desselben, die einem rechtschaffenen Arzte so nöthige Vorsicht nicht überschreiten mögen. Seine magenstärkende Eigenschaft, wegen welcher es Trinker ohne Zweifel ihrem Branntweine beymischen, schätze ich nicht sehr, da wir zu dieser Absicht sicherere und wirksamere Mittel haben. Dennoch bekam ein Hund, dem man täglich 2 bis 3 Tropfen dieses Wassers eingab, stärkern Appetit, und wurde fett. Linné (16) faßt sich zu kurz, wenn er sagt, daß diese Blätter in Holland gewöhnlich wieder Krankheiten, welche die Lunge verzehren, als Thee getrunken würden. Daß er unter dieser Benennung die Schwindsucht verstehe, erhellet aus seiner Materia medica (17). Daß man die Schwindsucht, von der es so verschiedene Arten gibt, oft mit der Hektik verwechsele, ist bekannt. Baylies (18) glaubt, daß dieses Wasser in der Hektik von großer Wirksamkeit sey, weil es das zu dicke Blut-Wasser verdünne, und ein zu dickes Blut gewöhnlich mit der Hektik verbunden sey. Wir wissen aber, daß dieses Wasser, ohne Hitze zu verursachen, das Blut verdünnet. Das Blut war bey einem Menschen von melancholischem Temperamente, und welcher verschiedene Zufälle hatte, so dick, daß es, nach-

(16) Amoenit. acad. To. 4, p. 40.

(17) Ed. 1, n. 228.

(18) Practical essays on medical subjects, p. 37.

nachdem es aus der Ader gelaſſen war, und auf dem Teller die gehörige Zeit geſtanden hatte, kaum den vierten Theil Blut-Waſſer enthielt, nach dreywochigem Gebrauche dieſes deſtillierten Waſſers aber hatten alle Zufälle aufgehört, und das Blut hatte ſeine gehörige Farbe und Flüſſigkeit wieder erhalten. Ein ähnlich fehlerhaftes Blut in einem rheumatiſchen und aſthmatiſchen Menſchen, wurde gleichfalls durch dieſes Waſſer verbeſſert. Man bediente ſich aber eines ſehr ſaturirten Waſſers; denn zu 1 Pinte (16 Unzen) gemeinen Waſſers, hatte man 1 Pfund Blätter genommen, und von dieſem ließ man täglich 3, 4 oder mehr Mahl 60 Tropfen nehmen. Sehr oft hat es dem ber. Cameron geglückt, durch einen Aufguß dieſer Blätter, die hartnäckigſten Verſtopfungen der Leber zu zertheilen; und vermittelſt eines Brey-Umſchlages aus Hirſen-Mehl und dem geſättigten Aufguſſe der Kirſchlorbeer-Blätter, oder dem deſtillierten Waſſer derſelben, nicht allein ſcirrhöſe Geſchwülſte, die ſehr hart und krebsartig waren, merklich zu verringern, ſondern ſie auch wirklich zu zertheilen. Sowohl der innerliche Gebrauch dieſes Waſſers, täglich vier Mahl zu 60 bis 80, ja 100 Tropfen gereicht, als auch die äuſſerliche Anwendung deſſelben auf Carpie, ſchaffte einer Frau einigen Nutzen, der nach abgenommener Bruſt eine Geſchwulſt von der Größe einer Wallnuß, mit einem ſtechenden Schmerze begleitet, unter der Achſel entſtanden war, indem die Geſchwulſt und der Schmerz ſich verminderten, und ſelbſt das Geſchwür heilte; allein, die Geſchwulſt und der Schmerz vermehrten ſich wieder, und es erfolgte endlich der Tod (19). Mit dem Aufguſſe der Blätter hat Buchotz ein rotziges Pferd curirt, und daſſelbe anfangs

(19) Vogel chirurg. Wahrnehm. 1 Samml. S. 48.

fangs 2 Quent, und am 27sten Tage 9 Unzen saufen lassen (20).

* * *

Mit der Benennung **Purgier-Kirsche** belegt man:

1. Eine Art Garten-Kirschen, welche schmahle Blätter wie die Rain-Weiden haben, von keinem angenehmen Geschmacke sind, aber den Leib mehr, als andere Kirschen, öffnen. Mit Unrecht wird auch die ob. S. 72, beschriebene Schwefel-Kirsche also genannt.

2. Die Hecken-Kirsche, Lonicera Xylosteum *L.* s. oben, S. 146.

3. Eine Art Kreutz-Dornes, welche auf den hohen Gebirgen des mittägigen Europa wächst, Rhamnus alpinus *L.*; s. **Kreutz-Dorn.**

* * *

Unter **Teufels-Kirsche**, versteht man: 1. die Beeren des Wald-Nachtschattens, Atropa Belladonna *L.* welche auch **Toll-Kirschen** genannt werden. Siehe im Art. Nachtschatten.

2. Die Beeren der im XXXI Th. S. 621, fgg. beschriebenen **Juden-Kirschen**, Physalis Alkekengi *L.*

3. Die Beeren der oben beschriebenen **Hecken-Kirsche**, Lonicera Xylosteum *L.*

4. Die Beeren der weißen Zaun-Rübe, Bryonia alba *L.* welche auch **Hunds-Kirsche**, und **Kürbiß-Kirsche**, genannt wird.

* * *

Den Nahmen **Trauben-Kirsche** führt:

I. Eine Art Kirschen, wo ihrer mehrere an einem Haupt-Stängel sitzen; s. oben, S. 44.

II.

(20) S. Dessen Briefe, Th. 1, S. 386.

II. Die Frucht des Prunus Padus, welcher ſich von dem Kirſch-Lorbeerbaume gar nicht unterſcheiden läſſet, auch ſo gar in Anſehung der Art zu blühen damit überein kommt. Es ſind davon verſchiedene Arten bekannt.

1. Die **Ahl-Kirſche, Alp-Kirſche, Axe, Büſchel-Kirſche, Elſebeere, Elſenbeere, Gicht-Beere, Haubeere, Hohl-Kirſche, Hühneraugen-Beere, Raulbeere, Rintſchelbeere, moscovitiſche Lorbeer-Kirſche, Olt-Kirſche, Tölpelchen, Trieſelbeere, ſchwarze Vogel-Kirſche, Wald-Kirſche.** Der Baum, der ſie trägt, heißt: Alt-Baum, Dirleinsbaum, deutſcher Drachenbaum, Ehlen, Eley, Elpel, Elzbeerbaum, Elxen, Epen, Eſlen, Faulbaum, Haarholz, Hexenbaum, Hunds-Baum, Randelwiede, Ritſchbaum, Mayenbuſch, Oehlbeerbaum, Olantbaum, Papſtweide, Patſcherpen, Potſcherpen, Scherpchen, Scherpken, Steinbaum, Stinkbaum, Tölpelchensbaum, ſchwarze Weide, Waſſerſchlinge, Wiedebaum, Cerasus racemola ſylueſtris, fructu non eduli *C. B. du Ham.* Padus avium, glandulis duabus baſi follorum ſubiectis *Mill.* Prunus Padus, floribus racemoſis, foliis deciduis baſi ſubtus biglanduloſis *Linn.* Fr. Ceriſier à grappes, dont le fruit n'eſt pas mangeable; le Putier in Lothringen; Engl. The common Bird-Cherry. Iſt in ganz Europa zu Hauſe, wo ſie in Wäldern und an Gehägen wild wächſt. Sie ſteht beſonders gern in niedrigen und feuchten Gegenden, wie z. B. in Brüchen zwiſchen den Ellern, denen ſie auch, wenn die Blätter abgefallen ſind, dem äuſſern Anſehen nach ſehr ähnlich iſt, und mit denen ſie daher von vielen Forſtleuten verwechſelt wird. Die Blätter ſind oval länglich, über 3 Z. lang, und 2 Z. breit. Der äuſſere Rand iſt ſägeförmig eingeſchnitten; und am Ende eines jeden Blattes laſſen ſich auf der untern Fläche an dem

Stiele zwey kleine Drüsen bemerken, die in der Beschreibung des Linné ein Haupt-Kennzeichen dieser Art abgeben. Bisweilen findet man sie auf einigen Blättern am Ende des Blattes nach der entgegen gesetzten Seite hin. Die obere Fläche ist hellgrün, glänzend; die untere mehr weißlich, und in der Mitte mit einer weißlichen erhabenen Ader durchzogen, welche nach den Seiten kleinere Reben-Aeste abschickt. Sie blühet im May und Jun. Die Blumen haben runde weiße Blätter, welche am Rande gezahnt sind, der Länge nach an einem gemeinschaftlichen Stiele ährenweise sitzen, und den Baum in großer Menge bekleiden. Die Blumendecke ist in ihren Einschnitten nicht zurück gebogen, und von unangenehmen Geruche, obgleich der Geschmack etwas Pfirsichenartiges hat. Die Frucht ist eine kleine runde Beere, in der Größe einer Erbse von mittlerer Größe. Sie ist anfangs grün, wird nachher roth, und zur Zeit der Reife im Aug. und Sept. schwarz.

Es gibt auch eine Abart mit reifen rothen Beeren, welche in England unter dem Nahmen Cornish Cluster- oder Bird-Cherry (Cornwallis-Trauben-Kirsche) bekannt ist; Padus rubra, foliis lanceolato-ovatis deciduis, petiolis biglandulosis *Mill.* Diese Abart, deren Vaterland Armenien ist, hat gewöhnlich einen höhern aufrechten Stamm, eine dichtere regelmäßigere Krone, breitere, und wie die der Haupt-Art an der Rückseite der Basis mit zwey Drüsen versehene Blätter, und kürzere dichtere Blumen-Trauben, welche größere und rothe Beeren hinterlassen.

Es soll auch eine Varietät mit reifen weißen Beeren geben.

Die Rinde der Zweige ist braun, hin und wieder mit kleinen Warzen besetzt. Das Holz ist weiß, und hat in frischem Zustande, wie die zerriebenen Blätter, einen unangenehmen Geruch. Durch die Beeren pflanzt sich dieser Baum leicht von selbst fort, und diese wer-

werden von den Vögeln häufig ausgeſtreuet. Man ſetzt denſelben auch in die Plantagen und Luſt-Wälder, denen er durch die häufigen Blumen-Büſchel im Frühlinge ein ſchönes Anſehen gibt. Der Stamm treibt in lockern Boden eine Menge junge Brut hervor, und erhält eine mittelmäßige Höhe und Dicke. Man empfiehlt den Anbau dieſes Baumes in niedrigen, moraſtigen Gegenden, welche der Ueberſchwemmung ausgeſetzt ſind; er wird daſelbſt durch die häufigen Neben-Sproſſen bald zu einem Strauche. Er dient auch, die Ufer an reiſſenden Ströhmen zu befeſtigen, indem er dieſe ſtark durchwurzelt. Einige empfehlen ſolchen zu Hecken; er ſtirbt aber in feſten Hecken leicht ab, und ſauget das Erdreich ſehr aus. Einige bedienen ſich der Stämme, um die beſten Kirſch-Sorten darauf zu pflanzen. Gemeiniglich wird das Holz unter anderm Schlag-Holze mit abgetrieben, da es denn, wenn es ſtark genug iſt, zu verſchiedenen Drechsler-Arbeiten, und andern kleinen Hausgeräthe, inſonderheit zu den Büchſen-Schäften, gebraucht werden kann. Es erhält zuweilen den Nahmen St. Lucien-Holz, und wird mit dem oben beſchriebenen Mahaleb-Kirſchbaume verwechſelt. Aus den Aeſten macht man Tobacks-Röhre. Mit der innern Rinde des Holzes wird grün, und vorzüglich, vielleicht aus einem Aberglauben, die Vogel-Netze damit gefärbet.

Die Beeren ſind von einem ſüßen, aber unangenehmen Geſchmacke. Bey uns werden ſolche nicht gegeſſen; die Kamtſchadalen und Schweden eſſen dieſelben mit Salz beſtreut, und die Lappländer mit Wein oder Branntwein getränkt. Sie verſtopfen den Leib, und werden von Einigen wieder den Durchfall und die rothe Ruhr gebraucht. Den Beeren gehen die Geſang-Vögel ſo ſtark nach, daß man ſie darum Vogel-Kirſche genannt hat, und daß manche Garten-Freunde den Baum in der Abſicht, die gefiederten Sänger

in recht großer Anzahl einzuladen, in mehr als gewöhnlicher Menge in ihre Plantagen aufnehmen. Als der Aberglaube noch Mode war, pflegte man die Beeren den Kindern anzuhängen, um dieselben von der fallenden Sucht zu befreyen; und die Bauern sammelten am Walpurgis-Tage Zweige von diesem Baume, um sich und ihr Vieh gegen die Zaubereyen sicher zu stellen, weshalb er auch Hexen-Baum genannt wurde.

Nach des kön. schwed. Provincial-Arztes Bengt Björnlund Bemerkung, hat das Decoct der Rinde in gelinden venerischen Zufällen seine Wirksamkeit gezeigt, und in schwerern zur glücklichen Beendigung der Cur das seinige beygetragen.

Aus den von ihm, im 5 B. der übers. Neuen Abhandl. der kön. schwed. Akad. d. Wiss. für das Jahr 1784, (Lpz. 1786, gr. 8.) S. 212, fgg. angeführten 11 Vorfällen kann man abnehmen, daß das Decoct der Rinde des Elzbeerbaumes in venerischen Krankheiten kräftig ist, und in gelinden Zufällen zu helfen scheint. In Anleitung dessen, kann es 1. mit dem Gebrauche des Queckſilbers zugleich mit Nutzen angewendet werden; besonders da es ein zu leicht zu habendes und wohlfeiles Mittel ist, kann es für Arme angewendet werden, um die Kosten bey der Cur zu ersparen, statt der andern theuern Simplicien aus dem Gewächs-Reiche, als: Guajacum, Sassafras, Sassaparille, u. a. welche man oft entbehren kann. 2. Dient es als magenstärkendes Mittel, welches so oft bey der Cur angezeigt wird; und da es von weit milderer Natur ist, als manche andere blutreinigende Mittel, so kann es um so sicherer beygefüget werden. In dem Falle, daß eine scorbutische Schärfe zugleich mit der venerischen im Körper vorhanden seyn sollte, wobey die Queckſilber-Mittel, bevor jene nicht verbessert wird, schaden können, dient dieses als ein gutes Vorbereitungs-Mittel. 3. Da dasselbe in gelinden Zufällen hilft, so können die Armen hiermit den Fortgang der Krankheit hemmen, bis sie auf öffentliche Kosten, entweder in einem Hospitale, oder unter der Aufsicht und Sorge eines Arztes, Gelegenheit zur völligen Cur bekommen können. 4. Als eine gute Nach-Cur nach venerischen Krankheiten, da es oft als stärkendes Mittel zu

Stat-

Statten kommen, und die kleinen Ueberreste ausführen kann.

Die Dosis des Decoctes, welche täglich gebraucht wird, ist 1 Quart, welches Maß nicht überschritten werden muß, weil es sonst früher oder später dem Magen zur Last wird. Bey dem Gebrauche ist die Dosis jedes Mahl ½ Nößel, täglich 4 Mahl. Tobackrauchen muß gleich darauf vermieden werden, um den Ekel zu vermindern. In dieser Quantität fällt das Decoct, ob es gleich etwas unangenehm ist, nicht zur Last; doch kann es geschehen, daß die Patienten die ersten Tage gleich darauf etwas übel werden, und einige Magen-Beschwerden haben, welches sich aber bald darauf verliert.

Die Bereitung des Decoctes ist folgende. Auf die frische, oder trockne, klein gehackte Rinde zu 12 oder 16 Loth, wird eine Kanne See-Wasser genommen, oder, wo dieses fehlt, Quell-Wasser, welches in einem kupfernen Kessel gelinde bis auf die Hälfte eingekocht wird, oder bis auf 4 Pfund, worauf es vom Feuer genommen, zum Kaltwerden hingestellet, und zum Gebrauch auf Flaschen gefüllet wird. Durch die Untersuchung des Decoctes mit Eisen-Vitriol, findet man, daß es etwas adstringirender Natur ist; doch hat Hr. B. beym Tripper, oder in andern ähnlichen Fällen, nicht die geringste üble Wirkung davon verspürt.

Ausser der angeführten Wirkung des Decoctes in venerischen Krankheiten, als Vorbereitungs-Mittel, und bey der Cur als magenstärkendes, scheint es auch in ödematösen Zufällen, in Cachexie und Ausschlägen, von Nutzen zu seyn.

Wenn man Zweige mit der Blüthe auf den Korn-Böden und in den Scheunen unter das Korn legt, sollen dadurch die Mäuse abgehalten werden. Eben damit, wenn man sie in die Krippe legt, soll man die Pferde von dem Fressen abhalten können.

Uebrigens wird der Baum von Vielen mit dem im XII Th. S. 294, fgg. beschriebenen Faulbaume verwechselt, von welchem aber derselbe ganz unterschieden ist.

2. **Die virginische Trauben-Kirsche, der virginische wilde Kirschbaum**, Cerasus sylvestris,

fructu nigricante, in racemis longis pendulis, Phytolaccae inſtar congeſtis *du Ham. Gronov.* Padus Virginiana, foliis oblongo ovatis ſerratis acuminatis deciduis, baſi antice glanduloſis *Mill.* Prunus Virginiana, floribus racemoſis, foliis deciduis, baſi antice glanduloſis *Linn.* Fr. Ceriſier de Virginie, Engl. Virginia Bird-Cherry-Tree. Dieſer Baum wächſt, nach des berühmten Hrn. v. Wangenheim (deſſen Bildniß gegenwärtigen Theil ziert) Beſchreibung (*), unter dem gemäßigten Himmelsſtriche in Nord-Amerika in ſeiner größten Vollkommenheit. In Neu-York Provinz unter dem 41ſten Grade nördlicher Breite, erhält derſelbe eine Höhe von 30 bis 40 F., und eine Stärke von 2 F. im Durchſchnitt. Der Wuchs iſt dabey ziemlich ſchnell, weil aus 40jährigen Bäumen ſchon Breter geſchnitten werden können. Er ſteht am häufigſten an den Sommer-Wänden und am Fuße der Berge, an Ebenen und auf Hügeln, auf einem trocknen, heißen, aus Lehm, Sand und guter Erde gemiſchten lockern Boden; ſo gar wächſt er auf einem mit ein wenig Lehm gemiſchten, dürren Sande, nur mit dem Unterſchiede, daß der Wuchs nicht ſo ſchnell, auch die Höhe und Stärke der Bäume nicht ſo anſehnlich iſt; im Gegentheil iſt das auf dürren Flecken gewachſene Holz zum Verarbeiten das ſchätzbarſte.

Die Blätter ſind lang, oval, zugeſpitzt; der Rand iſt gezahnt. Auf der obern Seite der Blätter-Stiele ſitzen zwey kleine Drüſen. Beyde Flächen ſind glatt und von dunkelgrüner Farbe. Das Rindvieh rührt die Blätter nur bey dem größten Hunger, im Frühlinge, wenn ſie eben hervor brechen, an; ſie ſchwellen aber

(*) Beytrag zur teutſchen holzgerechten Forſtwiſſenſchaft, die Anpflanzung nordamerikaniſcher Holzarten, mit Anwendung auf teutſche Forſte, betreffend, von Fr. Adam Julius von Wangenheim. Mit Original-Zeichnungen, (Götting. 1787, 8.) S. 34, f.

aber davon auf, und erkranken. Wenn die Blätter völlig hervor gekommen sind, bricht die Blüthe gegen Ende des Mayes hervor; sie ist weiß, zwitterartig, von angenehmen Geruche, und sitzt an 3 bis 4 langen Träubchen, deren Haupt-Fruchtstiel ausserdem 2 bis 3 Z. lang ist. Wo die Blüthen sich endigen, sitzen gemeiniglich noch 2 Blättchen an dem Frucht-Stiele. Die Frucht, welche eine kleine, runde, fleischichte, glänzende, schwarze Kirsche ist, und einen einzigen ovalen, fast runden, steinartigen Samen enthält, reifet von der Mitte bis zu Ende des Augustes, welches von der Lage und dem Boden, worauf die Bäume wachsen, abhängt; sie ist von einem bitter-süßlichen, etwas herben und zusammenziehenden, dabey doch nicht unangenehmen Geschmacke. Sie dient vielen Arten der Vögel, die darnach begierig sind, zur Speise, und findet auch unter den Menschen ihre Liebhaber, weil man sie für sehr gesund hält. Der innere Kern ist von einem bitterlichen, aber sehr kräftigen Geschmacke. Man zieht von den Kirschen einen guten Kirsch-Geist ab, welcher in der Güte wenige seines gleichen hat. Auch geben die frischen Kirschen, in Wein oder Rum eingelegt, und destilliert, ein kräftiges, und, wenn es mäßig gebraucht wird, gesundes Getränk.

Die Rinde ist rothbraun. Das Holz ist fest, bey starken Stämmen gelbbraun, sehr fein, häufig gemasert, und nimmt eine gute Politur an. Es wird von den Würmern nicht angegriffen; es gibt daher auch dem Holze des schwarzen Wallnuß-Baumes (Juglans nigra) wenig nach, und dient zu einem vortrefflichen Nutz- und Werk-Holze, dessen Werth sich noch ausserdem erhöhet, weil die aus dieser Holz-Art geschnittenen Breter weder reissen, noch sich werfen, und zu Arbeiten, die aus ganzen Stücken bestehen und nicht eingeleget werden sollen, unverbesserlich sind. Ausserdem gibt dieser Baum ein gutes Brenn- und Kohl-Holz.

Die Anpflanzung des virginischen wilden Kirsch-Baumes in Deutschland, ist in mancherley Absicht zu empfehlen. Der Nutzen davon wird sich nicht allein auf die Förste, sondern auch auf Privatpersonen und den Landmann, erstrecken. Denn er liefert zu vielerley Gebrauch ein Nutz- und Werk-Holz von Werthe, und es kommen ihm hierin nur wenige Hölzer, die Färbe-Hölzer und das Mahagony-Holz ausgenommen, bey. Auch erhält derselbe eine solche Stärke, daß ansehnliche Arbeiten daraus verfertiget werden können. Ferner ist er seines schnellen Wuchses halber, auch geschickt, dem Holz-Mangel abzuhelfen; und im 20sten Jahre würden die Stangen schon eine solche Stärke haben, daß sie vieles und zugleich gutes Brenn- und Kohl-Holz liefern. So ist auch ein sehr mittelmäßiger trockner Boden, ja ein schlechter sandiger, schon geschickt, diese Baum-Art darauf anzubauen. Daß unsere Winter und unser Klima dieser Holz-Art angemessen seyn, sie ihren schnellen Wuchs auch behalte, weiß man schon aus der Erfahrung.

Damit eine Anpflanzung in Deutschland wohl gerathe, wird erfordert, den Samen, wenn noch kein einheimischer zu haben ist, aus Neu-York, oder von solchen Oertern, die unter dem 41 und 42sten Grad nördl. Breite in Amerika liegen, kommen zu lassen. Die Steine werden von dem Fleische gesäubert, etwas an die Luft geleget, mit trockenem Sande gemischt in Fässer eingeschlagen, und so versendet. Hr. v. Wangenheim versichert aus Erfahrung, daß der Same auf diese Art sich ein ganzes Jahr gut erhält. Es hängt daher von einem Jeden ab, ob er im Herbste, oder im Frühlinge, säen will. Soll die Aussaat im Frühlinge geschehen, so wird der Boden dazu im Herbste zuvor gewandt, vor der Saat geebnet, locker gemacht, und von allem Unkraute gereiniget. Soll es aber im Herbste geschehen, so wendet man den Boden erst im Frühlinge.

linge. Jene Aussaat geschieht zu Ende des März, oder im April; und letztere, im October. Die Steine können in 1 Z. tiefe Rinnen, oder gehackte Löcher, 6 Z. von einander geleget und gedecket werden. Beyde Samen werden fast zu gleicher Zeit aufgehen, wofern der Same gut gewesen ist; und es ist schwer zu bestimmen, welcher Aussaat man den Vorzug geben solle. Wo Huten und Triften, die einen sandigen, schlechten, dürren Boden haben, sich finden, oder Privatpersonen dergleichen leere Plätze besitzen, ist eine Anpflanzung darauf von sechs- oder achtjährigen Stämmen nützlich, zu deren Behuf man die Pflänzlinge in Schulen zieht, die nicht allein nach 30 oder 40 Jahren gutes Nutz- und Werk-Holz liefern werden, sondern wo die Frucht noch ausserdem zu Kirsch-Geist zu nutzen ist. Bey Ansäung der Förste hängt es aber von der Lage der Gegenden, wo sie unternommen werden, ab, ob es nützlicher sey, bloß Werk-Holz zu ziehen, oder sie gegen das 20ste Jahr zu Brenn- und Kohl-Holz abzutreiben.

3. **Die nordamerikanische niedrige oder Zwerg-Traubenkirsche**, Prunus nana, floribus racemosis, foliis oblongo-ouatis acuminatis, argute serratis deciduis, basi antice glandulosis, *du Roi*. Engl. Dwarf Canada-Cluster-or Bird-Cherry, wächst in Amerika vom 4ten Gr. der Breite weiter nördlich, nur zu einem niedrigen Busch von 4 bis 6 F. Höhe, und einer unbeträchtlichen Stärke. Sie steht gemeiniglich nur auf einem dürren sandigen Boden. Die schwachen biegsamen Zweige breiten sich mehr auf der Erde aus, als daß sie aufgerichtet stehen. Die Rinde ist bräunlich, und das Holz weiß und zäh. Die Blüthe bricht zu Ende des Mayes hervor. Sie sitzt in ästigen Träubchen. Die Früchte werden zu Anfange des Sept. reif; sie bestehen aus kleinen schwärzlichen Kirschen, die bloß Vögeln zur Speise dienen. Die Blät-

ter sind länglich oval, glatt, an den Seiten fein ausgezahnt; die obere Fläche ist hellgrün, die untere weißlich; auf der obern Fläche des Blatt-Stieles befinden sich gewöhnlich zwey Drüsen. Blüthe, Frucht und Blätter haben eine große Aehnlichkeit mit unserer gemeinen Trauben-Kirsche; nur sind sie in allem um $\frac{1}{3}$ kleiner, und die Drüsen bey der amerikanischen Art sitzen auf der obern Fläche des Blatt-Stieles, an statt daß sie bey jener auf der untern sitzen.

Unter der Benennung: **Die aufrecht stehende canadische Trauben-Kirsche,** Engl. upright Canada-Cluster or Bird-Cherry, verkauft man in den englischen Pflanzschulen eine mit der vorhergehenden sehr nahe verwandte Art der Trauben-Kirsche, welche mehr baum- als strauchartig wächst, und vollkommen das Ansehen unserer gemeinen Trauben-Kirsche hat, ausser daß die Drüsen auf der obern Fläche des Blatt-Stieles befindlich sind.

4. **Die nordamerikanische immergrüne Trauben-Kirsche, Vogel-Kirschbaum aus Carolina, Falscher Mahagony-Baum,** Prunus Padus Carolina, foliis lanceolatis acute denticulatis semper virentibus *Mill.* Engl. The bastard Mahagony. Miller hat den Samen aus Carolina erhalten, gibt also den Baum als einen dort einheimischen, und, den Beeren und der ihm zugeschickten Beschreibung nach, als eine Trauben-Kirsche an, ungeachtet er in England noch nicht geblühet hat. Die Blätter stehen wechselweise auf $\frac{1}{2}$ Z. langen, purpurfarbigen Stielen an den Zweigen, sind immergrünend, länglich zugespitzt, 3 Z. lang, und etwas über 1 Z. breit. Ihr Rand ist weitläuftig mit spitzigen Zähnen versehen; beyde Flächen sind glatt, die obere ist schön hellgrün und glänzend, die untere matter in der Farbe und mehr weißgrünlich, auch der Länge nach mit einer erhabenen Ader mit feinen Nebenadern und einem feinen Ader-Gewebe gezeichnet.

Sie

Sie ſind dick und ſtark. Die Rinde an alten Zweigen iſt braun, an jüngern aber grün. So wenig an den Blättern, als an ihren Stielen, finden ſich Drüſen.

Die Vermehrung geſchieht durch Samen, und durch eingelegte Zweige. Mit Schnittlingen hat es Miller'n nicht glücken wollen. Dieſer Schriftſteller glaubt, daß der Stamm in ſeinem Wuchſe niedrig bleibt, weil die Zweige mehr in Seiten-Aeſte, als in die Höhe, ſchießen. So lange er noch jung iſt, ſoll man bey Kälte und böſem Wetter behutſam mit ihnen verfahren; bey mehrerm Alter halten ſie indeſſen in England in einem freyen offenen Boden und nicht zu kalten Stande, die Winter aus.

Das Holz gleicht an Feſtigkeit und Farbe dem Mahagony-Holze, und wird öfters dafür ausgegeben. Würden die Stämme bey uns dauerhaft ſeyn, ſo würden ſie durch ihr ſchönes grünes Laub, Gärten und Plantagen eine wahre Zierde geben.

* * *

Den Nahmen **Vogel-Kirſche** führen:

1. Die oben, S. 31, beſchriebene **wilde Kirſche**, Prunus avium *L.*

2. Die Frucht des Prunus Padus *L.*; ſ. oben, S. 177.

3. Die **Hecken-** oder **Zaun-Kirſche**, Lonicera Xylosteum *L.*; ſ. oben, S. 145.

Die **afrikaniſche Vogel-Kirſche**, iſt eine Art **Eiſen-Holzes**, Sideroxylon melanophleus *L.*

Kirſche, (Ahl.) ſiehe oben, S. 146, und 177.
— — (Alp-) ſ. oben, S. 177.
— — (Back-) ſ. oben, S. 73.
— — (Blaſen-) ſ. **Juden-Kirſche.**
— — (Bloder-) ſ. oben, S. 40.
— — (Bouquet-) ſ. oben, S. 44.



Kirſche.(Lorbeer-)

— — (Brunn-) ſ. oben, S. 75.
— — ſiehe oben, S. 177.
— —) ſ. oben, S. 186.
— —) ſ. Kornelle.
— —) ſ. oben, S. 44.
— —) ſ. oben, S. 73.
— —) ſ. Juden-Kirſche.
— —) ſ. oben, S. 40.
— —) ſ. oben, S. 146.
— —) ſchwarze, ſ. oben, S. 70.
— —) ſ. oben, S. 38.
— —) ſ. oben, S. 41, und 57.
— —) ſ. oben, S. 145, fgg.
— — (Herz-) rothe, oder frühe, ſ. oben, S. 51, und 58.
— — (—) ſchwarze, oder ſpäte, ſ. oben, S. 60 und 60

Kirſche, (Lorbeer-) moscovitiſche, ſiehe oben, S. 177.
— — (Loth-) ſ. oben, S. 70.
— — (Mahaleb-) ſ. oben, S. 27.
— — (Maraſquin-) ſ. oben, S. 132.
— — (May-) ſ. oben, S. 65.
— — (Mönchs-) ſ. Juden-Kirſche.
— — (Muskateller-) pragiſche, ſ. oben, S. 51.
— — (von der Natte) ſ. oben, S. 69.
— — (October-) ſ. oben, S. 76.
— — (Olt-) ſ. oben, S. 177.
— — (Oranien-) rothe, ſ. oben, S. 55.
— — (—) ſchwarze, ſ. oben, S. 56.
— — (pragiſche Muskateller-) ſ. oben, S. 51.
— — (Purgier-) ſ. oben, S. 73, 146, und 176.
— — (rothe Herz-) ſ. oben, S. 51, und 58.
— — (rothe ſpaniſche) ſ. oben, S. 63.
— — (ſaure) ſ. oben, S. 40.
— — (ſaure Einmach- und Back-) ſ. oben, S. 73.
— — (ſchwarze Forellen-) ſ. oben, S. 70.
— — (ſchwarze Herz-) ſ. oben, S. 40, u. 60.
— — (ſchwarze ſpaniſche) ſ. oben, S. 40.
— — (ſchwarze ſüße) ſ. oben, S. 40.
— — (Schwefel-) ſ. oben, S. 72.
— — (ſpaniſche) rothe, ſ. oben, S. 63.
— — (—) ſchwarze, ſ. oben, S. 60.
— — (—) weiße, ſ. oben, S. 61.
— — (Stein-) ſ. Juden-Kirſche.
— — (Succeſſions-) ſ. oben, S. 53.
— — (ſüße) ſchwarze, ſ. oben, S. 40.
— — (Teufels-) ſ. oben, S. 146, und 176.
— — (Toll-) ſ. oben, S. 176.
— — (Trauben-) ſ. oben, S. 44, und 176.

Kirſche, Trauben- [illegible] immergrüne, ſ. oben, S. 185.
— — — — [illegible] niedrige oder Zwerg-, ſ. oben, S. 185.
— — — — [illegible], ſ. oben, S. 181.
— — [illegible]ſche Kirſche, ſ. oben, S. 56.
— — [illegible], ſ. oben, S. 54.
— — [illegible]ſche Trauben-, ſ. oben, S. 181.
— — Vogel-, ſ. oben, S. 31, 146, und 187.
— — Wachs-, ſ. oben, S. 40.
— — Wald-, ſ. oben, S. 31, und 177.
— — weiſſe, ſ. Korn-Ile.
— — (weiſſe) ſ. oben, S. 40, und 60.
— — (—) Herz-, ſ. oben, S. 40 und 60.
— — (—) ſpaniſche, ſ. oben, S. 61.
— — (wilde) ſ. oben, S. 31.
— — (Winter-) ſ. Juden-Kirſche.
— — (Zwerg-) ſ. oben, S. 146.

Kirsch-Baum, (wälscher) siehe Kornelle.
— — — (wilder) s. oben, S. 31.
— — — (—) virginischer, s. oben, S. 181.
— — — (wohlriechender) s. oben, S. 27.
Kirschbaum-Raupe, s. oben, S. 94.
Kirsch-Beißer, s. Kirsch-Fink.
Kirsch-Branntwein, Geist, Ratafia, oder Spiritus, s. oben, S. 34, fgg. und 131, fgg.
Kirsch-braun, s. im VI Th. S. 536.
Kirsch-Compote, s. oben, S. 138.
Kirsch-Dieb, } s. Kirsch-Vogel.
Kirsch-Drossel, }
Kirsch-Eis, s. oben, S. 139.
Kirsch-Essig, s. oben, S. 138.
Kirsch-Extract, s. oben, S. 126, f.
Kirsch-Farbe, kirschfarbig, Fr. Couleur de cerise, ist eine rothe Farbe, welche der Frucht gleicht, die ihr den Nahmen gegeben hat.
Kirsch-Fink, eine Art brauner Finken, mit einem großen festen Schnabel, welcher die Kirsch-Steine, wie andere Vögel die Hanf-Körner, aufbeißt, und den Kern frißt, daher er auch Kern-Beißer, Kirsch-Beißer, Kirsch-Hacker, Kirsch-Knepper, (weil man ihn beym Aufbeißen der Kirsch-Steine knacken hören kann,) Kirsch-Leske, Kirsch-Schneller, brauner Stein-Beißer, Dickschnabel, genannt wird, aber nicht mit dem Kirsch-Vogel, einer Art Drosseln, welche nicht nach dem Kerne, sondern nach dem Fleische der Kirschen, lüstern ist, und welche ich weiter unten beschreiben werde, wie auch nicht mit dem Kreutz-Schnabel oder Kreutz-Vogel, Loxia curvirostra *L.* verwechselt werden muß. Seine deutsche Provinzial-Nahmen sind: Bollebick, Bollenbeißer, Lyßklicker, Nußpicker; in der Schweiz Klepper; Fringilla cerasorum, Fringilla rostrata; Coccothrauſtes *Gesn. Aldr.*

Kirsche, (Tra

— — (

— — (un

— — B

— — v

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

Kirsch-2

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

— —

Das Weibchen und Männchen sind von einerley Größe, und sich sehr ähnlich. Der Vogel hält sich das ganze Jahr am liebsten in Buchwäldern auf, wo er auch brütet, welches im April und May zu geschehen pflegt, da er denn gemeiniglich 4 bis 5 Junge ausbrütet. So bald die Kirschen kommen, theilt er sich in alle Gärten aus. Im August gehen sie schon wieder in den Wald. Doch streichen sie in diesem und dem folgenden Monathe. In Sardinien befinden sie sich, nach des Hrn. Abt Cetti Berichte (*), in jeder Jahreszeit. Zu Anfange des Aprils aber versammeln sie sich in großer Menge auf den Ulmbäumen, deren Blüthen sie abfressen.

„Vor einigen Jahren," schreibt Hr. Cetti: „ließ ich „mir viele von diesen Vögeln schießen, und bringen. Ich „fand hierbey nicht ohne Verwunderung, daß die meisten „weiblichen Geschlechts waren, und daß die geringe Anzahl der Männchen in sehr ungleichem Verhältnisse mit „ihnen stand. Um desto sicherer zu gehen, verließ ich mich „nicht bloß auf die äussere Gestalt, sondern zergliederte den „Vogel. Das nähmliche beobachtete ich die folgenden „zwey Jahre darauf, und im vierten bemühte ich mich, das „genaue Verhältniß der Zahl der Männchen zu den Weibchen zu entdecken, und fand dieselben wie 1 zu 2. Man „könnte nun fragen, ob in Sardinien von dieser Art Vögel mehr Weibchen zur Welt kommen, als Männchen? „oder gehen die Weibchen den Ulmbaumblättern mehr „nach, als die Männchen? Oder sind die überzähligen „Weibchen Sardiniens Zug-Vögel? Diese letztere Vermuthung, so seltsam sie immer scheinen mag, ist doch von „ungefähr die richtigste. Es ist bekannt, daß von einigen „Arten der Vögel bloß die Weibchen streichen, wie z. B. „die Reißfresser (Emberiza oryzivora L.), deren Weibchen „im Herbste von Cuba nach Carolina übersetzen. Wichtiger ist es, daß das nähmliche bey dem Buch-Finken geschieht, deren Weibchen gleichfalls aus Holland nach Ita-

„lien

(*) In seiner aus dem Ital. übers. Naturgeschichte von Sardinien, 2 Th. (Lpz. 1784, 8.) S. 179, 199.

„lien wandern. Es ist also nicht nur nicht wiederspre-
„chend, sondern völlig gewiß, daß die Weibchen des Buch-
„Finken, eine sehr nahe Gattung des Kernbeißers, in an-
„dere Gegenden streichen, welches aus diesem Grunde
„auch in Ansehung des Kirsch-Finken ziemlich viel Wahr-
„scheinlichkeit hat.

„Wenn der Ulmbaum verblüht ist, folgt die Blühezeit
„der Kirschbäume. Allein, diese sind eben nicht in hinrei-
„chender Menge vorhanden, daß die Kernbeißer alsdann
„nicht Mangel leiden dürften. Um Kirschbäume aufzufin-
„den, müssen sie selbst in Sardinien umher wandern, und
„zwar nach dem Flusse bey Bosa, in die Weinberge von
„Santo Lussurgin, nach Villasidro und Iglesias. Weiter
„finden sie dieselben in Arizzo, in Atzara, und seit einigen
„Jahren in den Weinbergen und Gärten um Sassari. An-
„derwärts würde man Kirschbäume insgemein vergebens
„suchen. Seit der grausamen von den Carthaginensern
„unternommenen Verheerung aller Obstbäume des Königs-
„reiches (*), hat man bisher an eine solche Verbesserung
„oder Wiederherstellung noch wenig gedacht. Selbst nach
„der Haupt-Stadt werden die Kirschen aus einer Entfern-
„ung von 30 Meilen, wie es nicht anders möglich ist, gar
„sehr zerdrückt und zerquetscht, gebracht."

Der Kirsch-Fink hat unter unsern Land-Vögeln, seiner Größe nach, den dicksten und stärksten Schnabel; er frißt aber bloß Körner, und zwar nicht nur von allerley Gesäme, insonderheit Hanf- Rettig- und Rübe-Samen, sondern auch Kirsch-Kerne, Schlehen, Eicheln, Buch-Samen, und Wachholderbeeren. Er besitzt das Vermögen, diese Kerne, wie auch den Samen von den Hain-Büchen, den ein Mensch, der gute Zähne hat, kaum zu zerbeißen vermag, gar leicht, geschwinde, und lange nach einander, zu zerknirschen. Dieses thut er nicht nur zur Noth, oder wenn er vom Hunger getrieben wird, wie der Verf. der angenehmen Landlust, S. 200, schreibt, sondern

(*) Im Jahr der Welt 3449. 50. Die Carthaginenser setzten Todes-Strafe darauf, wer einen Baum pflanzte.

dern aus Lust; denn er lässet alles andere kleine Gesäme liegen, so lange er Kirsch-Kerne haben kann. Daher führt er seine Jungen häufig in unsere Gärten, wo Kirschbäume sind, und ist, wenn er nicht verjaget wird, die meiste Tageszeit damit beschäftigt, daß er die reifen Kirschen abschälet, die Steine heraus nimmt, selbige aufbeißt, und das Inwendige seinen Jungen in das Maul steckt. Dazu ist sein Schnabel auch von innen besonders eingerichtet, an dessen untern Theile ein Ansatz befindlich ist, daß der Stein beym Drucke nicht weichen kann; der obere Theil aber ist mit rauhen Erhöhungen und Vertiefungen versehen, vermittelst welcher der Stein, bey seinem, auf festen Beinen und starken Muskeln bestehenden Kinne, leicht zerdrückt werden kann. Von dem Schaden, den dieser Vogel an den Kirschen thut, s. oben, S. 97, f. Wenn er keine Kirschen mehr findet, greift er die Stabel-Erbsen an, deren Schoten er aufhauet, und solcher Gestalt ganze Beete verwüstet. Eingesperrt kann man ihn bey Hirse-Kleyen mit Milch, wozu er sich leicht gewöhnen lässet, lange erhalten.

Diese Vögel setzen sich, bey ihrer Ankunft, in die kleinen Gehaue, nisten auf den Bäumen, und bauen das Nest gewöhnlich 10 bis 12 F. hoch an dem Stamme, da wo die großen Aeste heraus kommen. Sie bauen dasselbe wie die Turtel-Tauben aus trocknen Baum-Reisern, und weben kleine Wurzeln dazwischen. Sie legen gemeiniglich 5 braungefleckte Eyer.

Das Nest eines Kernbeißers, welches man am 24 Apr., 10 bis 12 F. hoch, auf einem Pflaumbaume fand, saß zwischen den Gabeln eines Astes. Es war halb kugelförmig, und auswärts von kleinen Wurzeln und Baum-Flechten, inwendig aber von zartern und feinern Wurzeln gemacht, worin 4 etwas zugespitzte Eyer lagen, deren größter Diameter 9 bis 10, der kleinste 6 Lin., betrug. Auf ihrem hellblauen Grunde waren olivenfarbig braune Flecken, und schwärzliche Striche.

Hr. Graf v. Büffon hält es für glaublich, daß die Kirſch-Finken im Jahre nur ein Mahl brüten, weil ihre Art ſo wenig zahlreich iſt. Zorn hingegen ſagt, daß ſie zwey Mahl brüten. Sie ernähren ihre Jungen mit kleinen Inſecten, Raupen, u. d. gl.; und wenn man dieſelben aus dem Neſte nehmen will, vertheidigen ſie dieſelben muthig, und beißen ſtark.

Es iſt ein ſtiller Vogel, deſſen Stimme man ſelten hört, und der weder einen Geſang, noch ein beſtimmtes Geſchrey hat. Bey dem Männchen iſt die Stimme ſtärker und häufiger, als bey dem Weibchen, welches nur einen einfachen, etwas ſchleppenden und heiſern Ton hören läſſet, den es von Zeit zu Zeit wiederhohlt.

Wenn man in der Kirſch-Zeit einen Lock-Vogel auf eine hohe Stange ſetzt, und eine kleine Staude dazu hinauf bindet, welche mit Leim-Spindeln verſehen

sondern Käfiche halten, denn sie tödten die schwächern, bey ihnen eingeschlossenen Vögel in aller Stille, ohne zänkisch zu scheinen, und stoßen nicht mit der Spitze des Schnabels nach ihnen, sondern kneifen die Haut, und reissen Stücke davon ab.

Das Fleisch dieses Vogels ist fett, und gibt dem Menschen eine gesunde und schmackhafte Nahrung. Nach dem Forst- und Jagd-Lexicon, (Th. 2, Col. 484) führt dieser Vogel viel flüchtiges Oehl bey sich, dient wieder das böse Wesen, und treibt den Urin, wenn er gegessen, oder abgekocht und als ein Trank gebraucht wird. In dieser Absicht wird sie nun wohl kein Arzt vorzüglich empfehlen; indessen werden sie von Einigen lieber, als die Krammets-Vögel, gegessen.

Es gibt verschiedene ausländische Vögel, welche mit dem Kornbeißer Aehnlichkeit haben. Man findet dieselben in Hrn. v. Büffon Naturgesch. der Vögel, nach der mit Anmerk. und Zusätzen vermehrten Uebersetz. des Hrn. Prof. Otto, 10 B. (Berl. 1784, 8.) S. 54, fgg. beschrieben, und abgebildet.

Bemerkungen über einige Vögel vom Vorgebirge der guten Hoffnung, zur Gattung der Kernbeisser (Loxia) gehörig, von C. P. Thunberg, s. im 5 B. der übers. Neuen Abhandl. der kön. schwed. Akad. d. Wiss. für das Jahr 1784, (Lpz. 1786,) S. 287, fgg.

Kirsch-Flecken, wie solche aus leinenen, wollenen und seidenen Zeugen zu bringen, s. im XIV Th. S. 107, f.

Kirsch-Fleisch, (Eingemachtes) s. oben, S. 122, f.

Kirsch-Gefrornes, oder Glace; s. oben, S. 139.

Kirsch-Geist, s. Kirsch-Branntwein.

Kirsch-Gelee, s. oben, S. 138, f.

Kirsch-Gummi, Kirsch-Harz; s. oben, S. 33, 37, f. und 84.

Kirsch-Hacker, s. Kirsch-Fink.

Kirsch-Harz, s. Kirsch-Gummi.

Kirsch-Holder, Kirschholdr; s. Kirsch-Vogel.

Kirſch-Iſopp, Ciſtus Helianthemum *L.*; ſ. Th. XX, S. 318.

Kirſch-Kalteſchale, ſ. oben, S. 138.

Kirſch-Kern, ſ. oben, S. 80; ihre mediciniſche Kraft, S. 116; Ratafia davon, S. 132.

Kirſch-Knepper, ſ. Kirſch-Fink.

Kirſch-Kuchen, ſ. oben, S. 134, fgg. und 140.

Kirſch-Leske, ſ. Kirſch-Fink.

Kirſch-Lorbeerbaum, Kirſch-Lorbeere; ſ. oben, S. 153, fgg.

Kirſch-Marzipan, ſ. oben, S. 139.

Kirſch-Meth, ſ. oben, S. 131.

Kirſch-Mus, ſ. oben, S. 133, f.

Kirſch-Paſte, ſ. oben, S. 127, f.

Kirſch-Pflaume, Fr. Ceriſette; ſ. unter **Pflaume.**

Kirſch-Ratafia, ſ. **Kirſch-Branntwein.**

Kirſch-Saft, ſ. oben, S. 124, fgg.

Kirſch-Säure, deren chemiſche Unterſuchung; ſ. oben, S. 103, fgg.

Kirſch-Schneller, ſ. **Kirſch-Fink.**

Kirſch-Spiritus, ſ. **Kirſch-Branntwein.**

Kirſch-Suppe, ſ. oben, S. 137.

Kirſch-Syrupp, ſ. oben, S. 35, und 134.

Kirſch-Torte, ſ. oben, S. 136, f.

Kirſch-Vogel, eine Art Droſſeln, welche nach dem Fleiſche der Kirſchen ſehr lüſtern ſind, ihr Neſt an die Bäume hängen, und wegen ihrer Beſchaffenheit, ſonderbaren Stimme ꝛc. verſchiedene zum Theil ſeltſame Nahmen bekommen haben: **Kirſch-Dieb, Kirſch-Droſſel, gelbe Kirſch-Droſſel, Kirſchholder, Kirſchholdt, Biereſel, Bierhohler, Bierholdt, Bierholf, Bierole, Bruder Berolf, Bruder Hultrof, Bülau, Bülaw** (im Meklenburgiſchen), **Bülow, Bülowvogel** (in Pommern) (*), **Byrol, Byrolt,**

(*) Weil man ſich einbildet, daß ſeine Stimme dieſen Nahmen ausrufe. Dieſes iſt auch der Nahme einer alten berühmten adel-

rolt, Gelbling, Gelbvogel, Gerolf (im Heſſiſchen), Gerolft, Goldamſel (*), Golddroſſel, Goldmerle, Gugelfahraus, Gugelfraus, Gutmerle, Kerſenrife, Kirſenrife (um Cöln), Kugelfraus, Olimerle, Pfeifholder, Pfingſtvogel (in Meißen, weil er im Frühlinge am ſpäteſten ankommt, indem er erſt um Pfingſten, wenn die Bäume mit vollem Laube bekleidet ſind, in unſern Ländern eintrifft), Pirol, Pirolt, Pyrale, Pyrol, Pyrold, Pyrolf, Schulze von Nilow (in der Mittelmark), Sommerdroſſel, Tyrolf, Tyrolt, Vidual, Vogelſpötter (weil er die Stimme anderer Vögel gern nachäffet), Vogelſtrauß (in Steyermark und Oeſtreich), Weidwall, Weihrauch, Weihrauchvogel, Widdewal, Widewall (in der Schweitz), Withewall, Wittewalch, Wittewald, Witwol, Wyrok; Lat. Ales luridus, Avis Icterus, Chloreus, Chloreus *Ariſtot.* Chlorion, Chloris, Coracias Oriolus. Galbula *Aldrov.* Galbulus, Galgulus, Icterus *Plin.* Lutea, Lutcolus, Luteus, Merula aurea, Oriolus *Alberti.* Oriolus (Galbula) luteus, loris artubusque nigris, rectricibus exterioribus poſtice flavis *Linn.* Picus nidum ſuſpendens *Aldrov.* Turdus aureus ſ. luteus *Klein.* Turdus flavus, alis et extrema cauda nigris, pupillis rubris *Barrère*, Vireo, Vireo; Griech. χλωριον, χλωρις das Weibchen, nach dem Aelian, Κολιος, Κολεος, Κελεος, Κλορεος; Neugriech. Συκοφαγος; Franz. Becfigue, Bilorot

eigen Familie in Nieder-Sachſen, welche auch ehedem in Pommern geweſen iſt, wie die Wapen in den dortigen Kirchen zeigen. Der ber. ſchwediſche General Barthold v. Bülow, welcher 1667 zu Stettin ſtarb, gehörte zu derſelben Familie, welche auf dem Helme einen Vogel, vielleicht unſern Bülow, führen. Die Freyherren von Bülow haben auch in zwey Schilden einen ſolchen Vogel.

(*) Dieſe Goldamſel iſt nicht mit dem im I Th. S. 715, beſchriebenen Coracias Oriolus *Linn.* zu verwechſeln.

Bilorot, Cortpendu, Grive dorée *Edw.* Loriot, Compère Loriot (*), Louſot, Merle doré, Merle-jaune, Orimerle, Oriot, Piloriot; Altfranz. Lorion, Lourion, Aurion, Lauriol, Orio, Oriol; Ital. Becquafiga, Becquafigo, Bruſola, Galbero, Garbella, Gualbedro, Melziozallo, Regalbulo, Regeyo, Reigalbero; Spaniſch: Oropendola, Oroyendola; Engl. The golden Thruſh *Edw.* Witwal, Witwol; Böhm. Brhel; Poln. Wilga, Wywielga; Ruſſ. Iwolga; Lettiſch Wahlod. Dieſer Vogel iſt ungefähr ſo groß als eine Amſel, 9 bis 10 Z. lang, 16 Z. in der Flügel-Breite. Der Schwanz iſt ungefähr 3½ Z., und der Schnabel 14 Lin. lang. Das Männchen iſt über den ganzen Körper, den Hals und Kopf, ſchön gelb, ausgenommen bis auf einen ſchwarzen Strich, welcher von dem Auge bis zum Winkel des Schnabels geht. Die Flügel ſind ſchwarz bis auf einige gelbe Flecken, welche am Ende der meiſten Schwung-Federn und einiger Deck-Federn liegen. Der Schwanz iſt gleichfalls halb gelb und halb ſchwarz, ſo, daß das Schwarze auf den ſichtbaren Theilen der beyden mittelſten Schwanz-Federn die herrſchende Farbe iſt, und daß das Gelbe immer ſtärker und ſtärker an den Seiten-Federn des Schwanzes wird, da nähmlich daſſelbe an den Enden derjenigen anfängt, welche den mittelſten am nächſten ſind. Es iſt aber zu bemerken, daß das Gefieder bey dem Männchen und Weibchen nicht einerley Farbe hat. Faſt alles, was bey dem Männchen völlig ſchwarz iſt, iſt bey dem Weibchen nur braun mit einem grünlichen Anſtriche; und faſt alle Theile, welche bey dem Männchen ſo ſchön gelb ſind, ſind bey dem Weibchen olivenfarbig, blaßgelb oder weiß; nähmlich olivenfarbig auf dem

(*) Einige leiten den Nahmen Loriot aus dem Griech. Chlorion, Andere aus dem Lat. Aureolus, und noch Andere von dem Geſchreye des Vogels, her.

dem Kopfe und oben auf dem Leibe; schmutzig weiß mit braunen Streifen gemischt unten auf dem Leibe, weiß an den Enden der meisten Schwung-Federn, und blaßgelb an den Enden ihrer Deck-Federn. Das wahre Gelb ist bey dem Weibchen bloß an den Enden der Schwanz-Federn und ihren untern Deck-Federn. Man bemerkt zuweilen auch bey dem Weibchen einen kleinen Raum hinter dem Auge, welcher ohne Federn und hell schieferfarbig ist.

Die jungen Männchen gleichen den Weibchen in Ansehung des Gefieders um so mehr, je jünger sie sind. In der ersten Zeit sind sie so gar mehr gefleckt, als die Weibchen; sie sind solches dann so gar an den obern Theilen des Körpers. Im August-Monathe kommt aber das Gelb schon zum Vorschein. Sie haben auch ein anderes Geschrey, als die alten; diese flöten io, io, io, welches sie einige Mahl hören lassen, und welches Einige mit dem Mauen der Katzen vergleichen. Dieses Flöten kann man leicht und sehr gut mit dem Munde nachahmen; und da es der Ruf des Gatten zur Liebe ist, so kann man diese Vögel aus der Ferne nach einem Baume locken, unter welchem man etwas versteckt steht; und auf diese Art kann man bisweilen einen Kirsch-Vogel schießen, welchem man sonst nicht leicht nahe kommen kann. Das Wort Bülow kommt, bereits erwähnter Maßen, auch mit dessen Flöten ziemlich überein. Mit dem Katzen-Geschreye aber scheint es von allen angegebenen Tönen die wenigste Aehnlichkeit zu haben. Bock sagt, man lege in Preußen dem Gesange dieses Vogels die Deutung bey: Hast du gesoffen, so bezahle auch; und daher entstanden vermuthlich seine Nahmen vom Biere: Bier-Esel, Bierhohler, Bierholdt, Bierholf, Bierole. Ausser diesem Geschreye, welches jeder Mensch nach

seiner Weise und Einbildung hört (*), haben sie noch eine Art von Flöten, besonders bey bevorstehendem Regen; daher man diesen Vogel auch Regen-Katze genannt hat.

Der Kirsch-Vogel hat eine rothe Iris in den Augen, und einen rothbraunen Schnabel, welcher oft bey alten Männchen ganz blutroth ist. Inwendig ist der Schnabel röthlich. Der Rand der untern Kinnlade ist, seiner Länge nach, ein wenig gebogen. Die Zunge ist gespalten, und am Ende gleichsam ausgefasert. Der Magen ist muskulös, und vor demselben liegt ein Sack, welcher von der Erweiterung der Speiseröhre entsteht. Die Gallenblase ist grün; die Blinddärme sind sehr klein. Die Füße sind schwarzblau, und das erste Glied der äussern Zehe ist mit der mittelsten Zehe zusammen gewachsen.

Er ist ein Zug-Vogel, der sich den Winter über in warme Länder begibt (**). Er ist, den Birk-Häher ausgenommen), einer von denen, die am spätesten bey uns anlangen, und am frühesten wieder weg ziehen. Er kommt nicht eher zu uns, als wenn das Laub ausschlägt, welches zuweilen erst im May, vor der Mitte des Aprils aber niemahls geschieht, und sucht seinen Aufenthalt alsdann in Laub-Wäldern, oder auch wo Laub-Holz unter dem Tangel-Holze steht. Er fängt, sobald er ankommt, sein Nest zu machen an, und verrichtet, weil er am Ende des August-Monathes unsere Gegenden schon wieder verlässet, seine Bruten geschwinde.

Diese

(*) Gesner sagt, seine Stimme komme mit dem Worte Oriot, Loriot, überein; Belon, er scheine Compère Loriot zu sagen; Andere haben Louſor bonnes meriſes, u. d. gl. zu hören geglaubt.

(**) Klein glaubt doch, daß sie des Winters in Preußen bleiben. Allein, vielleicht gaben dazu nur einzele zurück gebliebene Anlaß.

Diese Vögel bauen ihr Nest auf hohen Bäumen, oft nur auf einer mäßigen Höhe. Sie machen es mit besonderm Fleiße, und auf eine ganz andere Art als die Amseln, ob man gleich diese Vögel zu Einer Gattung gerechnet hat. Sie befestigen es gemeiniglich an einen kleinen gabelförmigen Zweig. Um die kleinen Zweige, welche die Gabel machen, wickeln sie lange Stroh- oder Hanf-Halme, deren einige von einem dieser Zweige gerade zu den andern gehen, und vorn den Rand des Nestes machen, andere aber in das Gewebe des Nestes selbst dringen, oder unter dasselbe weg gehen, und an der andern Seite sich um den entgegen gesetzten Zweig wickeln, und dem Werke Festigkeit geben. Die langen Fäden von Hanf oder Stroh, welche das Nest von unten zu umfassen, umhüllen es von aussen; der innere Polster aber, welcher dazu bestimmt ist, daß die Eyer darauf liegen sollen, ist ein Gewebe von kleinen Gras-Halmen, deren Aehren nach dem erhabenen Theile zurück gebogen, und so wenig auf der ausgehöhlten Seite zu sehen sind, daß man diese Stängel öfters für Wurzel-Fasern gehalten hat. Endlich ist noch zwischen diesem Polster und der äussern Hülle eine beträchtliche Menge Mos, Baum-Flechten, und andere dergleichen Materien, welche gleichsam eine mittlere Watte vorstellen, und das Nest von aussen undurchdringlicher, und zugleich von innen weicher machen.

Zorn sagt, daß der Kirsch-Vogel wegen seiner herrlichen Farben, seines lauten nicht unangenehmen Geschreyes, und seiner Seltenheit, vielen Nachstellungen ausgesetzt sey. Man findet in einem ziemlichen Bezirke nur ein Par, oder wenige Pare. Er hat ein Nest an einer Weiß-Buche hangen gesehen. „Es war mitten im Baume an die Gabel eines schlanken Astes, welcher von oben und unten etwas frey stand, angehängt, und aus vielen Fäden von Bast, zarten Wurzeln und langen Gras-Stängeln, künstlich und stark in einander geflochten, am Rande aber ringsherum eingesäumet. An den beyden Zacken der Gabel war

es angeheftet, und gleich einem Korbe, welcher an zwey Handhaben getragen wird. Ob gleich ein ſolches Neſt ohne Verdeck und ganz offen iſt, auſſer daß es von oben mit belaubten Zweigen behangen iſt, ſo kann doch, wenn ſchon der Aſt vom Winde hin und her getrieben wird, kein Ey oder Junges heraus fallen, auch wenn die Alte nicht darauf ſitzt. Dawieder dient die Einfaſſung des Neſtes, welche ſich etwas einwärts beuget."

Sein Neſt beſchreibt auch Plinius, L. 10, c. 33. Picorum aliquis ſuspendit in ſurculo (nidum) primis in ramis cyathi modo. Gesner fand es ziemlich niedrig.

Friſch, welcher doch ein ſehr großer Vogel-Kenner war, hat einen nicht geringen Irrthum begangen, und das Neſt einer Schwanz-Meiſe für das Neſt eines Kirſch-Vogels ausgegeben, und unter dieſem Nahmen umſtändlich beſchrieben (*). Denn das von ihm beſchriebene und abgebildete Neſt iſt fein gearbeitet, und hat von einem Aſte, an dem es geflochten war, gehangen. Der Kirſch-Vogel aber hängt, gedachter Maßen, und wie auch Hr. Prof. Titius (**) richtig angemerkt hat, das Neſt niemahls von einem Aſte, ſondern ſetzt es zwiſchen einen Zwieſel-Aſt, daß zwar der Boden des Neſtes dazwiſchen herab hängt; aber der obere Rand des Neſtes, wo die Oeffnung befindlich iſt, iſt um den Zwieſel geflochten. Zudem iſt dieſes Neſt oben jederzeit offen, wie die Vogel-Neſter gewöhnlich alle ſind. Das von Friſch abgebildete Neſt aber, iſt, wie des Remiz ſeines, oben zu, und nur zur Seite mit einem Eingange verſehen.

Linné hat, im 12 Th. der überſ. Abhandl. der königl. ſchwed. Akad. d. Wiſſ. a. d. J. 1750, (Hamb. u. L. 1754, 8.) S. 130, fgg. das Neſt richtiger abzeichnen laſſen, als ihm der Vogel, ſammt dem Neſte, aus Livland zugeſendet worden, und er ſelbſt nicht gewußt hat, was er aus dem Vogel machen ſollte, daher er ihn unter die Seidenſchwänze geſetzt hat.

Wenn

(*) S. Miſcell. Berolin. To. VII, p. 358, Tab. 7.

(**) In ſeiner Beſchreibung der kleinſten Meiſe, oder des liefländiſchen Remizvogels, im Hamb. Magaz. 18 B. 3 St. S. 245.

Wenn das Nest auf die Art gemacht ist, legt das Weibchen darin 4 bis 5 Eyer. Diese übertreffen an Größe beynahe die Eyer der Weiß-Drossel. Sie sind am Grunde schneeweiß, nicht stumpf, sondern etwas spitzig zugehend, und recht wohl geformt. Auf dem Weißen haben sie ziemlich starke kohlschwarze Flecken und Tüpfel, deren einige nur wie Puncte von Tinte aussehen; doch stehen diese Zeichen nicht allzu dicht. Nach Büffon sollen diese Eyer einen schmutzig weißen Grund haben, und die schwarzen Flecken in das Braune fallen. Bock hingegen beschreibt diese Eyer lichtgrau, etwas weniges röthlich, und schwärzlich fein gefleckt. Vielleicht findet hier auch eine kleine Abänderung in der Farbe Statt.

Das Weibchen brütet ungefähr 3 Wochen sehr anhaltend, und wenn die Jungen ausgekommen sind, setzt es die Vorsorge für dieselben nicht nur lange Zeit fort, sondern vertheidigt dieselben auch gegen ihre Feinde, ja so gar gegen den Menschen, mit mehrerer Unerschrockenheit, als man von solchem kleinen Vogel erwarten sollte. Man hat gesehen, daß die Alten diejenigen, die ihnen die Brut genommen haben, angefallen haben: ja, was noch seltener ist, die Mutter ist mit dem Neste weggenommen worden, hat im Bauer zu brüten fortgefahren, und ist auf ihren Eyern gestorben.

Wenn die Jungen erwachsen sind, begibt sich die ganze Familie auf den Abzug. Dieses geschieht gewöhnlich gegen das Ende des Augustes, oder zu Anfange des Sept. Nie versammeln sie sich in großen Scharen, ja es bleibt die Familie nicht einmahl beysammen; denn man trifft kaum mehr als 2 bis 3, bey einander an. Ob sie gleich nicht sehr leicht fliegen, und mit den Flügeln schlagen wie die Amsel, so ist es doch wahrscheinlich, daß sie den Winter in Afrika zubringen. Denn eines Theils hat der Ritter des Majy,

Com-

Commandeur des Malteser-Ordens, den Hrn. Graf v. Büffon versichert, daß sie im Sept. nach Malta kämen, und im Frühlinge wieder zurück zögen; andern Theils sagt Thevenot, daß sie im May nach Aegypten kämen, und im Sept. wieder zurück zögen. Er setzt noch hinzu, daß sie im May sehr fett wären, und ihr Fleisch alsdann gut zu essen sey. Forskähl meldet, daß sie im Jun. nach Constantinopel kämen, und daselbst bis zum Sept. blieben, sich von Feigen, Wein-Trauben und Maulbeeren nährten, und alsdann in wärmere Länder zögen; in Alexandrien kämen sie kurz vor Ueberschwemmung des Niles, und flögen im Nov., bey bevorstehendem Froste, wieder weg.

Wenn diese Vögel im Frühlinge ankommen, nähren sie sich von Insecten, Käfern, Raupen, Würmern; kurz, von demjenigen, was sie bekommen können; allein ihre vorzüglichste Nahrung, nach welcher sie am begierigsten sind, sind Kirschen und Feigen, daher man sie auch in einigen Ländern Συκοφάγος, (Feigen-Fresser) genannt hat; und diese Nahrung macht vielleicht ihr Fleisch so gut zu essen; sie fressen auch Vogelbeeren, Erbsen, u. d. gl. Zwey dieser Vögel sind im Stande, an Einem Tage einen reichlich tragenden Kirschbaum zu berauben, weil sie immer eine Kirsche nach der andern, und zwar nur den reifsten Theil derselben, anhacken. Doch ist der Schade, den diese wenige Vögel thun, selten so groß, als der von den Sperlingen, Staaren, Kirsch-Finken, und andern. Der Kirsch-Fink beißt, gedachter Maßen, die Kirsch-Steine mit seinem dicken Schnabel auf, den er in die Fuge des Steines bringt, und ihn so theilt; der Pirol oder Kirsch-Vogel hingegen lässet die Steine fallen, und kann mit seinem schwächern Schnabel dieselben auch nicht öffnen.

Die

Die Kirsch-Vögel sind nicht leicht aufzuziehen und zahm zu machen; sie sollen aber alsdann gut flöten und sprechen lernen, wie Hrn. Prof. Otto ein Jäger aus Erfahrung versichert hat. Ein altes Männchen aber, welches am Flügel lahm geschossen war, ernährte man in dem Zimmer mit Kirschen, und es starb, da dieselben nicht mehr zu haben waren. Zorn sagt auch, dieser Vogel sey in der Gefangenschaft nicht lebendig zu erhalten. Sie werden mit Locken, an der Tränke, und mit verschiedenen Arten von Netzen, gefangen; man kann dieselben auch, wie ich bereits erwähnt habe, zu sich locken. Zorn hat einige in Schlingen, wobey Kirschen aufgesteckt waren, gefangen.

Diese Vögel haben sich bisweilen bis an das Ende der alten Welt verbreitet, ohne eine Veränderung in ihrer äussern Gestalt oder in ihrem Gefieder erlitten zu haben. Denn man hat, wie Hr. v. Büffon meldet, Pirole von Bengalen, und selbst aus China, gesehen, welche den unsrigen völlig gleich gewesen sind. Doch war, wie Edwards schreibt, der Vogel, welchen Albin aus Bengalen erhalten hatte, vielleicht gar nicht unser Pirol; wenigstens hat ihn Albin alsdann sehr unkenntlich gemahlt.

Verschiedene Abarten des Pirols, findet man in Büffon's Naturgesch. der Vögel, nach Hrn. Prof. Otto Uebersetz. 8 B. (Berl. 1782, 8.) S. 184, fgg. beschrieben und abgebildet.

Kirsch-Wasser ausgepreßtes; s. oben, S. 133; destilliertes, S. 35, f.

Kirsch-Wein s. oben, S. 128, fgg.

Kirsch-Wurm, s. oben, S. 95, f.

Kirse, s. Lein-Dotter.

Kirsentrise, s. Kirsch-Vogel.

Kirsey (der oder das) eine Art eines gewirkten wollenen Zeuges, dessen Nahme bey dem Horneck schon im 13ten Jahrh. Chursit lautet. Er wird bald Kersay,

[illegible] bald **Kerſey, Kirſar,** bald [illegible] geſchrieben und geſprochen. Im [illegible] Karley, im Holl. Karley, im Schwed. [illegible] alle aus dem Ital. Cariſea, oder Franz. Cariſée, Cariſel, Cariſet, Carize, Carſeye, und Créſeau, [illegible] Creſeau.

Der Kirſey iſt ein wollener gekreußter oder geköperter Zeug, und eine Art von grober Sarſche, die auf beyden Seiten recht und mit Haaren bedeckt, ſtark gewalkt, aber deſto leichter geſchoren iſt. Er wird ſowohl von ordinärer, als auch von Kern-Wolle gemacht, und werden zu einem 1¼ Elle breiten, und 32 E. langen, Stücke 2 Steine oder 44 Pfund Wolle genommen. Dieſe Wolle wird, wenn ſie mit Fett wohl zugerichtet iſt, zu einem feinen und gleichen Garne geſponnen. Zur Werft müſſen 17, und zum Einſchlage 27 Pf. genommen werden. Die Werft muß ſeyn 29 Schrenk von 1⅛ E. geſchoren, und der Einſchlag mit 4 Schämeln, doch daß der Köper nach der rechten Ecke zu gehe, und recht geſcheuert, auch der ordinäre ſowohl, als der feine, mit 2 ſtarken Schlägen wohl gewirket werde. Vom Wirk-Stuhle kommt er 6½ Viertel breit, und 44 E. lang, welchen dann der Walker über die Hand, bis zu vorgedachter Länge und Breite, mit guter Fuller-Erde oder grüner Seife wohl walken muß, bis alles Fett heraus iſt. Wenn aber der Kirſey nicht gefärbet werden, ſondern weiß bleiben ſoll, muß ihn der Tuch-Bereiter, nachdem er rein und von dem Tuch-Scherer ausgeſchoren iſt, in laulichem Waſſer mit 2 Pf. weißer Seife rein waſchen, alsdann anſchlagen, aber nicht recken, ſondern nur vergleichen, und mit nicht allzu heißen Eiſen preſſen.

Man verfertigt den Kirſey in verſchiedenen Ländern und Städten von Europa, als: in England, Scotland, Frankreich, Holland, inſonderheit in Leyden ꝛc. die meiſten und beſten aber kommen aus England,

land, wo sie vornehmlich in Kent fabriciret werden, und aus Scotland. Man hat von denselben verschiedene Arten, als: grobe und feine; ingl. weiße, und mit allerley Farben gefärbte. Von letztern sind einige vor dem Weben in der Wolle gefärbt; andere aber sind weiß von dem Stuhle gekommen, und nachher erst zugerichtet und gefärbet worden. Die Kirseye, insonderheit die engländischen und scotländischen, liegen gemeiniglich $\frac{5}{8}$ par. Ellen breit; die Länge der Stücke aber ist verschieden, indem einige 15, andere 16, 17, 18, 22, 24, 30, 32 bis 34 Ellen par. Maß halten; die scotländischen Kirseye aber sind 12 E. doppelt gemessen lang. Diese Art Zeuge findet durch die ganze Welt starken Abgang; insonderheit gebrauchen die Holländer viel davon, vornehmlich blauen, zur Montur ihrer Soldaten, und zwar nicht allein in Holland fabricirten, sondern auch in England gemachten. Doch dürfen die englischen Kirseye nicht anders, als weiß, oder in der Wolle, vor dem Weben, gefärbt, nach Holland gebracht werden; da hingegen diejenigen, welche erst, nachdem sie vom Weber-Stuhle gekommen, zugerichtet und gefärbt sind, daselbst unter die contrabanden Waaren gehören.

Im Preußischen tragen die Officier von der Cavallerie, feinen und aus spanischer Wolle fabricirten Kirsey zu ihren Colleten. Der grobe, welcher von etwas besserer Land-Wolle, als das ordinäre Tuch, gemacht ist, und nur 1 E. breit liegt, wird von den gemeinen Cavalleristen getragen.

Nach dem kön. preuß. revidirten und renovirten Tuch- und Zeug-Reglement für die Churmark und selbiger incorporirten Kreise, d d. Berl. d. 22 Nov. 1772, werden zu dem, 30 E. langen, und 2 E. breiten Kirsey, 48 Pfund aus feiner, zweyschüriger, weißer, wohl sortierter halb Sommer- halb Winter-Wolle gesponnenes Garn erfordert, wovon zur Kette rechts 19 ℔., und zum Einschlag links 29 ℔., überhaupt also 48 ℔. Garn kommen,

welche in der Länge zu 33 E., und in der Breite zu 60 Gänge mit 16 Pfeifen geſchoren werden, und vom Stuhle zur Schau 33 E. in der Länge, in der Breite aber 3 E., und aus der Walke 30 E. lang, und 2 E. breit, ſeyn müſſen.

Kiſch, Kiſchmir, Kiſchmiſch, Kis, Kismich, Queſano, Queſſins, oder **Queixoma,** eine Inſel in dem perſiſchen Meerbuſen, an der Küſte vom glückſeligen Arabien, nicht weit von der Inſel Ormus, welche 12 Meilen im Umkreiſe hat. Sie iſt ſehr fruchtbar, und hat inſonderheit ſchöne Gärten, in welchen Citronen, Pomeranzen, Melonen und herrliche Weintrauben, wachſen, die in großer Menge nach Gamron und Bander-Abaſſi geführet werden. Um dieſe Inſel iſt die größte Perlen-Fiſcherey von orientaliſchen Perlen. Man nennt dieſelben **Baharen,** weil die Stadt dieſes Nahmens auf derjenigen Küſte von Arabien liegt, welche dieſer Inſel gegenüber iſt, und weil man daſelbſt auch ſehr ſchöne Perlen fiſcht, welche die Einwohner **Murwarid** oder **Marwarid** nennen.

Kislaragaſi, iſt das Oberhaupt der ſchwarzen Verſchnittenen am türkiſchen Hofe, und der Ober-Aufſeher über das Frauenzimmer des Sultans (Harem), zu deren Gemächern er die Schlüſſel hat, und worein keine andere Mannsperſon, als der Groß-Sultan, kommen darf. Er hat auch die Aufſicht über die königl. Moskeen, welches ihm beträchtliche Einkünfte abwirft, weil er die Stellen in dieſen Moskeen zu beſetzen hat.

Kis, heißt ein Verſchnittener. lar, oder ler iſt das Zeichen des Genitivs in der mehrern Zahl. Aga, heißt Vorſteher; und das angehängte ſi zeigt an, daß das vorhergehende Wort im Genitiv ſtehen muß.

Kislev, oder **Cisleu,** der dritte Monath im Juden-Kalender, welcher in unſerm Nov. ſeinen Anfang nimmt, und im Dec. ſich endigt. Am 25ſten deſſelben

wird

wird Chanucha, d. i. das Fest der Kirchweihe, oder Kirchmesse, gefeyert.

Kisseri, Kissery, Ketseri, eine Art kleiner und sehr wohlschmeckender, zu dem Geschlechte des Geiß-Klees gehöriger, Hülsen-Früchte, wie Erbsen, womit in Ost-Indien großer Handel getrieben wird. Es kommen deren viele aus verschiedenen kleinen malabarischen Königreichen, insonderheit aus Cochin, Porca, Calicoulan und Coulang, von wannen die Engländer und Holländer, welche daselbst ihre Niederlagen haben, alle Jahre viele Schiff-Ladungen davon abhohlen, um dieselben alsdann in andere indianische Oerter, wo diese Frucht wegen des dortigen Erdreiches nicht recht fort will, zu verführen, und mit ansehnlichem Vortheile wieder zu verkaufen. Einige nennen diese Frucht auch, wiewohl unrecht, **Cayang,** oder **Catiang,** indem diejenige Frucht, welche eigentlich **Cayang** heißt, bey weitem nicht so gut ist. Siehe **Cayang,** im VII Th. S. 752.

Kissina, s. **Paradies-Holz.**

Kissingen, eine kleine Stadt, Ober- und Cent-Amt, im Bisthume Würzburg an der fränkischen Saale, 3 Meilen von der Reichs-Stadt Schweinfurt, wo ein Gesund-Brunnen, Wildbad, und gute Salz-Quellen sind. Es ist auch ein neues Gradier-Haus daselbst errichtet worden. Die umliegende Gegend ist sehr angenehm. Die Berge sind von mittelmäßiger Höhe, an ihrem Fuße mit Früchten besäet, auf der Mitte mit fruchtbaren Weinbergen bepflanzt, und auf der Spitze mit schönen grünen Waldungen besetzt. Zwischen diesen Bergen, insonderheit um Kissingen, ist ein ziemlich breites ebenes Thal mit einem Wiesen-Grunde und dem Saal-Flusse. Etwa 60 Schritt von der Stadt, südwärts, entspringt der erste Gesund-Brunnen, welcher sonst der Trink-Brunnen genannt wird. Derselbe treibt, in vier Quellen getheilt, aus einem

harten Felsen. Alle vier Quellen sind mit einem über 8 Schuh hohen Fuße, und einem darauf gerichteten steinernen Aufsatze, beschränkt. Vier Schuh davon ist eine Ring-Mauer zur Abhaltung der wilden Wasser geführt. Das Wasser dieses Brunnens ist sehr spiritös, klar, und von einem recht angenehmen Geschmacke. 370 Schuh unterhalb gegen Mittag, ist der zweyte Brunnen, welcher sonst der Bade-Brunnen heißt, weil er in vorigen Zeiten mehr zum Baden, als Trinken, angewendet worden ist. Er steht in Holz eingefaßt, ist von einem starken Triebe, und schmeckt salzartig, bitterlich, viel stärker und nicht so lieblich, als der Trink-Brunnen. Die Fassung sowohl, als der Ablauf desselben, sind ringsum mit vieler gelber Erde belegt. 11 bis 12 Schuh von demselben entspringt der dritte Brunnen. Man fand ihn bey dem Abgraben des Saal-Flusses, und er wird der neue Brunnen genannt. Er ist ebenfalls in Holz gefaßt, von beynahe noch stärkerm Geschmacke als der vorige, übrigens aber mit dem Bade-Brunnen von gleicher Kraft und Wirkung. Die Fassung sowohl, als der Ablauf, wird ebenfalls mit einer häufigen gelben Erde überzogen. Damit letztgedachte zwey Brunnen rein gehalten, und von dem anwachsenden Saal-Flusse nicht überschwemmet würden, hat der Fürst Bischof zu Würzburg und Bamberg den Saal-Fluß seitwärts ableiten, und die Gegend der Brunnen in der Länge und Breite 7 Schuh erhöhen und einebenen lassen. Dabey ist ein breiter, grüner, mit Klee bewachsener, mit Kastanien besetzter, und noch sonst mit verschiedenen Alleen gezierter Platz angelegt. Endlich ist auch ein bequemes Cur-Haus erbauet worden.

Die **Kissinger Brunnen** sind schon seit zwey Jahrhunderten bekannt gewesen; zu welcher Zeit aber ihre eigentliche Entdeckung geschehen sey, ist ungewiß. Mit den Reagentibus haben sie alle die Verhältnisse, die

die man bey alkaliſchen Stahlwaſſern findet. Der ordinäre Trink-Brunnen ſetzt keinen Ocher ab. Von den Galläpfeln wird er wenig tingirt. Nach der völligen Verdunſtung bekam Overkamp aus einem Medicinal-Pfunde 31½ Gran Salz, und 9½ Gr. gelbe Erde. Delius aber erhielt 46 Gr. Mittel-Salz, und 18 Gr. alkaliſche Erde. Der Bade-Brunnen und der neue Cur-Brunnen werden beyde von den Galläpfeln dunkelroth gefärbt. Ein Pfund von letzterm, liefert, nach der Evaporation, nach Overkamp's Angabe, 75 Gr. Salz und 6 Gr. Erde; nach Delius Verſuchen 80 Gr. Sediment, worunter 12 Gr. alkaliſche Erde ſind; das übrige iſt ein Mittel-Salz, woran noch einige ungeſättigte laugenſalzige Theilchen hängen. Der Bade-Brunnen hat dieſelben Beſtand-Theile, nur um einige Gran mehr.

Joh. Wittichs Nachricht vom Kiſſinger Waſſer. 1589.
Torhofr. Steckii deſcriptio fontis medicati Kiſſingenſis. Wirceb. 1595, 8.
Fehrs Beſchreibung des Kiſſinger Brunnen. 1676.
Jo. Fr. Joſeph. Gaebii Beſchreibung des Kißinger Sauerbronnen. Fulda, 1696, 8.
Jo. Barthol. Ad. Beringers Beſchreibung des Kißinger Waſſers. 1738.
Franz Joſeph de Overkamp Nachricht von dem Kiſſinger Brunnen. 1745.
Heinr Fr. Delius Unterſuchungen und Nachrichten von den Geſundbrunnen und Bädern zu Kiſſingen und Bocklet im Fürſtenthum Würzburg. Erlang. 1770, 8. ſ. u. e. h. B. u. a K. D.

Kiſte, Diminut. das **Kiſtchen**, Oberdeutſch **Kiſtlein**, zuſammengez. **Kiſtel**, ein Wort, welches mit **Kaſten** überhaupt genommen, gleich bedeutend iſt, und auch in Nieder-Sachſen, in allen Fällen, wo das Wort **Kaſten** gebraucht wird, ſtatt deſſelben gangbar iſt. Selbſt in einigen oberdeutſchen Gegenden ſind **Geld-Kiſte**, für einen Geld-**Kaſten**, **Kleider-Kiſte**, für Kleider-Kaſten, **Todten-Kiſte**, für einen ſchweren Sarg mit einem erhabenen Deckel, Niederſ. **Küſtkiſte**, von **Raſt**, Ruhe, üblich. **Kiſten und Kaſten voll haben**, im g. L. Sprichw. Bey einer offenen Ki-

ſie ſündigt auch wohl ein Geſcheuter, Gelegenheit macht Diebe.

Am häufigſten braucht man es im Hochdeutſchen, von einem gemeiniglich länglich viereckigen, aus Bretern zuſammen geſchlagenen Behältniſſe mit einem Deckel, welcher einen Beſchlag, auch eine Krampe und einen Ueberwurf hat, um mit einem Vorlege-Schloſſe verſchloſſen werden zu können. Manchmahl iſt es auch nur ein Behältniß, worin Waren oder Sachen eingepackt oder verſchickt werden, wo der Deckel mit Nägeln aufgeſchlagen und befeſtiget wird. Zuweilen hat die Kiſte auch einen Schieber, d. i. einen Deckel, der in eine Fuge eingeſchoben werden kann, vornehmlich bey kleinen Kiſten. Dieſe Behältniſſe werden auch häufig Kaſten und Käſtchen genannt.

In engerer Bedeutung iſt in der Glas-Handlung eine Kiſte Fenſter-Glas, eine Kiſte von beſtimmter Größe, welche 20 Bund, jedes von 6 Tafeln, enthält; ſ. Th. XVIII, S. 672.

Im Niederſ. Kiſte, im Engl. Cheſt, im Angelſ. Ceſt, im Franz. in der engern hochdeutſchen Bedeutung Caiſſe, im Dän. Kiſte, im Schwed. Kiſta, im Isländ. Kiſta, im Perſ. Caſtr, alle in der weitern Bedeutung eines Kaſtens, ſo wie das Lat. Ciſta, Griech. Κιστη, und Hebr. כד. Es bedeutete urſprünglich ein jedes hohles Behältniß, einen eingeſchloſſenen Raum, wovon noch häufige Beweiſe vorhanden ſind. Das Niederſ. Kiſte bedeutet noch ein enges Gefängniß, beſonders in den Zuſammenſetzungen Doren-Kiſte, ein Narren-Häuschen, Doll-Kiſte, ein Toll-Häuschen, im Schwed. Tyfkiſta, ein Gefängniß für Diebe; imgl. ein durch Pfahlwerk abgetheiltes Fach zur Füllung eines Erd-Dammes. Innan chinus herzen Kuſt, bey dem Ottfried, B. 1, C. 18, wofür man in den ſpätern Zeiten des Herzens Schrein ſagte. Im Ital. iſt Ceſta, ein Korb. S. Kaſten, Kaue, u. ſ. f.

Kisten-Holz, büchenes Holz, so fern es sich gut spalten lässet, um kleine Kisten daraus zu verfertigen.

Kisten-Macher, in einigen Gegenden, eine Art Tischler, welche vornehmlich kleinere und größere Kisten zur Einpackung und Versendung mancher Arten von Waren verfertigen; der **Kistner**.

Kisten-Pfand, siehe **Pfand**.

Kister, auf Hüttenwerken, ein Eisen, daran vorn ein Streich-Holz angemacht ist, womit die Schlacken von dem schmelzenden Metalle abgezogen werden.

Kistner, s. **Kisten-Macher**.

Kitai, ist 1. eine Art chinesischer Damaste, welche die Tatarn, die in der Nachbarschaft der großen chinesischen Mauer wohnen, wie auch die Karavanen, die von Moskau nach Peking gehen, und fast ganz Sibirien durchreisen müssen, den Ostiaken mitbringen, deren Weiber solche zu Schleyern, womit sie das Gesicht bedecken, brauchen.

2. Eine Art chinesischer Leinwand, die mit Baum-Wolle vermischt, und theils blau, theils roth, und mit verschiedenen andern Farben gefärbt ist.

Kitaika, ein baumwollener Zeug von allerley Farben, welcher aus China und der Bucharey nach Rußland gebracht, und zu Kleidern für beyderley Geschlecht gebraucht wird. Der chinesische ist der beste, und von zweyerley Art, deren die eine **Odiazovaia**, und die andere **Tiumovaia** (**Tünewaia**) genannt wird. Die erste, als die feinste, ist $3\frac{1}{4}$ Viertel breit, und bis 20 Ellen lang, und jedes Stück besonders zusammen gerollet; die andere ist etwas gröber, aber dauerhafter, ungefähr 10 E. lang und $\frac{3}{4}$ breit, wovon 10 Stück zusammen gerollet werden, welches **Tium** (**Tjün**) heißt. Der aus der Bucharey, und von den Mungalen **Selimskai** genannt, ist der schlechteste, und auch schmähler und kürzer, und wird nicht gerollet, sondern jedes Stück wird besonders zusammen geleget, und deren 10

sind in ein Tjün gebunden. Sie sind meistens blau, oder von hellen Farben.

Der baumwollene Zeug, welchen die Russen Kitaika, die Chineser aber Bu, nennen, ist auf der Gränze zu Kjächta (s. Th. XXXII, S. 218,) zum Grunde der Handlung gelegt, wornach die Preise der übrigen Waren berechnet werden, weil derselbe die am meisten abgängige Ware ist. Doch wird auch viel daselbst gegen russische Silber-Münze gehandelt, so gar, daß die meisten Waren, wenn man sie gegen bares Geld kauft, noch um einige Rubel wohlfeiler, als nach dem Werthe des Kitaika, wie solcher von den Chinesern gegen russische Waren gerechnet wird, zu haben sind.

Kitaika tünewaia, wovon 10 Stück zusammen gelegt ein Tjün ausmachen, kostete in den Jahren 1733, bis 1735, das Tjün durch die Bank gegen bares Geld 3 Rubel. Im J. 1737 stieg er bis auf 5 Rubel. Er ist durchgehends blau, aber bald heller, bald dunkler. Der dunkelste wird am meisten geachtet; denn die hellblaue Farbe verbleicht leicht, und verliert viel durch die Wäsche, dagegen die dunkle dauerhafter ist. Man erlaubt aber im Kaufen kein Aussuchen; sondern es werden von allen drey Gattungen, von der hellesten, von der mittlern, und von der dunkelsten Farbe, unter einander gemischet; und bestehet die Sorgfalt eines russischen Kaufmannes nur darin, daß er mehr von dunkler und mittlerer, als heilblauer, Farbe zu bekommen sucht. Er gibt dabey auf den Faden Acht, weil ein Kitaika feiner, als der andere, ist. Er macht hin und wieder ein Tjün auf, zur Probe, ob der Kitaika nicht darlegen, oder in der Farbe verbrannt ist, und daher leicht reißt, oder ob er auch Löcher hat. Insonderheit kauft er keine große Packe, ohne dieselben aufzumachen. Denn da hat mancher, der so treuherzig gewesen ist, nachgehends in den Packen zwischen dem Kitaika ausgeschnittene Hölzer von der Größe und Gestalt des Kitaika, wie er tjünweise zusammen gelegt ist, gefunden.

Andere Arten von Kitaika sind: der von den Chinesern so genannte Uadschua, und Schanchaihu, von mancherley Farben. Sie werden stückweise zusammen geleget, aber auch zu 10 Stück in einem Tjün verkauft. Diese halten mit der ersten Art einerley Preise. Der Schanchua-

bu,

bu, (ruſſiſch Semilannaja) und Jenchua-bu, (ruſſ. Sanzowaia) ſind davon nur in der Feine des Fadens unterſchieden, und koſten deswegen das Tſün zu 6 Rubel. Der Nahme Semilannaja rührt daher, weil im erſten Anfange der Handlung mit China ein Tſün von den ruſſiſchen Karavanen in Peking gegen 7 Laan Silber gekauft wurde. Den Nahmen Sanzowaia hat man von den Mungalen angenommen, welche dieſe Art Kitaika Zochor-Samza nennen.

Eine andere Art Kitaika, welche gleichfalls von mancherley Farben, aber etwas breiter, und faſt noch einmahl ſo lang, als der gemeine, iſt, wird ſtückweiſe verkauft, und koſtet das Stück 1 Rubel 10 bis 20 Kopecken. Alle dieſe Arten von Kitaika ſind geglänzt.

Eine einzige Art iſt ungeglänzt. Dieſe ſieht unſerm Kamelote nicht ungleich. Man hat inſonderheit von fünferley Farben, als: ſchwarz, roth, grün, orangegelb, und Sand-Farbe. Er iſt auch etwas breiter, als der gemeine, ſonſt aber mit demſelben von einerley Länge. 10 Stück werden von jeder Farbe zuſammen geleget; dieſe koſteten bey wohlfeilen Preiſen 5, nachher 7 Rubel. Will man die Farben wählen, ſo wird die grüne für die beſte gehalten, und dafür ½ Rubel mehr bezahlt.

Müllers Samml. ruſſiſcher Geſchichte, 3 B. 5 und 6 St. St. Petersb. 1760, 8.) S. 574, 599

Kits, Kitz, oder Kitze. 1. Eine Art eines in den Niederlanden üblichen Fahrzeuges; Fr. Chat, Chatte; ſ. im XXXV Th. S. 188.

2. Ein kleines Schiff, welches mit Waren beladen wird, nur Ein Verdeck hat, und einen Gabel-Maſt führt, wie die Jacht oder Heu; Fr. Caiche, Quaiche, oder Queche. Die Engländer bedienen ſich häufig dieſer Art Schiffe; man darf ſich aber damit nicht weit auf die See wagen.

Kitſch-Baum, Prunus Padus *L.*; ſ. **Trauben-Kirſche,** oben, S. 177.

Kitſcher, ſ. **Keſſer.**

Kitſee, Ungar. Köpcſeny, ehemahls Kochy, Kotſi, ein Flecken in der wieſelburger Geſpanſchaft in Ungarn, von welchem die Kutſchen, deren Erfinder K.

der Jahrszeit, seyn kann. Diese Geschwindigkeit, mit welcher man bey Aufführung der Wasser-Gebäude zu Werke zu gehen hat, erfordert die zweyte Eigenschaft des Kittes, nähmlich: daß derselbe schnell trockne, oder, nach der Bau-Leute ihrer Sprache, schnell anziehe. Die Kälte des Winters überzieht das Gewässer in unserm Deutschlande mit Eis, welches sich an den Einfassungs-Mauern derselben stark ansetzt, an die Steine und den Ciment gefriert, und, wenn solcher nicht besonders stark sich mit dem Steinwerke verbunden hat, in dessen Fugen er ist, ferner los macht. Bey dem Eis-Gange stoßen öfters die stärksten Eis-Schollen auf dergleichen Mauerwerk, mit heftiger Erschütterung desselben; und ein Kitt von geringer Festigkeit wird die hierdurch nothwendig erfolgende Trennung der Steine des Mauerwerkes nicht verhindern können. Ueberdies wird ein lockerer Kitt das Wasser an sich ziehen; das solcher Gestalt eingesogene Wasser wird von dem Froste in demselben gefrieren, durch das Gefrieren aber sich ausdehnen, und bey erfolgter gelinderer Witterung, wenn das gefrorne Wasser wieder aufthauet, würde ein solcher Kitt aus einander fallen. Hieraus folgt die dritte Eigenschaft desselben, daß er dicht in seinen Theilen und fest sey. Diese Eigenschaften des Kittes geben also solche Materialien zu Bestand-Theilen desselben an, welche, nach ihrer Verbindung mit einander, eine Masse geben, die im Wasser nicht nur unauflöslich und fest ist, sondern auch diese Beschaffenheit durch eine schnelle Verbindung erhalten hat. Diese sind: Bitter- und Stein-Kalk, Sand, Puzzolane, Traß, Ziegel-Mehl, Glas-Mehl, Stein-Mehl, Hammer-Schlacken, Oehl und Wasser, wovon immer eines hierzu vorzüglicher, als das andere, ist.

Je gewisser es also ist, daß es bey Errichtung dauerhafter und jeder Witterung wiederstehender Gebäude

auf

auf die Beschaffenheit der Bau-Materialien, und auf das dabey wohl in Obacht genommene Verhältniß der Lage des Ortes mit jenen sehr viel ankommt: desto nöthiger ist augenscheinlich eine sorgfältige Wahl dieser Bau-Materialien zu den verschiedenen Endzwecken, und um so nöthiger eine genaue Kenntniß aller Fossilien, welche mehr oder weniger tüchtig sind, Bau-Materialien abzugeben. Man hat sich besonders viele Mühe gegeben, einen viele Jahre lang ausdauernden Kitt ausfündig zu machen, und an vielen Orten Versuche mit verschiedenen Erd- und Stein-Arten, durch Vermischung derselben einen festen Mörtel hervor zu bringen, angestellt, die von mancherley Erfolge gewesen sind, doch aber selten den Wunsch des Grund-Besitzers befriedigt haben. Besonders sind an vielen Orten noch vergebliche Versuche angestellt worden, einen solchen Kitt zu verfertigen, welcher der allmählichen Wirkung der Ströhme, und dem Eindringen derselben in das trockne Land, in Mauern, u. s. w. widerstände, bis man endlich von den an der See gelegenen, und den Ueberschwemmungen am meisten ausgesetzten Ländern Nachrichten einzog, und nach jener Art wasserfeste Mauern zu errichten sich bemühete. Italien und Holland sind diejenigen Länder, deren Erfahrungen genutzet und nachgeahmet worden sind. Man bemerkte, daß die dortigen Einwohner zu einem festen Mörtel, Kalk, Sand, und noch eine gewisse Erde, oder statt derselben eine etwas festere Stein-Art zermalmt, gebrauchten. Die gedachte Erde hat von dem Orte in Italien Puzzuolo, oder Puzzuoli, wo sie am häufigsten gefunden wurde, den Nahmen Terra di Puzzuoli, Puzzulan-Erde oder Puzzolane erhalten; und die festere Stein-Art ist Tarras oder Tras genannt worden. Der aus der Puzzolane oder dem Tras mit Kalk und Sand bereitete Mörtel war von der größten Festigkeit, sowohl in denjenigen Mauern, die der Feuchtigkeit

igkeit und dem Wetter sehr ausgesetzt waren, als auch in Kellern und Cisternen, wo er das Ein- und Ausbringen des Wassers verhütete. Dieser Erd- und Stein-Arten Vorzüge wurden so hoch geschätzt, daß man dieselben nach Deutschland, und nach andern weit entlegenen Orten, aus Italien und Holland kommen ließ. Die Puzzolane wird noch aus Rom auf der Tiber nach Civita Vecchia geführt, und aus diesem Orte nach verschiedenen europäischen Ländern versendet. Nothwendig mußte dieses sehr kostbar ausfallen; und man bemühete sich nun, diese Erd- und Stein-Arten in andern Ländern auch aufzufinden, und setzte Prämien auf die Findung derselben. Aber da es hier und da an solchen Nachsuchern fehlte, welche Kenntniß genug besaßen, die wahre Natur der Erd- und Stein-Arten anzuzeigen, so waren die ausgesetzten Belohnungen zum Theil fruchtlos, zum Theil wurden verschiedene zerreibliche Erden, die nur einige entfernte Aehnlichkeit mit der Puzzolane und dem Tras hatten, dafür ausgegeben.

In den sächsischen Provinzen hat Hr. Prof. Leske, bey Gelegenheit seiner im J. 1782 angefangenen Reise durch die Ober-Lausitz, diese so nutzbare Erd- und Stein-Arten sehr häufig angetroffen. Hr. v. Gersdorf hatte zwar schon vor Hrn. L. Ankunft, gedachte Erd- und Stein-Arten von einem Orte in der Ober-Lausitz gesammelt, und auch bereits solche Versuche damit angestellt (*), welche, wenn man auch in die äussere Uebereinstimmung einen Zweifel setzen wollte, Jeden sogleich von der wahren Beschaffenheit derselben überzeugen konnten; er war aber doch selbst noch zweifelhaft, ob dieselbe wirklich wahre Puzzolane und Tras wären.

(*) S. Hrn. v. Gersdorf Versuche einen in Wasser erhärtenden Mörtel oder Cement zu machen, im 4 St. der Provinzial-Blätter der oberlausitz. Gesellsch. der Wissensch. S. 411.

wären. Davon aber überzeugten ihn, und Hrn. L., die fernere Kennzeichen, Verbindungen mit andern Stein-Arten, und andere angestellte Versuche. Nach der Zeit hat Letzterer diese Erd- und Stein-Arten an mehrern Orten sehr häufig gefunden; vornehmlich: an dem südlichen Abhange der Landeskrone bey Görlitz; an dem westlichen Fuße des Steinberges bey Lauban; an dem Spitzberge bey Heidersdorf und Linde; in dem südöstlich angelegten Steinbruche auf dem schönen Berge bey Schönberg; auf mehrern Bergen bey Nieda, wie auch an dem Knorrberge bey Dittersbach, am Fuße des Bernhardsberges bey Schöna; auf mehrern Hügeln und kleinern Bergen bey Herrnhut und Hennersdorf; ferner bey Witgendorf und Heinewalde, u. s. w. Die besondern Umstände, unter welchen dieselben gefunden werden, hat Hr. L. in seiner Reise durch Sachsen in Rücksicht der Naturgeschichte und Oekonomie, Lpz. 1785, gr. 4. angezeigt. Er fand diese Fossilien allezeit neben dem Basalte, wie sie denn auch mit diesem eine große Verwandtschaft, wo nicht eben dieselbe Mischung, haben.

Hr. Leske hält die Puzzolane für nichts anders, als für aufgelöseten und verwitterten Tras; der Tras aber ist, nach seiner Meinung, zum Theil ein aufgelöseter und verwitterter Basalt, zum Theil aber eine etwas von dem Basalte verschiedene Stein-Art, die dem Bimsteine ähnlich ist, und eine durch die Länge der Zeit aufgelöste Lava-Schlacke. Beyde, sowohl der Tras, als die Puzzolane, sind in ihrer Farbe sehr verschieden. Hr. L. hat gelblichweiße, ochergelbe, olivengrüne, gelblichgraue, bläulichgraue, röthlich- und auch dunkelbraune Puzzolan-Erde gefunden; der Tras aber ist in seiner Haupt-Masse allezeit mehr oder weniger hell oder dunkel bläulichgrau, und hat weiße, gelbliche, grüne, auch schwarze Schörl-Körner, die vermuthlich alle vormahls krystallisirt waren, mit eingesprengt, die mehr oder weniger aufgelöset sind. Auch ist der Tras nach dem Verhältnisse dieser Auflösung bald mehr, bald weniger, zerreiblich. Die Puzzolan-Erde hat

theils

theils staubartige, theils schuppichte Theilchen, und schimmert daher auch ein wenig; sie ist leicht, und fühlt sich, wenn sie ganz rein ist, etwas fettig an; sie wird daher auch an verschiedenen Orten von den Steinbrechern Steinmarks genennt. Oft sind darin einige festere Theilchen, die dem lemnischen Bolus vollkommen gleich sind; auch, wenn man sie in das Wasser thut, mit einem Knistern zerfallen, so wie überhaupt die ganze Erde, wenn sie in etwas Wasser gethan wird, in einen flockigen Staub zerfällt. Der Tras hingegen ist auf dem Bruche erdig, und von einem ganz porösen und schwammichten Gewebe. Die runden, auch länglichen Pori und Blasen sind bald so klein, daß sie nicht anders, als mit einem Hand-Mikroskope, bemerket werden können, oft aber auch von ziemlich beträchtlicher Größe. Der Tras ist inwendig schimmernd, undurchsichtig, weich, man kann ihn mit den Nägeln schaben, zuweilen ist er gar zerreiblich, oft aber auch halbhart, so daß man ihn mit dem Messer schaben kann. Auch findet sich in Ansehung seiner Schwere eine ziemlich beträchtliche Verschiedenheit, je nach dem er mehr oder weniger porös ist. Das Wasser zieht der Tras sehr stark an sich. Vergleicht man mit dieser, nach den natürlichen Körpern selbst entworfenen Beschreibung, die von andern Schriftstellern gegebene, so wird man sehr bald beurtheilen können, welcher von ihnen den wahren Tras vor Augen gehabt habe, und welche vielleicht ganz andere Fossilien unter diesem Nahmen beschrieben haben.

Was die Vorbereitung derselben, ehe sie zum Kitt gebraucht werden können, betrifft: so darf die Puzzolan-Erde, die an sich schon fein und zerreiblich ist, entweder nur von den gröbern Theilen durch das Sieben abgesondert, oder diese auf irgend eine Art zerrieben, und zum Gebrauch aufgehoben werden. Der Tras hingegen muß entweder mit Stämpeln gestampfet, oder, welches noch besser wäre, auf Mühl-Steinen zerrieben werden, ehe er mit dem Kalke vermischet werden kann. So hat man schon in Holland Wind-Mühlen angelegt, worin der Tras zerrieben wird, damit er sich desto bequemer mit dem Kalke vermische.

Daß nun die Puzzolane und der Tras einen sehr dauerhaften Kitt, besonders im Wasser, abgeben,

werde

werde ich an seinem Orte ausführlicher zeigen. Nach Hrn. Leske Versicherung hat der in der Ober-Lausitz befindliche Tras und Puzzolane mit dem italiänischen, holländischen und französischen, gleiche Kraft und Wirkung. Da derselbe aber keine eigene Versuche darüber angestellt hat, so will ich hier einen kurzen Auszug aus den mit vieler Sorgfalt und Behutsamkeit angestellten Versuchen des Hrn. v. Gersdorf hersetzen. Des Hrn. v. G. Versuche gehen noch weiter; er hat gezeigt, daß zu eben der Absicht, statt des Trass, auch der feste Basalt, obwohl mit mehrerer Mühe, zum Cäment zubereitet werden könne.

Zuerst also die Versuche mit dem Basalte. Hr. von Gersdorf nahm: 1 Maß frisch gebrannten ungelöschten Kalk; 2 Maß fein gepülverten Basalt; ½ Maß reinen Fluß-Sand, und 2 Maß klein zerschlagene Steine. Der Kalk wurde in eine runde, etwa 3 Z. starke Scheibe in einen Kalk-Kasten ausgebreitet, dicht herum eine Einfassung von gepülvertem Basalte gemacht, darauf der Kalk mit Behutsamkeit gelöscht, sodann mit Basalt-Staube vermischt, und zugleich Sand immer ganz dünn darauf gestreuet, und recht tüchtig durch einander gerührt, bis sich kein bläulicher Basalt- noch weißer Kalk-Fleck mehr zeigte, sondern alles eine recht gleiche bläulichgraue Masse geworden war. Hierauf wurden, unter beständigem Durcharbeiten, die Steine nach und nach hinein geschüttet, und sodann in einen hölzernen Kasten hinein gedrückt, fest zugebunden, und in das Wasser versenkt. Ferner ließ Hr. v. G., um die Vorzüge gedachten Mörtels aus der Vergleichung zu bestimmen, einen gewöhnlichen Mauer-Mörtel verfertigen, und mit demselben in eben dem Verhältnisse kleine Steine vermengen, und darauf, wie obgemeldete Masse, in Wasser versenken. Beyde mit den verschiedenen Mörteln angefüllte Kästchen ließ Hr. v. G. über 3 Monathe ruhig im Wasser stehen, und alsdann dieselben öffnen. Das Kästchen mit dem gewöhnlichen Mörtel war bey dem Herausnehmen weit leichter, und durch verschiedene Seiten- und Boden-Löcher, auch Seiten-Fugen, drang viel weißes milchichtes Kalk-Wasser durch, bey dem andern Kästchen aber gar nichts. Die gewöhnliche Kalk-Masse ließ sich

sehr leicht in Stücke zersetzen, war sehr naß, weich, und ließ sich gleich mit den Fingern zerbröckeln. Bey dem andern mit Basalt-Staube gemachten Mörtel, theilten sich an den Ecken etliche Stückchen ab; die innere Masse aber war hart, und auch schwer.

Auf ähnliche Art vermischte Hr. von G. nachher zerriebenen Tras aus Herrenhuth mit Kalk. Das Gemenge arbeitete sich viel schwerer zusammen, als der Basalt-Staub, und wurde schmutzig dunkelgrau. Die ganze Masse war in folgender Proportion: An Kalke, 3 Mäßel; an Traße, 6 M.; an Sande, 1½ M.; an Stein, 6 M. Als diese Masse 9 Monathe im Wasser gelegen hatte, war sie ganz fest, auf allen Oberflächen fast glatt, und wenigstens so fest als ein Mauer-Ziegel, inwendig war die Masse grau, und ganz ziegelhart.

Hieraus folgt, daß der Mörtel, worunter Tras gekommen war, sehr hart und im Wasser unveränderlich, der mit Basalt-Staube gemachte Mörtel aber zwar nicht so fest, doch weit fester, als der gewöhnliche Mörtel, war. Indessen glaubt Hr. v. G., daß der Basalt noch nicht klar genug gemacht worden, und daß also die Vermischung der Kalk- und Basalt-Theilchen nicht so genau geschehen war, als es wohl bey größerer Sorgfalt hätte geschehen können.

Jetzt, da man, nach Hrn. Leske Untersuchungen, Tras genug in der Ober-Lausitz findet, wird man sich die Mühe ersparen können, den festen und harten Basalt zu zermalmen, da dessen Staub ohnedies doch nicht so festhaltend ist, als der zerriebene Tras und die Puzzolan-Erde.

Anzeige von der leipz. ökon. Societät, in der Oster-Messe 1783, S. 13, fgg.

Zu vorstehender Nachricht des Hrn. Prof. Leske, hat Hr. Bergsecret. Voigt in Weimar folgenden Nachtrag eingesendet.

„Mit vielem Vergnügen finde ich in der Anzeige von der leipz. ökon. Societät, die vortreffliche Abhandlung von der in der Ober-Lausitz gefundenen Kitt-Erde und ihrer Nutzanwendung. Da ich nun Gelegenheit gehabt habe, am Rheinstrohm die Geburts-Oerter des Trasses, seinen Gebrauch und den großen Handel damit zu sehen: so glaube ich, hier noch einiges zur Ergänzung derselben beytragen zu können.

„Ueber

„Ueber seine Nutzbarkeit und den Gebrauch desselben lässet sich kaum noch etwas sagen, desto mehr aber über seine Natur und richtige Erkenntniß desselben. Er ist ganz zuverlässig allemahl eine vulcanische Ausgeburt, und der in der Gegend um Andernach eine vulcanische Asche, die nur in einem sehr geringen Grade verhärtet, und voll kleiner Bröckchen von Bimstein, Lava und Thon-Schiefer, ist, die mit ihm zugleich ausgeworfen wurden.

„Dieser Traß wird vorzüglich geschätzt, und von den Holländern in unglaublicher Menge weggefahren. Nun fragt sich, warum man just diesen so hoch schätzt, ob es in seinen Bestand-Theilen, oder in andern Umständen, liegt? Der Augenschein überzeugte mich dort, daß es allein seine Leichtigkeit und der geringe Zusammenhang seiner Theile war, weswegen er besser transportiret, und geschwinder zermalmet werden konnte.

„Bey dem Dorfe Conz befinden sich Aschen-Schichten, die nur etwas härter sind, als die übrigen, und deswegen erkennt man sie gar nicht für Traß, nennt sie auch zum Unterschied von jenen Brietz.

„Nahe bey Bockenheim, ohnweit Frankfurth am Mayn, bricht eine etwas poröse schwarzgraue Lava, die sehr schicklich zu Quadern, Thür- und Fenster-Pfosten, ingl. zu Abweisern an die Straßen ꝛc. verarbeitet wird. Die klaren Abgänge davon sammeln die Steinmetzen sorgfältig, und verkaufen sie, als den feinsten Traß theurer, als jenen, der vulcanische Asche ist, weil man dort weiß, daß er mehr innere Güte hat. Man sieht hieraus, daß es nicht eben Asche seyn muß, sondern daß jede Art Lava, folglich auch der Basalt, hierzu sehr brauchbar ist, wie dieses auch die angestellten Versuche des Hrn. v. Gersdorf bestätigen. Man hat also nicht mehr Ursache, sich bey Wasserbauen so ängstlich nach Traß umzusehen, da vulcanische Berge nicht eben sparsam unsere Erde besetzen. Gesetzt aber, sie wären zu weit entlegen, so könnte man mit eben dem Vertrauen seine Zuflucht zu Schlacken nehmen, die gewiß mancher Gegend eines der größten Bedürfnisse in diesem Falle ersetzen würden. Zu ihrer Zermalmung braucht man nicht mehr Anstalten und Kosten, als zu Zermalmung des Trasses; und wie leicht wäre es nicht, an irgend eine benach-

barte Mühle in dieſer Abſicht ein trocken Pochwerk anzuhängen.

Anzeige von der leipz. ökon. Societ. in der Mich. Meſſe 1783, S. 20, fgg.

Wenn man den gewöhnlichen Leder-Kalk mit Gyps und zerklopften Ziegel-Steinen vermiſcht, ſo iſt er zu Waſſerwerken dienlich. Gyps, Eiſenfeilſtaub, oder bey gröbern Arbeiten Hammerſchlag, mit Ziegel-Mehl gemengt, und mit Eſſig angefeuchtet, gehört ſchon unter den feinern Kitt.

1 Pf. Wachs, 1 Pf. Pech, und 2 Loth Talg, unter einander zerlaſſen, gibt einen Kitt zu Waſſer-Trögen.

Auszug eines Schreibens, von Waſſer-Behältniſſen und Cement, des in holländiſchen Dienſten ſtehenden Generals von Creuenach. „Ich zweifle nicht, man werde auch den Urſprung der Quelle, oder den Einlauf in die Röhren bey der Quelle, ingl. die Röhren über dem Stadt-Graben auf ſolche Art verwahrt haben, damit durch einen ſtarken Froſt das Waſſer nicht zu Eis gefrieren kann. Denn dieſe Vorſorge iſt ſo nöthig, als alles andere, was bisher gethan worden iſt. Denn wenn man das Unglück haben ſollte, daß das Waſſer in einer Röhre gefröre, ſo würde es erſtlich ſchwere Koſten verurſachen, um das Waſſer wieder fließend zu machen; ferner würden viele Röhren zerſpringen und berſten, und die Bürgerſchaft würde in der nöthigſten, und in Anſehung der Feuersgefahr gefährlichſten Zeit im Jahre keinen Tropfen Waſſers haben. Vornehmlich wäre nöthig, daß bey dem Einlaufe des Waſſers in die Röhren, ein Brunnen-Häuschen über die Quelle gebauet würde, damit das Waſſer an dem Einlaufe vor allen Dingen nicht gefrieren möge. Was das zu bauende Baſſin oder Waſſer-Behältniß bey dem Brunnen in der Stadt betrifft, ſo wäre meine Meinung, daß man daſelbſt ein beträchtliches Baſſin hätte anlegen müſſen, woraus man in Feuersgefahr einen hinlänglichen Vorrath von Waſſer zum Löſchen haben könnte. Wenn das Waſſer 4 Schuh über die Erde ſteigen kann, ſo könnte das Baſſin über die Erde gebauet werden; ſteigt es aber nicht ſo hoch, ſo müßte es in die Erde gemacht werden.

den. Ueber der Erde kann es, wenn man keine gute Quader-Steine haben kann, auch von dicken eichenen Bäumen verfertiget werden. In der Erde aber müßte es gemauert werden, welches, in Ermangelung der Quader-Steine, nur mit Back- oder Ziegel-Steinen geschehen darf; wo man zu unterst erst ein Bette von trocknen fetten Leimen 1½ Sch. dick, in ganz dünnen Lagen, so hart als Stein, auf einander fest setzt, und hernach darauf bauet. An statt des Mörtels zu den Mauern müßte man sehr wenig, oder gar keinen Sand unter den Kalk mengen, sondern die Hälfte gelöschten, und die andere Hälfte ungelöschten, zu Mehl gestoßenen und fein durchgesiebten Kalk durch einander gebrauchen, und in die Fugen zwischen den Steinen, so dünn als möglich, anlegen. Hinter diese Mauern müßte, wenn man die Kranz-Mauer aufführt, wieder 1 Sch. dick trockner und fetter Leimen herum gestampfet werden. Von innen aber werden die Fugen zwischen den Steinen nach der Breite eines Fingers tief gleich währendem Aufmauern ausgekratzet. Hernach, wenn die Mauer ganz fertig ist, macht man einen frischen Kalk, auf vorgedachte Art, von halb gelöschtem und halb ungelöschtem Kalk, und dann nur so viel, als der 8te Theil beträgt, von klein gestoßenem und fein durchgesiebtem ungebrannten Kalk-Steine. Man zerschlägt nähmlich und stampft dergleichen Stein, woraus der Kalk gebrannt wird, so klein als Mehl, und treibt es durch ein Mehl-Sieb; menget alsdann von diesem Stein-Mehle, so viel als der 8te Theil vom Kalke beträgt, unter den gelöschten und ungelöschten Kalk, richtet diese Masse mit Wasser, wie ordinären Mörtel, zu, und macht hiervon einen Anwurf von innen in dem Bassin an die Mauer, einen halben Finger dick, wobey der Mäurer diese Masse mit der Kelle in die ausgekratzten Fugen zwischen die Steine fest eindrückt, damit die angetragene Masse oder der Anwurf sich in diese Fugen recht einlege, und fest halte. Man reibt alsdann den Anwurf sauber mit kleinen Marmor-Täfelchen ab, damit er recht glatt werde, so wird das Bassin, als ob es aus einem einzigen Stücke von harten Kalk-Steinen gegossen wäre, und ein ewig dauerndes Werk darstellen. Wenn aber der Hr. Burgemeister sich zu einer solchen Arbeit entschließen sollte, müßte er vorher, in Ansehung der obbemeldeten, aus zweyerley Kalke bestehenden Composition oder Masse, durch einen Mäurer nur von

10 bis 20 Ziegel-Steinen eine Probe machen laſſen, um zu ſehen, ob die aufgegebene Proportion mit dem dortigen Kalke gut und brauchbar ſey; oder ob man von dem einen mehr, als von dem andern, unter einander nehmen müſſe. Denn der Kalk iſt an dem einen Orte ſtärker oder ſchwächer, als an dem andern. Wir haben hier den Stein-Kalk von Tornay, und von Lüttich. Der erſte iſt viel ſtärker, und zu Waſſer-Gebäuden beſſer, als der letzte; doch beyde werden in verſchiedener Vermiſchung mit ſehr gutem Effecte gebraucht. Nach meiner Meinung müßte das Baſſin inwendig wenigſtens 24 Schuh weit, 30 Sch. lang, und 3 Sch. tief, gemacht werden."

No. 27 des leipz. Int. Bl. v. J. 1767, S. 266, f.

Die von Lehm oder Töpfer-Erde gebrannten Röhren zuſammen zu kitten, bedient man ſich, nach de Serres Vorſchrift, entweder eines warmen, oder eines kalten Kittes. Zu einem warmen Kitt, nimmt man Bolus, Hammerſchlag, Glas, und Bach-Sand, von einem ſo viel, als von dem andern, und ſo viel Ziegel-Mehl von alten Ziegeln, als die vorgedachten 4 Stücke zuſammen betragen, ſchlägt das Ziegel-Mehl durch ein Sieb, und vermiſcht es mit den andern Materien wohl; hernach nimmt man zwey Mahl ſo viel Pech, als obgedachten Pulvers mit einander geweſen iſt, zerläſſet ſolches in einem eiſernen Topfe über Kohl-Feuer, thut ein wenig Nuß- oder auch nur Lein-Oehl, und etwas Fett oder Schmeer, es ſey von was für einem Thiere es wolle, darunter. Wenn dieſes nun mit dem Peche zergangen iſt, und zu kochen anfängt, muß man obgedachtes Pulver nach und nach einmiſchen, und ohne Unterlaß wohl einrühren, bis man ſieht, daß es ſich an dem Rühr-Holze fadenweiſe, wie Terpenthin, aufzieht, und, wenn es zur Probe in das Waſſer geworfen wird, gleich erhärtet; hernach wird es in ein irdenes glaſurtes Geſchirr, an deſſen Boden ein wenig Waſſer iſt, gegoſſen, und, wenn es hart geworden iſt, zum Gebrauch aufgehoben. Wenn man dieſen Kitt brauchen will, muß man ihn erſtlich mit einem

ſtarken

ſtarken Hammer zerſchlagen, hernach über einem Kohl-Feuer zergehen laſſen, und alſo warm verarbeiten. Wenn man dieſen Kitt brauchen will, muß man die Röhren ebenfalls warm machen, und beydes heiß zuſammen ſetzen. Es können alſo allezeit 4 bis 6 Stück auſſer dem Graben über dem Feuer zuſammen gekittet, und hernach mit dem kalten Kitte an die andern geſetzet werden.

Den kalten Kitt präparirt man gleichfalls von oben erwähnten Pulvern, macht ſolche mit Lein- oder Nuß-Oehl ziemlich dünn an, mengt zerſchnittenen Hanf, Werg, oder Baumwolle, oder Reh-Haare, wie auch etwas Bocks- oder Ziegen-Talg mit darunter; in dieſen dünnen Kitt wird hernach ungelöſchter durchgeſiebter Kalk nach und nach eingerührt, bis der Kitt weder an das irdene Geſchirr, noch an das Rühr-Holz, ſich mehr anhängt, auch nicht an den Händen klebt, daß man als mit weichem Wachſe damit umgehen, und ihn alſo kalt verarbeiten kann.

Die Beſchaffenheit feſten Mörtels und Cimentes zu erläutern, hat Hr. Prof. Gadd zu Abo über 100 Verſuche angeſtellt, von denen er 80 im 32 B. der Abh. der Kön. ſchwed. Akad. d. Wiſſ. a. d. J. 1769, (nach der Ueberſetz. des Hrn. Hofr. Käſtner, Lpz. 1774, 8.) S. 201, fgg. mittheilt. Die Proben waren in Geſtalt länglicher kleiner Würfel, 1 Zoll dick, und 4 Z. lang. Der größte Theil dieſer Zuſammenſetzungen wurde im Anfange des Märzes 1760 zubereitet. Weil andere Geſchäfte Hrn. Gadd hinderten, ſo ließ er ſie nachher in einer Kammer zum Trocknen ſtehen bis d. 10 Jul. 1767, da ihre Härte und ihr Verhältniß im Waſſer unterſucht wurde. Alle Proben lagen 10 Min. lang im Waſſer, worauf angemerket wurde, ob ſie aufgeweicht, oder gar aufgelöſet waren, auch wie viel Waſſer in dieſer Zeit jede Ciment-Art an ſich zog. Bey jeder Probe wird zuerſt ihre

und Zuſammenſetzung, nebſt ihrem Gewich-
h ihre Härte und Feſtigkeit, ehe ſie in das
n, und zuletzt ihr Verhalten im Waſſer, an-
.

I. Kalkartige Cimente.

4 Theile Kalk, $\frac{1}{10}$ Eiſen-Vitriol, und $\frac{1}{10}$ Oehl; wog $\frac{3}{4}$ Loth, ziemlich hart und feſt; weichte im Waſſer nicht auf.

2. $\frac{1}{10}$ Kupfer-Feilſpäne gegen den Kalk; 1 L., ſehr hart; zog $\frac{1}{4}$ Loth Waſſer ein.

3. $\frac{1}{10}$ Rübſen-Oehl gegen den Kalk; 2 L., ſehr hart, zog wenig Waſſer an.

4. $\frac{1}{7}$ groben Sand gegen den Kalk, 2 L., härter als Kalk und Waſſer; zog $\frac{1}{2}$ L. Waſſer ein.

5. Kalk mit Kupfervitriol-Waſſer; 1 L., locker; zog mehr als $\frac{1}{4}$ L. Waſſer ein.

6. $\frac{1}{10}$ Ziegel-Mehl mit Kalk und Vitriol-Waſſer; 1 L., locker; zog über $\frac{1}{4}$ L. Waſſer.

7. 1 Th. Kalk und $\frac{1}{10}$ Eiſen-Feil mit ganz wenig Oehl im Waſſer; $1\frac{1}{4}$ L., hart und feſt; kam unverändert wieder aus dem Waſſer.

8. $\frac{1}{2}$ gebranntes Ziegel-Mehl, 1 Th. Kalk; $1\frac{1}{2}$ L., ziemlich hart; aber im Waſſer weichte es auf.

9. $\frac{1}{2}$ Eiſen-Vitriol gegen 1 Th. Kalk; $1\frac{1}{4}$ L., etwas hart; ward aber im Waſſer locker, und zog $\frac{1}{2}$ L. in ſich.

10. $\frac{1}{10}$ Vitriol gegen Kalk; 1 L., feſter und härter; verhielt ſich aber im Waſſer wie vorhergehendes.

11. $\frac{1}{2}$ Eiſen-Feil gegen Kalk; 1 L., ziemlich hart; kam noch feſter aus dem Waſſer.

12. $\frac{1}{10}$ Ziegel-Mehl gegen 1 Th. Kalk; $1\frac{1}{4}$ L., nicht ſo hart als voriges; zog $\frac{1}{4}$ L. Waſſer an.

13. 1 Th. Kalk, $\frac{1}{10}$ Eiſen-Feil, $\frac{1}{20}$ Thran-Oehl; $1\frac{1}{4}$ L., ziemlich hart; wurde nicht aufgelöſet.

14. $\frac{1}{10}$ Eiſen-Feil gegen 1 Th. Kalk; $1\frac{1}{4}$ L., locker; weichte etwas.

15. Halb Thon, halb Kalk; $1\frac{1}{2}$ L., locker; wurde im Wasser aufgelöset.

16. 1 Th. Kalk, $\frac{1}{4}$ Eisen-Vitriol, mit ein wenig Oehl; $1\frac{1}{2}$ L., guter Mörtel; wenig aufgelöset.

17. 1 Th. Kalk, $\frac{1}{10}$ Thran-Oehl; 1 L., härterer Mörtel; im Wasser wenig geändert.

18. 1 Th. Kalk, $\frac{1}{10}$ Eisen-Feil in Vitriol-Wasser; $1\frac{1}{2}$ L., lockerer; weichte auf.

19. 1 Th. Kalk, $\frac{1}{2}$ Salpeter mit kochendem Wasser; 1 L., harter Mörtel, weiß; wenig aufgelöset.

20. Kalk mit heißem Zinkvitriol-Wasser; 1 L., bleichgelb und ziemlich hart; zog $\frac{1}{4}$ L. Wasser an.

21. Kalk mit kochendem Alaun-Wasser; 1 L., ziemlich hart; zog $1\frac{1}{4}$ L. Wasser an.

22. Feiner Kalk und grobkörniger Kalk mit kochendem Wasser; 1 L. Der letztere gab stärkern Mörtel, als der erste; aber beyde zogen $\frac{1}{4}$ L. Wasser an.

23. 1 Th. Kalk, $\frac{1}{10}$ Ziegel-Mehl in öhlichter Lauge; $1\frac{1}{2}$ L., ein fester brauner Mörtel; im Wasser nicht aufgelöset.

24. 2 Th. Kalk, 1 Th. Thon; 1 L., locker; zog $\frac{1}{4}$ L. Wasser ein.

25. 1 Th. Kalk, 1 Th. grober Sand, 1 Th. Thon; 2 L., locker; wurde im Wasser aufgelöset.

26. 1 Th. Kalk, $\frac{1}{4}$ Thon, $\frac{1}{8}$ Eisen-Feil; 2 L., locker; aufgelöset.

27. 1 Th. Kalk, $\frac{1}{4}$ Sand, mit kochendem Alaun-Wasser; $1\frac{1}{2}$ L., etwas fester; weichte aber nach und nach.

28. Kalk mit kochendem Vitriol und Alaun; 1 L.; eben so.

29. Kalk mit kochendem Salpeter und Kochsalz-Solution; 1 L., fester Mörtel; zog wenig Wasser an.

30. Kalk mit Koch-Salz und Vitriol-Wasser zusammen gekocht; $1\frac{1}{4}$ L., bleichrother harter Mörtel; weichte aber, und zog $\frac{1}{4}$ L. Wasser an.

31. Kalk mit feinem Kohlen-Gestübe und Wasser; 1 L., hart; weichte aber ebenfalls.

32. Kalk mit Koch-Salz und Alaun-Waſſer; 1 L., hart; weichte auch.

33. Kalk mit Kochſalz-Solution allein: 1 L.; verhielt ſich wie die beyden vorigen.

34. Kalk mit Alaun und Salpeter-Solution; 1 L. harter Mörtel; zog doch ½ Loth Waſſer an.

35. Kalk mit ſaurer Butter-Milch vermengt; 1 L., weiß und harter Mörtel; zog kein Waſſer an.

36. Kalk mit ſaurer Milch und der Hälfte Waſſer; 4 L., ſah eben ſo aus; zog aber ein wenig Waſſer an, und wurde weich.

37. Kalk, ſaure Milch und Alaun-Waſſer; 1 L.; verhielt ſich in allem wie voriges.

38. 2 Th. Kalk mit 1 Th. Quell-Roſt (*); 1½ L., ziemlich hart; in Waſſer aber löſete es ſich auf.

39. Kalk, Theer-Waſſer und Aſche; 1 L., hart; löſete ſich aber auf.

40. 2 Th. Kalk, 1 Th. Quell-Roſt, mit Theer-Waſſer; 1¼ L., feſterer Mörtel; wurde doch nach und nach aufgeweicht.

41. 1 Th. Kalk, ¼ Quell-Roſt, mit Butter-Milch; 1¼ L., guter Mörtel; weichte wenig.

42. Kalk, Theer-Waſſer und Vitriol; 1 L., gewöhnlicher Mörtel, weichte aber.

43. Vorerwähnte Zuſammenſetzung mit ¼ beygemiſchten Sande; 1½ L., lockerer Mörtel; wurde gänzlich im Waſſer aufgelöſet.

44. 1 Th. Kalk, ½ calcinirter Vitriol mit Lein-Oehl; 1¼ L., bleichgelber harter Mörtel; wurde nicht aufgelöſet.

45. 1 Th. Kalk, ¼ eiſenroſtiger Sand mit abgegoſſenem Dünger-Waſſer; 1¼ L., bleichgelb, harter Mörtel; weichte nicht.

II. Thon-

(*) Vielleicht der roſtähnliche Boden-Satz, der ſich in eiſenhaltigen Quellen findet.

II. Thonartige Cimente.

1. 1 Th. Thon, $\frac{1}{2}$ Eisen-Feil mit Theer-Wasser; 1 L., lockerer Mörtel; im Wasser aufgelöset.
2. 1 Th. Thon, $\frac{1}{2}$ Asche, $\frac{1}{10}$ Rübsen-Oehl; 1 L., harter, zäher Mörtel; nicht aufgelöset.
3. 1 Th. Thon, $\frac{1}{2}$ Eisen-Vitriol, $\frac{1}{8}$ Rübsen-Oehl; $1\frac{1}{2}$ L., hart und fest; wurde wenig aufgelöset.
4. 1 Th. Thon, $\frac{1}{8}$ Eisen-Feil mit $\frac{1}{8}$ Thran-Oehl; 1 L., recht harter Mörtel; nicht aufgelöset.
5. Thon mit Theer und Aschen-Lauge; 1 L., etwas hart; weichte nach und nach.
6. Thon mit Theer und Wasser; 1 L., etwas hart; wurde aufgelöset.
7. Thon mit öhlichter Lauge, welche aus 4 Th. Thran-Oehl und 1 Th. Asche bestand; $1\frac{1}{4}$ L., recht harter und fester Mörtel; hält fest gegen die Nässe.
8. Thon mit Vitriol-Wasser; $1\frac{1}{4}$ L., locker; leicht auflöslich.
9. 1 Th. Thon, $\frac{1}{2}$ Koch-Salz, $\frac{1}{10}$ Theer; $1\frac{1}{4}$ L., fester als voriges; weicht aber auf.
10. 1 Th. Thon, $\frac{1}{4}$ Kalk, mit Theer-Wasser; 1 L., etwas hart; aber leicht auflöslich.
11. 1 Th. Thon, $\frac{1}{2}$ Eisen-Vitriol, mit Theer-Wasser; 1 L.; verhielt sich wie voriges.
12. 1 Th. Thon, $\frac{1}{4}$ Asche, mit Vitriol-Wasser; 1 L., locker; auflöslich.
13. 1 Th. Thon, $\frac{1}{4}$ fein Kohlen-Gestübe; 1 L., etwas hart; weicht leicht auf.
14. Thon, Theer-Wasser und Kohlen-Gestübe; 1 L., locker; sog Wasser ein, und wurde aufgelöset.
15. 1 Th. Thon und $\frac{1}{4}$ Ziegel, eben so.
16. Thon, Ziegel und Theer-Wasser; 1 L., locker; weicht nach und nach.
17. Thon, Ziegel und Vitriol-Solution, eben so.
18. Thon, Ziegel-Staub, Asche und Theer, mit Wasser; $1\frac{1}{4}$ L., hängt nicht sehr zusammen; wird aufgelöset.

19. Thon, gebrannter Ziegel-Stein, und Oehl; 1 L., bindet ziemlich; wird vom Waſſer nicht ſehr aufgelöſet.

20. Thon mit Quell-Roſt; 1 L., taugt nicht zu Mörtel; wird leicht vom Waſſer aufgelöſet.

21. Thon, Quell-Roſt und Theer-Lauge; 1 L., locker; leicht aufzulöſen.

22. Thon, Quell-Roſt und Oehl-Lauge; $1\frac{1}{2}$ L., viel feſter; wird aber doch aufgelöſet.

23. Thon, Eiſen-Feil und Waſſer; $1\frac{1}{2}$ L., gleicht dem gewöhnlichen Mörtel, iſt aber im Waſſer nicht bindend, wenn es auch gleich mit Lauge von Theer zubereitet wurde.

24. Thon, Alaun-Waſſer und Sand; $1\frac{1}{2}$ L., ſchien bindend zu ſeyn; wurde aber doch leicht aufgelöſet.

25. Thon, Alaun-Waſſer, Aſche und Sand; $1\frac{1}{2}$ L., etwas hart im Trocknen; wurde aber nach und nach im Waſſer aufgelöſet.

26. 1 Th. Thon, $\frac{1}{4}$ Aſche, in ſaurer Milch zubereitet; 1 L., gab einen ſehr harten Mörtel, welcher aber doch im Waſſer weichte.

27. Thon, Sand und ſaure Milch; $1\frac{1}{4}$ L., etwas feſt; wurde aber aufgelöſet.

28. 1 Th. Thon und $\frac{1}{2}$ Kalk; 1 L., verhielt ſich wie voriges.

29. 1 Th. Thon und $\frac{1}{10}$ Kalk; $\frac{1}{4}$ L., locker; weicht leicht auf.

30. 1 Th. Thon, $\frac{1}{4}$ See-Sand, $\frac{1}{10}$ Kalk; $1\frac{1}{2}$ L., untauglich; leicht aufzulöſen.

31. 1 Th. Thon, $\frac{1}{2}$ eiſenroſtiger Sand, $\frac{1}{10}$ Kalk, $1\frac{1}{2}$ L., war verhärtet; wurde aber doch etwas aufgelöſet. Iſt zu Herden in Schmelz-Oefen, und zum Beſchlage bey Feuer-Stätten zu brauchen.

32. 1 Th. Thon, $\frac{1}{4}$ eiſenroſtiger Sand, mit abgeſeihetem Dünger-Waſſer; $1\frac{1}{2}$ L., gibt ſtärkern Mörtel, und wird weniger aufgelöſet, als vorhergehendes.

33. 1 Th. Thon, $\frac{1}{6}$ Puzzolane, $\frac{1}{10}$ Kalk; $1\frac{1}{2}$ L.; ein ziemlich hartes Ciment, welches doch im Waſſer nach und nach aufweicht.

III. Gypsartige Cimente.

1. Gebrannter abgekühlter Gyps zu Mörtel in einem Versuche, und heisser Gyps in einem andern; jedes 1 L. Der letztere gab festern Mörtel, als der erste; beyde aber wurden im Wasser durchweicht und aufgelöset.
2. Heißer Gyps, mit der Hälfte Wasser und der Hälfte Butter-Milch; 1 L.; noch fester, und nicht so leicht aufzulösen.
3. Halb Gyps und halb Kalk; 1 L., lockerer, bey weniger Kalk fester; doch wurde es nach und nach aufgelöset.
4. Halb Thon und halb gebrannter Gyps: 1½ L., ziemlich guter Mörtel; aber im Wasser weichte es auf.

Schlüsse.

1. Nach den angeführten Versuchen, entstehen die festesten Cimente und Mörtel, aus Kalk, Eisen oder eisenhaltiger Erde, mit beygemischter Fettigkeit, die doch in einer gewissen Proportion, und nicht überflüssig, zugesetzet werden muß, wenn sie die erwünschte Wirkung thun soll.
2. Beymischung von Theer, seifenartigem Wesen, vegetabilischer oder mineralischer Säure, hindern des Cimentes Stärke.
3. Aus Thon, ein wenig Asche und Oehl, wird ein gutes Ciment. Lässet man die Asche weg, und mischt Eisen-Erde mit häufigem zugesetzten Oehle unter den Mörtel, so wird er auch im Wasser hart.
4. Eisen-Erde verschlackt, oder in Kalk-Gestalt, bindet nicht so gut, als wenn das Eisen in seiner metallischen Gestalt vorhanden ist. Will man das erste brauchen, so muß man etwas Brennbares hinzu setzen, wodurch das Eisen im Cimente metallisirt wird.
5. Zerstoßene gebrannte Ziegel lassen sich, in Ermangelung der Puzzolan-Erde, mit Kalk brauchen, wenn nur genug Brennbares zugesetzt wird.

6. Eisen-

6. Eiſen-Vitriol unter den Kalk zu Mörtel zu mengen, bringt mehr Schaden als Nutzen, wofern nicht eine Fettigkeit dazu kommt.

7. Eiſen-Ocher, Eiſen-Schlacken, und eiſenhaltige Erd-Arten, binden nicht ohne Brennbares.

8. Wenn man eiſenhaltigen Steinkohlen-Staub, welcher nicht thonig iſt, mit Waſſer und etwas Oehlichten anfeuchtet, und ein Par Wochen darnach mit Kalke zu Mörtel vermenget, ſo gibt er ein ſo feſtes Ciment, als Puzzolan-Erde.

9. Wie unſere Künſtler durchgängig bey ihren Kitten, Bley mit Zuſetze von Oehl brauchen, auch die chemiſche Theorie und die Erfahrung beſtätigen, daß Bley in Kalk-Geſtalt, mit Zuſatze eines Brennbaren allemahl ſteinhart wird: ſo möchte es der Mühe werth ſeyn zu verſuchen, ob ſich nicht aus armen Bley-Erzen, welche ſonſt die Koſten nicht einbringen, eine gute Puzzolane machen lieſſe. Man brauchte zu dieſer Abſicht nur dieſe arme Bley-Erze zu röſten und zu pochen.

Nach Hrn. Gadd, hat auch der Bergm. und Direct. bey dem Eiſenmanufacturwerke in Stockholm, Hr. Bengt Quiſt, folgende Verſuche mit der Puzzolane, und zugleich, um der Vergleichung willen, mit mehrern Erd- und Stein-Arten angeſtellt.

§. I. Unter der Puzzolane, wie ſie aus Italien und von Civita Vecchia unbereitet oder ungemahlen kommt, hat man folgende Abänderungen ausgeſucht, die man gemeiniglich in Klumpen von ungleicher Größe, von einem Eye bis zu einer Haſelnuß und darunter, findet.

No. 1. Rothbraun, durchaus röhrig, wie Bimſtein oder Schwamm, mit eingemengten weißen Druſen, größer oder kleiner, in allen Stücken dunkelm Quarze ähnlich, aber ohne glänzende Fläche und manchmahl mit ſichtbaren Theilen von weißen Glimmern und kleinen Druſen, von grauer Farbe. Dieſe Art findet man oft mit kleinen Druſen-Höhlen, meiſt leer. a) Iſt ſehr ſpröde, und fühlt ſich zwiſchen den Fingern ſcharf an. b) Etwas ſchwer, von gröberer Textur, ſo daß die

röhr-

röhrichte oder drusichte Zusammensetzung ziemlich grob ist. c) Schäumt nicht mit sauern Geistern. d) Roh wird es ziemlich vom Magnete gezogen, und die Calcination scheint dieß nicht zu verstärken. e) Gebrannt, verliert es etwas von der rothbraunen Farbe, und wird dunkler. f) Es schmilzt leicht genug für sich zu einer schwarzen Schlacke; mit Borax schmilzt es sehr leicht zu einem matten gelbgrünen Glase, gemeiniglich aber bleibt ein Theilchen ungeschmelzt. Mit Sal fusibile microcosm. wird es nicht sogleich aufgelöset, geht gleichwohl damit in starker Hitze, in eine undurchsichtige Glas-Masse. g) Vorerwähnte weiße Drusen, die durchaus überall in die Puzzolane eingemengt sind, sind wie feine Sand-Körner, die durch das Feuer gegangen sind, von unterschiedener Größe, von den feinsten Sand-Theilchen, bis zur Größe gewöhnlichen Hagels; sie fühlen sich scharf an, sind aber auch sehr zerbrechlich, schäumen nicht mit Säuren, schmelzen weder allein, noch mit Borax, überlaufen aber bey heftigem Feuer auf der Oberfläche leicht mit Glase.

NB. Durch kleines Gebläse im Feuer wurden erwähnte weiße Drusen klar, wie gewöhnliche weiße und klare Quarz-Körner. Dadurch, daß sie zuvor gleichsam calcinirt, und durchaus zum feinsten Mehle zertheilt sind, und in gehöriger Hitze bald wieder zusammen schmelzen, eräugnet sich, daß die Undurchsichtigkeit verschwindet, und diese kleine Drusen im Feuer zu verhärten scheinen, welches gleichwohl nur eine Zusammenschmelzung der feinsten Theile ist, die an einander rühren; nachgehends lassen sie sich nicht in Borax auflösen, wenn sie nicht zum feinsten Pulver gemahlen worden, da denn das Glas weiß, ungefärbt wird.

No. 2. Härter und ein wenig schwerer, aber von eben der Farbe und röhrichten Baue; im Bruche und in den Drusen-Höhlen kleine schwarze Schlacken-Häute, wie eine bekannte Art Blutstein, hat sehr wenig vorerwähnte Drusen (No. 1. g.), übrigens in allen Umständen von eben dem Verhalten.

No. 3. Violet, noch härter und schwerer, ganz gleich röhricht, ziemlich wie die Pierre d'Agde, welche weiter

ter unten beſchrieben werden ſoll, auch die weißen Druſen, wie No. 1, und in allen Umſtänden ſo.

No. 4. Braun, ziegelfarben, etwas lockerer, als alle vorhergehenden, von eben dem Baue, wenig weiße Druſen. a) Roh wird es faſt ganz und gar vom Magnete gezogen. b) Wird im Feuer dunkler. c) Schmilzt ohne Zuſatz ſehr leicht zu ſchwarzer Schlacke, die auch vom Magnete gezogen wird, und mit Borax leichter aufzulöſen iſt, als vorhergehende, aber dem Glaſe keine andere Farbe gibt, als matt gelbgrün. d) Scheint ein wenig im Feuer zu verharten. e) Schäumt nicht mit Säuren.

No. 5. Grau, lockerere Zuſammenfügung, als alle vorhergehende, eben ſo undichter ſchwammichter Bau mit Druſen-Höhlen, und wenig graugelbe Druſen. a) Schäumt nicht mit Säure. b) Wird roh ziemlich ſtark vom Magnete gezogen. c) Wird im Feuer rothbraun, und ſcheint ein wenig zu verhärten. d) Schmilzt für ſich zu ſchwarzer harter Schlacke, die nicht vollkommen mit Borax ſchmilzt, aber das Glas matt gelbgrün färbt.

No. 6. Bleich, rothbraun mit lichtern Flecken, röhricht, nicht ſehr hart. a) Schäumt nicht mit Säuren. b) Wird uncalcinirt vom Magnete gezogen. c) Verhärtet merklich im Feuer, und bekommt eine dunklere braune Farbe. d) Schmilzt für ſich zu ſchwarzer Schlacke, die vom Magnete gezogen wird. Uebrigens mit vorigen einerley.

No. 7. Dunkelgrau, ein wenig in das Braune fallend, hart und von gröberer Zuſammenſetzung, als vorige, einer röhrichten Schlacke ähnlich, zerfällt in concave und convexe Stücke, wenn man es mit dem Hammer zerſchlägt, wird roh vom Magnete gezogen, bekommt in der Calcinations-Hitze eine ſtärkere braune Farbe, ſchmilzt für ſich zu ſchwarzer Schlacke, und mit Borax zu gelbgrünen Glaſe.

No. 8. Meiſt ſchwarz, lockerer als nächſt vorhergehendes, von etwas feinerm Gewebe, gegen die äuſſere Fläche graulich, inwendig ſchwarz; gerieben gibt es ein graues Pulver; roh wird es am ſtärkſten unter allen vom Magnete gezogen, verliert aber hierin gleichſam

sam etwas durch das Feuer, brennt sich rothbraun, schmilzt leicht zu schwarzer Schlacke, und mit Borax zu gelbgrünen Glase.

N. 9. Schwarz, härter und schwerer, von dichterer Structur, als vorhergehende, gegen die Oberfläche graulich, in das Braune fallend, inwendig schwarz, hat einige wenige, oben beschriebene Drusen. a) Gerieben, gibt es ein graues Pulver. b) Wird roh vom Magnete gezogen. c) Wie vorige.

No. 10. Dunkel, ein wenig in das Braune fallend, sehr hart, obenhin wie ein Blutsteinerz anzusehen, wie alle vorige, von undichter schwammichter Zusammenfügung, bräunlich und rauh auf der Oberfläche, inwendig dunkel, riecht merklich wie roher Thon. a) Gepülvert, wird es graulich. b) Vom Magnete gezogen. c) Schmilzt für sich zu einer schwarzen harten Schlacke. d) Färbt das Borax-Glas gelbgrün.

No. 11. Rothbraun, dem Jaspiß sehr ähnlich, von eben der Farbe, von etwas dichter Zusammensetzung mit Drusen-Höhlen. a) Riecht wie roher Thon. b) Wird vom Magnete gezogen. c) Schmilzt für sich zu schwarzer harter Schlacke, und mit Borax zu gelbgrünen Glase.

No. 12. Schwarz, mit rothbrauner Fläche rings herum, inwendig aber schwarz, dicht, am härtesten unter allen, und ziemlich schwer. Im Bruche, einem dunkeln Agate nicht unähnlich, hin und wieder mit schuppigen Theilchen, und feinen eingesprengten Drusen-Höhlen. a) Lässet sich nicht wohl mit Stahle schneiden, sondern schneidet selbst Glas, gibt doch gegen Stahl kein Feuer. b) Gepülvert, wird es graulich. c) Vom Magnete gezogen. d) Seine eigene Schwere zum Wasser = 2, 570 : 1. e) Schmilzt ohne Zusatz zur Schlacke, übrigens wie vorige.

No. 13. Schwarz, hart und ziemlich schwer, aber nicht so dicht, als vorhergehende, sondern mehr drusig oder röhrig, wiewohl nicht so gleichröhrig, als die meisten vorigen; unter dem Hammer zerfällt es in concave und convexe Stücke, riecht wie roher Thon, sonst wie die übrigen.

No. 14. Lichtgrau, von mehrern Abänderungen, mit lichter, grauer, in das Braune fallender Oberfläche. Im Bruche schuppig, mit eingemengten, meist klaren Drusen, größern und kleinern, wie Quarz-Körner. a) Riecht wie roher Thon. b) Schäumt nicht mit Säuren. c) Verhärtet nicht im Feuer, und wird spröder. d) Wird roh vom Magnete gezogen. e) Schmilzt für sich zu schwarzer Schlacke. f) Wird im Borax zu gelbgrünen Glase aufgelöset. g) Die weißen Drusen im Feuer völlig, wie No. 1. g.

No. 15. Von dichtern und feinern Korne, viel härter, sonst aber eben so, und mit eben dergleichen Fläche. Eigene Schwere zum Wasser = 2, 785 : 1.

No. 16. Sandichtes Korn, in das Braune fallend, zerfällt schalig in concave und convexe Stücke, mit bräunlicher lichterer Fläche; eingesprengte weiße Drusen, undurchsichtig und hart. a) Nicht besonders hart. b) Wird ziemlich stark vom Magnete gezogen, ungebrannt. c) Riecht wie roher Thon. d) Schmilzt für sich zu schwarzer Schlacke, und mit Borax zu gelbgrünen Glase. e) Eigene Schwere = 2, 689 : 1.

No. 17. Dergleichen sandichtes Korn, ein wenig lichter, fällt schalig wie vorige; übrigens wie No. 14.

No. 18. Bräunlich, feinkörnig, hart und dicht, fällt schalig, wie mehrere vorhergehende, mit eingesprengten weißen Körnern (No. 14.); riecht wie roher Thon, wird fast ganz und gar vom Magnete gezogen; übrigens wie vorige.

No. 19. Lockerer grau, mit matt bräunlicher Rinde, und mit einer Menge eingestreueter Körner von oft erwähnter Art. Diese aber sind locker und undurchsichtig, wiewohl nicht so locker, als in No. 1, g.; doch viel lockerer, als No. 4, wenn sie klar und meist unzerstört sind. Riecht wie roher Thon, wird vom Magnete gezogen, und verhält sich übrigens wie vorige.

No. 20. Noch lockerer, schwarzgrau, mit vielen solchen Drusen, die lockerer, als bey vorigen, sind. Riecht wie roher Thon; sonst wie die übrigen.

No. 21. Noch lockerer, graugelb, sehr zerbrechlich, mit vielen eingemengten Drusen von matt weißer Farbe, un-

undurchsichtig und lockerer. Riecht wie roher Thon. Sonst völlig wie die andern.

No. 22. Graugelb, von sandigem Korn, etwas hart, fällt schalig in concave und convexe Stücke, eingesprengt vorerwähnte weiße Körner, riecht wie roher Thon, wird vom Magnete gezogen; meist das Gewebe, wie No. 18. Sonst wie alle vorige.

No. 23. Mehr grau, gelblich, am lockersten unter allen, fühlt sich nicht so scharf an, hat eine Menge vorerwähnter weißer Körner, und mehr Sand-Theilchen; ist ziemlich leicht. a) Wird roh fast ganz und gar vom Magnete gezogen. b) Riecht wie Thon. c) Verhärtet stark im Feuer, wird vor dem Gebläse aussen graublau, im Kerne dunkelbraun. d) Schmilzt für sich zu einer schwarzen Schlacke, und gibt dem Borax-Glase eine gelbgrüne Farbe, wie alle vorhergehende.

§. II. Im Schlämmen hat sich die Puzzolane folgender Maßen verhalten.

A. Gewählte Stücke vorbeschriebener Abänderungen, von No. 1 bis 6, wurden zerquetscht, und mit siedend heißem Wasser geschlämmet. Da wurde denn gleich im Anfange folgendes abgegossen.

No. 1. Ein sehr feiner Schlamm, welcher a) wie gebrannter Thon oder Ziegelstein-Mehl roch; b) getrocknet, die Farbe behielt, ohne zu zerfallen; c) gebrannt, etwas verhärteter, und sich schärfer zwischen den Fingern anfühlte, auch geneigt war in Würfel zu zerspringen; d) vom Magnete gezogen wurde; e) für sich zu schwarzer Schlacke schmolz, und mit Borax ein matt gelbgrünes Glas gab, wiewohl schwerer, als ungeschlämmte Puzzolane. Die Farbe ließ sich durch größere Einmengung nicht concentriren. f) Mit Sal sulib. schmilzt er ziemlich leicht zu einem undurchsichtigen weißen Glase.

No. 2. Ein gröberer Schlamm. a) Einerley Geruch mit vorigem. b) Nach dem Trocknen verlor er die Form, und zerfiel in Mehl. c) Dunkelbrauner, als voriger. d) Wurde stärker vom Magnete gezogen,

und ſchmolz etwas leichter. Uebrigens verhielt er ſich, wie der feinere.

No. 3. Das Ueberbleibſel, welches aus größern und kleinern Theilen beſtand, darunter ſich keine andere erkennen lieſſen, als von den §. 1. beſchriebenen Abänderungen, von No. 1 bis 6. Die Größe richtete ſich allezeit nach der Härte der unterſchiedenen Arten. Glimmer-Theile bemerkte man häufiger, als in ganzen Klumpen.

B. Im Ganzen genommen, wie die Erde aus Italien kam, gepülvert und geſchlämmt, gab ſie einerley Schlamm mit vorhergehenden, aber das Ueberbleibſel von mehr Abänderungen, als harte und ſchwarze Stücke, die der Zermalmung lange widerſtanden.

§. III. Gepülverte und geſiebte Puzzolane wurde ½ Stunde in reinem Waſſer gekocht, und verlor dabey am Gewichte $11\frac{27}{3}$ pro Cent; ſonſt hatte ſie keine Veränderung erlitten. Das Waſſer wurde ein wenig verdünnet, und zwey Mahl filtrirt, hatte aber noch eine Milch-Farbe, und ſtand ſo zwey Tage, ehe man merken konnte, daß ſich etwas zu Boden ſetzte, welches doch endlich geſchahe. Der Bodenſatz beſtand aus ſehr feiner Erde, die ſich ſo, wie Puzzolane insgemein, verhielt. Dieſes Waſſer hatte keinen Geſchmack, wurde von der Auflöſung des Bley-Zuckers nicht flockicht, änderte die Farbe vom Succo heliotrop. oder Coccionell. nicht, auch nicht vom Syr. violarum.

§. IV. Mit Ol. vitriol. unterſuchte man 1) gepülverte und geſiebte Puzzolane, die damit ¼ Stunde gekocht wurde, und a) dabey vom Gewichte ungefähr 42 p. C. verlor; b) auch nun ganz und gar nicht vom Magnete gezogen wurde. c) Abgewaſchen, ſchmolz ſie für ſich nicht vollkommen, ſondern ſinterte nur in eine lichte Rinde zuſammen; mit Borax ſchmolz ſie leicht zu einem klaren Glaſe, von matter, in das Grüne fallender Farbe. d) Die rothbraune Farbe war ganz und gar vergangen, und in Lichtgelb verändert.

2) Der Schlamm (§. II. A. No. 1.) wurde ¼ Stunde mit Ol. vitrioli gekocht. a) Verlor die rothbraune

Farbe,

Farbe, die in Weißgelb verändert wurde. b) Verlor $51\frac{7}{16}$ am Gewichte, c) und wurde gar nicht mehr vom Magnete gezogen; d) schmolz nicht für sich, aber mit Borax sehr leicht, zu einem farbenlosen Glase. e) Mit Sal fusib. microcosm. wurde er nicht so leicht im Feuer aufgelöset, es war dazu ziemlich starke Hitze nöthig.

3) Das Ueberbleibsel (§. I. A. No. 3.) wurde mit Ol. vitr. etwas über $\frac{1}{2}$ Stunde gekocht, und verlor im Gewichte $30\frac{20}{177}$ p. C.; die Farbe wurde bleichroth, mit Theilen darunter, welche meist weiß waren. Calcinirt, wurde es etwas vom Magnete gezogen. Man kochte es wieder mit von neuem hinzu gegossenen Vitriol-Oehle, welches mit reinem Wasser verdünnt war; da verlor es nur 6 p. C. am Gewichte, ward lichter von Farbe, und verlor mehr Anziehung des Magnetes. Es wurde noch weiter gekocht, und verlor am Gewichte $5\frac{20}{116}$ p. C., auch immer mehr und mehr von der rothbraunen Farbe; wurde vom Magnete noch so weit angezogen, daß sich einige Theilchen, weiße und lichtgraue, fanden, welche mit besonderer Heftigkeit gezogen wurden. Sie glichen polyedrischem Eisen-Erze, wenn man sie mit dem Mikroskope betrachtete. Die weißen Körner waren nur eines Theils mit der gewöhnlichen Puzzolan-Erde überkleidet, und durch Kochen mit dem Vitriol-Oehle weiß geworden; die größern Theilchen zogen die kleinern an; sie schmolzen nicht für sich, aber mit Borax wurden sie leicht zu einer schwarzen Schlacke. Der erwähnten Eisen-Körner waren sehr wenige. Nach mehrern wiederhohlten Kochen mit Vitriol-Oehle, welches allemahl mit Wasser verdünnet war, wurde dieses Ueberbleibsel ganz weiß. Die größern schwarzen Theile, welche die härtesten waren, hatten auch eine weiße Farbe bekommen; ihr Raum war viel kleiner geworden. Am Gewichte hatte sie in allem $42\frac{7}{16}$ verloren; wobey zu merken ist, daß dieser Verlust beym ersten Kochen allemahl am größten war, da auch die Solution am stärksten schmeckte. Erwähnte größere Theile waren durchaus weiß, und liessen sich leicht zermalmen; darunter liessen sich, ausser den beschriebenen Eisen-Theilchen, keine weitere Abänderungen bemerken, als we-

nige weiße und gelbe Glimmer-Theilchen, die mit Borax ſchmolzen. Erwähnten Ueberbleibſels Verhalten im Feuer, war auſſerdem, wie bey vorerwähnten Schlämmen No. 1. und 2. (§. II) nachdem ſie in Vitriol-Oehle auf eben die Art gekocht waren.

§. V. Vorerwähnter Maßen (§. III.) enthielt das Waſſer, welches mit Puzzolane gekocht war, und ſich flockig und milchicht zeigte, auch nach zwey wiederhohlten Filtrirungen, eine ſehr feine Erde, welche wie Puzzolane überhaupt beſchaffen war. Nachdem zu dieſem Waſſer Ol. vitr. war gegoſſen worden, ward es davon ſogleich klar. Hernach wurde es etwas über 1 Stunde gekocht, und ſodann in gelinder Wärme zum Abdunſten hingeſetzt. Es hinterließ auf der Zunge einen ſüßlich adſtringirenden Geſchmack; und nachdem es an einem kalten Orte geſtanden hatte, fand ſich nach gehöriger Zeit auf dem Boden des Gefäßes eine weiße Salz-Maſſe, welche nicht in ordentliche Kryſtallen anſchießen wollte, aber ſich völlig wie Alaun verhielt.

§. VI. Die Auflöſungen von Puzzolane mit Vitriol-Oehl (§. IV. 1. 2. 3.) ſchmeckten auf der Zunge wie Alaun, und die erſten Decocte der Puzzolane allemahl am ſtärkſten. Sie wurden ferner mit reinem Waſſer verdünnt, filtrirt und eingekocht, darauf zum Anſchießen in das Kalte geſetzt, und nach oft wiederhohlten Arbeiten bekam man Alaun und ſelenitiſches Salz, völlig von eben der Geſtalt und eben den Eigenſchaften, wie dasjenige Salz, welches aus Tras und Vitriol-Geiſte erhalten wird.

Anmerk. Wenn man, in Vergleichung mit vorerwähnten hier gebrauchten Auflöſungs-Mitteln, eine zulängliche Menge Puzzolane nahm, ſammelte ſich nicht nur im Kolben, ſondern ſelbſt im Filtro, ehe die Solution recht erkaltet war, eine Menge größerer und kleinerer Theile, von einer lichtgrauen Salz-Maſſe und vielen Selenit-Kryſtallen. Vorerwähnte Salz-Maſſe gab, nach neuer Auflöſung in reinem Waſſer, Einkochen, Filtriren, Abdunſten und Anſchießen, große Alaun-Kryſtallen, die man bey der Unterſuchung noch ein wenig eiſenhaltig fand.

§. VII

§. VII. Aus den im §. I. beschriebenen Varietäten der Puzzolane wählte man, als zu einer allgemeinen Probe, zwey Sortierungen; die eine, No. 1 bis 6; die andere, No. 7 bis 23. Beyde Sortierungen wurden, jede besonders, klein gestoßen und gesiebet, auch besonders mit Salpeter versucht, der in einem Tiegel über Feuer aufgelöset war. Beyde verhielten sich auf einerley Art, detonirten nicht mit dem Salpeter, und gaben keine merkliche Funken, wie gemeiniglich zu geschehen pflegt, wenn das Mengsel entzündbare Theile hat. Statt dessen entstand eine Art von Schäumen oder Sieden, dergleichen Gyps oder Kalk, auch Tras, mit Salpeter verursachet.

Anmerkungen. 1. Aus vorstehenden Beschreibungen und Versuchen zeigt sich deutlich, daß der Grundstoff der Puzzolane ein eisenhaltiger versteinerter Thon ist, der von andern fremden Beymischungen ziemlich frey zu seyn scheint; einige wenige, die man als zufällige ansehen muß, ausgenommen, die ausserdem so wenig betragen, daß sie nur gewisse kleine Aenderungen im Erfolge der Versuche machen, die man auch als zufällig ansehen muß. Ist also das Verhalten im Feuer, der im §. I. und an mehrern Orten erwähnten weißen Drusen bekannt, die man in Puzzolane eingemengt findet, der Beschreibung (§. I. No. 1. g.) gemäß, so wird man sich nicht wundern, daß Puzzolane mit Borax im Feuer untersucht, oft ein Theilchen ungeschmelzt zurück lässet. (No. 1. f. eben des §.) Indessen, wenn man alle übrige Umstände, die sich bey dem Versuche gezeigt haben, zusammen nimmt, als: die Verhärtung im Feuer, (§. I. No. 4. d. No. 5. e. No. 6. c. u. s. w.) der Geruch, (§. I. No. 10. No. 11. a. §. II. No. 1. a.) daß mit Vitriol-Geiste Alaun entsteht, (§. V. VI.) so wird man den Grund-Stoff dieser Erde zulänglich kennen.

2. Die Gegenwart des Eisens, als in Puzzolane aufgelöset, zeigt sich durchgängig so deutlich, daß daran nicht zu zweifeln ist. Als ein ziemlich unerwarteter und seltener Umstand, dient doch die Bemerkung, welche der Versuch §. IV. 30. gibt, daß magnetisirtes Eisen-Erz mitgeht. Aus dem Verhalten

der acht Abänderungen (§. I. No. 8.) ſollte man ſchließen, die magnetiſche Kraft ginge mit dem Eiſen in dieſer Zuſammenſetzung fort. Dieſes, ſo unvermuthet es auch vorkommen möchte, in Betrachtung deſſen, daß Puzzolane nichts anders, als ein Eiſen-Stein iſt, ſtreitet doch ſo ſehr gegen die Beobachtungen, welche die magnetiſche Kraft betreffen, als auch das, daß erwähnte Kraft bey den Zerſtörungen, welche die Puzzolane allem Anſehen nach im Feuer erlitten hat, nicht gänzlich verſchwunden iſt.

3. Daß Kalk-Erde zum Theil bey der Puzzolane iſt, beweiſet das ſelenitiſche Salz (§. VI.), wie auch das Sieden (§. VII.). Aber daß ſich dieſe Kalk-Erde ſonſt nicht durch Aufwallen mit ſauern Geiſtern entdeckt, lieſſe ſich leicht erklären, wenn darauf ein Haupt-Umſtand beruhete.

4. Das allgemein gleiche Verhalten, welches alle dieſe Aenderungen der Puzzolane zeigen, und das Anſehen einiger wenigen, welche am wenigſten zerſtört worden ſind, (No. 14. ꝛc. §. I.) zeigt, dieſe Erde ſey von der Art, die bey einigen Schriftſtellern Baſalt heißt, in Schweden aber Trapp Swart, oder Tegelſkol.

5. Die Puzzolane iſt, in ihrer natürlichen Beſchaffenheit betrachtet, ein verſteinerter eiſenhaltiger Thon, welcher von unterirdiſchen Feuer verſchiedene Verſchlackungen und Calcinationen erlitten hat, wie mehrere Ueberbleibſel von feuerſpeyenden Bergen. Die röhrichte und bimſteinartige Zuſammenſetzung bey einigen Abänderungen, iſt völlig gewiſſen Schlacken ähnlich. Die weißen Druſen bey den meiſten Abänderungen, und bey einigen ſo, wie ſie nur durch gewiſſe Gewaltthätigkeiten von Feuer und Waſſer gebildet zu werden pflegen; auch der Umſtand, daß ſie alleſammt, ſo wie ſie aus der Erde kommen, vom Magneten gezogen werden, da man doch weiß, daß keine Erd- oder Stein-Art dieſer Gattung ohne vorher gegangene Calcination dem Magneten folgt: das alles bezeugt vollkommen, daß dieſe Erde Veränderungen von unterirdiſchem Feuer erlitten hat. Die meiſten unterſchiedenen, und dem

Ansehen nach etwas unähnlichen Abänderungen der Puzzolane, rühren von ungleichem Grade der Calcination und des Schmelzens, vielleicht auch von nachfolgender ungleichen Verwitterung, oder der ungleichen Wirkung, welche das Wasser nachher ausgeübt hat, her.

§. VIII. Nachher stellte man unterschiedene Ciment-Versuche nicht nur mit Puzzolane, sondern auch um der Vergleichung willen, mit mehrern Erd- und Stein-Arten, an. Ehe dieselben aber angeführt werden, wird nöthig seyn, daß man alle diese Mischungs-Materien zuvor wohl kenne. Es sind dieselben in der Ordnung, wie die Versuche angestellet wurden, folgende.

No. 1. Puzzolane, gepülvert, wie sie aus Italien kommt.

No. 2. Dergleichen, aus den Abänderungen No. 1. bis 6. (§. I.) gewählt, fein gepülvert und gesiebt.

No. 3. Dergleichen, geschlämmt (§. II. A. No. 1.), Schlamm, No. 1.

No. 4. Dergleichen, geschlämmt (§. II. A. No. 2.), dergleichen, No. 2.

No. 5. Dergleichen, geschlämmt (§. II. A. No. 3.), Ueberbleibsel, No. 3.

No. 6. Dergleichen Schlamm No. 1. in Vitriol-Oehl gekocht. §. IV. 2.

No. 7. Dergleichen No. 2. in Vitriol-Oehl gekocht. §. IV. 1.

No. 8. Puzzolane; Ueberbleibsel nach dem Schlämmen No. 3. (§. II. A. No. 3.), in Vitriol-Oehl gekocht. §. IV. 3.

No. 9. Puzzolane, No. 7 bis 23. gewählt.

No. 10. Ueberbleibsel nach dem Schlämmen in unausgelesener Puzzolane, so wie sie aus Italien kommt.

No. 11. Tras.

No. 12. Schlacken vom Aetna, lichtgelb, weißlich, hin und wieder mit dunkeln Flecken, sehr löcherig und röhricht, wie ein Schwamm. a) Ein eigener Geruch, der sich nicht beschreiben läßet. b) Magnet zieht sie nicht. c) Im Feuer ändern sie die Farbe nicht.

d) Sie ſchmelzen nicht vollkommen mit Borax, und geben dem Glaſe keine Farbe. e) Werden auch vom Sal fuſib. nicht aufgelöſet.

No. 13. Lava vom Aetna, mit weißen dunkeln Druſen, der Boden gleich völlig einer ſchwarzen Schlacke; gepülvert ward es ſchwarzgrau. a) Der Magnet zog die ſchwarzen Theile. b) Es ſchmolz nicht mit Sal fuſib.; c) auch nicht vollkommen mit Borax, aber die Farbe ward im Feuer in Lichtgrau verändert.

No. 14. Glich gebranntem Thone von Ziegelſtein-Farbe, obgleich nicht ſehr hart gebrannt. Vom Aetna. a) Wurde vom Magnete nicht gezogen, bis es calcinirt war, da man einen ſchwachen Zug merkte. b) Sintert leicht zuſammen, und wird ſchwärzlich. c) Schmilzt mit Borax, und färbt das Glas mit einer ganz matten in das Grüne fallenden Farbe. d) Schmilzt nicht mit Sal fulibile.

No. 15. Pierre d'Agde, ein Ueberbleibſel von Vulcanen, verſchlackt, wie ein Theil Schlacken von Aſcenſion, und rheinl. Mühlſtein. Durchaus röhricht, von grober Zuſammenſetzung, ſchwarzgrau, von Agden in Languedoc in Frankreich. a) Gepülvert wird er lichtgrau. b) Calcinirt wird er ganz und gar vom Magnete gezogen. c) Schmilzt für ſich zu ſchwarzer Schlacke. d) Schmilzt leicht mit Borax, und gibt dem Glaſe eine matte grünliche Farbe. e) Geht mit Sal fuſib. nicht recht leicht zu einer dunkeln unreinen Salz-Maſſe.

No. 16. Leibfarben, mit weißen feinen eingeſprengten Körnern, dunkel und brüchig, nebſt kleinen ſchimmernden Theilen. Von Heſſen-Darmſtadt. a) Calcinirt bekommt es eine lichtere bleichrothe Farbe, und darunter wenig ſchwarze Theile, welche der Magnet zieht. b) Schmilzt nicht für ſich. c) Auch nicht mit Borax. d) Mit Sal fuſib. gibt es ein weißes milchfarbiges Glas.

No. 17. Gemeiner Bimſtein.

No. 18. Gelber Tripel. a) Roh wird er ein wenig vom Magnete gezogen. b) Im Feuer bekommt er eine bleiche rothbraune Farbe. c) Gibt bey ſtärkerm Gra-

de

de des Feuers einen schwachen phosphorescirenden Schein. d) Schmilzt leicht mit Borax, und gibt dem Glase eine matte grünliche Farbe. e) Mit Sal fusib. schmilzt er leicht zu einem weißen milchfarbigen Glase.

No. 19. Eine Art eisenhaltiger Thon-Schiefer, dunkelgrau, im Bruche feinkörnig, meist dem Trapp ähnlich, vom Hunneberg. a) Stark gebrannt, öffnete er sich im Feuer querüber, und war voll Eisenrost-Häute; verhärtete so stark, daß er gegen Stahl Feuer schlug. Inwendig zu Schlacken gebrannt. b) Gepülvert, ward er grau. c) Calcinirt, zog ihn der Magnet. d) Schmolz für sich, und e) mit Borax, zu einem gelbgrünen Glase. f) Mit Sal fusib. schmolz er etwas schwer zu einem dunkelgrünen Glase.

No. 20. So genannter Alaun-Schiefer vom Hunneberg, schwarz, sehr locker, ungeneigt sich in parallele dünne Scheiben zu schiefern. a) Unter der Calcination war er meist mit Glase überlaufen. b) Der Magnet zog ihn. c) Schmilzt für sich zu schwarzen Schlacken; d) Mit Borax, zu dunkeln gelbgrünen Glase, und scheint anfangs ein wenig damit zu schäumen. e) Mit Sal fusib., zu ungefärbtem Glase.

No. 21. Dergleichen Schiefer, nicht so hart gebrannt, nur calcinirt, so, daß er ganz durch bleich rothbraun war, sonst im Feuer, von eben dem Verhalten, wie voriger.

No. 22. Dunkelgrauer Trapp, im Bruche feinschuppig, nicht ungleich; Hälleflinta; riecht wie roher Thon, vom Hunneberg. a) Gebrannt, verhärtet er sehr, und wird ganz fest, schlägt an den äussern scharfen Kanten Feuer gegen Stahl. b) Gepülvert, wird er lichter grau. c) Calcinirt, vom Magnete gezogen. d) Schmilzt für sich zu einer schwarzen Schlacke. e) Geht mit Borax zu einem gelbgrünen Glase, obwohl etwas schwer. f) Mit Sal fusib. schwer zu einer grauen Glas-Masse.

No. 23. Dergleichen Stein, stärker calcinirt, brannte sich rothbraun, und war eben so hart, als vorhergehender. a) Gepülvert, ward er violet. b) Wurde ganz und gar vom Magnete gezogen. c) Schmilzt für sich zu einer schwarzen Schlacke, und mit Borax

zu

zu einem dunkeln gelbgrünen Glaſe, doch ließ er einige unſchmelzbare Theile zurück. d) Mit Sal fuſib. ein weißes, graulichtes, undurchſichtiges Glas.

No. 24. Rothbraun roſtig dergleichen von einer dichten Art; vom Hunneberge. a) Calcinirt, verhärtet es, bekommt auſſen eine rothbraune in das Violet fallende Farbe; inwendig iſt der Kern dunkel feinkörnig. b) Wird ganz und gar vom Magnete gezogen. c) Sintert im Feuer zuſammen, ſchmilzt aber ohne Zuſatz nicht vollkommen. d) Wird mit Borax leicht zu einem reinen gelbgrünen Glaſe aufgelöſet. e) Geht mit Sal. fuſib. leicht zu einem grauen undurchſichtigen Glaſe.

No. 25. Eben die Art, nur ſchieferig, ſonſt in allem einerley.

No. 26. Puzzolane, einerley mit No. 1.

No. 27. Schiefer vom Hunneberg, einerley mit No. 21.

No. 28. Trapp daher, eben die Art wie No. 22.

No. 29. Weißer graulicher Stein, im Bruche grobſchalig, ziemlich hart, riecht einiger Maßen wie roher Thon, ſchlägt Feuer gegen Stahl, gleicht meiſt einer Art von Wetzſteine. a) Gebrannt, wird er ſehr hart, aber brüchig, und zeigt eine fadichte Textur, ſchlägt da beſſer Feuer gegen den Stahl. b) Wird nicht vom Magnete gezogen. c) Schmilzt nicht in gewöhnlicher Hitze, und mit den gewöhnlichen Anſtalten weder für ſich, noch mit Zuſatze.

No. 30. Grauer, mehr lockerer, von eben der Stelle, gleicht meiſt des Mörtkärbergs Ställſten von Norrberk, ſteht ſeiger in parallele Schiefern, vertical gegen den Wuchs des Steines, läſſet ſich mit dem Meſſer ſchneiden. a) Gebrannt, bekam er eine dünne klare Farbe, und zeigte einige wenige Glimmer-Theile. b) Verhärtete anſehnlich im Feuer, ſo, daß er faſt einerley Härte mit dem Quarze bekam, ward aber ſehr brüchig.

No. 31. Gemeiner Thon, lichtgrau, hält 12 p. C. feinen Sand, und ein wenig gröbern Graus, von Brinkebergskulle. a) In offenem Feuer calcinirt, verhärtete er ziemlich, und bekam eine lichte bräunliche Farbe.

b) Wurde

b) Wurde ziemlich stark vom Magnete gezogen. c) Schäumt nicht mit Säuren. d) Schmilzt für sich selbst, und e) mit Borax zu einem klaren Glase, von matter, ein wenig in das Grüne fallender Farbe. f) Mit Sal fusib. schmilzt es schwer zu einer weißen undurchsichtigen Salz-Masse.

No. 32. Hunnebergs Kalk, von schwarzen Orsten, mit der Hälfte Lenna-Kalk, gebrannt und gelöscht.

No. 33. Schiefer vom Hunneberg, No. 21.

No. 34. Dergleichen eben daher, einerley mit No. 21.

Anmerkungen. 1. Von vorhergehenden Erd- oder Stein-Arten, wovon ein großer Theil, allem Ansehen nach, mehr oder weniger Hitze von unterirdischem Feuer ausgestanden hatte, und andere, die man in ihrer natürlichen Beschaffenheit ganz unzerstört fand, und die mit Fleiß gebrannt wurden, machte man Mischungen zu Ciment, dergestalt, daß die Hälfte jeder von oben beschriebenen Arten, dem Gewichte nach gerechnet, gegen gebrannten und gelöschten Kalk genommen wurde. Die Bereitung geschahe auf die gewöhnliche Art, mit Wasser nach Bedürfniß; und damit die Mischung desto gleichförmiger würde, hat man sie mehrmahls mit einem eisernen Messer, oder einer Stange, durchgearbeitet, und sie in einen hohlen eisernen Cylinder, von $\frac{3}{4}$ Z. im Durchmesser, gethan, wobey alle Proben gehörig numerirt, und 12 Tage zum Trocknen gelassen wurden.

2. Von No. 1 bis 25, wurden sie allesammt zur Hälfte mit Hunnebergs-Kalke bereitet; No. 26, 27, 28, ebenfalls zur Hälfte, mit Lenna-Kalke; No. 29, 30, 31, wieder mit Hunnebergs-Kalke, von jedem die Hälfte; No. 33, von 3 Theilen gegen 2 Th. Hunnebergs-Kalk; und endlich No. 34, 2 Theile gegen 2 Th. Hunnebergs-Kalk, und 1 Th. gebrannten Gyps.

3. Nachdem alle Proben 12 Tage getrocknet hatten, versuchte man ihre Stärke, Gewichte zu tragen, bis sie quer abbrachen; dazu brauchte man keine andere Vorrichtungen, als einen Hebel, welcher ber-

dergestalt an das Ciment-Stück angebracht war, wie zum Abbrechen nöthig war. Zu dieser Absicht ward es an einem befestigten Arme mit einer Höhlung darin gesetzt, welche völlig den Durchmesser der Höhlung des eisernen Cylinders hatte, darin die Proben waren gegossen worden, daß der Abstand zwischen der Unterlage, und dem Brechungs- oder Drückungs-Puncte, sich zum Abstande zwischen erwähnten Puncten, und dem Schwer-Puncte, wovon eine Wageschale herab hing, wie 1 zu 12, verhielt. Dieses Gewicht, welches in der Wageschale nöthig war, jede Probe abzubrechen, ist in folgende Vergleichungs-Tafel gebracht, ohne Absicht auf die Proportion vorerwähnten Hebels. Denn weil es hier nur auf eine gewisse Vergleichung der unterschiedenen Proben mit einander ankommt, war es nicht nöthig, das wahre Gewicht anzugeben, welches jede Probe getragen hat, ehe sie abbrach, da die Proportion zwischen ihnen immer dieselbe bleibt.

4. Keine erwähnte Ciment-Probe ist währendem Trocknen eingegangen, sondern der ganze Cylinder hat so genau, als sich beobachten ließ, seinen ersten Raum behalten.

5. Alle zusammen haben mehr Stärke und Härte bekommen, nachdem sie im Wasser gelegen hatten, und wieder trocken geworden sind; der meiste Theil hat auch alles eingesogene Wasser wieder von sich gelassen, so, daß er meist wieder zu eben dem vorigen Gewichte gekommen ist, welches er hatte, ehe man ihn in das Wasser that; ein einziges ausgenommen, welches am Gewichte verloren hat, wie die Tabelle zeigt.

6. In nachstehender Tabelle, zeigt die I Col. die Feinheit der Theilchen von jeder Zusammensetzung nach einer gewissen Ordnung. II und III, die Härte auf der Oberfläche, und inwendig im Kerne, auch in der Ordnung, daß die kleinsten Zahlen die größte Härte, und umgekehrt, anzeigen. IV, die Stärke, Gewichte zu tragen, in Lothen, nach zwölftägigem Trocknen. V, eben die Stärke, nachdem die Probe

im

im Waſſer gelegen hatte. VI. wie viel pro Cent Zuwachs am Gewichte die Probe bekommen hatte, als ſie aus dem Waſſer genommen wurde. VII, eben ſolcher Zuwachs, als ſie halb trocken war. VIII, Verluſt im Gewichte bey der halb getrockneten Probe. Die beyden letzten Columnen zeigen, wie viel pro Cent die völlig getrocknete Probe am Gewichte gewonnen, oder verloren hat.

Verhalten
zwiſchen folgenden Ciment-Proben.

No.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII	IX.	X.
1	4	2	4	14	43	17	5	0	1 1/2	0
2	2	1	2	28	64	24	14	0	2	0
3	1	1	2	20	51	27	18	0	1	0
4	2	2	2	30	68	32	17	0	1 1/2	0
5	4	2	1	23	44	22	16	0	2	0
6	1	1	1	33	71	36	22	0	0	0
7	2	1	1	36	73	38	26	0	2	0
8	5	3	4	14	42	30	20	0	2 3/4	0
9	3	3	4	11	40	24	18	0	2	0
10	5	2	2	19	42	21	16	0	1 1/2	0
11	4	1	2	20	48	19	15	0	2 1/2	0
12	3	4	4	23	43	29	23	0	1	0
13	3	1	6	8	28	22	18	0	1 1/2	0
14	3	3	5	16	33	23	21	0	1 3/4	0
15	3	3	5	14	30	37	31	0	11	0
16	2	2	2	24	44	37	25	0	11	0
17	2	2	2	18	37	25	18	0	1 1/2	0
18	3	2	3	22	40	30	24	0	2 1/2	0
19	4	3	8	6	14	4	0	2 1/2	0	14
20	3	4	7	11	20	23	18	0	2	0
21	2	1	1	29	64	21	17	0	1 1/2	0
22	3	2	1	12	46	17	12	0	1 1/2	0
23	3	4	1	12	44	23	17	0	1 1/2	0
24	3	2	2	14	20	18	11	0	1 1/4	0
25	3	2	3	12	40	23	17	0	2 1/4	0
26	4	2	3	24	44	20	11	0	3 1/2	0
27	3	2	3	34	72	17 1/2	8 3/4	0	2 1/2	0
28	3	4	3	32	70	28 1/2	19	0	13	0
29	3	5	7	4	9	13	6	0	1 1/4	0
30	3	5	7	4	10	17	8	0	0	0
31	3	2	2	14	43	19	9 1/2	0	3/4	0
32	3	4	4	14	40	23	7 3/4	0	1	0
33	3	4	4	8	20	18	13	0	1 1/4	0
34	3	2	2	20	42	30	10	0	1 7/10	0

34 B. der Abhandl. der kön. ſchwed. Akad. der Wiſſ. a. d. J. 1772, Lpz. 1776, 8. S. 27, flg. und 117, flg.

Hierher

Hierher gehöret auch Hrn. S. Rinmann Unterſuchung vom Cäment, im 35 B. der Abhandlung. der kön. ſchwed. Ak. d. W. a. d. J. 1773, S. 95. fgg. und der Bericht von des Hrn. Direct. Uſſtröms Cämente zum Waſſerbaue, von Fr. Mallet, eb. daſ. S. 273, fgg.

Ein Kitt zerbrochenen Marmor und andere Steine damit an einander zu kitten, oder zu verbinden, **Stein-Kitt, Stein-Leim**, Gr. und Lat. Lithocolla, wird auf mancherley Art verfertigt. Nach Nils Brelin Vorſchrift, zerſchneidet man reinen, friſchen Süßemilch-Käſe in dünne Scheiben, nachdem man vorher die äuſſere Rinde abgenommen hat, und rührt denſelben in ſiedend heißem Waſſer ſo lange mit einem Koch-Löffel um, bis er zu einem zähen Schleim geworden iſt, der ſich mit dem Waſſer nicht vermiſcht. Wenn nun dieſer Käſe zu verſchiedenen Mahlen in heißem Waſſer, welches immer friſch aufgegoſſen werden muß, genug bearbeitet worden iſt, ſchöpft man ſolchen mit einem Löffel auf einen warm gemachten Reibe-Stein, oder in einen warm gemachten ſteinernen Mörſer, und arbeitet denſelben mit ungelöſchtem Kalke zuſammen, bis er zu einem recht guten Kitt wird, welcher ſich am beſten gebrauchen läſſet, wenn er warm gemacht worden iſt. Doch müſſen die zuſammen geleimten Stücke, nach Verhältniß ihrer Größe, 2 bis 3 Mahl 24 Stunden lang trocknen. Mit eben dieſer Maſſe können auch zerbrochene hölzerne Gefäße und Statüen wieder vereiniget werden. Dieſer Kitt kann auch ſogar mit Scheide-Waſſer nicht aufgelöſet werden.

Abhandl. der kön. ſchwed. Akad. d. Wiſſ. a. d. J. 1739 und 1740, Hamb. 1749, 8 S. 259.

Oder: man nimmt friſchen Quark, oder Molken, fein geriebenen Sandſtein, und fein geſiebten ungelöſchten Kalk, und macht ſolches mit Eyweiß an.

Dieſer Kitt wird in einer halben Stunde eiſenfeſt, und dient auch zu eiſernen und irdenen Sachen. Er wird weder vom Feuer verzehret, noch vom Waſſer aufgelöſet.

Nach des Hrn. Bau-Inſpect. Manger (*) Angabe, wiegt ein Kubik-Fuß Oehl-Kitt zu Verdichtung der Fugen zwiſchen Kupfer oder Sand-Steinen, 216 Pfund, und alſo der Kubik-Zoll insgemein 4 Loth. Deſſen Zuſammenſetzung ſoll eigentlich aus 7 Theilen Mennige, 3 Th. Silberglätte, 3 Th. Bolus, 1 Th. geſtoßenem Glaſe, und 2 Th. guten Firniß, beſtehen.

An ſtatt der 7 Theile Mennige, nimmt man auch nur halb ſo viel, und die andere Hälfte gutes Bleyweiß. Denn man hat gefunden, daß zu viel Mennige bey Kupfer- und Blech-Verkittungen nicht gut thut. Sie verzehrt ſich in etlichen Jahren gleichſam von ſelbſt, und macht den Kitt wandelbar, ſpröde und abſpringend, da hingegen das Bleyweiß ſich länger hält.

Bey Sandſtein-Verkittungen darf man gar nicht darauf rechnen, daß die angeführten Ingredienzien wirklich zum Kitt genommen worden ſind. Gemeiniglich verfertigen ihn die Werkmeiſter von lauter Bolus und etwas zerſtoßenem Glaſe, welches ſie mit Firniß und weißem Thran zuſammen arbeiten. Und im Grunde, wenn die Sand-Stein-Fugen vorher zwey Mahl mit heißem Firniſſe getränket worden ſind, und der auf gedachte ſimple Art gemachte Kitt dazwiſchen gebracht worden iſt, ſolcher auch nachher noch zwey Mahl mit guter Oehl-Farbe überſtrichen wird, kann ihm weder Froſt noch Hitze leicht einigen Schaden zufügen.

Ein feſter Stein-Kitt, um die Fugen zwiſchen Werkſtücken oder Quader-Steinen, es ſey unter oder über dem Waſſer, ſo zu verbinden, daß ſie kein Waſſer durchlaſſen, auch die eiſernen Bänder und Anker, ſtatt des Bleyes damit zu vergießen und feſt

(*) S. Deſſen Nachricht von dem neuen Grundbaue ꝛc. 3 St. (Berl. 1786, gr. 8.) S. 234.

feſt zu machen, ſo, daß ſie gegen Waſſer, Luft und Hitze beſtehen, und nicht wieder von einander laſſen. Man nimmt 1½ Pf. gut geſiebtes Ziegel-Mehl von ſtark gebranntem und noch nicht feucht gewordenen Ziegel-Stein, 1¼ Pf. vom beſten Gypſe, 1 Pf. Eiſen-Späne, 1 Pf. Vitriol, 6 Loth Galläpfel, friſches Rinds-Blut und Eyweiß, von jedem ſo viel genug iſt, und eben ſo viel guten Wein-Eſſig, 1 Pf. Bolus, 1 Pf. Pottaſche, und 1 Handvoll Salz; menget alle dieſe Materien gut durch einander, ſchlägt und arbeitet ſie ſo lange durch, bis das ganze Mengſel weich wird, und ſchmiert es alsdann in die Stein-Fugen.

Einen Stein-Kitt von Roſt zu machen, nimmt man guten Feilſtaub, ſo wie er auf den Werkſtätten der Schlöſſer häufig beyſammen liegt, und läſſet ihn in einer Pfanne über dem Feuer glühend werden, damit der darin vermiſchte Staub wegbrenne. Ueber den noch heißen Feilſtaub gießt man Wein-Eſſig, bis daraus eine Art von Mörtel wird, den man in die Fugen ſtreichen kann. An der Oberfläche deſſelben, macht man ihn mit einer Mauer-Kelle glatt, die man von Zeit zu Zeit in Wein-Eſſig taucht.

In Reſteln algieriſchen Beſchreibung findet man einen Kitt, Bogen- und Waſſer-Behältniſſe zu bewahren, welcher aus Thon, Aſche, Sand, Baum-Oehl und Waſſer zuſammen beſteht, beſchrieben. An ſtatt des theuern Baum-Oehles, hat Hr. Salberg in Schweden Lein-Oehl, auch dünnen Theer verſucht, und befunden, daß ſolches einen guten, feſten und ſichern Kitt gibt, deſſen Zubereitung folgender Maßen geſchieht. In gewöhnliche Mauerſpeiſe thut man 9 Theile feinen Thon, 6 Th. geſiebte Aſche, 3 Theile feinen Sand, und 9 Th. Theer (oder Lein-Oehl) und ſo viel Waſſer, als erfordert wird, daß der Mörtel dick genug wird; dieſes muß ſehr wohl umgerühret, durcharbeitet, geſtampfet und geklopfet werden, wozu wohl einen gan-

zen Tag fleißige Arbeit gehört; und je mehr Arbeit darauf gewandt wird, deſto ſicherer iſt man vor Riſſen. Der Theer (oder das Lein-Oehl) wird nicht zuſammen auf ein Mahl hinein gethan, ſondern nach und nach, und ja allezeit mehr Waſſer, damit die Durcharbeitung deſto vollkommener geſchehe. Mit dieſem Kitte wird das Gewölbe überall beſtrichen, ſowohl an den Steinen, als auch in den Fugen, worauf er in etlichen Tagen trocknen muß, und hart wird. Nachher bedeckt man alles zuſammen mit feinem Sande, und zuletzt legt man das obere Stein-Gewölbe darauf, welches auch, um mehrerer Sicherheit willen, mit dieſem Kitte in den Fugen verbunden werden kann. In Kellern iſt dieſer Kitt auch zum Legen der Boden zu gebrauchen; aber da muß man Lein-Ohl nehmen, weil der Theer-Geruch ſehr ſtark, und lange anhaltend iſt. Bey Schluß-Gewölben iſt dieſer Kitt mit gutem Vortheile zu nutzen, worüber Hr. S. verſchiedene Verſuche angeſtellt hat. Nachdem die Probe über ½ Jahr im Waſſer gelegen hatte, war ihr Gewicht vollkommen wie zuvor, woraus erhellet, daß ſie kein Waſſer in ſich gezogen hat.

4 B. der Abh. der kön. ſchwed. Akad. der Wiſſ. a. d. J. 1742, S. 90, f.

Das Verkitten eines ſteinernen Kuppel-Gewölbes einer Kirche, habe ich im XXXVIII Th. S. 163, f. beſchrieben.

Auf die in No. 57 des leipz. Int. Bl. v. J. 1768 befindliche Frage: Was für ein Kitt hält das Waſſer von den Fugen der Steine auf Altanen zurück, daß es nicht eindringen kann? ertheilt J. G. Schubert, in Noſſen, in N. 11 deſſ. v. J. 1769, folgende Beantwortung. Zuvörderſt mache man dieſen Firniß: Silberglätte, und rothe Mennige, von jedem ¾ Pfund; Maſtix und Sandarach, von jedem 1 Loth; weißen Vitriol, 1½ L.; Lein-Oehl, 1½ Kanne. Dieſe Species bringe man unter einander, laſſe ſie bey gelindem Feuer ungefähr ½ Stun-

de

de lang unter beständigem Umrühren gelinde sieden, bis Silberglätte und Mennige sich aufgelöset haben; alsdann lässet man es erkalten, und hebt es zum Gebrauch auf. Wenn man nachher Gebrauch davon machen will, nimmt man geschlämmten Lehm und Mennige, von jedem 1 Pf., Silberglätte ½ Pf., und macht daraus ein Pulver, zu welchem man eben so viel Firniß nimmt, zusammen also 2½ Pf., und es mit einander unter stetem Umrühren zu einer Masse kochen lässet. Diese Masse kann man nach Belieben dick oder dünn machen; und sie wird das Durchdringen des Wassers gewiß verhindern, wenn man sie in die Fugen drückt, die aber überdies von aussen noch gut überstrichen seyn müssen.

In Frankreich hat im J. 1782, Hr. d'Etienne, Ritter vom kön. St. Ludwigs-Orden, einen Kitt angegeben, dessen vornehmste Eigenschaften seine Härte und Dauer sind, und mit welchem er eine Terrasse über seinem Hause in Paris, welche er, statt des Daches, zu einem kleinen Garten braucht, hat belegen lassen, und welcher, bis zur Bekanntmachung, 2 Jahr lang Wind und Wetter ausgestanden hat, ohne den mindesten Schaden zu nehmen. Auch in einem hölzernen Wasser-Behältnisse, welches inwendig mit Ziegeln gefüttert, und mit einer Lage Kitt nur ½ Linie dick überzogen ist, konnte das Wasser nicht durchdringen, ob es gleich bis auf den Boden fror; und wenn es ausgeleert wird, so trocknet der Ueberzug in 1 Stunde. Wenn man diesen Kitt mit Eisen oder Stahl bestreicht, nimmt er, wie ein Wetzstein, die abgehenden Theilchen des Metalles an. Wasser und Feuchtigkeit können ihn nie erreichen; und so wiedersteht er dem Regen, Eise, Nebel und Schnee. Er hat den Vortheil, daß er sehr dünn aufgetragen werden kann, und wenig kostet, nähmlich 30 Sous (ungefähr 9 Ggr.) die französische Toise. Ob der Erfinder dieser wichtigen Entdeckung,

(welche man in der Schrift: Mémoire sur la découverte d'un Ciment impénetrable à l'eau, & sur l'application de ce Ciment à une terrasse de sa maison de l'Auteur, par Mr. d'Etienne. à Par. 1782, 4. 2½ B. beschrieben findet,) für die Baukunst, an der schon mehrere gescheitert haben, glücklicher gewesen sey, muß erst die Zeit lehren. Denn, wenn gleich die Probe einer Terrasse, welche der Hr. Erfinder an seinem Hause, statt eines Daches angebracht, und darauf einen Garten und ein beträchtliches Wasser-Behältniß angelegt hat, bisher Stich gehalten hat, und an einer darunter befindlichen Gyps-Decke nicht die geringste Spur von Feuchtigkeit zu bemerken war: so wird doch von Andern die Zuverlässigkeit dieser Angabe bezweifelt. Das gedachte Wasser-Behältniß ist beständig angefüllt; und ob es gleich oft ganz zugefroren war, so konnte doch das Wasser niemahls durch eine halblinien-dicke Lage dieses Kittes durchdringen. Die Verfertigung desselben ist sehr einfach, und wenig kostbar. Man mischt 1 Maß gelöschten Kalk mit 1½ Maß Wasser, und zermalmet ihn mit einer Kelle so lange, bis er ganz vertheilt, und einer weißen dünnen Milch ähnlich wird. Alsdann wirft man 5½ Maß von gestoßenem Kiesel- oder Ziegel-Stein (oder beyde Materien vermischt) hinein. Wenn diese Materien mit dem aufgelöseten Kalke wohl verbunden sind, thut man 1 Maß wohl gepülverten lebendigen Kalk dazu; und so bald man mit der Kelle diese Materie wohl bearbeitet hat, kann man den Kitt brauchen. Das Haupt-Geheimniß scheint also in der Mischung gelöschten und ungelöschten Kalkes, und dem Verhältnisse der Kalk-Theile zum Kiesel zu bestehen; und so ist die obenerwähnte Puzzolane von Neapel der beste Kitt, weil diese Theile in dem gehörigen Verhältnisse darin herrschen, und nicht so leicht entweder von der Wärme aufspringen, oder sich von dem Wasser durchdringen lassen. Was die Art, diesen

Mörtel aufzutragen, betrifft, so soll der Boden mit viereckigen Steinen beleget, und diese mit gutem Gypse (ohne Staub, und, wo möglich, mit etwas Kienruß vermischt,) eingekittet werden. Auf diesen Boden legt man alsdann den Mörtel kübelweise, nur 2 Linie, und in so gleicher Dicke als möglich. Wind und Sonne muß, bis derselbe trocken ist, davon entfernet werden. Um das Trocknen, welches bey schönem Wetter in 3 bis 4 Stunden bewirket werden kann, zu befördern, überstreicht man die Terrasse mit einer Lage von Oehl. Der Hr. Verf. endigt die Schrift mit einem dichterischen Blicke in die Zukunft; er hebt durch seine Entdeckung allen Häusern die Dächer ab, fast wie der Diable boiteux, und will, daß Gärtner, Bildhauer und Mahler ihre Kunst vereinigen, um unsere Häuser auf eine würdigere Art zu krönen. Jede Wohnung würde eine Stern-Warte für den Liebhaber. Die Brände würden weniger gefährlich und fürchterlich; die Einwohner der Städte würden eine reinere Luft athmen; jeder Eigenthumer würde einen Garten auf seinem Hause und eine prächtige Aussicht haben, und seine Nachbarn daselbst besprechen können. Nur fürchte ich, der Rauch der Schorsteine möchte diese Spatziergänge oft unangenehm machen. Gewiß ist es allezeit, auch ohne die Einbildungskraft zu hoch zu spannen, daß, wenn diese Entdeckung bewährt ist, und das Siegel einer unwiedersprochenen Erfahrung auf dieselbe wird gedrückt worden seyn, die Baukunst ungemein viel Vortheil daraus ziehen würde, und unsere Häuser, deren Gipfel gemeiniglich so geschmacklos sich endigen, wie in Italien, angenehmere Bestimmungen auch in diesem so kostbaren als unnöthigen Theile bekommen könnten. Einige wollen die Entdeckung des Hrn. Etienne dem Hrn. Loriot zuschreiben, und behaupten, der einzige Unterschied bestehe in der Dicke des Auftrages.

Zur Bereitung eines Kittes, Alabaſter, Marmor, Porphyr und andere Steine zu verbinden, nehme man 2 Pfund Bienen-Wachs und 1 Pf. Harz, ſchmelze dieſes, und thue 1½ Pf. von der Materie, woraus der Körper, welcher zuſammen gekittet werden ſoll, beſteht, ſtreue dieſes Pulver in das geſchmolzene Mengſel, und rühre es wohl unter einander; hernach knete man die Maſſe in Waſſer, damit das Pulver durch und durch dem Wachſe und Harze einverleibet werde. Die Quantität der pulveriſirten Materie kann, wenn es erforderlich iſt, verändert werden, um den Kitt dem Körper, bey dem er gebraucht werden ſoll, an Farbe ähnlicher zu machen. Dieſer Kitt muß, wenn man ihn brauchen will, warm gemacht werden, ſo wie auch die Theile des Körpers, den man kitten will; auch müſſen dieſelben ganz trocken ſeyn. Dieſer Kitt iſt dermaßen feſt, daß er auch herab hängende Körper von beträchtlicher Schwere hält, wenn er durch und durch getrocknet und ſteif iſt.

Zur Bereitung eines **Eiſen-Kittes**, nimmt man Pech und Colophonium, thut es in eine Pfanne, ſchüttet geriebenes Ziegel-Mehl, klein geſchnittenes Bley und Eiſenfeil-Späne über dem Feuer hinein, und rührt es mit einem Holze um. Hiermit wird das über Kohlen warm gemachte Eiſen gekittet.

Oder: man nimmt Blut von einem friſch geſchlachteten Kalbe, menget fein geſiebten ungelöſchten Kalk darunter, und rührt es um, daß es wie ein dicker Brey wird. Alsdann ſtreicht man es auf das Gefäß, welches geleimet werden ſoll, nachdem es vorher wohl gereiniget worden iſt, und läſſet es allmählich trocknen. Mit dieſer Maſſe kann man ſowohl allerley Steine zuſammen kitten, als auch die Boden in gegoſſenen eiſernen Töpfen (Grapen), wie auch andern metallenen Pfannen, wenn ſie entzwey ſind, wieder dicht machen, ne daß der Kitt verbrennt.

Zu einer Masse, eiserne Klammern, Thorangel-Haken, u. d. gl. einzukitten, nehme man 2 Theile Gyps, und 1 Th. Eisenfeil-Späne, oder so genannten Hammerschlag, rühre solches mit Essig ganz flüssig ein, und lasse es binden. Es ist nur Schade, daß diese Composition die Nässe und den Regen nicht gut verträgt, sondern leicht zu rosten pflegt. Kann sie aber mit Oehl-Farben überstrichen, und also gegen die Feuchtigkeit verwahret, oder soll sie ohnedies an einem verdeckten Orte angebracht werden: so kann man dergleichen sicher und mit Vortheile gebrauchen.

Der Eisen-Kitt in Stein, welcher in la Rochelle und dortiger Gegend, statt des Bleyes gebraucht, und wodurch an den Kosten viel erspart wird, ist geschmolzener Schwefel, den man in die Oeffnung gießt, und alsdann mit Sand, Erde und Asche bedeckt, damit er erlösche und erkalte. Er soll das Eisen so fest halten, daß man nach Verlauf einiger Minuten den Stein zerschlagen müsse, um es los zu schlagen. Bey dem damit angestellten Versuche, nahm man ganzen Schwefel, so viel davon nöthig war, in eine Pfanne oder in einen Gießlöffel, ließ denselben über einem Kohlfeuer zergehen, und goß ihn so fließend, wo man ihn hin haben wollte, um, statt Bleyes, Klammern oder Thür-Haken in Stein zu befestigen, welcher dann, sobald er erkaltet, gut und fest hält. Weil man aber sich hüten muß, theils, daß er nicht zum Brennen komme, und wenn es geschieht, etwas Sand darauf wirft, um die Flamme zu ersticken, theils, daß man den Schwefel-Dampf nicht in den Mund und in die Nase ziehe, welches üble Folgen haben würde: so ist folgender, eben so haltbarer, Kitt vorzuziehen. Wenn nähmlich das Loch in den Stein gehauen, und die Klammer oder der Thür-Haken eingepaßt ist, nimmt man 2 Theile gebrannten und recht fein gestoßenen Gyps, und 1 Th. Feil-Späne, in ein Geschirr, gießt so viel Wasser

unter beständigem Rühren hinzu, bis es zum Brey wird, schmiert damit das Loch voll, treibt das Eisen-Werk hinein, und, ehe der Gyps noch bindet oder fest wird, 2 bis 3 hölzerne oder auch eiserne Keile dazu: so hält es viel besser, als wenn es mit Bley eingegossen wäre.

Vorschrift, wie man allerley Löcher in eisernen Platten, Röhren, Büchsen, oder andern zerbrochenen Eisenwerke, wieder fest zusammen fügen könne, dergestalt, daß gedachtes Eisen viel eher an einem andern als dem ausgebesserten Orte zerspringen muß, indem das Mengsel dazu dem Feuer, der Luft, der Hitze und dem Froste wiedersteht; aus dem Holländ. des Hrn. General v. Creuznach. Man muß zu dieser Absicht zuvörderst folgenden Firniß bereiten. Man nimmt 6 Maß Lein-Oehl, 1 Pf. Silber-Glätte, 1 Pf. rothe Mennige, 1 Stück weißen Vitriol in der Größe eines Eyes, und 1 Theil Arsenik, so viel als eine wälsche Nuß groß. Man thut dieses zusammen in einen eisernen Topf, läßet es kochen, und rührt es stets um, damit sich kein Theil des Mengsels zu Boden setze, als wodurch alles leicht in Brand gerathen könnte. Man hat auch ein Faß Wasser zur Hand, damit, wenn die Materien etwa zu stark, oder gar überkochen sollten, man den Boden des Topfes in das Wasser halten könne; wobey man aber große Sorgfalt haben muß, daß ja kein Tropfen Wasser in das Mengsel komme. Hat die Masse auf diese Weise drey Mahl aufgekocht, und sich wieder gesetzt, so wirft man 3 große Feigen hinein, und hebt sie zum Gebrauche auf. Um nun ferner die Composition zu verfertigen, womit die Löcher, Ritzen und Risse verkleibet und gestopfet werden können, nimmt man 7½ Pfund fein durchgesiebtes Ziegel-Mehl, vom besten stark gebrannten Ziegel-Steine, der noch kein Wasser eingesogen hat; 7 Pf. dergleichen Mengsel von gutem Kalk-

Stein,

Stein, oder auch von Kiesel-Stein, als: weißen Marmor; 6 Pf. fein gestoßenes Glas; 6 Pf. Schmiede-Schlacken; 6½ Pf. rothen Bolus; 3 Pf. Hammerschlag, 3½ Pf. Eisen-Späne, 19 Pf. ungelöschten Stein-Kalk, 3 Pf. rothe Mennige, 2 Pf. Silber-Glätte, und 1 Pf. Reh- oder kurze Kuh-Haare. Wenn nun alle diese Materien, ausser dem Hammerschlag, den Eisen-Spänen und den Haaren, wohl unter einander gemenget, und durch ein feines Sieb gesichtet sind, mengt man hernach auch den Hammerschlag nebst der Silberglätte darunter. Sodann werden auf dieses Mengsel 5 bis 6 Maß Lein-Oehl gegossen, und das gesammte wird durch drey Personen mit dazu verfertigten dreyeckigen Schlägeln, deren eine Schärfe stets unterwärts gehalten wird, einen halben Tag gut durch einander gearbeitet, so lange, bis das darin vertheilte und in die Masse eingezogene Oehl durch das anhaltende Schlagen wieder zum Vorschein kommt, und die ganze Masse sich in einen oder mehrere Klumpen bringen lässet, und an einander kleben bleibt. Sodann wird ½ Maß von dem oben beschriebenen Firnisse darauf gegossen, und die Masse mit dem Eisen aufs neue geschlagen, bis sie zuletzt etwas flüssig wird, und zu hanthieren ist. Will man diesen Kitt nunmehr gebrauchen, so müssen die schadhaften Stellen, welche man verkleiben und kitten will, zuvor überall mit gedachtem Firnisse bestrichen werden. Alsdann thut man diese Kitt-Materie darauf, bestreicht dieselbe aufs neue mit dem ersten Firnisse, und lässet alles zusammen trocken werden.

Auch dient gepülverter Eisenstein, mit Härings-Milch wohl durchknetet, durchlöcherte oder gerissene eiserne Gefäße wieder zu ergänzen.

Ein Ofen-Kitt, womit man die Fugen an den eisernen Blättern eines Ofens verstreicht, muß 1. an die eisernen Ofen-Platten fest angreifen; 2. nicht so ein-

eintrocknen, daß er bey der geringſten Erſchütterung des Ofens wieder abfällt; und 3. auch keinen Rauch durchlaſſen. Einen ſolchen Kitt verfertigt man auf folgende Weiſe.

1. Man nimmt durchgeſiebte und durchgebeutelte Feilſpäne; fein geſtoßenes und pulveriſirtes Glas, und klein geſtoßenen und durchgebeutelten ungelöſchten Kalk. Dieſe Materien werden nach Proportion mit einander vermiſcht, und mit Rinds-Blut und Eyweiß angemacht. Man kann auch etwas fein geriebenen Alaun darunter nehmen. Will man nun dieſen Kitt zum Verſtreichen des Ofens gebrauchen, ſo muß man ihn, ſo bald er fertig iſt, mit der größten Geſchwindigkeit in die Fugen ſtreichen, weil er ſonſt zu ſtark bindet, daß man ihn nicht mehr regieren kann.

2. Man nimmt guten Lehm, ſucht die Steinchen heraus, gießt Waſſer darauf, rührt ihn ſcharf um, und gießt ihn, indem er in Bewegung iſt, in ein anderes Gefäß. Wenn ſich dieſer alſo geſchlämmte Lehm zu Boden geſetzt hat, gießt man das Waſſer ab, und läſſet den Lehm trocknen. Wenn er trocken geworden iſt, macht man ihn mit Salz-Waſſer wieder weich, thut nach Proportion Roß-Aepfel und etwas ungelöſchten Kalk dazu, und arbeitet ihn mit den Händen durch, daß er wie ein Teig werde. Alsdann nimmt man Ziegel-Mehl, Glas-Mehl und Hammerſchlag, welches alles klein geſtoßen und durch ein feines Sieb geſchlagen werden muß, und miſcht es zuſammen unter den Lehm-Teig, daß er ſteif werde. Man kann auch Feilſpäne dazu thun. Iſt der Teig zu ſteif, ſo kann man ihn mit Salz-Waſſer verdünnen, und Reh- oder Kuh-Haare, die ſehr fein aus einander gezupft ſeyn müſſen, darunter arbeiten. Soll nun dieſer Lehm gebraucht werden, ſo nimmt man ungefähr 1 Quart Rinds-Blut, und einen dicken Borſten-Pinſel, überſtreicht damit inwendig den Ofen, drückt den Lehm an,

an, und macht solchen mit der Hand eben und glatt, wozu man Salz-Wasser bey der Hand haben muß. Man überstreicht aber den Ofen mit dem Blute nicht auf ein Mahl, sondern nach und nach, so wie man auch den Lehm nach und nach anbringt. Ist der Ofen inwendig mit Lehm ganz überzogen, glatt und eben gemacht, so überfährt man ihn mit dem in Rinds-Blut getunkten Borsten-Pinsel allenthalben. Dieses ist von einem Kachel-Ofen zu verstehen. An einem eisernen Ofen werden nur die inwendigen Fugen verstrichen. In den auswendigen Fugen, sowohl an Kachel- als eisernen Oefen, muß der Lehm etwas steifer seyn. Man pinselt zuerst die Fugen mit Rinds-Blute, drückt den steifen Lehm stark in dieselben, und überfährt sie mit dem Blut-Pinsel. Wenn alles trocken ist, überschwärzt man ihn nach der gewöhnlichen Art. Bleibt von dem Lehme etwas übrig, so kann man es aufheben; und weil er steinhart wird, so muß man ihn zum abermahligen Gebrauche entzwey schlagen, und mit Salz-Wasser wieder erweichen.

Ein anderer Kitt zu eisernen Oefen, ist folgender. Man nimmt ungelöschten Kalk, frischen Quark, etwas Seifensieder-Lauge, und Hammerschlag. Der Kalk und Hammerschlag wird durch einen Durchschlag gesiebet, in eine hölzerne Mulde oder in ein Faß geschüttet, und so viel Quark und Lauge dazu gethan, bis man sieht, daß der Kalk genässet wird, und mit einer Mauer-Kelle ½ Stunde lang tüchtig durchgearbeitet. Sollte er durch die Länge der Arbeit zu dünn werden, so wird er mit einer hinlänglichen Quantität der trocknen Materie versetzt. Die Fugen werden zuvor mit frischem Rinds-Blute ausgebürstet; auch wird, wenn der Ofen gesetzt ist, der Kitt wieder mit Rinds-Blute überstrichen. Ist bey einem Seifensieder halb gesottener Fluß zu bekommen, so ist derselbe besser, als

die

die Lauge. Es wird auch unter dem Gebrauche immer darein gearbeitet.

Man streicht auch die Ritzen der eisernen Oefen dicht voll weichen Apfel, und läßt durch die Hitze den Apfel an das Eisen anbacken, worauf hernach die nöthige Farbe gestrichen werden kann.

Von **Kupfer- und Blech-Verkittungen**, siehe oben, S. 258.

Eine **Beschreibung verschiedener Arten von Kitt, womit man in den Indigoterien in Amerika die gemauerten Küpen zum Indigmachen auszubessern pflegt**, s. im XVIII Th. S. 581.

In der Chemie braucht man verschiedene Kitte, welche entweder die gläsernen und irdenen Gefäße überziehen (*), um sie solcher Gestalt vor der allzu großen Wirkung des Feuers, vor dem Zerspringen oder vor dem Schmelzen zu verwahren, oder welche die Fugen der Gefäße genau verschließen, um die Substanzen, welche sie enthalten, wenn sie flüchtig und in Dämpfe verwandelt worden sind, zurück zu halten; oder endlich auch, welche gebrochene Gefäße wieder vereinigen. Zu dieser Absicht wendet man verschiedene Materien an, welche man überhaupt Klebewerk oder Kleibewerk, L. Luta, Fr. Lut und die Arbeit oder Verrichtung selbst, das Verlutieren nennt, von Lutum, Lehm, weil man gemeiniglich Lehm, oder eine Mischung von Lehm und andern Dingen dazu anwendet.

Der Kitt, womit man die **gläsernen und irdenen Kolben oder Retorten** beschlägt oder überzieht, muß ungefähr aus gleichen Theilen Sand und unschmelzbarem Thone bestehen. Man verdünnt diese Materien mit Wasser, mischt sie gut durch einander, und setzt etwas gezupfte Reh- oder Kälber-Haare hinzu, die man ebenfalls gut darunter menget. Aus diesen Materien macht man einen etwas flüssigen Teig, womit man

(*) Das Ueberziehen der gläsernen und irdenen Retorten und Kolben mit Kitte, wird das Beschlagen oder Loriciren (Loricatio) derselben genannt.

man die Gefäße schichtweise bis zu einer solchen Dicke, als man für nöthig erachtet, überzieht. Der grobe Sand, den man mit den Thone vermischt, ist in diesem Kleibewerke nöthig, um die Spalten und Ritzen zu verhindern, welche die große Umfangs-Verminderung verursacht, die der Thon, wenn er rein ist, bey seinem Eintrocknen allezeit leidet. Die Haare dienen gleichfalls zur Verbindung der Theile dieses Kleibewerkes, und zur Festhaltung desselben an den Gefäßen. Denn ungeachtet man den Sand mit hinzu setzt, entstehen doch allezeit einige Risse, welche die Ursache sind, daß das Kleibewerk sich zuweilen stückweise los begibt.

Rothe hat, in seiner Anleit. zur Chymie, (Lpz. 1750, 8.) S. 39. zur äusserlichen Ueberziehung der Kolben oder Retorten folgenden brauchbaren Beschlag angegeben. Man nimmt gute Ziegel-Erde, mischt etwas Spreu oder gezupfte Kuh-Haare darunter, macht mit Wasser einen Teig daraus, und beschlägt damit die Gefäße. Wenn das Kleibewerk trocken geworden ist, und die Risse gehörig verstrichen sind, bestreicht man es hin und wieder mit etwas Lein-Oehl. Auf diese Weise erhält man ein recht festes Kleibewerk. Eben dasselbe ist zur Ausfütterung der Oefen dienlich, nur mit dem Unterschiede, daß man die Ziegel-Erde mit Salz-Wasser einmacht. Wenn das in dem Ofen angebrachte Kleibewerk trocken zu werden anfängt, muß man, um zu verhüten, daß dasselbe im Feuer keine Risse bekomme, erst alle sich zeigende Risse mit den Fingern, hierauf aber das ganze Kleibewerk mit der flachen Hand so stark als möglich zusammen drücken, und dieses so lange wiederhohlen, als sich noch Risse zeigen, und das Kleibewerk feucht ist. Nach jedem Andrücken aber muß man das Kleibewerk mit einer naß gemachten Hand wieder gleich und glatt machen.

Baumé (Erl. Experimentalchymie, Th. 1, S. 46, fgg.) empfiehlt 2 ℔ Ofen-Lehm, eben so viel weißen Sand, und 1 ℔ blauen, etwas schmelzbaren Thon, mit ein Par Loth gezupften Reh-Haaren und Wasser, zu einem so weichen Teige genau zu vermengen, und zusammen zu kneten, daß derselbe nicht mehr an den Fingern hängen bleibt. Bey dem Beschlagen hält man die Retorte am Halse, und

schmiert

ſchmiert entweder das Kleibewerk auf die Retorte, 6 Lin. dick, ſo gleichförmig als möglich, trocknet es an der Luft, und ſchabt alsdann ſo viel wieder mit dem Meſſer davon herunter, daß es nur 3 oder 4 Lin. dick darauf ſitzen bleibt. Oder, man taucht die Retorte in das mit Waſſer zu einer flüſſigen Maſſe verdünnte Kleibewerk zu wiederhohlten Mahlen, und ſo ein, daß man allemahl die angeſetzte Schicht über einem Kohlen-Feuer, über welchem man das Gefäß herum drehet, vor dem folgenden Eintauchen trocken werden läſſet. Bey ſtarkem Feuer iſt dieſes Kleibe-Werk etwas ſchmelzbar, welches gut iſt, und das Abſpringen verhindert. Um es noch ſchmelzbarer, und folglich zur Aushaltung eines noch ſtärkern Feuers geſchickt zu machen, kann man 1 oder 2 Unzen Bley-Kalk dem Mengſel zuſetzen, oder auf den trocknen Beſchlag mit einem Pinſel Mennige oder Glätte, mit Lein-Oehl oder Waſſer eingerührt, auftragen.

Die Kitte, mit welchen man die Fugen der Gefäße verſtreicht, ſind von verſchiedener Art, und werden nach der Beſchaffenheit der Arbeiten, welche man anſtellt, und der Subſtanzen, welche man deſtilliert, eingerichtet. Wenn man bloß die Dünſte wäſſeriger und durchaus nicht beitzender Feuchtigkeiten zurück halten muß, darf man nur die Fugen der Vorlage nebſt dem Schnabel des Helmes oder der Retorte, mit Papier- oder Leinwand-Streifen, die mit Mehl-Kleiſter (*) überſtrichen worden ſind, belegen. In dieſem Falle verkleibt man auch ziemlich bequem mit Streifen von eingeweichter Schwein-Blaſe (**). Hat man es mit durchdringenden und auflöſenden Dämpfen zu thun, ſo bedient man ſich eines Kittes, welcher aus Kalke beſteht, der an der Luft zerfallen iſt, und den man mit

Eyweiß

(*) Mit Kleiſter aus Stärk-Mehl, welcher ohne, oder mit etwas zugeſetztem Tiſchler-Leime gekocht worden iſt.

(**) Sie muß ſo lange im Waſſer eingeweicht worden ſeyn, bis ſie, ſich klebrig anzufühlen, anfängt. Man befeſtigt ſie um die Gefäße mit Bindfaden.

Eyweiß (*) schlägt, und zu einem dünnen Teige macht. Man streicht diesen Teig auf Streifen von Leinwand, welche man genau um die Fugen der Gefäße herum legt. Dieser Kitt, welchen die Chemisten Lutum sapientiæ nennen, ist sehr bequem; er trocknet leicht, und wird zu einem sehr festen Körper. Mit eben demselben kann man auch die Risse in gläsernen und porzellanenen Gefäßen, ingl. heraus gesprungene Stücke, wieder verkitten, und sie zum Gebrauche und zur Aufbewahrung trockner Substanzen wieder geschickt machen. Er muß aber allezeit frisch gemacht und sogleich verbraucht werden, weil er gar zu bald krümelig und trocken wird. Bey dem Brennen des Scheide-Wassers, verkleibt man die Röhre des Recipienten, damit der Spiritus nicht durchgehe, mit einer aus Eyweiß, Kalk und Bier bestehenden Masse; diese schmiert man auf Leinwand, und belegt damit die Fugen.

Muß man endlich salzartige, saure und scharfe Dämpfe zurück halten, so bedient man sich eines so genannten fetten Kittes. Man nimmt in dieser Absicht sehr trocknen Thon, welcher keine Kalk-Erde enthalten muß, fein gepülvert und durch ein Haarsieb geschlagen worden ist, befeuchtet ihn mit gekochtem, d. i. mit einem Lein-Oehle, welches durch etwas währendem Kochen darin aufgelöfete Bleyglätte trocknender gemacht worden ist, und folglich mit eben dem Oehle, dessen man sich als eines trocknenden Oehles in der Mahler-Kunst

(*) Das Eyweiß muß vorher mit einer gleichen Quantität Wasser so lange gerührt werden, bis es zergangen ist. Den Kalk läßet man durch ein feines Sieb hinein fallen. An statt des Eyweißes kann man auch eine Brühe, die man aus dem mit genugsamem Wasser verdünnten Quarke durch eine Leinwand heraus gepreßt hat, oder auch eine mit Eyweiß versetzte dünne Auflösung von Tischler-Leim, nehmen, welcher letztere mit Kalke Beaumé's so genanntem Lait d'âne gibt.

Kunſt bedient (Mahler-Firniß) (*), und macht eine Art von feſtem Teige daraus, indem man das Mehlſel in einem Mörſer wohl durcharbeitet. Dieſer Kitt nimmt jede Geſtalt, die man ihm geben will, leicht an, und behält ſie auch (**). Man rollt ihn in walzenförmige Stangen von gehöriger Dicke, und legt dieſelben, indem man ſie breit macht, um die Fugen der Gefäße, welche völlig trocken ſeyn müſſen, weil die geringſte Feuchtigkeit das Anhängen dieſes Kittes verhindern würde. Wenn die Fugen mit dieſem fetten Kitte ganz genau verſtrichen ſind, bedeckt man alles wieder mit Leinwand-Streifen, welche mit dem Kitte aus Kalk und Eyweiß beſtrichen werden, und befeſtigt es auch noch mit Bindfaden. Dieſer zweyte Kitt iſt zur Befeſtigung des erſten oder des fetten Kittes nöthig, weil der letztere weich bleibt, und keine ſolche feſte Conſiſtenz annimmt, daß er ſich allein erhalten könnte.

Nour hat einen ſehr guten Kitt bekannt gemacht, welcher die Stelle des fetten vertreten kann, und ſo gar den Vorzug hat, daß er ſich ſehr leicht mit Waſſer los machen läſſet. Dieſer Kitt wird aus einem Teige von dem Rückbleibſel der Mandeln, aus denen man das Oehl gepreſſet hat, mit ſtarkem in ſiedendem Waſſer aufgelöſeten Leime verfertigt, von welchem letztern man ſo viel hinzu ſetzt, als nöthig iſt, daß eine feſte

und

(*) Man kocht dieſen Mahler-Firniß aus 4 Pfund Leinöhl, und 6 Unzen fein geſiebter Glätte, in einem reinen, eiſernen oder kupfernen Topfe, unter beſtändigem Umrühren, bis zur völligen Auflöſung der Glätte. Statt des Mahler-Firniſſes nehmen Andere zum fetten Kitte Bernſtein-Firniß, den man aus 2 Theilen vorher gebrannten, und bey gelinder Hitze in einer eiſernen Pfanne ſchmelzenden Bernſteine, und 3 Th. Leinöhl, bereitet.

(**) Je länger er liegt, deſto beſſer wird er. Man muß ihn aber in einem zugedeckten ſteinernen Topfe, und zwar im Keller, verwahren. Er läſſet ſich leicht von den Gefäßen wieder herunter nehmen, und wenn er nur nicht angebrannt iſt, zu mehrern Mahlen gebrauchen.

und doch sehr geschmeidige Masse daraus entstehe. Eine andere große Bequemlichkeit von diesem Kitte ist diese, daß die Gefäße, welche man damit verkleibt, nicht so, wie bey dem fetten Kitte, trocken seyn dürfen.

Auch der **Glasscherben-Kitt**, welcher aus fein gesiebter Kreide und Mahler-Firnisse besteht, kann zur Verkleibung der Fugen gebraucht werden; nur erhartet er an den Gefäßen in starkem Feuer gar zu sehr. Zur Einkittung der Glas-Röhren in die Gefäße, in welchen man Gas-Arten entbindet, ist er, seiner Dichte wegen, sehr dienlich. Wenn in Vorlagen, in welchen man saure oder flüchtig alkalische Geister sammeln will, Löcherchen sind, kann man dieselben mit dem aus 1 Th. Terpenthin, und 8 Th. gelbem Wachse durch Zusammenschmelzen bereiteten weichen Wachse verstopfen.

Einen dauerhaften **Kitt für Kachel-Oefen** zu verfertigen, nehme man Kreide, die aber an keinem feuchten Orte gelegen haben muß, pulverisire sie, und netze sie dann mit starkem Biere dergestalt, daß es ein Brey werde, der sich in Fugen und Ritzen bequem einpinseln lässet. Unter diesen Brey mische man die Wolle von einem Bären-Felle, die man zuvor in längere und kürzere Enden zerstücken muß, doch so, daß der Brey sich noch pinseln lasse. Mit diesem werden an dem Ofen die Fugen, wenn sie zuvor von dem krümeligen Unrathe des vorigen Einschmierens durch Ausbürsten wohl gereiniget worden sind, aus- und voll gestrichen, doch nicht auf ein Mahl, sondern nach und nach, so wie der erste Einstrich wohl eingetrocknet ist: da sich denn die in ihm entstandenen Risse durch den Nachstrich, den man noch immer wiederhohlen und nun etwas flüßiger machen kann, zuletzt ganz zusetzen. Bey porzellänenen Oefen ist dieser Kitt, seiner Weiße wegen, gut. Bey schwarzen nimmt er auch die Schwärze gern an.

Pulverisirter und mit Pergament-Wasser diluirter Gyps ist auch hierzu dienlich; nur muß man bey dem Gebrauche des Gypses eilen, weil der Teig bald erhartet, daher allemahl bey der Wiederhohlung des Anstriches eine neue Zubereitung nöthig ist.

Oefen auf eine dauerhafte Art zu verschmieren, dient auch folgende Masse. Man nimmt Mehl, Eisenfeil-Späne und Eyweiß, und schmiert das Mengsel in die Fugen, nachdem der alte Lehm vorher heraus gebracht worden ist. In die Fugen kann man auch eisernen Draht stellen, und denselben mit überschmieren, so hält es desto besser.

Ein wohlfeiler Kitt, womit man dem Rauchen eines Ofens in einem Augenblicke auf lange Zeit abhelfen kann, ist folgender. Man nimmt Lehm, feuchtet ihn mit Wasser und etwas Blut an, und vermischt diesen Teig mit ungelöschtem Kalke. Wenn dieser Teig an einem kühlen Orte aufbehalten wird, ist er lange Zeit brauchbar, und lässet sich verarbeiten. Streicht man ihn aber in die Fugen eines heißen Ofens, so bindet er sogleich, der Rauch verliert sich, und es ist schwer, diesen Kitt nachher wieder heraus zu bringen. Das Blut, welches untermenget wird, verursachet zwar anfangs einigen Geruch, welcher sich aber in ein Par Stunden verliert. Wenn man die Masse, in Form einer Kugel, in eine Gluht wirft, findet man dieselbe nach der Abkühlung so hart als einen Stein.

Im 90 St. des hannover. Magaz. v. J. 1783, wird die Vorschrift zu einem dauerhaften Ofen-Kitte folgender Gestalt mitgetheilt. Man nimmt reine, wohl durchgesiebte Asche, vermischt solche mit Salz, macht es mit Wasser zu einem Teig, und schmiert damit die Ofen-Ritzen. Bey neu zu setzenden, besonders den runden Oefen, ist solcher Kitt unverbrechlich. Man kann auch, wenn man will, etwas Lehm darun-

ter nehmen; doch ist der Kitt ohne Lehm besser und dauerhafter.

Kitte für zerbrochenes Fayance- Porzellan- auch anderes irdenes Geschirr, und Gläser.

1. Man nimmt alten schmierigen Käse, oder auch nur Käse von einer bey dem Feuer zusammen gelaufenen Milch, und vermischt damit so viel ungelöschten Kalk, daß ein zäher Brey daraus wird. Mit dieser Masse bestreicht man die Ränder der Tassen, Teller, oder Gläser, füget sie genau an einander, und lässet es trocknen. Die also ergänzten Sachen werden viel leichter an andern Stellen wieder zerbrechen, als da, wo sie gekittet sind. Auch das Blut allein ist geschickt, Porzellan-Zeug damit zusammen zu leimen.

2. Oder: man nimmt das Weiße von einem Ey, thut darein, einer Haselnuß groß, ungelöschten und recht klein zerstoßenen oder zerriebenen Kalk, rührt alles wohl unter einander, und bestreicht damit die Stücke des zerbrochenen Gefäßes. Hierauf setzt man dieselben wieder zusammen, und bindet sie, wo möglich, mit einem Faden, welcher um das Gefäß herum geht, fest zusammen, und lässet es einen Tag lang trocknen. Will man ein etwas großes Gefäß dieser Art wieder zusammen fügen, so muß man die Materie dazu nicht so flüssig machen, sondern eine größere Menge Kalk darein thun.

3. Oder: man nimmt Eyweiß, schlägt es stark durch einander, füget alsdann Käse und ungelöschten Kalk hinzu, und arbeitet es gut durch einander.

4. Oder: man lässet Auster-Schalen calciniren, und macht sie zu feinem Pulver, welches durch ein seidenes Sieb getrieben, oder auf Marmor so lange gerieben wird, bis es recht fein ist; nimmt sodann Eyweiß, macht davon mit dem Pulver einen Teig oder Leim, schmiert die beyden entgegen gesetzten Ecken da-

beym Feuer behutsam schmelzen, und die Spalten, welche man verkitten will, mit Kohlen fein warm machen; alsdann wird die Masse darein gegossen, oder damit geschmiert, auch daneben, wenn es sich thun lässet, die Fugen mit Werg ausgestopfet: so hält es das Wasser so gut, als neu.

Oder: man nimmt die Molken, welche vom Käsemachen ablaufen, und rührt damit 3 Theile ungelöschten Kalk ein, mit welchem sie sehr geschwinde durch einander gearbeitet werden müssen, und wohey so viel Sand zugesetzt werden muß, als zur Verdickung nöthig ist. Es muß auch dieser Kitt bald verarbeitet werden, weil er, wie Gyps, bald bindet. Diese Composition hält so fest, daß man bey dem Gebrauche derselben nicht nöthig hat, die Breter an den Decken der Zimmer erst mit Rohr zu belegen; sie hält an den Seiten der Fenster, wo sonst der Kalk von der Witterung leicht abspringt, eben so stark, und geht niemahls von dem Holze los. Zwey Stücke glatt gehobeltes Tannen-Holz, die mit diesem Kalk-Kitte waren zusammen gesetzt, getrocknet, und darauf in das Wasser gelegt worden, daß sie aufquollen, sind gleichwohl nicht aus einander gegangen.

Es gibt auch einen Kitt aus Säge-Spänen und Tischler-Leime, womit die Fenster, und allerley Ritzen, Spalten und kleine Löcher in Holzwerke verkleibet und zugeschmieret werden; Fr. Futée.

Ferner dient: rothe Mennige mit Oehl bis zur Dicke gekocht, Wasser-Fässer zu verkitten.

Wenn man Stein-Tröge, oder hölzerne Gefäße, verkitten lässet, hat man Ursache dafür zu sorgen, daß nichts von dem Kitte, worunter rothe Mennige kommt, auf den Höfen oder in den Ställen verzettelt werde. Man hat Beyspiele, daß das Federvieh davon gestorben ist. Es wäre auch gut, dasselbe unterdessen auf einen andern Hof oder in einen andern Stall zu bringen, damit das Feder-Vieh nicht den frischen Kitt von den Gefäßen abhacke.

Die Chineser machen aus dem Oehle des Oehl- oder chinesischen Rettiges (Raphanus chinensis oleiferus

rus

an, und macht solchen mit der Hand eben und glatt, wozu man Salz-Wasser bey der Hand haben muß. Man überstreicht aber den Ofen mit dem Blute nicht auf ein Mahl, sondern nach und nach, so wie man auch den Lehm nach und nach anbringt. Ist der Ofen inwendig mit Lehm ganz überzogen, glatt und eben gemacht, so überfährt man ihn mit dem in Rinds-Blut getunkten Borsten-Pinsel allenthalben. Dieses ist von einem Kachel-Ofen zu verstehen. An einem eisernen Ofen werden nur die inwendigen Fugen verstrichen. In den auswendigen Fugen, sowohl an Kachel- als eisernen Oefen, muß der Lehm etwas steifer seyn. Man pinselt zuerst die Fugen mit Rinds-Blute, drückt den steifen Lehm stark in dieselben, und überfährt sie mit dem Blut-Pinsel. Wenn alles trocken ist, überschwärzt man ihn nach der gewöhnlichen Art. Bleibt von dem Lehme etwas übrig, so kann man es aufheben; und weil er steinhart wird, so muß man ihn zum abermahligen Gebrauche entzwey schlagen, und mit Salz-Wasser wieder erweichen.

Ein anderer Kitt zu eisernen Oefen, ist folgender. Man nimmt ungelöschten Kalk, frischen Quark, etwas Seifensieder-Lauge, und Hammerschlag. Der Kalk und Hammerschlag wird durch einen Durchschlag gesiebet, in eine hölzerne Mulde oder in ein Faß geschüttet, und so viel Quark und Lauge dazu gethan, bis man sieht, daß der Kalk genässet wird, und mit einer Mauer-Kelle ½ Stunde lang tüchtig durchgearbeitet. Sollte er durch die Länge der Arbeit zu dünn werden, so wird er mit einer hinlänglichen Quantität der trocknen Materie versetzt. Die Fugen werden zuvor mit frischem Rinds-Blute ausgebürstet; auch wird, wenn der Ofen gesetzt ist, der Kitt wieder mit Rinds-Blute überstrichen. Ist bey einem Seifensieder halbgesottener Fluß zu bekommen, so ist derselbe besser, als

die

die Lauge. Es wird auch unter dem Gebrauche immer darein gearbeitet.

Man streicht auch die Ritzen der eisernen Oefen dicht voll weichen Apfel, und läßt durch die Hitze den Apfel an das Eisen anbacken, worauf hernach die nöthige Farbe gestrichen werden kann.

Von Kupfer- und Blech-Verkittungen, siehe oben, S. 258.

Eine Beschreibung verschiedener Arten von Kitt, womit man in den Indigoterien in Amerika die gemauerten Küpen zum Indigmachen auszubessern pflegt, s. im XIX Th. S. 581.

In der Chemie braucht man verschiedene Kitte, welche entweder die gläsernen und irdenen Gefäße überziehen (*), um sie solcher Gestalt vor der allzu großen Wirkung des Feuers, vor dem Zerspringen oder vor dem Schmelzen zu verwahren, oder welche die Fugen der Gefäße genau verschließen, um die Substanzen, welche sie enthalten, wenn sie flüchtig und in Dämpfe verwandelt worden sind, zurück zu halten; oder endlich auch, welche gebrochene Gefäße wieder vereinigen. Zu dieser Absicht wendet man verschiedene Materien an, welche man überhaupt Klebewerk oder Kleibewerk, L. Lutu, Fr. Lut und die Arbeit oder Verrichtung selbst, das Verlutieren nennt, von Lutum, Lehm, weil man gemeiniglich Lehm, oder eine Mischung von Lehm und andern Dingen dazu anwendet.

Der Kitt, womit man die gläsernen und irdenen Kolben oder Retorten beschlägt oder überzieht, muß ungefähr aus gleichen Theilen Sand und unschmelzbarem Thone bestehen. Man verdünnt diese Materien mit Wasser, mischt sie gut durch einander, und setzt etwas gezupfte Reh- oder Kälber-Haare hinzu, die man ebenfalls gut darunter menget. Aus diesen Materien macht man einen etwas flüssigen Teig, womit man

(*) Das Ueberziehen der gläsernen und irdenen Retorten und Kolben mit Kitte, wird das Beschlagen oder Loriciren (Loricatio) derselben genannt.

man die Gefäße schichtweise bis zu einer solchen Dicke, als man für nöthig erachtet, überzieht. Der grobe Sand, den man mit den Thone vermischt, ist in diesem Kleibewerke nöthig, um die Spalten und Ritzen zu verhindern, welche die große Umfangs-Verminderung verursacht, die der Thon, wenn er rein ist, bey seinem Eintrocknen allezeit leidet. Die Haare dienen gleichfalls zur Verbindung der Theile dieses Kleibewerkes, und zur Festhaltung desselben an den Gefäßen. Denn ungeachtet man den Sand mit hinzu setzt, entstehen doch allezeit einige Risse, welche die Ursache sind, daß das Kleibewerk sich zuweilen stückweise los begibt.

Rothe hat, in seiner Anleit. zur Chymie, (Lpz. 1750, 8.) S. 39. zur äusserlichen Ueberziehung der Kolben oder Retorten folgenden brauchbaren Beschlag angegeben. Man nimmt gute Ziegel-Erde, mischt etwas Spreu oder gezupfte Kuh-Haare darunter, macht mit Wasser einen Teig daraus, und beschlägt damit die Gefäße. Wenn das Kleibewerk trocken geworden ist, und die Risse gehörig verstrichen sind, bestreicht man es hin und wieder mit etwas Lein-Oehl. Auf diese Weise erhält man ein recht festes Kleibewerk. Eben dasselbe ist zur Ausfütterung der Oefen dienlich, nur mit dem Unterschiede, daß man die Ziegel-Erde mit Salz-Wasser einmacht. Wenn das in dem Ofen angebrachte Kleibewerk trocken zu werden anfängt, muß man, um zu verhüten, daß dasselbe im Feuer keine Risse bekomme, erst alle sich zeigende Risse mit den Fingern, hierauf aber das ganze Kleibewerk mit der flachen Hand so stark als möglich zusammen drücken, und dieses so lange wiederhohlen, als sich noch Risse zeigen, und das Kleibewerk feucht ist. Nach jedem Andrücken aber muß man das Kleibewerk mit einer naß gemachten Hand wieder gleich und glatt machen.

Baumé (Erl. Experimentalchymie, Th. 1, S. 46, fgg.) empfiehlt 2 ℔ Ofen-Lehm, eben so viel weißen Sand, und 1 ℔ blauen, etwas schmelzbaren Thon, mit ein Par Loth gezupften Reh-Haaren und Wasser, zu einem so weichen Teige genau zu vermengen, und zusammen zu kneten, daß derselbe nicht mehr an den Fingern hängen bleibt. Bey dem Beschlagen hält man die Retorte am Halse, und

schmiert

ſchmieret entweder das Kleibewerk auf die Retorte, 6 Lin. dick, ſo gleichförmig als möglich, trocknet es an der Luft, und ſchabt alsdann ſo viel wieder mit dem Meſſer davon herunter, daß es nur 3 oder 4 Lin. dick darauf ſitzen bleibt. Oder, man taucht die Retorte in das mit Waſſer zu einer flüſſigen Maſſe verdünnte Kleibewerk zu wiederhohlten Mahlen, und ſo ein, daß man allemahl die angeſetzte Schichte über einem Kohlen-Feuer, über welchem man das Gefäß herum drehet, vor dem folgenden Eintauchen trocken werden laſſet. Bey ſtarkem Feuer iſt dieſes Kleibe-Werk etwas ſchmelzbar, welches gut iſt, und das Abſpringen verhindert. Um es noch ſchmelzbarer, und folglich zur Aushaltung eines noch ſtärkern Feuers geſchickt zu machen, kann man 1 oder 2 Unzen Bley-Kalk dem Mengſel zuſetzen, oder auf den trocknen Beſchlag mit einem Pinſel Mennige oder Glätte, mit Lein-Oehl oder Waſſer eingerührt, auftragen.

Die Kitte, mit welchen man die Fugen der Gefäße verſtreicht, ſind von verſchiedener Art, und werden nach der Beſchaffenheit der Arbeiten, welche man anſtellt, und der Subſtanzen, welche man deſtilliert, eingerichtet. Wenn man bloß die Dünſte wäſſeriger und durchaus nicht beitzender Feuchtigkeiten zurück halten muß, darf man nur die Fugen der Vorlage nebſt dem Schnabel des Helmes oder der Retorte, mit Papier- oder Leinwand-Streifen, die mit Mehl-Kleiſter (*) überſtrichen worden ſind, belegen. In dieſem Falle verkleibt man auch ziemlich bequem mit Streifen von eingeweichter Schwein-Blaſe (**). Hat man es mit durchdringenden und auflöſenden Dämpfen zu thun, ſo bedient man ſich eines Kittes, welcher aus Kalke beſteht, der an der Luft zerfallen iſt, und den man mit Eyweiß

(*) Mit Kleiſter aus Stärk-Mehl, welcher ohne, oder mit etwas zugeſetztem Tiſchler-Leime gekocht worden iſt.

(**) Sie muß ſo lange im Waſſer eingeweicht worden ſeyn, bis ſie, ſich klebrig anzufühlen, anfängt. Man befeſtigt ſie um die Gefäße mit Bindfaden.

Eyweiß (*) schlägt, und zu einem dünnen Teige macht. Man streicht diesen Teig auf Streifen von Leinwand, welche man genau um die Fugen der Gefäße herum legt. Dieser Kitt, welchen die Chemisten Lutum sapientiæ nennen, ist sehr bequem; er trocknet leicht, und wird zu einem sehr festen Körper. Mit eben demselben kann man auch die Risse in gläsernen und porzellanenen Gefäßen, ingl. heraus gesprungene Stücke, wieder verkitten, und sie zum Gebrauche und zur Aufbewahrung trockner Substanzen wieder geschickt machen. Er muß aber allezeit frisch gemacht und sogleich verbraucht werden, weil er gar zu bald krümelig und trocken wird. Bey dem Brennen des Scheide-Wassers, verkleibt man die Röhre des Recipienten, damit der Spiritus nicht durchgehe, mit einer aus Eyweiß, Kalk und Bier bestehenden Masse; diese schmiert man auf Leinwand, und belegt damit die Fugen.

Muß man endlich salzartige, saure und scharfe Dämpfe zurück halten, so bedient man sich eines so genannten fetten Kittes. Man nimmt in dieser Absicht sehr trocknen Thon, welcher keine Kalk-Erde enthalten muß, fein gepülvert und durch ein Haarsieb geschlagen worden ist, befeuchtet ihn mit gekochtem, d. i. mit einem Lein-Oehle, welches durch etwas währendem Kochen darin aufgelöfete Bleyglätte trocknender gemacht worden ist, und folglich mit eben dem Oehle, dessen man sich als eines trocknenden Oehles in der Mahler-Kunst

(*) Das Eyweiß muß vorher mit einer gleichen Quantität Wasser so lange gerührt werden, bis es zergangen ist. Den Kalk läßet man durch ein feines Sieb hinein fallen. An statt des Eyweißen kann man auch eine Brühe, die man aus dem mit genugsamem Wasser verdünnten Quarke durch eine Leinwand heraus gepreßt hat, oder auch eine mit Eyweiß versetzte dünne Auflösung von Tischler-Leim, nehmen, welcher letztere mit Kalke Beaumé's so genannten Lait d'âne gibt.

Kunſt bedient (Mahler-Firniß) (*), und macht eine Art von feſtem Teige daraus, indem man das Mennſel in einem Mörſer wohl durchreibt. Dieſer Kitt nimmt jede Geſtalt, die man ihm geben will, leicht an, und behält ſie auch (**). Man rollt ihn in walzenförmige Stangen von gehöriger Dicke, und legt dieſelben, indem man ſie breit macht, um die Fugen der Gefäße, welche völlig trocken ſeyn müſſen, weil die geringſte Feuchtigkeit das Anhängen dieſes Kittes verhindern würde. Wenn die Fugen mit dieſem fetten Kitte ganz genau verſtrichen ſind, bedeckt man alles wieder mit Leinwand-Streifen, welche mit dem Kitte aus Kalk und Eyweiß beſtrichen werden, und befeſtigt es auch noch mit Bindfaden. Dieſer zweyte Kitt iſt zur Befeſtigung des erſten oder des fetten Kittes nöthig, weil der letztere weich bleibt, und keine ſolche feſte Conſiſtenz annimmt, daß er ſich allein erhalten könnte.

Nour hat einen ſehr guten Kitt bekannt gemacht, welcher die Stelle des fetten vertreten kann, und ſo gar den Vorzug hat, daß er ſich ſehr leicht mit Waſſer los machen läſſet. Dieſer Kitt wird aus einem Teige von dem Rückbleibſel der Mandeln, aus denen man das Oehl gepreſſet hat, mit ſtarkem in ſiedendem Waſſer aufgelöſeten Leime verfertigt, von welchem letztern man ſo viel hinzu ſetzt, als nöthig iſt, daß eine feſte und

(*) Man kocht dieſen Mahler-Firniß aus 4 Pfund Leinöhl, und 6 Unzen fein geſtoßener Glätte, in einem reinen, eiſernen oder kupfernen Topfe, unter beſtändigem Umrühren, bis zur völligen Auflöſung der Glätte. Statt des Mahler-Firniſſes nehmen Andere zum fetten Kitte Bernſtein-Firniß, den man aus 2 Theilen verher gebrannten, und bey gelinder Hitze in einer eiſernen Pfanne ſchmelzenden Bernſteine, und 3 Th. Leinöhl, bereitet.

(**) Je länger er liegt, deſto beſſer wird er. Man muß ihn aber in einem zugedeckten ſteinernen Topfe, und zwar im Keller, verwahren. Er läſſet ſich leicht von den Gefäßen wieder herunter nehmen, und wenn er gut nicht angebrannt iſt, zu mehrern Malen gebrauchen.

und doch sehr geschmeidige Masse daraus entstehe. Eine andere große Bequemlichkeit von diesem Kitte ist diese, daß die Gefäße, welche man damit verkleibt, nicht so, wie bey dem fetten Kitte, trocken seyn dürfen.

Auch der Glasschleifer-Kitt, welcher aus fein gesiebter Kreide und Mahler-Firnisse besteht, kann zur Verkleibung der Fugen gebraucht werden; nur erhärtet er an den Gefäßen in starkem Feuer gar zu sehr. Zur Einkittung der Glas-Röhren in die Gefäße, in welchen man Gas-Arten entbindet, ist er, seiner Dichte wegen, sehr dienlich. Wenn in Vorlagen, in welchen man saure oder flüchtig alkalische Geister sammeln will, Löcherchen sind, kann man dieselben mit dem aus 1 Th. Terpenthin, und 8 Th. gelbem Wachse durch Zusammenschmelzen bereiteten weichen Wachse verstopfen.

Einen dauerhaften **Kitt für Kachel-Oefen** zu verfertigen, nehme man Kreide, die aber an keinem feuchten Orte gelegen haben muß, pulverisire sie, und netze sie dann mit starkem Biere dergestalt, daß es ein Brey werde, der sich in Fugen und Ritzen bequem einpinseln lässet. Unter diesen Brey mische man die Wolle von einem Bären-Felle, die man zuvor in längere und kürzere Enden zerstücken muß, doch so, daß der Brey sich noch pinseln lasse. Mit diesem werden an dem Ofen die Fugen, wenn sie zuvor von dem krümeligen Unrathe des vorigen Einschmierens durch Ausbürsten wohl gereiniget worden sind, aus- und voll gestrichen, doch nicht auf ein Mahl, sondern nach und nach, so wie der erste Einstrich wohl eingetrocknet ist: da sich denn die in ihm entstandenen Risse durch den Nachstrich, den man noch immer wiederhohlen und nun etwas flüßiger machen kann, zuletzt ganz zusetzen. Bey porzellanenen Oefen ist dieser Kitt, seiner Weiße wegen, gut. Bey schwarzen nimmt er auch die Schwärze gern an.

Pulverisirter und mit Pergament-Wasser diluirter Gyps ist auch hierzu dienlich; nur muß man bey dem Gebrauche des Gypses eilen, weil der Teig bald erhartet, daher allemahl bey der Wiederhohlung des Anstriches eine neue Zubereitung nöthig ist.

Oefen auf eine dauerhafte Art zu verschmieren, dient auch folgende Masse. Man nimmt Mehl, Eisenfeil-Späne und Eyweiß, und schmiert das Mengsel in die Fugen, nachdem der alte Lehm vorher heraus gebracht worden ist. In die Fugen kann man auch eisernen Draht stellen, und denselben mit überschmieren, so hält es desto besser.

Ein wohlfeiler Kitt, womit man dem Rauchen eines Ofens in einem Augenblicke auf lange Zeit abhelfen kann, ist folgender. Man nimmt Lehm, feuchtet ihn mit Wasser und etwas Blut an, und vermischt diesen Teig mit ungelöschtem Kalke. Wenn dieser Teig an einem kühlen Orte aufbehalten wird, ist er lange Zeit brauchbar, und lässet sich verarbeiten. Streicht man ihn aber in die Fugen eines heißen Ofens, so bindet er sogleich, der Rauch verliert sich, und es ist schwer, diesen Kitt nachher wieder heraus zu bringen. Das Blut, welches untermenget wird, verursachet zwar anfangs einigen Geruch, welcher sich aber in ein Par Stunden verliert. Wenn man die Masse, in Form einer Kugel, in eine Gluht wirft, findet man dieselbe nach der Abkühlung so hart als einen Stein.

Im 90 St. des hannover. Magaz. v. J. 1783, wird die Vorschrift zu einem dauerhaften Ofen-Kitte folgender Gestalt mitgetheilt. Man nimmt reine, wohl durchgesiebte Asche, vermischt solche mit Salz, macht es mit Wasser zu einem Teig, und schmiert damit die Ofen-Ritzen. Bey neu zu setzenden, besonders den runden Oefen, ist solcher Kitt unverbrechlich. Man kann auch, wenn man will, etwas Lehm darun-

ter

ter nehmen; doch ist der Kitt ohne Lehm besser und dauerhafter.

Kitte für zerbrochenes Fayance-, Porzellan- auch anderes irdenes Geschirr, und Gläser.

1. Man nimmt alten schmierigen Käse, oder auch nur Käse von einer bey dem Feuer zusammen gelaufenen Milch, und vermischt damit so viel ungelöschten Kalk, daß ein zäher Brey daraus wird. Mit dieser Masse bestreicht man die Ränder der Tassen, Teller, oder Gläser, füget sie genau an einander, und lässet es trocknen. Die also ergänzten Sachen werden viel leichter an andern Stellen wieder zerbrechen, als da, wo sie gekittet sind. Auch das Blut allein ist geschickt, Porzellan-Zeug damit zusammen zu leimen.

2. Oder: man nimmt das Weiße von einem Ey, thut darein, einer Haselnuß groß, ungelöschten und recht klein zerstoßenen oder zerriebenen Kalk, rührt alles wohl unter einander, und bestreicht damit die Stücke des zerbrochenen Gefäßes. Hierauf setzt man dieselben wieder zusammen, und bindet sie, wo möglich, mit einem Faden, welcher um das Gefäß herum geht, fest zusammen, und lässet es einen Tag lang trocknen. Will man ein etwas großes Gefäß dieser Art wieder zusammen fügen, so muß man die Materie dazu nicht so flüssig machen, sondern eine größere Menge Kalk darein thun.

3. Oder: man nimmt Eyweiß, schlägt es stark durch einander, füget alsdann Käse und ungelöschten Kalk hinzu, und arbeitet es gut durch einander.

4. Oder: man lässet Auster-Schalen calciniren, und macht sie zu feinem Pulver, welches durch ein seidenes Sieb getrieben, oder auf Marmor so lange gerieben wird, bis es recht fein ist; nimmt sodann Eyweiß, macht davon mit dem Pulver einen Teig oder Leim, schmiert die beyden entgegen gesetzten Ecken damit,

nig, die man wieder zusammen haben will; und nachdem man die Stücke des zerbrochenen Porzellanes wieder gehörig an einander gesetzt hat, hält sie einige Minuten lang fest an einander gedrückt.

5. Oder: man zerstößt Knoblauch in einem steinernen Mörser, und bestreicht mit dem Safte die Seiten, die man wieder zusammen setzen will. Es ist der stärkste Kitt zu diesem Endzwecke, und lässet wenig oder gar keine Spuren zurück, wenn es sorgfältig gemacht wird.

6. Oder: man nimmt Hausenblase, 1 Loth; Mastix, ½ Loth; Tischler-Leim, 15 Gran; Knoblauch-Saft, einen Speise-Löffel voll, und Spiritus vini so viel, als ein kleines Bierglas fasset. Man bringt alles dieses in einem hierzu bequemen Gefäße zur gehörigen Consistenz, so hat man einen Kitt, der nach seiner völligen Erhartung auch in siedendem Wasser nicht erweicht wird. Dieser Masse können auch, nach Verschiedenheit der Farbe der zerbrochenen Gefäße, Farben von verschiedener Art beygemischet werden.

Zerbrochenes Glas kann man auch mit arabischem Gummi, oder Hausenblase, in Weingeist aufgelöset, zusammen fügen.

Gummi Traganth in Wasser aufgelöset, und mit gebranntem Borax vermischt; damit können Ritzen in Gläsern verstrichen werden.

Sehr zart und subtil gepülvertes weißes oder venedisches Glas, und Mennige, unter einander mit einem Oehl- oder Spiek-Firnisse angemacht, gibt ebenfalls einen guten Kitt für zerbrochenes Glas und gläserne Geschirre, ab.

Auch Kreide, Rocken-Mehl, und venedisches Glas, von jedem gleich viel, mit Baum-Oehl und Eyweiß wohl durch einander geknetet, dient, zerbrochene Gläser zu verstreichen.

Von einem aus Queckſilber und Bley oder Zinn zu bereitenden Kitte, die Ausdampfung der geiſtigen Feuchtigkeiten in großen Flaſchen und Gläſern, in welchen Naturalien von mancherley Art erhalten werden ſollen, zu verhindern, werde ich im Art. Naturalien-Cabinet Nachricht ertheilen.

Vom Kitte zu Befeſtigung der Glas-Tafeln in Sproſſen-Fenſtern (Fenſter-Kitt), ſ. im XII Th. S. 591, fgg.

Ein zu Holz und verſchiedenen andern Materie in aller Witterung wohl dauernder Kitt, wird folgenden Maßen zubereitet. Man nimmt ein Stück ungelöſchten Kalk, gießt in einem Geſchirre ein wenig Waſſer daran, damit der Kalk brauſe und zerfalle. Sodann wird das Waſſer abgegoſſen, damit der Kalk zu einem trocknen Mehle werde. Von dieſem Kalk-Mehle werden hernach 12 Loth in ein Geſchirr, 6 andere Loth aber in ein anderes Gefäß gethan, und dieſes ſorgfältig mit 4 Loth ſchönen weißen Nocken-Mehles unter einander gemenget. Alsdann gießt man 4 Loth Lein-Oehl dazu, und rührt es ebenfalls mit den nach und nach hinein zu ſtreuenden, noch übrigen 6 Loth Kalk-Mehl ſo lange unter einander, bis dieſe Maſſe zu einem Teige gemacht iſt. Wenn es nun auf dieſe Art abgeknetet iſt, muß 1 Quent reine Baumwolle nach und nach hinein geknetet werden. Hernach wird dieſer Teig mit einem Stabe, unter Zuſtreuung des übrigen Kalk-Mehles ſo lange geſchlagen, bis der Teig weder am Stocke, noch an den Händen, mehr anklebt.

Ein anderer Holz-Kitt, zu Fäſſern, Kannen und Bretern, iſt folgender. Man laſſe Pech, Rinds-Blut, Lein-Oehl, Terpenthin, und fein geſtoßenes Ziegel-Mehl, unter einander in einer eiſernen Pfanne

beym Feuer behutsam schmelzen, und die Spalten, welche man verkitten will, mit Kohlen fein warm machen; alsdann wird die Masse darein gegossen, oder damit geschmiert, auch daneben, wenn es sich thun lässet, die Fugen mit Werg ausgestopfet: so hält es das Wasser so gut, als neu.

Oder: man nimmt die Molken, welche vom Käsemachen ablaufen, und rührt damit 3 Theile ungelöschten Kalk ein, mit welchem sie sehr geschwinde durch einander gearbeitet werden müssen, und wohey so viel Sand zugesetzt werden muß, als zur Verdickung nöthig ist. Es muß auch dieser Kitt bald verarbeitet werden, weil er, wie Gyps, bald bindet. Diese Composition hält so fest, daß man bey dem Gebrauche derselben nicht nöthig hat, die Breter an den Decken der Zimmer erst mit Rohr zu belegen; sie hält an den Seiten der Fenster, wo sonst der Kalk von der Witterung leicht abspringt, eben so stark, und geht niemahls von dem Holze los. Zwey Stücke glatt gehobeltes Tannen-Holz, die mit diesem Kalk-Kitte waren zusammen gesetzt, getrocknet, und darauf in das Wasser gelegt worden, daß sie aufquollen, sind gleichwohl nicht aus einander gegangen.

Es gibt auch einen Kitt aus Säge-Spänen und Tischler-Leime, womit die Fenster, und allerley Ritzen, Spalten und kleine Löcher in Holzwerke verkleibet und zugeschmieret werden; Fr. Futée.

Ferner dient: rothe Mennige mit Oehl bis zur Dicke gekocht, Wasser-Fässer zu verkitten.

Wenn man Stein-Tröge, oder hölzerne Gefäße, verkitten lässet, hat man Ursache dafür zu sorgen, daß nichts von dem Kitte, worunter rothe Mennige kommt, auf den Höfen oder in den Ställen verzettelt werde. Man hat Beyspiele, daß das Federvieh davon gestorben ist. Es wäre auch gut, dasselbe unterdessen auf einen andern Hof oder in einen andern Stall zu bringen, damit das Feder-Vieh nicht den frischen Kitt von den Gefäßen abhacke.

Die Chineser machen aus dem Oehle des Oehl- oder chinesischen Rettiges (Raphanus chinensis oleiferus

rus *Linn.*), durch ſtarke Durcharbeitung mit ungelöſchtem Kalke, den Kitt, den ſie China nennen, womit ſie alle Fugen ihrer Fahrzeuge bedecken, welcher, wenn er verhärtet iſt, auf lange Zeit die See-Würmer abhält.

Von dem eigentlichen **Schiff-Kitte**, oder Schiff-Leime, ſ. den Art. **Spalm**.

Die gewöhnlichſten Arten des Kittes, deren die Künſtler und Handwerker ſich bedienen, ſind folgende.

Die Bildhauer verfertigen ihren Kitt, Fr. Badigeon, womit ſie theils abgebrochene Stücke Marmor wieder an einander fügen, theils kleine Löcher und Lücken ausfüllen, oder andere Mängel verbeſſern, aus Gyps, feinem Marmor-Staube, (oder Staube von eben demſelben Steine, woraus die Figur gemacht iſt,) flüſſig gemachtem ſtarkem Leim und Pech.

Die Böttcher bedienen ſich, um die Zwiſchenräume, die ſich zwiſchen zwey Stäben befinden, und wo das Flüſſige durchlaufen würde, zu zuſtreichen, einer Art Kitt, der aus Rüſter-Blättern und Hammel-Talge, beydes unter einander gerieben, beſteht.

Der Kitt der Diamant-Schleifer, beſteht aus gleichen Theilen von Bley und Zinn. Der jüdiſche Künſtler benennt dieſen Kitt mit einem ziemlich undeutſchen Worte **Soldier**. Der Diamant wird bey dem Schleifen in eine kupferne Büchſe (die Doppe genannt,) an einen Draht eingekittet. Siehe im IX Th. S. 209.

Der Kitt der Edelſtein-Schneider, beſteht aus 2 Theilen weißen Pech, 1 Th. Ziegel-Mehl, und etwas Maſtix, womit der Künſtler ſeine Steine auf der Grundfläche eines hölzernen abgekürzten Kegels, welcher der **Kitt-Stock** genannt wird, zum Schneiden und Schleifen befeſtigt. Siehe im IX Th. S. 197.

glühend, steckt sie in den Kitt, und treibt sie so weit hinein, bis die Scheibe der Klinge genau an das Band der Schale anschließt.

Wenn die Mühl-Steine gar zu große oder tiefe Schläge oder Löcher haben, in welche sich gar zu viel Körner untermahlen hinein legen können, füllen die Müller in Frankreich einen Theil dieser Löcher mit einem Kitte aus, welcher aus Rocken-Mehle und in frischem Wasser dick aufgelöseten Kalke besteht, welcher Kitt dann die Körner in den Schlägen der Mühl-Steine anhält, daß sie den schneidenden Ecken, die sie zermalmen sollen, nicht entwischen können. Unsere Müller machen dergleichen Kitt von weißem Quarke, welcher, wenn Rocken-Mehl damit vermenget wird, steinhart wird. An einigen Orten, wo keine ganze Mühl-Steine zu bekommen sind, macht man eine Form von Holz, füllet sie voll Steine, gießt einen Kitt, der die Steine zusammen bäckt, darüber; nimmt, wenn es hart ist, die Form weg, und hauet den Stein zurecht. Allein, dieser Kitt zu einem Mühl-Steine kommt so hoch zu stehen, daß man bey uns 3 bis 4 Mühl-Steine dafür kaufen kann.

Der Schwert-Feger befestigt die Theile der Degen-Gefäße (s. Th. IX, S. 51,) bey dem Verschneiden auf zwey besondern Kitt-Stöcken. Auf dem ersten hölzernen Kitt-Stocke, Fig. 2090 *) liegt das Gehäuse oder das Kreutz des Gefäßes, d. i. der massive Theil zwischen dem Stich-Blatte und Griffe, nebst der Parier-Stange und dem Bügel; der Kitt-Stock muß daher nach der Gestalt des Bügels gekrümmt seyn. Auf dem einen Ende liegt das massive Stück des Gehäuses, welches man die Brust nennt, und an diesem Ende wird auch das Gehäuse auf dem Kitt-Stocke befestigt. Dieserhalb ist ein eiserner Arm a b c angebracht, dessen senkrechte Theile c und a auf den Seiten des Kitt-Stockes dergestalt eingefalzt sind, daß

[redacted]

[redacted] den gut Kreide und Leinöhlr-Firniß beste-
henden Kitte der Glas-Schneider, ſ. davon S.
275.

Die Metall-Arbeiter, als: Gold- und Silber-Arbeiter, Gelbgießer, und Gürtler, haben einen Kitt, mit welchem erhobene Arbeit von Blech verſchiedener Metalle, getrieben (ciſelirt), und mit erhabenen Figuren gezieret wird, daher man ihn auch Treibe-Kitt nennet. Es beſteht derſelbe aus 4 Pfund Pech oder Colophonium und 40 Pf. Ziegel-Mehl, beydes zuſammen geſchmolzen. Hieraus wird ein Klumpen gemacht, welcher auf eine halbe durchgebohrte Kugel von Holz gedrückt wird, die auf einem runden Kranze von geflochtenen Weiden ruhet, um die Kugel mit dem Kitte auf dem Werk-Tiſche nach verſchiedenen Seiten drehen zu können. Iſt der Kitt noch zu hart, und will er nicht den Schlägen, die mit den Bunzen auf das Blech geſchehen, nachgeben, ſo miſcht man etwas Theer oder Talg darunter. Es muß derſelbe zwar den Eindrücken, die er von dem Bleche erleidet, wenn mit den Bunzen darauf geſchlagen wird, etwas nachgeben, doch aber auch nicht zu weich ſeyn. Siehe Getriebene Arbeit, im XVIII. Th. S. 24. fgg. Gold- und Silber-Arbeiter, im XIX Th. S. 459 fgg.

Der Kitt der Mahler, deſſen man ſich zur Ausbeſſerung des Grundes der Gemählde, wo die Farben bis auf die Leinwand abgegangen ſind, bedient, iſt eine Compoſition aus zuſammen geſchmolzenem gelben Wachſe, Lein- oder Nuß-Oehle mit Braunroth.

Der Mechanicus braucht Kitt von Lack und Terpenthin-Oehl, die Glas-Röhre einer Elektriſir-Maſchine in die meſſingene Hülſe zu befeſtigen, und zu andern dergleichen Verkittungen.

Der Kitt des Meſſer-Schmiedes beſteht aus Colophonium und Kreide. Hiermit füllet er das Loch in der Achſe der Schale aus, macht die Angel der Klinge glü-

glühend, steckt sie in den Kitt, und treibt sie so weit hinein, bis die Scheibe der Klinge genau an das Band der Schale anschließt.

Wenn die Mühl-Steine gar zu große oder tiefe Schläge oder Löcher haben, in welche sich gar zu viel Körner unzermahlen hinein legen können, füllen die Müller in Frankreich einen Theil dieser Löcher mit einem Kitte aus, welcher aus Rocken-Mehle und in frischem Wasser dick aufgelöseten Kalke besteht, welcher Kitt dann die Körner in den Schlägen der Mühl-Steine anhält, daß sie den schneidenden Ecken, die sie zermalmen sollen, nicht entwischen können. Unsere Müller machen dergleichen Kitt von weißem Quarke, welcher, wenn Rocken-Mehl damit vermenget wird, steinhart wird. An einigen Orten, wo keine ganze Mühl-Steine zu bekommen sind, macht man eine Form von Holz, füllet sie voll Steine, gießt einen Kitt, der die Steine zusammen bäckt, darüber; nimmt, wenn es hart ist, die Form weg, und hauet den Stein zurecht. Allein, dieser Kitt zu einem Mühl-Steine kommt so hoch zu stehen, daß man bey uns 3 bis 4 Mühl-Steine dafür kaufen kann.

Der Schwert-Feger befestigt die Theile der Degen-Gefäße (s. Th. IX, S. 51,) bey dem Verschneiden auf zwey besondern Kitt-Stöcken. Auf dem ersten hölzernen Kitt-Stocke, Fig. 2090 a) liegt das Gehäuse oder das Kreuz des Gefäßes, d. i. der massive Theil zwischen dem Stich-Blatte und Griffe, nebst der Parier-Stange und dem Bügel; der Kitt-Stock muß daher nach der Gestalt des Bügels gekrümmt seyn. Auf dem einen Ende liegt das massive Stück des Gehäuses, welches man die Brust nennt, und an diesem Ende wird auch das Gehäuse auf dem Kitt-Stocke befestigt. Dieserhalb ist ein eiserner Arm a b c angebracht, dessen senkrechte Theile c und a auf den Seiten des Kitt-Stockes dergestalt eingefalzt sind, daß

daß der ganze Arm ſich hinauf und hinab ſchieben läſſet. Dieſes letztere bewerkſtelliget man vermittelſt einer Schraube d, welche den horizontalen Theil b des eiſernen Armes, und zugleich den Kitt-Stock durchbohret. Die beyden ſenkrechten Theile a und c, ragen etwas über dem Kitt-Stocke hervor; und in die hervor ſtehenden Stücke kann ein Stift a c eingeſchraubet werden. Bey dem Gebrauche bewegt man, vermittelſt der Schraube d, den eiſernen Arm a b c in die Höhe; und nunmehr kann man die Bruſt des Kreuzes unter den Stift a c ſtecken, und der Bügel kommt von e bis f zu liegen. Die Spitze der Schraube d hat ein Loch, und durch dieſes, zugleich aber auch durch eine Oeffnung in der Bruſt wird ein eiſerner Stift geſteckt. Wenn man alſo die Schraube wieder anzieht, bewegt ſich der Arm a b c hinab, und das Gehäuſe des Degen-Gefäßes wird hierdurch auf dem Kitt-Stocke feſt gehalten, die Spitze des Bügels aber in f mit einem Bande angebunden. Den ganzen Kitt-Stock ſpannet der Profeſſioniſt bey dem Verſchneiden in den Schraub-Stock.

Auf dem zweyten Kitt-Stocke, Fig. 2690 b), liegt bey dem Verſchneiden das Stich-Blatt. Er iſt gleichfalls von Holz, und eine eiſerne Schraube a b durchbohrt ihn in ſeiner Axe. Das Stich-Blatt hat, bekannter Maßen, in der Mitte ein Loch, wodurch man es auf die Spitze b der Schraube a b ſchieben kann. Durch ein Loch in dieſer Spitze wird über dem Stich-Blatte ein Stift geſteckt; dieſer hält das Stich-Blatt feſt, wenn die Flügel-Schraube a angezogen wird. Beynahe eben die Geſtalt und Einrichtung hat der hölzerne Stock, worauf die Stich-Blätter geſchabet werden. Die Spitze b hat nur einen vierkantigen Kopf, womit ſie das Stich-Blatt feſt hält.

Der Kitt der Schwert-Feger, wird aus Pech und Ziegel-Mehl zuſammen geſchmolzen, und bey dem Gebrau-

brauche wieder erwärmet. Soll er aber geschmeidig seyn, so muß dem Peche und Ziegel=Mehle noch etwas Talg beygemischet werden.

Die Stein=Schneider, haben einen so genannten **Lauf=Kitt, Binde=Kitt,** und **Glanz=Kitt,** und ein **Kitt=Eisen,** wovon ich bey Beschreibung dieser Profession Nachricht ertheilen werde.

Der **Uhrgehäuse=Macher,** befestigt vermittelst eines Kittes das Untertheil und alle andere Theile eines Uhr=Gehäuses an seinem Dreh=Stuhle an eine flach nach einer Kugel ausgehöhlte Scheibe, die **Kitt=Scheibe** genannt, wovon bey Beschreibung dieser Kunst ein mehreres vorkommen wird.

Kitt, (Bildhauer=) s. oben, S. 281.
— — (Binde=) s. oben, auf dieser Seite.
— — (Böttcher=)
— — (Diamant=Schleifer=) } s. oben, S. 281.
— — (Edelstein=Schneider)
— — (Eisen=) s. oben, S. 264.
— — (Fenster=) s. oben, S. 279.
— — (Gelbgießer=) s. oben, S. 282.
— — (Glanz=) s. oben, auf dieser Seite.
— — (Glas=Schleifer=) s. oben, S. 279.
— — (Gold= und Silber=Arbeiter=) } s. oben, S.
— — (Gürtler=) } 282.
— — (holländischer) s. Tras.
— — (Holz=) s. oben, S. 279.
— — (italiänischer) s. Puzzolane.
— — (Kupfer= und Blech=) s. oben, S. 258.
— — (Lauf=) s. oben, auf dieser Seite.
— — (Mahler=)
— — (Messer=Schmiede=) } s. oben, S. 282.
— — (Müller=) s. oben, S. 283.
— — (Ofen=) zu eisernen Oefen, s. oben, S. 267; zu Kachel=Oefen, s. oben, S. 275.

Kitzel, L. Titillatio, Fr. Chatouillement, Titillation. 1. Eigentlich der höchste Grad des Juckens, welcher zunächst an dem Schmerzen gränzt, gemeiniglich ein Lachen erreget, und durch eine zitternde Bewegung der Nerven verursacht wird. Einen Kitzel im Halse empfinden. Ingl. die Fähigkeit, diese Empfindung durch äussere Berührung zu bekommen. Den Kitzel verlieren. Jemanden den Kitzel vertreiben.

2. In weiterer Bedeutung, ein hoher Grad der sinnlichen angenehmen Empfindung, gemeiniglich im nachtheiligen und verächtlichen Verstande. Was ist der flüchtige Kitzel, womit alle gekünstelte Gerichte die Zunge reitzen? Ein verzärtelter Leib, der stets an den Kitzel angenehmer Empfindungen gewöhnt ist. Gell.

3. Figürlich, eine aus dieser sinnlichen Empfindung herrührende ungeordnete Begierde, das unruhige Verlangen, sich ein ungeordnetes sinnliches Vergnügen zu verschaffen; gleichfalls im verächtlichen Verstande. Der Kitzel der Schwatzhaftigkeit reißt ihn dahin. Den Kitzel der Schreibsucht fühlen. Der Kitzel sticht ihn, im g. L., er fühlt ein solches unruhiges ungeordnetes Verlangen. Der Kitzel ist ihm vergangen. Der Autor-Kitzel, Dichter-Kitzel, u. s. f.

Daher **kitzelig**, zusammengezogen **kitzlig**, Fr. chatouilleux. 1. Eigentlich, fähig leicht Kitzel zu empfinden, in der eigentlichsten Bedeutung des Haupt-Wortes, fähig leicht gekitzelt zu werden; am häufigsten als ein Neben-Wort. Kitzelig seyn. An einer Stelle des Leibes kitzelig seyn, Nieders. kiddelsk, Schwed. kittslig.

2. Figürlich bedeutet **kitzelig**, so viel als empfindlich, im g. L. und der vertraulichen Sprech-Art, doch nur im engern Verstande, fähig leicht Unwillen über etwas zu empfinden, fähig sich leicht für beleidigt zu hal-

halten; einer, den man mit einer Kleinigkeit erzürnen oder beleidigen kann; c'eſt une perſonne bien chatouilleuſe, dies iſt eine Perſon, mit der man behutſam umgehen muß; man kann es gar leicht bey ihr verſehen; man kann ſie mit einem Bagatell vor den Kopf ſtoßen. In der Ehre iſt er ſehr kitzelig. Niederſ. kiddelhaarig.

Man ſagt im niedrigen Styl: er iſt um den Hals herum kitzelig, Fr. il eſt chatouilleux de la gorge, d. i. er hätte den Galgen verdient.

Wenn von Sachen die Rede iſt, als: von Affairen, Unternehmungen, Projecten ꝛc. ſo bedeutet im figürlichen Sinne kitzelig ſo viel als bedenklich, gefährlich, mißlich, u. d. gl. Wer öffentliche Gelder unter Händen (oder unter ſeiner Verwaltung) hat, bekleidet einen kitzeligen (d. i. gefährlichen Poſten; Fr. le maniment des deniers publics eſt un emploi fort chatouilleux. Dieß iſt eine kitzlige (mißliche) Unternehmung; ſie erfordert ausnehmend viel Behutſamkeit; Fr. cette entrepriſe eſt chatouilleuſe. Dieß iſt ein kitzliges (bedenkliches) Project; dieſer Entwurf iſt ſchwer (oder gefährlich) auszuführen; er iſt tauſend Schwierigkeiten und Anſtößen unterworfen; der Zweck kann gar leicht dabey verfehlt werden ꝛc. Fr. voilà un projet bien chatouilleux.

Auf der Reit-Schule nennt man ein Pferd kitzelig, Fr. cheval chatouilleux, welches für die Spornen gar zu empfindlich iſt; welches ſich gleich ein wenig bäumet, wenn man ihm mit den Spornen zu nahe kommt. Aber ein wiederſpännſtiges Pferd, welches dem Sporne gar nicht gehorchen will, und, bey der geringſten Berührung damit, wild zurück weicht, und gewaltſam hinten ausſchlägt, wird Ramingue genannt.

Von Vielen wird dieſes Wort kitzelich, kitzlich, geſchrieben. Allein, wenn es das Suffixum lich bekommen ſoll,

muß auch das l verdoppelt werden, und man muß kitzellich ſchreiben und ſprechen.

Kitzeln, Kitzel verurſachen. 1. Eigentlich, in der eigentlichen Bedeutung des Haupt-Wortes. **Jemanden kitzeln**, durch Berührung gewiſſer empfindlicher Theile ſeines Leibes diejenige Empfindung in ihm hervor bringen, welche der Kitzel genannt wird. **Das Kitzeln nicht leiden können. Sich kitzeln, damit man lachen könne, oder damit man was zu lachen habe**, Fr. ſe chatouiller, pour ſe faire rire, ſagt man figürlich und ſprichwortsweiſe von jemanden, welcher ohne begreifliche Urſache lacht, oder ſich zum Lachen zwingt, ſich ſelbſt zum Lachen auffordert, mit Gewalt luſtig ſeyn will. Imgl. imperſonaliter, doch nur im g. L. **Es kitzelt mich**, ich fühle dieſe Empfindung.

2. Einen hohen Grad der ſinnlichen angenehmen Empfindung erwecken, gemeiniglich im nachtheiligen Verſtande. **Was die Einbildungskraft auf eine feine Art reitzet und kitzelt. Seinen Geſchmack kitzeln. Einem die Ohren kitzeln, Einen mit ſeinem Lobe kitzeln**, Fr. chatouiller les oreilles, einem ſchmeicheln, ihm Dinge erzählen, welche er gerne höret. In engerer Bedeutung, **ſich kitzeln**, ſich innerlich und herzlich über etwas freuen. **Sich über etwas kitzeln**, ſich herzlich und innerlich darüber freuen.

Daher die Kitzelung, welches zuweilen für **Kitzel gebraucht wird. Eine angenehme Kitzelung empfinden.**

Im Oberd. **kutzeln**, daher es auch einige Hochdeutſche **kützeln** ſprechen und ſchreiben; in Boxhorn's Gloſſen kichizolon, im Niederſ. **kiddeln**, in einigen Gegenden Englands kittle, in andern tickle, im Dän. kille und kildre, im Angelſ. citelan, im Schwed. kittla, im Franz. chatouiller, im Lat. titillare, im Lettiſchen kutteht, im Finnländ. cutitus. Es ſcheint das Diminut. von getzen, in ergetzen zu ſeyn, wenn es nicht vielmehr das Frequentativum oder Diminutivum von einem veralteten Zeit-Worte kiſen,

ten, leicht stehen, berühren, ist, weil doch die Empfindung des Kitzels eine Art eines angenehmen Stechens ist. Das Engl. tickle, kitzeln, ist gleichfalls das Diminut. von tick, leicht berühren, Nieders. ticken, woher vermittelst des vorgesetzten Zisch-Lautes unser stechen stammet. In Boxhorn's Glossen wird kiziguſta durch angebat übersetzt, welches gleichfalls eine Art des Stechens ist.

Der **Kitzel** wird von Einigen bloß für einen höhern Grad des Juckens gehalten, aber mit Unrecht. Das Gefühl, welches wir den Kitzel nennen, hat nähmlich das Eigenthümliche, daß wir dadurch zum Lachen gereitzet werden. Ungeachtet nun freylich ein sehr geringer Grad des Kitzels allerdings mit dem Jucken die größte Aehnlichkeit hat, und von demselben kaum zu unterscheiden ist, so lehrt doch die Erfahrung, daß nicht jedes Jucken, bey zunehmender Heftigkeit, in einen Kitzel ausartet. Es kann eine feine, dabey aber sehr scharfe Materie, oder ein vielfacher Stich von Insecten, die Nerven unter unserer Haut dergestalt reitzen, daß das Jucken endlich in die heftigsten Schmerzen übergeht; und doch werden wir bey keinem einzigen Grade dieses zunehmenden Gefühles zum Lachen gereitzt.

Hierzu kommt, daß wir uns das Jucken selbst erregen, uns aber nicht selbst kitzeln können. Wenn man sich z. B. mit einer Feder oder Korn-Aehre leise in dem Innern des Ohres oder der Nase reitzt, so kann man sich selbst ein unerträgliches Jucken verursachen. Man kann dagegen an allen Theilen unsers Leibes, wo wir uns, ohne zu lachen, von Andern nicht berühren lassen können, z. B. im Innern der Hand, an der Fuß-Sohle, am Halse, und in den Seiten, sich selbst zu kitzeln versuchen, und man wird nicht lachen. Es ergibt sich also auch hieraus, daß das Jucken und der Kitzel, ihrer Natur nach verschiedene Gefühle seyn müssen.

Die Natur des letztern völlig zu erklären, ist den aufmerksamsten Beobachtern des Menschen noch bis jetzt nicht gelungen; auch dürfte dieses Räthsel wohl schwerlich durch die sorgfältigsten Untersuchungen aufgelöset werden. Wir müssen uns daher begnügen, dieser Auflösung nur so nahe, als möglich, zu kommen; und zu dem Ende wird es nöthig seyn, eine kurze Vergleichung derer Fälle anzustellen, in welchen wir uns überhaupt zum Lachen gereizt fühlen.

Es ergibt sich sogleich, daß die Ursache des Lachens nicht bloß in dem Gefühle, welches durch eine besondere Art der Berührung erreget wird, zu suchen seyn könne; denn wir lachen auch, wenn wir gar nicht berührt werden, sondern nur etwas Lächerliches sehen, hören, oder denken. Und wie nahe verwandt das Lachen, welches der Kitzel verursacht, mit dem Lachen über einen drolligen Einfall sey, wissen manche gemeine Leute sehr gut, weswegen sie ihres Gleichen, denen sie etwas Lächerliches erzählen, gewöhnlich, wenn sie sich erst selbst in Lachen gesetzt haben, mit einem Finger in der Seite zu prickeln pflegen, um ihnen den Beyfall zu erleichtern.

Wir lachen, wenn wir den Don Quixotte, oder Siegfried von Lindenberg, oder Peregrine Pickle, lesen, vor uns im Stillen; wir lachen über die mündliche komische Erzählung eines Andern; wir lachen, wenn uns unser guter Freund eine Zeit lang sauer ansieht, oder das Gesicht auf eine ungewöhnliche Art verzieht; wir lachen, wenn wir einen ernsthaften Mann, übrigens in vollem State, aber mit der Schlaf-Mütze auf dem Kopfe, ausgehen, oder auch nur einen Erwachsenen fallen sehen. Das züchtige Mädchen lacht, wenn ihr Bräutigam sie zum ersten Mahl in Gegenwart Anderer küßt. Wir lachen, wenn wir etwas Unschickliches in der Zerstreuung thun, wenn es gleich nicht völlig so arg ist, wie der Mißgriff eines Mannes, der bey

dem

dem Bret-Spiele saß, und die Würfel, die er im Becher mit der einen Hand hielt, verschluckte, ein Glas Wasser aber, das er hatte trinken wollen, mit der andern Hand in das Bret goß. Wir lachen, wenn jemand sehr unvermuthet zu uns in das Zimmer tritt. In allen diesen Fällen kann es nicht das körperliche Gefühl seyn, wodurch wir zum Lachen gereitzet werden, sondern die Veranlassung dazu muß in den damit verbundenen Vorstellungen unserer Seele liegen. Sobald daher die ganze lächerliche Sache dieselbe bleibt, nur unsere Vorstellungen dabey von einer andern Art sind, findet auch das Lachen nicht mehr Statt.

Nach dem die bey den angeführten Fällen in der Seele herrschende Vorstellung ist, finden wir die Sache lächerlich, oder nicht. Träte ein Freund, der vor etlichen Tagen auf einen Monath von mir Abschied nahm, jetzt in mein Zimmer, so würde ich vielleicht lachen, wenn ich mir das Wiedersprechende zwischen seinem Abschiede auf einen Monath, und seiner Wiedererscheinung nach vier Tagen, lebhaft dächte. Ich würde aber nicht lachen, wenn etwa sogleich die Vorstellung erwachte, daß ein Unglück ihn genöthigt haben könnte, so schnell zurück zu kehren. Hätte jemand in Gedanken auf den einen Fuß einen schwarzen, und auf den andern einen weißen Strumpf gezogen, so könnte er darüber lachen, wenn er es sähe; würde er es aber in einer Gesellschaft von Personen, für die er Ehrerbiethung hätte, gewahr, so würde wahrscheinlich das Gefühl der Verlegenheit, worin er sich befände, alle Neigung zum Lachen bey ihm ersticken. Die züchtige Braut lacht nur bey dem Küssen des Bräutigams, so lange sie sich noch durch ein Gefühl von geheimer Schamhaftigkeit gereitzt fühlt, sich gegen den Kuß zu sträuben, der ihr übrigens angenehm ist. Wir lachen, wenn wir einen Erwachsenen fallen sehen, weil uns das Wiedersprechende oder der Contrast zwischen dem festen, ernsthaften Gange und dem Fallen, zwischen der abgemessenen Haltung des Körpers im Gehen, und der unbehülflichen Bewegung im Fallen, lebhaft auffällt. Wenn dagegen ein Kind fällt, lachen wir nicht, weil wir den unsichern Gang des Kindes kennen, und daher auch nicht die

geringſte Idee des Wiederſprechenden oder des Contraſtes in uns entſteht, wenn wir es fallen ſehen. Eben ſo lachen wir auch nicht über den Fall des Erwachſenen, ſo bald wir ſehen, daß er Gefahr dabey läuft oder leidet. Wäre der Mann, der mit der Schlaf-Mütze über die Straße ginge, irgend jemand, für den wir eine zärtliche Achtung fühlten, ſo würde in uns der Unwille, Andere über ihn lachen zu ſehen, viel zu ſtark bey uns ſeyn, als daß wir ſelbſt auch lachen könnten. Jener Unwille würde das Gefühl des Contraſtes zwiſchen ſeiner übrigen Kleidung und ſeiner Schlaf-Mütze nicht bey uns aufkommen laſſen. Die wunderlichſten Verzerrungen des Geſichtes ſind bey einem Menſchen nicht mehr lächerlich, ſobald wir hören, daß ſie eine Folge vom Schlage ſind. Wenn unſer Freund uns ſauer anſieht, ſo lachen wir nur, ſo lange wir den Contraſt zwiſchen dieſer Miene und ſeinen Geſinnungen gegen uns empfinden; es iſt uns aber nicht lächerlich, wenn wir voraus ſetzen, daß er wohl wirklich auf uns böſe ſeyn könnte.

Aus der Entwickelung aller dieſer Beyſpiele ergibt ſich, daß das Lachen eine Vorſtellung wiederſprechender oder contraſtirender Ideen iſt, die man ſich verworren oder lebhaft, enge mit einander verbunden, oder gleichſam als Eins, denkt. Wenn wir z. B. jemanden einen Vorwurf darüber machen, daß er ſich ſchon früh morgens betrunken habe, und er antwortete: „ach! ich bitte um Vergebung; mein Räuſchchen, das Sie zu bemerken belieben, iſt nur noch ein Reſtchen von geſtern Abend“: ſo denken wir uns den Contraſt zwiſchen einer Anklage, die er ſich ſelbſt macht, und zwiſchen ſeiner Abſicht, ſich zu entſchuldigen, völlig lebhaft, und lachen. Es iſt aber nothwendig, daß die contraſtirenden oder wiederſprechenden Ideen gleichſam in Eins zuſammen fließen, wenn ſie Lachen erregen ſollen. Stellt man einen ernſthaften, ehrwürdigen Mann, und einen Harlekin neben einander, und denkt ſich gar keine Beziehung des einen auf den andern, ſo wird man auch nichts lächerliches in dieſen beyden contraſtirenden Vorſtellungen finden. Man laſſe aber den Harlekin die

Ge-

Geberden, den Anstand, die Mienen des ehrwürdigen Mannes nachäffen; und es wird lächerlich seyn, weil nun die contrastirenden Ideen in einander fließen, und, da sie zusammen als Eins vorgestellt werden, einen wirklichen Wiederspruch mit einander machen. Endlich müssen auch wiedersprechende Ideen, wenn sie lächerlich werden sollen, nicht deutlich, sondern sinnlich, wie man es zu nennen pflegt, vorgestellt werden; d. h. man muß sie nicht genau und weitläuftig zergliedern, nicht genau angeben, worin eigentlich das Wiedersprechende liegt, sondern alle die Vorstellungen, die den Wiederspruch mit einander machen, müssen in Eins zusammen gefasset und gleichsam im Ganzen gedacht werden. Hierdurch gewinnen die Ideen nicht nur an Lebhaftigkeit, sondern es werden auch mehrere Contraste zugleich empfunden, und der Wiederspruch fällt desto mehr auf. Wenn ein Mahler den Pallast des Königes Salomo mahlte, und eine preußische Schildwache davor stellte, so würde uns sein Bild äusserst lächerlich vorkommen. Im Augenblicke, da wir es ansähen, würden wir uns, gleichsam auf ein Mahl, den ganzen Abstand der Zeit und der Sitten zwischen dem jüdischen und nordischen Salomo vorstellen; wir würden fühlen, wie unmöglich es sey, so etwas Verschiedenes als Eins zu denken, und uns doch genöthigt sehen, es zu thun, weil es auf dem Bilde Eins wäre. Hierin würde das Lächerliche liegen. Hätte aber ein Mahler eine Scene aus dem alten Aegypten gemahlt, und dazu das altrömische Costume gebraucht, so würde dieses für niemand lächerlich seyn, als wer mit den alten ägyptischen und römischen Sitten und Gebräuchen bekannt genug wäre, um das Wiedersprechende auf ein Mahl zu entdecken. Einem Andern könnte man nach und nach zeigen, daß die Gefäße, die Säulen, die Gestalt der Thiere auf dem Bilde nicht nach Aegypten, sondern nach Rom gehörten; und er würde nicht eher lachen, als bis er, an

ſtatt alle dieſe Ideen zu zergliedern, und einzeln zu vergleichen, nun auf ein Mahl ſeine Kenntniſſe von dem ägyptiſchen Coſtume mit dem Verſtoße des Mahlers dagegen zuſammen hielte.

Nach eben denen Gründen, nach welchen wir das Lächerliche überhaupt zu beurtheilen haben, wird ſich nun auch das Gefühl des Kitzels erklären laſſen. Zuvörderſt iſt die Frage: Finden ſich bey dem Kitzel wirklich wiederſprechende oder contraſtirende Vorſtellungen in der Seele? Ich denke allerdings. Wir dürfen nur, um uns davon zu überzeugen, die Oerter unſers Körpers betrachten, an welchen wir kitzelig ſind. Es iſt die innere Fläche der Hand, die Fuß-Sohle, der Hals, die Gegend unter dem Arme, und das Weiche der Seiten. Alle dieſe Theile ſind für eine ſchmerzhafte Empfindung mehr oder weniger empfindlich, weil ſie mit einer großen Menge von Nerven verſehen ſind, welche ſo liegen, daß ſie durch eine äuſſere Berührung ſehr leicht ſtark gereitzet werden können. Die Fuß-Sohlen und die innere Fläche der Hände ſind es am wenigſten; mehr iſt es der Hals, und noch mehr die weiche Stelle jeder Seite. Am meiſten ſind wir daher auch an dieſen letztern kitzelig; in der innern Hand dagegen ſind wir es nur in einem geringen Grade. Werden wir an dieſen Stellen berührt, ſo hat die Seele ſogleich die Vorſtellung vom Schmerze. Bey dem Kitzel aber werden wir nur leiſe berührt, ſo, daß nicht nur kein Schmerz, ſondern ſo gar ein an und für ſich angenehmes Gefühl erfolgt. Es findet alſo allerdings die contraſtirende Vorſtellung von Schmerz und von Vergnügen Statt. Wird die Berührung wirklich ſchmerzhaft, ſo verſchwindet die Vorſtellung des angenehmen Reitzes der Nerven, es fällt aber auch damit alle Neigung zum Lachen hinweg. Zwar iſt hier die eine Idee, nähmlich die wirkliche Empfindung des Reitzes, ein Gegenſtand des Gefühles, die andere dagegen, die

Furcht

Furcht vor dem Schmerze, aus dem Gebiethe der Phantasie geschöpft; aber beyde fließen doch sehr genau in Eins zusammen, wie dieses bey mehrern lächerlichen Vorstellungen der Fall ist, welche der Seele durch verschiedene Vermögen, die sie besitzt, an die Hand gegeben werden. So wird man z. B. auch lachen, wenn man uns eine elende Kleck-Mahlerey zeigt, und dabey sagt: sie sey ein wahres Original von Raphael Urbino, oder sey bestimmt, das Vatican zu zieren.

Endlich bedarf es kaum eines Beweises, daß bey dem Kitzel die Vorstellungen von dem zu befürchtenden Schmerze sowohl, als auch von dem gelinden, angenehmen Reitze der Gefühl-Nerven bloß sinnlich seyn. Wer ist es sich deutlich bewußt, indem er lacht, daß er eine Gefahr befürchte, oder daß seine Nerven auf eine angenehme Art gereitzt werden? Beydes geht so sehr in dem Felde der dunkeln Vorstellungen vor, daß es eben deswegen so schwer wird, sich und andern davon Rechenschaft zu geben. Es ist indessen doch möglich, durch Zusammenstellung mehrerer Erfahrungen nachzuweisen, daß in der That bey dem Kitzel beyde Vorstellungen in der Seele lebhaft seyn. Warum wären denn sonst die Theile unsers Leibes, die mit wenigern Nerven versehen sind, oder wo die Nerven mit vielem Fleische und Fette bedeckt sind, so unfähig vom Kitzel gereitzt zu werden? Bey den übrigen, die zwar empfindliche Nerven genug haben, und an denen wir doch nicht kitzelig sind, kommt dieses wohl offenbar daher, weil sie einer öftern Berührung gewohnt sind, wobey sich also die Seele nach und nach davon versichert, daß keine Gefahr vorhanden sey, wenn eine Berührung derselben vorgeht. Dahin gehören die Spitzen der Finger, die äussere Fläche der Hand, und das Gesicht. Man sage nicht, daß an diesen Theilen also Kinder, die der Berührung noch nicht gewohnt sind, auch kitzelig seyn müßten. Kinder sind gar nicht

kitzelig, weil ſie die Gefahr noch nicht vorher ſehen, die ihnen eine härtere Berührung zuziehen könnte. Zum Theil werden ſie auch mit der Zeit in den Seiten und am Halſe kitzeliger gemacht, als ſie es von Natur ſeyn würden, weil die Aeltern und Wärterinnen ſie öfters zu kitzeln drohen, und dadurch die dunkle Vorſtellung einer Gefahr bey ihnen größer machen, als ſie ſeyn würde, wenn man die Kinder ihrem bloßen Gefühle überlieſſe.

Es erklärt ſich hieraus von ſelbſt, warum man ſich mit ſeiner eigenen Hand nicht kitzeln könne. Denn es iſt natürlich, daß man die Meinung weiß, in welcher man ſich ſelbſt berührt. Man befürchtet nicht, daß man ſich ſelbſt einen Schmerz zufügen werde; man fühlt alſo, wenn man ſich ſelbſt kitzeln will, nichts weiter, als das einfache angenehme Gefühl, welches dem Jucken ähnlich iſt, wobey alles Contraſtirende der Empfindung und der Einbildung hinweg fällt, und daher auch kein Lachen erfolgt. Man kann es auch durch einige Gewalt, die man ſich anthut, bald dahin bringen, daß man gegen das Kitzeln von einem Andern gleichgültig wird. Sobald man ſich nur recht lebhaft und feſt vorſtellt, daß uns der Andere keinen Schmerz zufügen werde, ſo empfinden wir auch nichts anders, als wenn wir uns ſelbſt berühren. Da jedoch wenige Menſchen eine ſolche Herrſchaft über einmahl rege gewordene dunkle Vorſtellungen haben, ſo gehört einige Uebung dazu, es auch in dieſem Theile der Selbſtbeherrſchung weit zu bringen. Selbſt wenn man durch ein ernſthaftes Nachdenken den Kitzel ſchon ganz überwunden zu haben glaubt, pflegt man doch das Lachen nicht durchaus laſſen zu können, wenn ein Anderer uns lange kitzelt. Allein, in dieſem Falle pflegt es in der That auch wenigſtens ſo lange fortgeſetzt zu werden, bis wirklich eine kleine ſchmerzhafte Empfindung erfolgt; und dann iſt es freylich nicht befremdend, daß das Gefühl

fühl endlich über unsere eingebildete Vorstellung von Sicherheit Meister wird.

Kitzel-Husten, siehe im XXVII Th. S. 13.

Kitzelig, siehe oben S. 288.

Kitzeln, siehe oben, S. 209.

Kitzingen, eine kleine, aber nahrhafte und wohl gebauete Handels-Stadt, in einer anmuthigen Gegend an dem, hier schon völlig schiffbaren Mayn, im Bisthume Würzburg. Sie liegt 4 Stunden von der Stadt Würzburg, und ½ Stunde von Bernheim, mithin auf dem Wege zwischen Nürnberg und Frankfurth am Mayn. Sie ist der Sitz eines Ober- und Cent-Amtes. Von den Mitgliedern des Magistrates sind zwey Drittel katholisch, und ein Drittel evangelisch; überhaupt aber besteht er aus 24 Raths-Herren. Die Einwohner, welche über 3000 Seelen betragen, sind untermischt, katholisch und evangelisch, so, daß beyde Religions-Parteyen in der Anzahl einander fast gleich kommen.

Vor Alters gehörte dieser Ort den Grafen von Hohenlohe, von welchen sowohl das Bisthum Würzburg, als auch die Markgrafen zu Brandenburg, ein Antheil an demselben erkauft hatten. 1443 versetzte Würzburg sein Antheil an der Stadt, an die Markgrafen zu Brandenburg-Anspach für 39100 Fl., welches es 1629 wieder einlösen wollte, es kam aber erst 1672 zum Vergleiche, und 1684 zu einem neuen, in welchem Brandenburg-Anspach die ganze Stadt an Würzburg abtrat. Im J. 1746 erhob der Bischof, ein gebornner Graf von Schönborn, die Stadt zu einer öffentlichen freyen Handels-Stadt, und verstattete auch deswegen den Protestanten noch mehrere Freyheiten.

Seinen Wohlstand hat Kitzingen hauptsächlich der unvergleichlichen Lage am Mayn-Strohme zu danken, und den wichtigen Handels-Verbindungen, welche vermittelst dieses Strohmes, zwischen den Niederlanden

und

und den Provinzen am Rhein, zwiſchen Ober-Sachſen und den öſtreichiſchen, bayeriſchen und pfälziſchen Ländern unterhalten werden. Das ſeit 100 Jahren hier befindliche Lager-Haus, ein Beweis von ſchon damahligen Handels-Geſchäften, wurde von vorgedachtem Biſchofe Friedrich Carl, in den Jahren von 1783 bis 1740, dergeſtalt von neuem, und maſſiv, wieder erbauet und erweitert, daß es an Räumlichkeit und guter Bauart am Mayn-Strohme nicht ſeines Gleichen hat. Eben dieſer Fürſt ließ zu gleicher Zeit auch einen ſchönen maſſiven Krahn, zum Ab- und Einladen der Güter, bauen. Dem ungeachtet wird in Kitzingen weder Lager- noch Krahn-Geld berechnet, ſondern der Fuhrmann bezahlt bloß für das Ab- und Aufladen, und der Schiffer für das Aus- und Einladen ſeiner Güter. Hier ſind zugleich die meiſten und beſten Schiffer am Mayn-Strohme, 12 an der Zahl, anzutreffen, welche mit den beſten Geſchirren und Fahrzeugen verſehen, und von der Regierung in der Ordnung angeſtellt ſind, daß längſtens binnen 14 Tagen ein Schiff nach Frankfurth und Maynz unfehlbar mit den gegenwärtigen Gütern, woran es nie fehlt, abgehen muß. In Abſicht der Nähe aber, die großen Heer- und Land-Straßen betreffend, kann die Lage der Stadt nicht bequemer ſeyn, als ſie wirklich iſt. Da nun Kitzingen überdieß, auſſer andern Freyheiten und Handels-Vortheilen, vermöge eines mit dem Markgrafthume Anſpach geſchloſſenen Receſſes, auch das Recht erhalten hat, daß alle Frankfurther Güter, in der achtwöchentlichen Geleits-Zeit, zwiſchen den beyden Frankfurther Meſſen, durchaus hierher geführet werden, und ſo hierdurch die Geleits-Straße nach Nürnberg paſſiren müſſen: ſo iſt nicht zu läugnen, daß Kitzingen ſelbſt vor dem nahrhaften Flecken Markſteft weſentliche Vorzüge voraus habe, und zum Propre-Handel ſowohl,

wohl, als auch zur Spedition, ungemein wohl gelegen sey.

Was den Propre-Handel der Kitzinger betrifft, so ist der Wein, welcher in der hiesigen Gegend in vorzüglicher Menge und Güte gewonnen wird, und der Stadt jährlich ansehnliche Summen einbringt, unstreitig der einträglichste Zweig desselben, insonderheit wird davon nach ganz Sachsen, Westphalen, Bayern ꝛc. der größte Absatz gemacht.

Von Manufacturen und Fabriken, befinden sich hier: zwey Fabriken in Kupferdrucker- (Frankfurther) Schwarz; eine Farbe, welche in eigenen Oefen aus Wein-Hefen gebrannt wird. Ferner sind hier ansehnliche Strumpf- und Hut-Manufacturen, Schön-Färbereyen, auch Roth- und Weiß-Gärbereyen. In Ansehung der letztern ist zu bemerken, daß die Kitzinger Roth-Gärber auch noch besonders mit niederländischem Leder handeln. Es gibt hier auch eine Farbeholz- und Sandel-Mühle, wie auch Essig-Siedereyen.

Buch und Rechnung wird hier, wie in andern Handels-Oertern Deutschlandes, gehalten, und sind alle Reichs-Münzen daselbst gangbar. Im Getreide-Maße hat diese Stadt ihre eigene Metze, deren acht 1 Malter machen; 16 kitzinger Metzen betragen in Nürnberg 1 Simra, 1 Metze 1½ Maß Korn; hingegen geben 18 kitzinger Metzen 1 Simra, 2 Metzen Hafer. Die dasige Elle ist der ulmer Elle gleich.

Die umliegende Gegend, 3 bis 4 Stunden vom Mayn-Strohme ab gelegen, bauet zwar sehr wenig Wein, aber desto mehr Obst, welches in Menge getrocknet und gebacken, auswärts verführt wird. Besonders sind die getrockneten Zwetschen oder Pflaumen ein wichtiger Gegenstand des Handels nach Holland, wodurch viele Menschen in Nahrung gesetzt werden. Ueberdieß ist der Boden in dieser Gegend auch

sehr

Klaes, ein Wald-Vogel; ſ. Dohle.

Klaff-Muſchel, ſ. unter Muſchel.

Klaffen, mit dem Hülfsworte haben, drückt eigentlich eine gewiſſe Art des Schalles aus, und wird beſonders in folgenden Fällen gebraucht, in welchen es aber im Ober- und Niederdeutſchen üblicher iſt, als im Hoch-Deutſchen.

1. Einen gewiſſen Schall verurſachen, welchen man im Hochdeutſchen durch Klappen ausdrückt, in welchem Verſtande es nur im Oberdeutſchen vorkommt, wo der Klaff, Crepitus, die Klaffe, oder der Klaffen, eine Klapper, und klaffen auch klappern iſt.

Bey dem Notker iſt Chlaffot dirre Werelte, das Geräuſch dieſer Welt.

2. Mit dieſem Schalle berſten, aufſpringen, und in weiterer und figürlicher Bedeutung nicht nur für berſten, aufſpringen überhaupt, ſondern auch für von einander ſtehen, abſtehen, ſich nicht gehörig ſchließen, von Dingen, welche ſich ſchließen ſollten; gleichfalls im Oberdeutſchen. Die Thür klaffet, wenn ſie abſteht, nicht ſchließt. Der Deckel klaffet, wenn er nicht feſt aufliegt. Die Erde klaffet überall vor Hitze, ſpringt auf, bekommt Riſſe. Eine klaffende Wunde, welche weit von einander ſteht. Klaffendes Holz, welches Spalten hat. In dieſer Bedeutung iſt es das Neutrum von dem oberdeutſchen Activo klieben, Niederſ. klöben, ſpalten. Siehe Klafter, Kloben, Kluft, Lefze, Lippe.

3. Reden, plaudern, ſchwatzen, ſowohl im Ober-Deutſchen, als im Niederſächſiſchen. Sie weiß artig zu klaffen, zu ſchwatzen. Wir wollen von etwas anderm klaffen. Das Klaffen der Staaren, Papageyen. In engerer Bedeutung iſt klaffen, kieſſen, klappeien, aus der Schule ſchwatzen, etwas durch Worte verrathen, um Lübeck klaffen, trotzig reden,

im

im Dän. klaffe, und im Schwed. klaffa, verleumden. Im Hochdeutschen ist es in allen diesen Bedeutungen ungewöhnlich. Das Schwed. gläppa bedeutet unbedachtsam reden. Siehe Kläffen, Klatschen, und Lippe.

Klaffen-Kraut, eine Benennung des kleinen weißen Hauslaubes, Sedum album *Linn.* s. im XXII Th. S. 392.

Kläffen, mit dem Hülfs-Worte haben, ist für das vorige Klaffen auch im Hochdeutschen üblich, wird aber nur von dem hellen Bellen kleiner junger Hunde, auch von jungen Füchsen gebraucht; Fr. japper. Kleine Hündchen, die den ganzen Tag kläffen, und bey allem ihrem Gekläffe niemand beißen.

Im Schwed. ist glaffa, bellen, im Franz. clabauder, stark bellen, und clapir, von dem natürlichen Geschreye der Kaninchen.

1. **Klaffer**, (der) Fämin. die **Klafferinn**, im Ober-Deutschen, eine schwatzhafte, plauderhafte Person, ein Schwätzer, in der deutschen Bibel, Sir. 51, 7. Kläffer.

2. **Klaffer**, im g. L. eine Benennung des Thlaspi arvense; s. 1 Klafter, unten auf dieser Seite.

Kläffer, Fr. Clabaud, ein Hund, welcher viel bellet, beständig bellet, auch im Hochdeutschen, besonders von kleinen Hunden dieser Art. Siehe Kläffen.

1. **Klafter**, (der) eine Benennung: 1. des im XXI Th. S. 195, fgg. beschriebenen Hahnen-Kammes, Rhinanthus Crista Galli *L.*; 2. des Bauern-Senfes, Thlaspi arvense; s. unter Senf. Im g. L. nur Klaffen, oder Klaffer.

2. **Klafter**, (die) Gr. und Lat. Orgyia, Fr. Toise, Braſſe, ist ein Maß, nach welchem sowohl die Längen, als auch die Flächen und die Körper ausgemessen werden.

Wenn es 1. zu Ausmeſſung der Längen dient, ſo iſt es diejenige Länge, die ein Mann, wenn er beyde Arme ausſtreckt, mit der Spitze der Mittel-Finger an beyden Händen erreichen kann. Weil aber die Länge der Menſchen, und alſo nach Proportion auch dieſe Weite und Diſtanz ſehr verſchieden iſt, ſo hat man dieſes Maß auf einen gewiſſen Fuß geſetzt, und gibt gemeiniglich 3 Ellen, oder 6 pariſer Schuh, wiewohl auch hierin einiger Unterſchied vorkommt. Dieſes iſt das Maß, welches die Franzoſen eigentlich Braſſe, oder Toiſe courante, nennen. Faſt alle Nationen bedienen ſich dieſes Maßes: a) zu Ausmeſſung der Tiefe des Meeres, der Flüſſe und der Brunnen, wo man jedoch ſolches aller Orten im Deutſchen nicht leicht eine Klafter, ſondern lieber, und inſonderheit auf den Schiffen, einen Faden, Holl. Vaam, oder Vadem, und im Franz. nicht leicht Toiſe, ſondern Braſſe nennt. b) Zu Ausmeſſung der Tiefe eines Bergwerkes, eines Schachtes, oder eines Stein-Bruches, wo es im Deutſchen gewöhnlich eine Lachter, und im Franz. ebenfalls Braſſe, und nicht Toiſe, heißt; wiewohl ein deutſches Lachter an den meiſten Orten etwas mehr, als eine Klafter, nähmlich $3\frac{1}{2}$ Elle lang iſt. c) Zu Ausmeſſung der Seile und Taue, inſonderheit der Kabel-Taue, welche dazu dient, die Schiffs-Anker daran zu befeſtigen; in welchem Falle die Franzoſen die Wörter Toiſe und Braſſe ohne Unterſchied, doch das letzte gewöhnlicher, als das erſte, gebrauchen. Doch iſt hierbey noch dieſes anzumerken, daß bey Ausmeßung der Kabel-Taue eines Schiffes, die Länge der Klafter nicht allemahl gleich iſt, ſondern, daß man hierzu dreyerley Arten von Klaftern hat, nähmlich: α) die große von 6 Fuß, deren man ſich bey den Kriegs-Schiffen bedient; β) die mittlere, von $5\frac{1}{2}$ F., nach welcher man auf den Kauffahrdey-Schiffen mißt, wiewohl die Holländer bey Ausrüſtung derjenigen Schiffe, wel-

welche die oſtindiſche Compagnie nach Oſt-Indien ſchickt, ebenfalls die Kabel-Taue nach der großen Klafter rechnen; und endlich 7) die kleine, welche nur 5 F. hält, und von den kleinen Schiffen, als: den auf den Härings-Fang auslaufenden Buyſen ꝛc. gebraucht wird. d) Bey dem Feldmeſſen und andern geometriſchen Vermeſſungen aber, wird die Klafter nur allein von den Franzoſen als ihr gewöhnliches Maß gebraucht, und in dieſem Falle ſolches bloß Toiſe, niemahls aber Braſſe, genannt, da hingegen wir Deutſche uns in dieſem Falle der Ruthe bedienen.

Wenn 2. die Klafter zu Ausmeſſung der Flächen gebraucht wird, wie inſonderheit bey den Franzoſen ebenfalls in ihren geometriſchen Vermeſſungen geſchieht, ſo heißt ſolche eine Quadrat-Klafter Fr. Toiſe carrée, und hält alsdann 3 Ellen oder 6 Fuß in der Länge, und eben ſo viel in der Breite oder Höhe.

Wenn endlich 3. die Klafter zu Ausmeſſung der Körper gebraucht wird, ſo heißt ſolche eine Kubik-Klafter, Fr. Toiſe cube, welche 3 Ellen, oder 6 F., in der Länge, eben ſo viel in der Breite, und eben ſo viel in der Höhe, beträgt. Allein, auch dieſes Maßes bedienen ſich ebenfalls nur die Franzoſen, nicht aber die Deutſchen, auſſer nur allein bey dem zu Scheiten geſchlagenen Brenn-Holze, als welches in Klaftern geſetzt (Fr. mouler du bois), und darnach verkauft zu werden pflegt (Fr. Membrure de bois). Aber alsdann iſt

4. die Klafter ein körperliches Maß, welches die Länge der Scheite zu ſeiner Breite, im übrigen aber eine Klafter oder 3 E. in der Länge, und eben ſo viel in der Höhe hat, auch in den Städten mit einer Reihe guter Scheite noch überleget werden muß.

Was man unter Buſch-Klafter, Knüttel- (Knüppel- oder Klöppel-) Klafter, und Stock-

oder **Stamm-Klafter**, verstehe, und was bey dem Setzen oder Legen des Holzes in Klaftern zu beobachten sey, s. im XXIV Th. S. 622 — 631.

Wenn eine Klafter in einem gewissen Lande 6 F. breit und hoch, und 4 F. 6 Z. lang ist, das Holz aber an eine Factorey verkauft wird, bey welcher die Klafter, nach eben dem Maße 6 F. 3 Z. breit und hoch, 4 F. 8¼ Z. lang ist, so entsteht die Frage: wie viel **Land-Klaftern** zu einer gewissen **Menge Factorey-Klaftern**, z. B. zu 5000, gehören? Diese Frage hat Hr. Hofr. **Beckmann** im 4 St. des 1 B. seiner physik. ökon. Biblioth. S. 545, aus dem 12 B. des allgem. Forstmagaz. S. 161, angeführt. Die Rechner, denen sie vorgelegt worden ist, mögen sie sehr schwer gefunden haben, auch haben sie, wie Hr. B. anführt, unterschiedene Facit heraus gebracht. Hr. B. hat sie am ang. O. so beantwortet, wie es auch dem gemeinsten Oekonomen faßlich seyn kann, der nur weiß, daß man zur Ausrechnung der Klafter, Länge, Breite und Höhe mit einander multipliciren muß. Zu dieser Absicht müssen die Maße in Viertel-Zollen ausgedruckt werden, und da kommen ziemlich große Zahlen heraus, deren Verhältniß Hr. B. in etwas kleinern Zahlen ausdrückt, und so die Frage beantwortet, auch zeigt, wie sie sich durch Logarithmen beantworten läßet. Ueber diese Klafter-Rechnung findet man auch eine ihres Verfassers, des Hrn. Hofr. **Kästner**, würdige Abh. im 50 St. des **Hannov. Magaz.** v. J. 1772, Col. 791, fgg.

Eine englische Klafter (Stack) ist 14 F. lang, und 3 F. hoch und breit.

In einigen oberdeutschen Gegenden **Kluster**, im Berg-Baue **Lachter**, welches eben dieses Wort ist, aus welchem durch Uebergang des mittelsten Hauch-Lautes in den Blase-Laut, und durch vorgesetzten Gaumen-Laut, **Klafter** geworden ist. Schon in dem alten Gedichte auf den h. **Anno** ist **Lastern**, ein Längen-Maß von 6 Fuß. So wie

Faden

Faden in dieser Bedeutung von fahen, umspannen, ist: so ist auch Klafter von dem veralteten klaffen, umgreifen. S. Klaffen 2. und Klaue. Im Oberdeutschen ist es auch ungewisses Geschlechtes, das Klafter. Mit Zahl-Wörtern bleibt es, wie andere Wörter dieser Art, im Plural unverändert. Sechs Klafter, nicht Klaftern.

Klafter-Holz, Holz, welches in oder nach Klaftern verkauft wird; zum Unterschiede von dem Bau-Holze, Nutz-Holze, Reis-Holze, Schock-Holze, u. s. f. Siehe im XXIV Th. S. 595, und 729.

Klafter-Maß. 1. Die Länge einer Klafter, als ein Maß betrachtet. Das Holz nach dem Klafter-Maße verkaufen.

2. Ein körperliches Maß, welches die Länge einer Klafter hat; ein langer Stock, so hoch und breit die Klaftern jedes Ortes sind, womit nachgemessen werden kann, ob die Klafter ihre richtige Höhe und Breite habe; ein **Klafter-Stock.**

Klafter-Schlag, im Forstwesen, ein Schlag, d. i. abgemessener Platz im Walde, wo Klafter-Holz geschlagen wird, oder geschlagen werden soll.

Klafter-Schläger, Holz-Hacker, welche in den Wäldern das Klafter-Holz schlagen; Scheit-Schläger, Scheit-Hauer.

Klafter-Stock, s. **Klafter-Maß.**

Klafterig, eine Klafter haltend, im g. L., und nur mit Zahl-Wörtern. Ein zweyklafteriger Baum, welcher 2 Klafter Brenn-Holz gibt.

Imgleichen, obgleich seltener, eine Klafter im Umfange oder in der Ausdehnung haltend. Ein dreyklafteriger Baum, der 3 Klafter im Umfange hat. Wie man auf ähnliche Art die Wörter griffig, spännig, fuderig, u. s. f. braucht.

Klaftern, Fr. toiser, mit ausgespannten beyden Armen messen, doch nur in dem zusammen gesetzten **umklaftern**, mit ausgespannten Armen umfangen. Bäume,

me, die von drey Mann nicht umkläftert werden können.

Klagbar. 1. So beschaffen, daß darüber gerichtlich geklaget werden kann; in welchem Verstande es doch nur selten gebraucht wird. Die Sache ist noch nicht klagbar.

2. Wirklich vor Gericht klagend; in der gerichtlichen Schreib-Art, und als ein Neben-Wort. Klagbar werden, vor Gericht klagen.

3. Vor Gericht als eine Klage angebracht; auch nur in der rechtlichen Schreib-Art. Klagbare Sachen, welche als Klagen bey einem Gerichte angebracht sind.

Klage (*), das Abstractum des folgenden Zeit-Wortes klagen, die Handlung des Klagens, und die Worte und Töne, wodurch solches geschieht; der Ausdruck unangenehmer Empfindungen durch Töne, und besonders durch Worte; L. Lamentatio, Querela; Fr. Gemissement, Lamentation, Plainte.

1. Ueberhaupt, wo es besonders in der edlern Schreib-Art am üblichsten ist, und am häufigsten im Plural gebraucht wird. In Thränen und laute Klagen ausbrechen. Seine Klagen vor jemanden ausschütten. Verschone mich mit deinen Klagen. Im g. L. ist dafür auch der Infinitiv das Klagen üblich. Die biblischen Ausdrücke, eine Klage halten, eine Klage klagen, seine Klage bey sich gehen lassen, u. s. w. sind im Deutschen ungewöhnlich.

2. In engerer Bedeutung.

1) Die laute Klage über einen Verstorbenen; eine Bedeutung, welche mit der Sache selbst im Deutschen

(*) Bey dem Otfried Klaga, im Oberd. Klagd, im Plural Klägde, im Niederf. und Holl. Klagt. Frisch irret, wenn er glaubt, daß das hochdeutsche Klage sein Zeichen des Abstracti verloren habe. Das e ist so gut ein Zeichen des Abstracti, als d und de.

schen veraltet ist, in welcher aber dieses Wort noch in der deutschen Bibel vorkommt. Eine große und bittere Klage halten, 1 Mos. 50, 10. In einigen Gegenden ist noch ein Ueberbleibsel davon vorhanden, indem Klage daselbst das feyerliche Beyleid bezeichnet, welches man den Hinterbliebenen eines Verstorbenen bezeiget. Die Klage einnehmen. Im Oberdeutschen wird es auch noch von der Trauer gebraucht. Die Klage anlegen, die Trauer. Nicht aus der Klage kommen, aus der Trauer. In der Klage gehen, in der Trauer.

2) Der Ausdruck unangenehmer Empfindungen über eine Person oder Sache gegen einen Andern. Seine Klage bey einem vorbringen. Klage über etwas erheben. Ich habe keine Klage darüber, habe nicht Ursache darüber zu klagen. Man hört viele und große Klagen über dich. Mache nicht, daß Klagen über dich kommen. Es laufen viele Klagen ein.

3) In noch engerer Bedeutung, die Klage über eine Person oder Sache vor Gericht, vor einem Richter; L. Actio, Fr. Action, Demande; imgleichen die Schrift, worin solche enthalten ist. Die Klage über Beschimpfung, über Diebstahl. Eine schriftliche Klage. Seine Klage eingeben, zurück nehmen, liegen lassen. Auf die Klage antworten. Eine Klage abweisen, annehmen. Du wirst mit der Klage nicht fortkommen.

Die Klage, in letzterer Bedeutung, ist überhaupt entweder eine persönliche, oder eine dingliche Klage. Eine persönliche Klage, L. Actio personalis, Fr. Action personelle, ist eine Klage, die sich bloß auf das persönliche Recht gründet, oder, die nur auf die Person gerichtet ist. Sie entsteht entweder aus der Verbindlichkeit, mit der jemand uns, entweder wegen eines mit uns geschlossenen Vertrages (Contractes), oder

wegen eines Verbrechens, verhaftet ist. Jene heißt eine **bürgerliche Klage**, L. Actio civilis, Fr. Action civile; diese, eine **peinliche Klage**, L. Actio criminalis, Fr. Action criminelle. Eine **dingliche Klage**, L. Actio realis, oder in rem, Fr. Action réelle, ist eine Klage, welche sich auf ein dingliches Recht gründet, und gegen jeden Besitzer der Sache, auf die uns ein solches Recht zukommt, angestellet werden kann; z. B. die Klage, wodurch ein Gläubiger verlangt, daß ihm die an ihn verpfändeten Güter des Schuldners bis zum Erfolge der Zahlung eingeräumet werden; L. Actio hypothecaria, Fr. Action hypothécaire. Eine **gemischte Klage**, L. Actio mixta, Fr. Action mixte, wird 1. diejenige Klage genannt, die sich auf ein dingliches und persönliches Recht zugleich gründet, und wodurch wir nicht nur unsere Sachen in Anspruch nehmen, sondern auch das ausklagen, was der Beklagte uns wegen dieser Sachen zu leisten verbunden ist, z. B. die davon gehobenen Nutzungen, u. d. gl. 2. Diejenige Klage, durch welche wir nicht nur unsere Sachen, sondern zugleich auch eine Strafe von dem Beklagten erlangen. Eine **unnütze oder vergebliche Klage**, L. Actio inanis, heißt, wenn man seine Klage wieder jemand anstellt, der nichts hat, und einem keine Satisfaction geben kann; daher kommt das Sprichwort: Wo nichts ist, da hat auch der Kaiser sein Recht verloren. (S. auch unten, im Art. **Klagen**, die Erklärung des Sprichwortes: Wer klagen will, der klage fest.)

Derjenige, welcher eine Klage führt, wird der **Kläger**, L. Actor, Fr. Demandeur, und derjenige, welcher damit belanget wird, der **Beklagte** genannt. Eine Klage muß vor demjenigen Richter angestellet werden, dem die Person, welche verklaget wird, oder die Sache, auf welche geklaget wird, unterworfen ist, nach der Regel: daß insgemein der Kläger dem Ge-

dinge

dinge des Beklagten folge, ausser in wenigen besondern Fällen. Die Klage wird erhoben, entweder mündlich, oder aber schriftlich, durch eine eingegebene Klage-Schrift, oder ein Klage-Libell, Fr. Plaidoié, worin der Kläger, der Beklagte, die Ursache der Klage, die Art, der Grund derselben, und das Begehren, deutlich und ausdrücklich vorgestellet werden soll, damit der Richter sowohl, als der Beklagte sich zur Genüge daraus vernehmen können; und es ist der Richter befugt, eine ungeschickte Klage-Schrift zu verwerfen und abzuweisen. Siehe auch Klagen, und Kläger.

Eine Klage, welche der Beklagte gegen den Kläger vor eben demselben Gerichte, und wegen eben derselben ausgeklagten Sache anstellt, wird die Gegen-Klage, Wieder-Klage, Reconventions-Klage, genannt, ehedem auch die Nach-Klage, zum Unterschiede von der Vor-Klage, oder Conventions-Klage. Diejenige Person, welche eine Gegen-Klage anstellt, heißt der Gegen-Kläger, oder Wieder-Kläger.

Klage-Frau, Frauen, welche ehedem bey Leichen gedungen wurden, den Verstorbenen zu beklagen, und welche noch an einigen Orten, wenigstens dem Nahmen nach, vorhanden sind, da die Sache selbst im Deutschen längst abgekommen ist. Sie werden auch Klage-Weiber, Klage-Mütter, und an andern Orten Leichen-Weiber, Trauer-Weiber, Leid-Frauen, Leid-Schwestern, genannt.

Die Klage-Weiber, L. Mulieres lamentatrices, Planctrices, Praeficae, gehörten unter andern zum Leichen-Gepränge der alten Römer und Griechen. Es waren Frauensperſonen, die für Geld bey den Leichen heuleten, und Trauer-Lieder mit kläglicher Stimme sangen, die mit dem rauhen und traurigen Tone der Trompeten oder Pfeifen harmonieren mußten. Diese

Trauer- oder Klage-Lieder hießen Nænise, und wurden von den Klage-Weibern angestimmt, so bald man die Leiche aus dem Hause weg trug, und fortgesetzet, bis man zum Scheiterhaufen gekommen war, wo der Todte verbrannt werden sollte; ja, sie stimmten sie oft von neuem noch bey dem Scheiterhaufen an, bis der Körper verbrannt, die übrigen Knochen in eine Urne gesammelt, und das ganze Leichen-Begängniß völlig geendigt war. Bisweilen rissen sie sich auch die Haare aus, darin ihnen die übrigen Weiber und Anverwandten des Verstorbenen nachfolgten.

In wie fern solche den Griechen zugeschrieben werden können, zeigt Pfeiffer Antiq. græc. L. IV, c. 47, S. 737. Siehe auch Arth. Young's Untersuchung abgöttischer Verderbnisse in der Religion, S. 194.

In der ersten christlichen Kirche waren dergleichen Klage-Weiber auch Mode, wie unter andern aus folgenden Worten des h. Chrysostomus zu schließen ist: *Miserabiles feminarum planctus non intersint fidelium funeri, ne forte illas constringamus ad deplorandum propria mala.* Bey dem jüdischen Volke müssen sie gar nicht unbekannt gewesen seyn, Jer. 9, 17. 18. Schaffet und bestellet Klageweiber, daß sie kommen, und schicket nach denen, die es wohl können, und eilend uns klagen, daß unsere Augen mit Thränen rinnen, und unsre Augenlieder mit Wasser fließen (*). Das Klage-Lied der hebräischen Schrey-Weiber

(*) Hr. Hofr. und Prof. Tychsen, in Bützow, macht in einer Einladungsschrift von 1785, darin er die Trauer-Gebräuche der Hebräer, nach Anleitung der h. Schrift, beschreibt, aus der Stelle Jer. 9, 17. 20. wahrscheinlich, daß die Klage-Weiber Sängerinnen gewesen seyn, welche in melodischen Trauer-Liedern geübt waren, wenn sie gleich die Melodien der feyerlichen Trauer-Gesänge von Andern nur durch das Gehör erlernt hatten.

Weiber ſteht, nach Geier's Meinung (im Tract. de luctu, c 5, §. 19.) Jer. 9, 21. Der Tod iſt zu unſern Fenſtern herein gefallen und in unſre Palläſte kommen, die Kinder zu würgen auf der Gaſſen, und die Jünglinge auf der Straßen. Doch erinnert Carpzov (in ſeinen Animadv. ad Goodwini Moſen & Aaron, p. 652) ganz wohl, daß man nicht einerley Klage-Lieder bey jeder Leiche gebraucht, ſondern dieſelben nach Beſchaffenheit der Perſon, Würde und Verdienſte, eingerichtet haben mag. Indeſſen halte ich mit Hrn. Strodtmann (*) dafür, daß gleichwohl die Worte des Jeremias die Worte ſelbſt ſeyn, welche die Praeficae geſchrien haben. Ich vermuthe ſolches aus Vergleichung mit einem andern Klage-Liede, welches ich weiter unten anführen werde.

Bey andern Völkern findet man hin und wieder vom Gebrauche der Klage-Frauen Spuren. Daß in Calabrien eine ähnliche Mode beobachtet worden ſey, berichtet Henning Trömmeling in einer Handſchrift, welche Running in ſeiner Bibliothek aufbehalten hat. In derſelben kommt auch die Leichen-Klage, deren ich eben gedacht habe, vor.

Running's eigene Worte ſind folgende. Funeris conſuetudinem inficetam ſatis, ſi non barbaram, etiamnum hodie praeficis in Calabria uſitatam refert Itinerario ſuo MSC. Henningus Trömmeling Ilentorpienſis ad a. 1616, p. 127, ſ. quam operæ pretium cenſeo, quin hactenus ineditum bibliothecam meam exornat, hoc loco donare. *In hac regione circa funeralia conſuetudinem habent mirabilem & ſane barbaricam. Quam primum enim paterfamilias, vel matrona moritur, maritus, vel mulier, vel aliqua alia perſona ex conſanguinitate ſtentorea voce defunctum deplangere incipit tanto clamore, ut ad horrorem potius, quam compaſſionem, aliquem moveant. In civitatibus autem etiamſi eandem conſervent conſuetudinem, modeſtiores tamen hac in parte videntur; illi enim matronam quandam*

(*) In ſeiner Abh. von den Schrey-Herren und Klage-Weibern, im 64 St. der Hannov. gel. Anz. v. J. 1753.

dam eaducunt, quae per rythmos canendo defunctum deplangit hoc modo:

Et donde venne la nebula?
El vienne del alto mare.
Amara fu il for et oimè!
Et trasse me dentro la camera
Et rompi a mi la specchiale.
Amara fu il for et oimè!
Lo specchiale era mariro mio
Et la luce del mio caso.
Amara fu il for et oimè!
Tal stava più che felice
Quando fresco è taglida
Amara fu il for et oimè!
Così l'amara femina,
Quando di novo incantion la.

Hierbey findet ſich zugleich eine Ueberſetzung, die den Verſtand ziemlich richtig ausdrückt, ausgenommen die letzten Zeilen, deren Verſtand wohl dieſer iſt: „So betrübt „eine Weide ausſieht, wenn ſie eben behauen, und ihrer „Aeſte beraubet worden; eben ſo betrübt iſt eine Frau, „wenn ſie von neuen, oder zum zweyten Mahle verſchlimmert iſt. (vielleicht wieder Wittwe worden iſt.)“ Trömmeling hat dieſe Verſe in folgende deutſche, obgleich nun ſchon altmodiſche Reime gebracht:

Wo kam der finſter Nebel her?
Der da heran that ſchleichen?
Er kam wol aus dem hohen Meer,
Mein Haus that er erreichen.
Er ſchleich in mein Schlafzimmer gar,
Mein Unglück muß ich klagen,
Und verbrach mir mein Spiegel klar,
Vor Leid mußt ich verzagen.
Der Spiegel war mein lieber Mann,
Ein Troſt in meinem Leben,
Daß ich nimmer vergeſſen kann,

Groß

Groß Leid that mich umgeben.
Dann gleich wie ein Weidenbaum,
Wann ihm sein Aest seynd abgehaut,
Langer Zeit muß in Trauren stahn;
Keiner ist der ihn anschaut:
Also ich betrübts verlohren Bild,
Kein Trost kan ich erleben.
Allem Unglück dieser Welt
Bin ich itzt gar ergeben.

Was die italiänischen Reime betrifft, so scheinen sie nach dem platten genuesischen Dialecte gemacht, die Wörter aber nach der alten Rechtschreibung richtig zu seyn.

Noch ein anderer Zeuge von besagter calabrischen Mode, ist *Angelus Roccha*, welcher versichert, daß dieselbe überdem auch in Sicilien und Apulien Statt gefunden habe. Testis est auritus *Angelus Roccha*, (schreibt Dillher T. I. disp. acad. p. 198.) huiusmodi per praeficas (Klageweiber) mercenarias, lingua vulgari *Repetitrici* dictas, lugendi consuetudinem etiamnum in Sicilia, Apulia & Calabria conservari, *in Bibl. Vatic.* p. 344.

Auch unsere Deutsche haben die Klage-Weiber gekannt, wenn gleich nicht in den ältesten Zeiten, weil wir keine Spuren davon finden, doch in den mittlern und spätern Zeiten. *Gregorius Turonensis* berichtet, L. 5, 34. daß die Klage-Weiber die Leiche des Clodobert in schwarzer Tracht begleitet haben, und daß der Gebrauch solcher Weiber bis in das 6te Jahrhundert gedauert habe.

Als etwas besonderes verdient angemerket zu werden, daß die Deutschen nicht nur **Klage-Weiber**, sondern auch **Schrey- und Klage-Männer** (*), bey vornehmen Leichen gebraucht haben.

Running

(*) Von diesen Schrey- und Klage-Männern, die bey Leichen gebräuchlich waren, muß man die Schrey-Männer in juristischem Verstande unterscheiden, in welchem Schrey-Mann einen Ankläger bedeutet.

Running ſchreibt davon, in ſeinem Sepulcreto Weſtphalico-Mimigardico gentili, alſo: Nolumus quidem virorum gravitatem feminarum in lacrymas levitati comparare; notiſſimum tamen eſt, moris huiusce veſtigia in celeberrima, eaque vicina ad Rhenum metropoli adhuc hodiedum deprehendi, quando principi in funere ad lacrymabile hoc officium non infimæ dignitatis viri (Schrey-Herren inde appellati) deſtinantur (*).

In dieſem Stücke haben unſere Deutſche, ſo wie in mehrern Stücken, mit den Hebräern etwas Uebereinſtimmniges. Auch bey den Hebräern finden wir Klage-Männer, Amos 5, 16. Es wird in allen Gaſſen Wehklagen ſeyn, und auf allen Straßen wird man ſagen! Wehe! Wehe! und man wird den Ackermann zum Trauren rufen, und zum Wehklagen, wer da weinen kann. Maimonides Hilc. אבל cap. 12. § 1. macht die Sache ganz deutlich. Ich will nur die Verſion herſetzen: Planctus vergit in honorem defuncti, ideo tenentur heredes mercedem ſolvere *planctoribus* & planctricibus, ut eum plangant. Sin autem præceperit (defunctus) ne plangant eum, id intermittunt.

Carpzovii Animadverſiones ad Goodwini Moſen & Aaron. p. 652.
Zeltneri Bibliothec. antiquar. T. I. p. 790.
Vberiores Annotat. Halenſ. in Hagiographos, V. Teſt. libros. ad Eccleſiaſt. XII. 5.

Bey den Hochländern in Scotland, oder den Berg-Schotten, kommen, ſo bald jemand ſtirbt, die Freunde und Verwandten des Verſtorbenen zuſammen, und leiſten den Leidtragenden die erſte Nacht Geſellſchaft.

(*) Running trägt dieſe Sache von den Schrey-Herren noch etwas deutlicher in ſeinem Auctario Gloſſarii Cangiani mit folgenden Worten vor:

Schreyherren. Præficarum vicem funus Archipræſulis Agrippinenſis ab antiquiſſimis temporibus duo viri commutabantur, qui plorantum ederent, lacrymas ab oculis abſtergentes, a *ſchreyen*, plorare, ſic dicti. Man ſieht hieraus deutlich, daß zwey Schrey-Herren, und zwar von gutem Stande, bey dem Begräbniſſe der Erz-Biſchöfe zu Cöln gebraucht worden ſind.

ſellſchaft. Sie tanzen, wie bey Hochzeiten, bis an den andern Morgen. Iſt der Verblichene ein Ehe-Mann, ſo führt die Wittwe den Tanz auf; iſt es eine Ehefrau, ſo thut es der Wittwer. Diejenigen, die von höhern Stande ſind, miethen ſich Klage-Weiber. Dieſe verrichten ihr Amt dadurch, daß ſie ihr Haupt mit einem grünen Tuche behängen, und dann und wann einen traurigen Ton hören laſſen. Eben dieſe Gewohnheit findet man gleichfalls in einigen Gegenden von Ireland.

Auch in dem heutigen Griechenlande, ſind Klage-Weiber gebräuchlich.

Hr. v. Tournefort, in ſeiner Reiſe nach der Levante, (nach der Ueberſetz. 1 B. Nürnb. 1776, gr. 8. S. 188, fgg.) meldet Folgendes: „Bey den Leichen-Begängniſſen der Griechen geht es ſehr traurig zu. Wir waren einſtens auf der Inſel Milo Zeugen davon. Die Sache verhielt ſich ſo: Die Frau eines der Vornehmſten der Stadt, an deſſen Hauſe wir wohnten, ſtarb 2 Tage nach unſerer Ankunft. Kaum hatte dieſelbe ihren Geiſt aufgegeben, ſo hörten wir ein auſſerordentliches Geſchrey, welches uns veranlaſſete, nach der Urſache deſſelben zu fragen. Man ſagte uns, daß, der alten Gewohnheit Griechenlandes zu Folge, die Klage-Weiber ihre Schuldigkeit bey der Verſtorbenen thäten. Es iſt wahr, daß dieſe Weiber ihr Geld redlich verdienen, und Horaz (*) ſagte mit gutem Grunde, daß ſich dieſe Art Menſchen weit mehr plagen müſſe, als andere Leute, die natürlicher Weiſe weinen. Dieſe gedungene Klage-Weiber zerſchlagen ihre Bruſt und zerſtoßen ihre Seiten, und unterdeſſen ſingen einige von ihrer Geſellſchaft Loblieder auf den Todten, er mag nun vom männlichen oder weiblichen Geſchlechte ſeyn. Denn dieſe Gattung von Liedern paſſen auf die zwey Geſchlechter, und auf alle Arten der Todten, von welchem Alter und Stande ſie auch ſeyn mögen. Unter dieſem erbärmlichen Geſchrey redeten einige von Zeit zu Zeit die eben verſtorbene Dame an.

(*) Vt, qui conducti plorant in funere, dicunt
Et faciunt prope plura dolentibus ex animo. *De arte poet.*

Klage-Geſchrey, beſteht in einem ſtarken, mit lauter Stimme deutlich ausgedrückten Aechzen. Bisweilen erhält ſich ein ſolches Geſchrey durchgängig in einerley Tone, beſonders, wenn es mit einem hohen durchdringenden Laute ertönet. Wenn es in einem niedrigen Tone ſich endigt, iſt es gemeiniglich in dem Falle, wenn die Kräfte durch das heftigere Geſchrey bereits geſchwächet worden ſind.

Klage-Haube, heißt, bey den regensburgiſchen Weibern, eine von weißem Zeuge verfertigte und auf gewiſſe Art überſchlagene Haube und Kopf-Aufſatz, deſſen ſie ſich in der Trauer zu bedienen pflegen.

Klage-Haus, Fr. Maiſon de deuil, ein Haus, in welchem über einen Verſtorbenen geklaget wird; ein auſſer der deutſchen Bibel ungewöhnlich gewordenes Wort, wofür im Hochdeutſchen **Trauer-Haus**, und im g. L.

Klagen (*), unangenehme Empfindungen durch Töne und Worte merklich machen. Es ist in dreyfacher Gestalt üblich.

I. Als ein Neutrum, mit dem Hülfsworte haben.

1. Ueberhaupt. Die Fürsten trauerten, Mann und Weib klagten, 1 Macc. 1, 27. Diese murmeln und klagen immerdar, Br. Judä V. 16. Man hört ihn das ganze Jahr klagen. Immer etwas zu klagen haben. Eine klagende Stimme.

Der Gegenstand der Klage bekommt das Vorwort über. Ueber theure Zeiten, über Mangel der Nahrung, über andrer Stolz, über jemandes Bedrückung klagen. Ueber Schmerzen im Kopfe, über schlaflose Nächte, über Mattigkeit, über Frost klagen. Ich habe nicht über Schmerzen zu klagen. Im Oberdeutschen auch wohl mit der vierten Endung. Schmerzen klagen, d. i. über Schmerzen. Der persönliche Gegenstand, an welchen die Klage gerichtet ist, wird in diesem Falle vermittelst des Vorwortes bey ausgedruckt. Bey jemanden über etwas klagen.

(*) Klagen, schon bey dem Kero clagen, bey dem Otfried klagon, im Nieders. gleichfalls klagen, im Schwed. klaga, ist eine Nachahmung des kläglichen Tones, durch welchen sich die unangenehme Empfindung äussert, dessen höhere Grade durch wehklagen, weinen, winseln, ächzen, u. s. f. ausgedruckt werden. Es gehört daher zu dem Griech. κλαίειν, weinen, bey dem Ulphilas klahan, von dem Weinen kleiner Kinder, im Nieders. klönen, klagen, und andern Zeitwörtern dieser Art. So fern bloß auf den lauten Ausdruck gesehen wird, bedeutet klönen im Nieders. auch, mit einer durchdringenden Stimme reden, und klaga im Schwed., sagen, aussprechen. Daß man diese Ableitung schon ehedem gekannt haben müsse, erhellet aus dem mittlern Lat., wo clamare, gerichtlich klagen, und Clamor, Clameum, eine gerichtliche Klage bedeutet, woher auch die Engländer ihr Claim, eine Klage, haben. Ja das Lat. clamare selbst gehört mit zu dem Geschlechte des deutschen klagen.

Klage-Geſchrey, beſteht in einem ſtarken, mit lauter Stimme deutlich ausgedrückten Aechzen. Bisweilen erhält ſich ein ſolches Geſchrey durchgängig in einerley Tone, beſonders, wenn es mit einem hohen durchdringenden Laute ertönet. Wenn es in einem niedrigen Tone ſich endigt, iſt es gemeiniglich in dem Falle, wenn die Kräfte durch das heftigere Geſchrey bereits geſchwächet worden ſind.

Klage-Haube, heißt, bey den regensburgiſchen Weibern, eine von weißem Zeuge verfertigte und auf gewiſſe Art überſchlagene Haube und Kopf-Aufſatz, deſſen ſie ſich in der Trauer zu bedienen pflegen.

Klage-Haus, Fr. Maiſon de deuil, ein Haus, in welchem über einen Verſtorbenen geklaget wird; ein auſſer der deutſchen Bibel ungewöhnlich gewordenes Wort, wofür im Hochdeutſchen **Trauer-Haus**, und im g. L. **Leid-Haus**, üblicher ſind.

Klage-Herr, obrigkeitliche Perſonen in Cöln am Rhein, welche über geringe Streitigkeiten zu erkennen haben.

Klage-Libell, ſiehe oben, S. 313.

Klage-Lied, ein trauriges Lied; und in weiterer Bedeutung, ein Gedicht, in welchem traurige Empfindungen herrſchen; am häufigſten in der dichteriſchen Schreib-Art. **Die Klage-Lieder Jeremiä** ſind unter dieſem Nahmen bekannt.

Von **Klage-Liedern bey Leichen**, ſiehe oben, S. 314.

Klage-Männer, bey den alten Hebräern und Deutſchen; ſ. oben, S. 317, f.

Klage-Mutter, ſiehe oben, S. 313.

Klage-Schatz, eine Benennung der **Gerichts-Gebühren**; ſ. Th. XVII, S. 386.

Klage-Schrift, } ſiehe oben, S. 313.
Klage-Weib, }

die Lehre geben wollen, daß er zuvörderst die rechte Klage anstellen und dabey alles beobachten soll, was nach der Gerichts-Ordnung beobachtet werden muß, wenn man nicht vergeblich klagen will.

Auch heut zu Tage dient dieses Sprichwort einem jeden Kläger zur Lehre, daß er nach demselben erwege, ob er mit Vortheil klagen könne, und ob es nicht besser sey, der Klage sich zu begeben, als mit einem Gegenparte, von welchem am Ende doch nichts zu erhalten ist, lange mit vergeblichen Kosten zu processieren; daß er ferner die Art des Processes prüfe, die rechte Klage anstelle, auf die Beweis-Mittel vorher bedacht sey, und was dergleichen mehr ist.

II. Als ein Reciprocum, sich klagen, in welcher Gestalt es doch nur im Oberdeutschen und einigen gemeinen Mund-Arten üblich ist, für sich beklagen. Sowohl absolute, als auch mit der zweyten Endung der Sache. Sich seines Kopfes klagen, über seinen Kopf klagen. Imgl. mit einem Vorworte, als: ob ꝛc.

In engerer Bedeutung ist es im g. L. der Meißner in der absoluten Gestalt sehr üblich, über körperliche unangenehme Empfindungen klagen. So bald sich eins im Hause klagt, Gell. über Unpäßlichkeit klagt. Er hat gestern angefangen, sich zu klagen. Andern, besonders niedersächsischen Mund-Arten, ist diese Art des Ausdruckes ein Anstoß.

III. Als ein Activum, seine unangenehme Empfindungen durch Worte entdecken, mit der vierten Endung der Sache.

1. Ueberhaupt, mit der dritten Endung der Person. Einem etwas klagen. Lassen Sie sich meine Noth, mein Elend, mein Anliegen, meinen Jammer klagen. Das sey dem Himmel geklagt! Mit Auslassung der vierten Endung der Sache, wir haben euch geklagt, und ihr wolltet nicht weinen, Matth. 11, 17. ist es im Hochdeutschen ungewöhnlich.*

2. In engerer Bedeutung, für beklagen, mit Auslassung der dritten Endung der Person; eine nur im Oberdeutschen übliche Bedeutung. Wer seinem

Daß das unaufhörliche Klagen über seine Umstände unrecht, und mehrentheils ganz ungegründet und unnütz sey, werde ich weiter unten darthun.

2. In engerer Bedeutung, bey einem Höhern, bey einem Richter klagen. Sowohl absolute. Er will klagen. Als auch mit dem Ausdrucke des Gegenstandes der Person und Sache. Ueber jemand klagen. Noch mehr mit dem Vorworte wieder. Wieder jemand klagen. Der Endzweck, die Absicht der Klage, erhält das Vorwort auf. Auf die Ehescheidung, auf eine Ehrenerklärung, auf eine Schadloshaltung klagen. Bey der Obrigkeit, vor Gericht klagen.

Sprichw. Wer klagen will, der klage fest. Die alten Deutschen folgten, bey Anbringung einer gerichtlichen Klage, nur allein dem Rechte der Natur, und der gesunden Vernunft. Der Kläger brachte bey dem Gerichte seine Beschwerden auf eine ganz natürliche und simple Weise, und ohne ängstliche Sorgfalt, an. Alle künstlich ausgesonnene Handgriffe und Verstellungen wurden für unnöthig und überflüssig gehalten; und die vielen Eintheilungen der Klagen in gewisse Ordnungen und Arten, welche im römischen Rechte vorkommen, sind lange unbekannt gewesen. Der Verfasser des Richtsteiges, welcher die Art und Weise, wie die alten Deutschen ihre Klage vor Gericht angebracht hatten, so sorgfältig beschrieben hat, gedenkt nur der Haupt-Eintheilung der Klagen, in bürgerliche, peinliche, und gemischte; s. oben, S. 312. Die alten Deutschen beobachteten eine ungemeine Hochachtung und Ehrfurcht gegen ihre Richter, welche sie vor Anbringung der Klage um Erlaubniß baten. So bald diese erfolgt war, wurde die Klage in kurzen Redensarten vorgetragen, welche der Gerichts-Schreiber aufzeichnete. Man schritt zum Beweis, und nach diesem erfolgte das End-Urtheil.

Da es also, wenn man klagen will, darauf ankommt, daß man die rechte Klage wähle, den Beklagten bey seinen Gerichten belange, und übrigens andere Gebräuche und Gewohnheiten genau beobachte, wenn die Klage angenommen, und der Kläger nicht vor dem Gerichte abgewiesen werden soll: so hat man durch dieses Sprichwort demselben

die

die Lehre geben wollen, daß er zuvörderst die rechte Klage anstellen und dabey alles beobachten soll, was nach der Gerichts-Ordnung beobachtet werden muß, wenn man nicht vergeblich klagen will.

Auch heut zu Tage dient dieses Sprichwort einem jeden Kläger zur Lehre, daß er nach demselben erwege, ob er mit Vortheil klagen könne, und ob es nicht besser sey, der Klage sich zu begeben, als mit einem Gegenparte, von welchem am Ende doch nichts zu erhalten ist, lange mit vergeblichen Kosten zu processieren; daß er ferner die Art des Processes prüfe, die rechte Klage anstelle, auf die Beweis-Mittel vorher bedacht sey, und was dergleichen mehr ist.

II. Als ein Reciprocum, sich klagen, in welcher Gestalt es doch nur im Oberdeutschen und einigen gemeinen Mund-Arten üblich ist, für sich beklagen. Sowohl absolute, als auch mit der zweyten Endung der Sache. Sich seines Kopfes klagen, über seinen Kopf klagen. Imgl. mit einem Vorworte, als: ob ꝛc.

In engerer Bedeutung ist es im g. L. der Meißner in der absoluten Gestalt sehr üblich, über körperliche unangenehme Empfindungen klagen. So bald sich eins im Hause klagt, Gell. über Unpäßlichkeit klagt. Er hat gestern angefangen, sich zu klagen. Andern, besonders niedersächsischen Mund-Arten, ist diese Art des Ausdruckes ein Anstoß.

III. Als ein Activum, seine unangenehme Empfindungen durch Worte entdecken, mit der vierten Endung der Sache.

1. Ueberhaupt, mit der dritten Endung der Person. Einem etwas klagen. Lassen Sie sich meine Noth, mein Elend, mein Anliegen, meinen Jammer klagen. Das sey dem Himmel geklagt! Mit Auslassung der vierten Endung der Sache, wir haben euch geklagt, und ihr wolltet nicht weinen, Matth. 11, 17. ist es im Hochdeutschen ungewöhnlich.*

2. In engerer Bedeutung, für beklagen, mit Auslassung der dritten Endung der Person; eine nur im Oberdeutschen übliche Bedeutung. Wer seinem

Rinde zu weich iſt, der klaget ſeine Striemen, Sir. 30, 7. In noch engerer Bedeutung, einen Verſtorbenen beklagen. Charl. chlagte ſinen toten, Stryckers. Man wird ihn nicht klagen, ach Bruder! Jer. 22, 18. Wenn einer ſtirbt, ſo klage ihn, Sir. 38, 16. Da kam Abraham, daß er ſie klagte und beweinte, 1. Moſ. 23, 2. In welcher Bedeutung es auch in der höhern Schreib-Art der Hochdeutſchen zuweilen gebraucht wird.

Das Haupt-Wort **die Klagung** iſt nur in den zuſammen geſetzten Zeit-Wörtern üblich, weil die **Klage** und **das Klagen** dafür gebraucht werden.

Das unaufhörliche Klagen über ſeine Umſtände iſt unrecht, und mehrentheils ganz ungegründet, und unnütz. Es iſt gewiß ein höchſt verdrießlicher Gemüths-Character, wenn Leute mit ihren Klagen und Vorſtellungen der ihnen beſchwerlichen Umſtände, andere Leute gar zu ſehr beläſtigen. Ich bin der Meinung, daß der Character eines rechtſchaffenen Menſchen es unentbehrlich erfordere, daß man nicht alle ſeine eigene verdrießliche Vorſtellungen andern Menſchen mittheile, und ihnen dadurch beſchwerlich falle. Ich behaupte aber gar nicht, daß ein Ehegatte dem andern, ein Freund dem andern, ein Menſch dem andern, niemahls ſeine Noth klagen müſſe. Nichts weniger als das. Einer der größten Vortheile des Eheſtandes, der Freundſchaft und aller menſchlichen Geſellſchaften, beſteht darin, daß einer des Andern Laſt trage, daß einer gegen den Andern ſein Herz ausſchütte, und ſich dadurch nicht nur ſelbſt ſeine Betrübniß vermindere, ſondern auch Andern Gelegenheit gebe, eine der menſchlichſten Tugenden auszuüben, und den Traurigen und Bedrängten mit Rath und That beyzuſtehen. Ich rede nur von denjenigen verdrießlichen und höchſt beſchwerlichen Leuten, die alle ihre klei-

ne Ungemächlichkeiten und Beschwerden gar zu lebhaft empfinden, und beständig was zu klagen haben; welche durch ihre verdrießliche Gesichter und Klagen ihre wirkliche Noth hundert Mahl größer vorstellen, als sie in der That ist; deren Klagen mehrentheils ganz ungegründet sind, und welche durch ihre Klagen keinen besondern Vortheil erlangen, sondern sich und Andere dadurch höchst mürrisch und mißmüthig machen.

Es wird mir sehr leicht zu beweisen seyn, daß ein solches Betragen mit einer wahrhaftig menschlichen Gesinnung unmöglich bestehen könne; denn es rührt unstreitig aus einer gar zu weichlichen Gemüths-Beschaffenheit her. Ein rechtschaffener Mensch weiß aus Gründen der Vernunft und Erfahrung, daß wir in diesem Leben nicht lauter erwünschte und angenehme Umstände zu erwarten haben. Er sucht sich demnach auszuhärten, und die kleinern Ungemächlichkeiten dieses Lebens entweder gar nicht zu empfinden, oder doch nicht gar zu stark. Einen solchen Menschen betreffen hundert Uebel, und er würdigt sie keiner Aufmerksamkeit; und indem er weiß, daß er wichtigere Dinge zu denken und zu thun hat, so hat er keine Zeit, auf die kleinern Uebel des menschl. Lebens Achtung zu geben, und er schätzt es demnach auch nicht der Mühe werth zu seyn, in weitläuftige Klagen über dieselben auszubrechen. Man kann also sagen, daß ein Mensch, der unaufhörlich klagt, kein starkes Gemüth besitze, welches den Zufällen des menschl. Lebens genug gewachsen wäre, daß er zu weibisch sey, und daß er sich nicht genug mit den menschlichen Pflichten beschäftige, weil er müßige Augenblicke genug hat, um auf die Quellen seiner unaufhörlichen Klagen zu sehr Achtung zu geben. Er ist also einem Menschen ähnlich, welcher gar zu zärtlich erzogen ist, und welcher daher bey jeder rauhen Luft vor Frost zittert; wer sich aber sehr oft dem Wetter aussetzt, der kann dem Sturme und Ungewitter

troßen. Aus dieſer Urſache ſcheint es herzurühren, daß die Schwachheit, von welcher ich hier handle, unter dem Frauenzimmer und unter vornehmen Leuten ſo gemein iſt.

Bey manchen Perſonen kann auch eben dieſe Schwachheit aus einem finſtern und zur Melancholie geneigten Gemüthe herrühren. In dem Gemüthe mancher Perſonen herrſchen gemeiniglich Mißvergnügen und Verdruß. Sie ſind daher ärgerlich, und die geringſte Kleinigkeit erregt in ihnen beunruhigende Leidenſchaften. Weil nun das Mißvergnügen in ihrem Gemüthe unaufhörlich ſo ſtark iſt, daß es alle Augenblicke zum Ausbruche bereit ſteht, ſo darf nur eine Kleinigkeit hinzu kommen, um dieſen Ausbruch vollends zur Wirklichkeit zu bringen. Kaum kann ſolchen Perſonen alſo eine kleine Ungemächlichkeit an ihrem Körper, oder in ihren äuſſerlichen Umſtänden, aufſtoßen, ſo ſchaffen ſie ihrer Leidenſchaft durch ihre Klagen die gewünſchte Befriedigung. Wie wenig handeln dieſe Perſonen der menſchlichen Natur gemäß! Ein rechtſchaffener Menſch ſucht allemahl das Uebergewicht des Vergnügens zu erhalten! Er weiß, daß ihn die göttl. Vorſehung in eine Welt geſetzt hat, welche mit Gütern angefüllt iſt, aus deren Empfindung er das Gefühl der Güte und Menſchenliebe ſeines Gottes herleiten ſoll. Er gewöhnt es ſich demnach an, vornehmlich ſeine Aufmerkſamkeit auf das Gute in dieſer Welt zu richten, und er findet alſo in dieſer Welt mehr Urſachen ſich zu freuen, als durch unaufhörliche Klagen über alle Kleinigkeiten, ſich unter die mißvergnügten Unterthanen Gottes, die wieder ſeine Regierung murren, zu mengen.

Der Menſch verſündigt ſich demnach an ſich ſelbſt durch ſein ewiges Klagen über alle Kleinigkeiten, und verletzt eine ſeiner höchſten Pflichten gegen ſich ſelbſt, indem er ſich in dem Genuſſe ſeiner Glückſeeligkeit ſtö-

ret.

ret. Was helfen mir alle Güter und Vollkommenheiten, wenn ich über dieselben kein Vergnügen empfinde? Dieses Vergnügen ist der Genuß dieser Güter; und was ist ein Besitz ohne Genuß? Bey allem Ueberflusse der Güter genießt ein solcher Kläger kein Vergnügen, weil ein kleines Kopfweh vermögend ist, sein Gemüth so hart anzugreifen, und ihn überwiegend mißvergnügt zu machen. Ein rechtschaffener Mensch muß also, aus Liebe zu seiner eigenen Glückseligkeit und Gemüths-Ruhe, solche ausschweifende Klagen vermeiden, und sich das menschliche Leben, welches ohnedies mit genug betrübten Zufällen untermengt und durchflochten ist, nicht ohne Noth beschwerlicher und schmerzhafter machen.

Man kann noch auf eine andere Art zeigen, daß unaufhörliche Klagen einem rechtschaffenen Menschen unanständig seyn. Gleichwie es die wahre menschliche Gesinnung, die zärtliche Menschen-Liebe, mit sich bringt, daß ein Mensch anderer Menschen Noth fühlt, daß er betrübt ist mit den Betrübten, und daß er mit den Weinenden weint; also erfordert es eben die Menschen-Liebe, daß ein Mensch den andern nicht ohne Noth betrübt und mißvergnügt mache. Die wahre Liebe sucht allemahl die Glückseligkeit der geliebten Person, und also auch das Vergnügen derselben, aufs möglichste zu befördern. Sie verschont demnach aufs möglichste die geliebte Person mit allem Mißvergnügen; sie verbeißt also manchen Schmerz und manchen Verdruß, damit die geliebte Person denselben nicht merke, und dadurch beunruhiget werde. Mithin hütet sie sich, in Gegenwart der geliebten Person gar zu sehr zu klagen, und dadurch den Verdruß von sich selbst auf die geliebte Person fortzupflanzen.

Wie kann also ein Mensch, welcher mit seinen ewigen Klagen jedermann beschwerlich fällt, sagen, daß er seine Nebenmenschen gehörig liebe? Er scheint

ein grausames Vergnügen an der Qual anderer Leute zu empfinden. Er scheint ihnen ihre Glückseligkeit nicht zu gönnen, indem er sie mit seinen Klagen unaufhörlich unterbricht. Und kann er also wohl sagen, daß er die Menschen wahrhaftig liebe?

Eine gar zu große Eigenliebe, und ein unerträglicher Stolz, kann ebenfalls diese unvernünftige Klagen verursachen. Ein solcher Mensch steht zuweilen in der närrischen Einbildung, daß er eine so wichtige Person in der Welt sey, daß jedermann viel daran gelegen sey, zu wissen, daß ihm ein Zahn wehe thut. Er scheint demnach, indem er seine kleine Noth klagt, seine Pflicht zu beobachten, und Andere zur Beobachtung ihrer Schuldigkeit zu bringen, nähmlich über seine Zufälle sich zu betrüben. Was für ein lächerlicher Stolz! Ein rechtschaffener Mensch sucht geliebt zu werden; allein, er erzwingt die Liebe anderer Menschen vornehmlich dadurch, daß er sich Hochachtung erwirbt. Wer aber gar zu viel klagt, der sucht durch den Weg des Mitleidens die Liebe zu erwecken. Ein Weg, den man nur in dringenden Umständen aus Noth erwählen muß. Das Mitleiden muß billig aus der Liebe entstehen; es ist also nicht das beste, wenn die Liebe von dem Mitleiden den Anfang nimmt.

Es gibt aber noch andere Gründe, warum die Klagen vieler Menschen über ihre Umstände, und ihre Unzufriedenheit mit der Schickung thöricht und ungegründet sind. Diese Klagen gehen niemahls auf die Seele, den edelsten Theil des Menschen. Die Eigenliebe verblendet einen Jeden, daß er mit sich selbst wohl zufrieden ist. Ein hirnloser Mensch, der nichts begreifen kann, und in seiner Unwissenheit aufgewachsen ist, beruhigt sich dadurch, daß er alle Wissenschaften verachtet, und sich für sehr verständig hält; und der Lasterhafte verachtet die Tugend. Jeder dünkt sich, seiner Seele nach, in den besten Umständen zu seyn.

Da so wenige Menschen über ihren Geist, oder über sich selbst klagen, so ist es, zweytens, lächerlich, daß sie über ihre leibliche Umstände sich beschweren. Denn wenn es wahr ist, daß sie mit ihrer Person zufrieden seyn können, und daß ihre Seele ihre Kräfte brauchen kann, so können sie gar leicht über alle äusserliche Dinge Herren werden; ist es aber mit ihrer Person selbst schlecht beschaffen, so verdienen, ja, sie verursachen sich selbst alles das, worüber sie zu klagen Ursache zu haben glauben.

Die Umstände, die uns drücken, stehen entweder in unserer Gewalt, oder nicht, wir haben sie uns selbst zugezogen, oder wir können nichts davor. Sind die Umstände, über welche wir klagen, in unserer Gewalt, so haben wir nicht nöthig zu klagen; wir können sie ändern. Eine solche Klage würde eben so thöricht seyn, als die Beschwerde jenes jungen Herrn, der, als es regnete, mit offenem Munde gen Himmel sahe, und seinem Hofmeister zurief: Herr Hofmeister! es regnet mir ins Maul! er bekam die billige Antwort: Narr! thue es zu! Wer in schlechten Umständen ist, die er leicht ändern kann, aber so viel Verstand nicht hat, sich selbst zu helfen, ist, meines Erachtens, auch zu unempfindlich, als daß er durch seine Umstände sollte gerührt werden können. Andere sehen nur, daß es diesem schlecht geht, da er es besser haben könnte, und beklagen ihn nicht, weil er sein Elend nicht fühlt, und auch das Bessere fühllos besitzen würde. Ein solcher Mensch ist ein Klotz, dem es einerley ist, ob er im Nassen oder im Trocknen liegt.

Stehen die Umstände nicht in unserer Gewalt, sie zu ändern, so haben wir, wenn wir unsere Seele recht cultivirt haben, Kräfte genug, dieselben erträglich, leicht, ja, so gar angenehm zu machen. Zwar gehört dazu ein starker Geist, eine edle Denkungs-Art, und ein Gemüth, welches sich über die gemeinen Vorur-

theile

theile hinweg schwingen kann; allein, wir haben Mittel genug, uns so hoch zu erheben, und wer dieselben nicht ergreift, ist nicht werth, daß man ihn hört, oder Mitleiden mit ihm hat. Es gibt eine Art von verzagten Menschen in der Welt, die über das geringste Widerige, das ihnen aufstößt, gleich ganz ausser sich selbst und in das äusserste Schrecken gesetzet werden. Solche Personen empfinden nicht nur mehr Elend, als sie wirklich haben, sondern sie sind auch ausser aller Fassung, auf Mittel zu ihrer Rettung zu denken. Es ist eine alte Erfahrung im Kriege, daß allemahl mehr bleiben von derjenigen Armee, die ihr Heil in der Flucht sucht, als von der, die sich muthig wehret, und festen Fuß hält. In geschlossene Glieder dringt der Feind so leicht nicht ein, als in die zertrennten. Wenn wir nun die Kräfte unserer Seele sammeln, und den Anfällen der wiedrigen Umstände gleichsam mit geschlossenen Gliedern begegnen, so werden wir sehr wenig Uebel leiden.

Ich weiß nicht, was diejenigen denken, welche die Geduld nicht als die erhabenste Tugend verehren. Sie ist die stärkste unter den Tugenden, weil sie alles Uebel ertragen kann. Es ist kein Wunder, daß Menschen, welche die Geduld nicht kennen, in ewigen Klagen ihr Leben abzehren. Die Vernunft, die Philosophie, über alles aber das Christenthum, geben uns die stärksten Gründe, Mittel und Kräfte zur Geduld. Diesen Anker können wir auf der Schifffahrt des Lebens allemahl bey uns haben. Wenn ein Schiffer den Weg vergißt, so geschieht ihm recht, wenn sein Schiff im Sturme untergeht, oder an einem Felsen zerscheitert. Es ist wahr, daß die Geduld eine Tugend ist, die im genauesten Zusammenhange mit dem Elende des menschl. Lebens steht; allein, sie steht zugleich in dem besten Zusammenhange mit demselben, indem sie das Elend nicht herbey führt und fühlbar macht, sondern erleichtert und endigt. Wer nicht geduldig ist, hat

eine

eine kleine Seele, und eine kleine Seele ist werth unglücklich zu seyn.

Zärtliche und sieche Personen müssen sich nicht in die rauhe Luft und auf beschwerliche Reisen machen. Da wir aber in dem menschl. Leben auf einer Reise sind, wo wir allerley Unbequemlichkeiten unvermeidlich erfahren müssen, so schickt es sich nicht, so zärtlich zu seyn; man muß sich stark machen, zumahl da es an Mitteln dazu keinem Menschen fehlen kann, der sich der christlichen Religion bedienen will.

Sind die Unfälle Wirkungen unserer Handlung, und ziehen wir uns selbst Unglück zu, so haben wir auch nicht Ursache zu klagen. Wer wird es leiden können, daß ein Mensch ihm die Ohren voll winsele, der sich mit Fleiß geschnitten hat? Es ist ganz unerträglich, daß Leute thun wollen, was ihnen beliebt, und die Wirkungen ihrer Thaten als ein großes Unglück ansehen. Diese Leute sind im äussersten Grade närrisch, denn sie wollen die Natur der Dinge und alle Ordnung umkehren. Man kann sie als den schändlichsten Theil des menschl. Geschlechtes ansehen. So viel an ihnen ist, verbannen sie alle Vernunft, Ueberlegung und Gerechtigkeit. Wenn der Faule nicht arbeiten will, und daher natürlicher Weise hungern muß, so klagt er über schlechte Zeiten. Wünschen sich solche Leute nicht in der That ein Schlaraffen-Land, wo der Marzipan auf den Bäumen wächst, und man für jede Stunde, die man schläft, einen harten Thaler verdient?

Da es nun ausgemacht ist, daß ein würdiger Mensch über wiedrige Umstände nicht klagt, und daß derjenige mit Unrecht klagt, der sich selbst elend macht, so glaube ich hinlänglich dargethan zu haben, daß das ewige Klagen unleidlich ist. Es kommt aber hierbey noch etwas Wichtiges in Betrachtung. Die meisten Klagen sind ganz und gar ungegründet; das Elend, darüber so häufige und so bittere Beschwerden geführet werden,

ist

iſt wirklich nicht da. Mir fällt hierbey Horaz ein. Er ſagt:

Qui fit, Maecenas, vt nemo quam ſibi ſortem
Seu ratio dederit, ſeu fors obiecerit, illa
Contentus vivat? laudet diverſa ſequentes?
O fortunati mercatores! grauis annis
Miles ait, multo iam fractus membra labore.
Contra mercator, naulum iactantibus auſtris,
Militia eſt potior: quid enim, concurritur? horae
Momento aut cita mors venit, aut victoria laeta.

Woher iſt doch, Mäcen! kein Menſch mit dem zufrieden,
Was ihm bald das Geſchick, bald eigne Wahl beſchieden?
Er lobt allein nur das, was er an Andern ſieht.
Beglückter Kaufmann! ruft, mit mürriſchem Gemüth,
Der Kriegsmann aus, gedrückt und mürb von Jahren,
An Gliedern ſteif gemacht von Wunden und Gefahren.
Vom Kaufmann gegentheils wird dann der Krieg erhöht,
Wenn auf ſein ſchwaches Schiff der Weſtwind ſtürmiſch weht.
Dann ſpricht er: was iſts mehr, man kämpft, in wenig Stunden
Stirbt er ſchnell, oder hat des Sieges Luſt empfunden.

Dieſe Art von Mißvergnügen empfinden Maulwurf-Seelen, die keine Blicke auf das Ganze thun können; ſolche unſelige Gemüther, die, einem Verwundeten gleich, nur das ſchmerzhafte Glied, nicht aber die geſunden, fühlen. Sie ſehen nur ihr Wiedriges ein, und niemahls ihr Gutes; ſie ſehen an Andern nur das Gute, und nie das damit verbundene Ungemach. Sie ſind den Schmetterlingen gleich, die von einer Blume auf die andere fliegen, und nicht das Honig koſten wollen. Es iſt ihnen wehe, wenn ſie Andere vergnügt ſehen, die doch nur deswegen vergnügt ſind, weil ſie ein größeres Uebel mit mehrerer Stärke ertragen können. Ja, ſie empfinden eigentlich kein Ungemach, ſondern nur weniger Wohl, als ein Anderer.

End.

Endlich ist das unaufhörliche Klagen auch deswegen thöricht, weil es keinen Nutzen, sondern vielmehr Schaden für die klagende Person verursacht. Andere Leute merken gar zu bald, daß dergleichen Klagen nichts bedeuten; sie härten sich also nach und nach ab, und nehmen mit der Zeit gar kein Antheil an solchen Klagen. Wenn es hoch kommt, so bedienen sich andere Leute eines Complimentes, welches man eine Condolenz nennt; und das ist eine Rede, bey welcher das Herz nichts fühlt. Was hilft es also einem solchen Menschen, wenn er mit seinen Klagen anderer Leute Ohren füllt, die nicht bis zum Herzen dringen? Er macht sich dadurch lächerlich und verächtlich. Man flieht seinen Umgang, und man bemüht sich, so bald man gewahr wird, daß er seinen Mund zum Klagen öffnet, einen andern Discurs auf die Bahn zu bringen, und zu verhindern, daß er sich der Unterredung nicht bemeistere. Ja, was noch mehr ist! wenn ein solcher Mensch einmahl wirklich in große Noth kommt, so glaubt man seinen Klagen nicht, weil man schon weiß, daß er mehrentheils ohne Noth klagt. Und es geht ihm also, wie einem Flucher und Schwörer, dem man auch alsdann nicht glaubt, wenn er recht schwört, darum weil er so oft vergeblich schwört. Ich halte demnach dafür, daß alle diejenigen, welche die jetzt abgehandelte Schwachheit an sich haben, in das Lazareth des menschlichen Geschlechtes gehören.

Kläger, (der) Fämin. die **Klägerinn**, eine Person, welche klagt. Die Kläger gehen umher, Pred. 12, 5. Im Hochdeutschen braucht man es nur in der engern gerichtlichen Bedeutung des Zeit-Wortes, eine Person, welche bey dem Richter, oder vor Gerichte klaget, im Gegensatze des Beklagten. Kläger seyn. Als Kläger erscheinen.

Sprichw. Wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter. Dieses Sprichwort, welches aus dem sächsischen Land-

Rechte

Rechte (*) hergenommen iſt, iſt auch in dem römiſche Rechte gegründet; (**) und es ſoll ſo viel anzeigen, daß der Richter nicht ſchuldig ſey, jemand zum Klagen zu zwingen, oder ohne vorher angebrachte Klage, ſein richterliches Amt in einer Sache zu verwalten. Es ſind aber doch in dem römiſchen Rechte verſchiedene Fälle ausgenommen, in welchen ein Richter auch ohne vorher gegangene Klage, jemand auch in bürgerlichen Sachen vor ſein Gericht ziehen kann, wo von die Sachen der vater- und mutterloſen Waiſen, und der elenden Perſonen, zum Beweis dienen (***). Und wo ins beſondre die Verbrechen betrifft, ſo iſt es der Obrigkeit Pflicht, eine Unterſuchung anzuſtellen, wenn auch gleich kein Kläger ſich gemeldet hat. Ja ſelbſt das römiſche Recht hat bey gewiſſen Verbrechen den Obrigkeiten ſolches auferleget. (****)

Kläglich. 1. Einer Klage ähnlich, gemäß, und figürlich auch, in derſelben gegründet. **Ein kläglicher Ton.** **Eine klägliche Stimme.** **Ein klägliches Geſchrey.** **Sehr kläglich um etwas thun.** **Kläglich weinen.**

2. Werth beklaget zu werden, andere zum Klagen bewegend. **Ein kläglicher Zuſtand.** **Das iſt kläglich.** **Er ſieht ſehr kläglich aus.** **Klägliche Zeiten.**

Klaglos; dieſes Wort iſt nur in der gerichtlichen Bedeutung des Wortes Klage üblich. **Jemanden klaglos ſtellen oder machen,** ihn befriedigen, und ihm dadurch alle Urſache zur Klage benehmen.

Klamm, ein Wort, welches nur in den gemeinen Mundarten, beſonders Nieder-Sachſens, üblich iſt. Es bedeutet,

1. Enge

(*) Lib. I. Art. 62.

(**) L. 4. §. 8. D. de damno infecto. L. 6. §. 2. de munerib. & honorib.

(***) L. 3. §. 4. D. de ſuſpect. tutor. L. 9. §. 5. D. de offic. proconſ.

(****) L. 3. D. de offic. præſid.

1. Enge; im g. L. der Hochdeutſchen auch knapp. Die Schuhe ſind mir zu klamm. Klamme Schuhe. Noch mehr

2. Figürlich. (1) Beängſtigt, enge um die Bruſt und um das Herz. **Klammherzig** iſt eben daſelbſt enge um das Herz, beängſtigt. (2) Nahe an einander gedrängt, den innern Theilen nach. Der Schnee iſt klamm, wenn er ſich ballet; Schwed. kram, Isländ. krom. Imgleichen für kleberig, einen gewiſſen Mittelſtand zwiſchen trocken und feucht zu bezeichnen. Klamme Hände haben, welche von Schweiß kleberig ſind; Engl. clammy. (3) Derb, feſt, gediegen. Klammes Gold, gediegenes Gold. S. auch **Klammgällig**. Im Niederſ. auch **klammer**. (4) Schwer zu haben und zu bekommen, knapp. Das Geld iſt hier ſehr klamm. Es ſind klamme Zeiten, wo die Bedürfniſſe ſchwer zu erwerben ſind. Das Waſſer wird klamm, fängt an zu fehlen. Im Berg-Baue iſt klamm, genau gewogen. **Klammlöthig**, das kaum 1 Loth hält.

Im g. L. der Hochdeutſchen iſt dafür auch klemm üblich; ſ. dieſes Wort, ſo wie klemmen, welches gleichfalls zu deſſen Geſchlechte gehört. Es gehört zu Leim, weil der Begriff des Bindens der herrſchende in dieſem Worte und deſſen ſämmtlichen Verwandten iſt. Die Hauch- und Gaumen-Laute ch, g, h und k, vor den flüſſigen Buchſtaben l, m, n, r, gehören ſelten zum Stamme, ſondern ſind zuweilen Präfixa, oft aber auch nur müßige Vorſchläge hauchender Mund-Arten. Im Angelſ. iſt Clam, ein Band. S. die folgenden. Zur Familie dieſes Wortes gehören noch das Niederſ. der Klamm, ein Klumpen, welches hochdeutſche Wort ſelbſt daraus entſtanden iſt, die Niederſ. verklamen, vor Kälte erſtarren, klamerig, vor Kälte erſtarret, **Klämke**, eine träge, unentſchloſſene, gleichſam erſtarrete Weibsperſon, die hochdeutſchen beklommen, klimmen, und wenn man das oben gedachte Schwed. kram und Isländ. krom mit in Betrachtung

zieht, auch zum Theil unſer krumm, verkrummen, Krampf, krimmen, und andere mehr.

Klamm, (der) auch nur im g. L., eine Art des Krampfes in der Luftröhre zu bezeichnen, Angina. Den Klamm haben.

Der im XXXVIII Th. S. 14, fgg. angeführte Kinnbacken-Krampf, Triſmus, wird von Einigen der Klamm-Fluß genannt. Siehe das vorige, und Klemme.

Klammer, L. Retinaculum, Fr. Crampon, heißt, bey den Zimmerleuten, Mäurern, Schlöſſern ꝛc. ein Stück Eiſen, welches an beyden Enden gebogen iſt, und entweder Spitzen daran hat, um in das Holz eingeſchlagen zu werden; oder Haken an beyden Schenkeln, um in eine dicke Mauer feſt gemacht oder auch mit Bley vergoſſen zu werden, und große Steine mit einander zu verbinden.

Bey den Huf- und Waffen-Schmieden, iſt die Klammer ein eiſernes Werkzeug, wodurch ſowohl zwey Balken, oder andere Stücke Holz, als auch zwey große Marmor- oder andere Stein-Blöcke, mit einander verbunden werden. Es iſt ein längeres oder kürzeres Stück Eiſen, oder eine Eiſen-Stange, die, nach der Abſicht ihrer Anwendung, bald ſtärker, bald ſchwächer iſt. Beyde Enden haben eine ſenkrechte umgebogene Spitze; dieſe beyde Spitzen werden jede in eins der zu verbindenden Stücke geſchlagen; und da von Weite zu Weite deren mehrere angebracht werden, ſo werden dadurch zwey Balken oder Steine zuſammen verbunden. Wenn aber zwey Steine damit verbunden werden, ſo werden zu den Spitzen die Löcher vorgehauen, die Klammern eingeſteckt, und die Spitzen und Löcher mit Bley vergoſſen.

Der Schmid hauet zu einer Klammer, mit dem Schrot-Meißel, ein Stück in erforderlicher Länge von einer Stange Eiſen ab, macht beyde Enden glü-

hend, spitzt sie zu, schlägt diese Spitzen an der Ecke des Amboſſes um, und schmiedet den Kopf über der Spitze etwas breiter, damit die Klammer sich gut einschlagen lasse.

Bey den **Buchdruckern**, sind die **Klammern** am Preßkarren, Fr. Corniètes, (so genannte **Bänder**) vier platte Eisen, welche an den vier Ecken des Karrens anliegen, und vermittelst welcher man eine Form auf die Presse befestigt, indem man zwischen das Ende einer jeden solchen Eck-Klammer und den Form-Rahmen einen Keil steckt.

Bey den **Zimmerleuten**, ist die **Klammer**, oder der **Klammer-Haken**, **Holz-Haken**, das **Balken-Band**, Niederſ. **Klamm-Haken**, Fr. Bride, Harpe, Harpon, Fig. 2091, ein 1 Fuß langer Haken, dessen beyde Schenkel 4 Zoll lang sind. Der eine Schenkel, oder eigentlich Haken, a, läuft nach der Länge der Klammer, der andere b aber nach der Quere oder Breite. Der Zimmermann befestigt hiermit das der Länge nach liegende Bauholz bey dem Behauen (Beschlagen) auf einer der Quere nach hohl untergelegten Unterlage. Den nach der Länge der Klammer laufenden Schenkel a schlägt er in die Unterlage ein, den Quer-Schenkel b aber in das Bau-Holz, wodurch er also eines mit dem andern verbindet, daß beyde in der Arbeit nicht aus ihrer Lage verrücket werden mögen.

Bisweilen werden auch wohl eben solche Klammern an baufälligen oder sonst beschädigten Gebäuden eingeschlagen, um sie vermittelst derselben noch eine Zeitlang im Stande zu erhalten, und ihren völligen Einsturz zu verhüten.

Im **Bergbaue** hat man **Fahrt-Klammern**, welche in das Gevierte über einen Schacht geschlagen werden, damit sich die Bergleute bey dem Ein- und Ausfahren daran halten können.

Von den Klammern der Schiff-Zimmerleute, s. im Art. Kluppe.

In weiterer Bedeutung, wird in einigen oberdeutschen Gegenden, das bewegliche Eisen an einer Thür, welches auf den Kloben passet, und vor welches das Vorlege-Schloß geleget wird, eine **Klammer** genannt. In Ober- und Nieder-Sachsen heißt es mit einem nahe verwandten Worte eine **Krampe**, im Oestreich. die **Narb**, in Regensburg die **Anlege**.

Um die Wäsche auf der Wäsch-Leine wieder den Wind zu befestigen, bedient man sich **hölzerner Klammern**, welche die Wäsche auf der Leine fest halten. Sie werden nur von leichtem Holze, dergleichen Ellern oder Weiden sind, geschnitten. Ihre Gestalt ist bekannt genug.

Man nennt auch, im Schreiben und bey den Buchdruckern, **Klammern** (Haken), Fr. Crochets, die Zeichen, womit eine Parenthesis eingeschlossen wird. Imgl. Linien, die unten und oben einen Haken haben, oder andere Figuren, womit etliche Zeilen, oder etliche Artikel, in Eins gezogen werden, wie z. B. in den Tabellen.

Im Dän. Klammer, im Schwed. Klaemmel, Kraemmel, im Poln. Klamra. Die End-Sylbe – er bedeutet ein Werkzeug. Die erste Hälfte ist das veraltete Klammen, fest halten, verbinden. Siehe Klamm, Klimmen, Klampe, Klaue, Krampe, u. s. f. Große mit starken Klauen versehene Raub-Vögel werden von eben diesem Zeit-Worte im Nieders. Klamvögel genannt; im Sachsenspiegel klemmende und krimmende Vögel. Im Holländ. ist Klamme, Klampe, ein Haken.

Klammer-Eisen, eine Art Huf-Eisen; s. im XXV Th. S. 477.

Klammer-Haken, s. auf der vorhergeh. Seite.

Klammer-Sparren, s. unter Sparren.

Klammer-Strauch, nennen die Deutschen eine Pflanzen-Gattung, welche Browne und nachher Jacquin

unter

unter dem Nahmen Echites bestimmt haben. Linné hat dieselbe, in der XI. Auflage des Natur-Systemes, mit der Tabernaemontana vereinigt, nachher aber wieder davon getrennt, und unter obigem Nahmen besonders angenommen. Der kleine, fünffach getheilte Kelch trägt ein trichterförmiges Blumenblatt, dessen Rand in fünf ausgebreitete Einschnitte abgetheilt ist. Die fünf kurzen Staubfäden tragen spitzige, gegen einander gerichtete Staubbeutel. Am Boden sieht man zwey Fruchtkeime, um welche fünf Drüsen stehen, und aus welchem nur ein Griffel treibt, dessen Staubweg aber in zwey Lappen getheilt ist, welche gleichsam durch ein besonderes leimiges Wesen mit den Staubbeuteln vereinigt sind. Es folgen zwey lange, einfächerige, einklappige Schoten, worin viele mit einer Haarkrone besetzte Samen liegen. Es zeigt diese Gattung viel ähnliches mit dem Oleander; durch den offenen Schlund des Blumenblattes, und die fünf Drüsen, wird man solche leicht davon unterscheiden können. Linné hat in der Murrayischen Ausgabe 11 Arten angeführt, davon die meisten Jacquin in Amerika gefunden und beschrieben hat, von welchen allen aber man bis jetzt in den hiesigen Gärten keine antrifft.

Klammern. 1. Mit den Händen oder Klauen fest halten, als das Intensivum oder Frequentativum des veralteten klammen, oder auch von dem vorigen **Klammer**; am häufigsten in den Zusammensetzungen: **anklammern**, mit Klammern an etwas befestigen; sich an die feindlichen Schiffe anklammern, d. i. anhaken, entern; imgl. in weiterer Bedeutung, sich an etwas anklammern, im g. L. sich mit Händen und Füßen daran fest halten, um nicht fortgerissen zu werden, Fr. se cramponner; **beklammern**, figürlich für umfassen, begreifen; **umklammern**, mit fest eingeschlagenen Klauen oder fest angeschlagenen Händen umfassen.

Von den Klammern d
ſ. im Art. Kluppe.

In weiterer Bedeutung,
ſchen Gegenden, das bewe
welches auf den Kloben p
Vorlege-Schloß geleget w
nannt. In Ober- und N
einem nahe verwandten Wo
reich. die Narb, in Regen

Um die Wäſche auf d
Wind zu befeſtigen, be
Klammern, welche die A
ten. Sie werden nur von
Ellern oder Weiden ſind,
iſt bekannt genug.

Man nennt auch, in
Buchdruckern, Klamm
die Zeichen, womit ein

enſtumm von
dieſes Wortes
oden zuſam-
ens.
feſt und hart.
gällige Felſen.
Gällig (im XV
doch ſo, daß die
chuen ſcheinen.

ädliches Wort, ein
halteus, der Ver-

ſt, ſind die Klam-
zum Grunde eines
ple mit einander ver-

Sonitus, Sonus, Fr. Son, ein klingender, mer und hell lautender Schall oder Laut Dauer; eine Onomatopoiesis dieses Schal- welche sich, so wie alle Wörter dieser Art, inden als beschreiben lässet. Einen Schall geben gewisse Dinge, insonderheit aber Glas alle, wie auch alle daraus verfertigte Sachen, , wenn daran geschlagen oder gestoßen wird, man sodann klingen, oder erklingen, und er- , nennt. Dieser Klang oder Schall pflegt alle- ärker und heller, oder schwächer und düsterer zu , nach dem die Materie, welche solchen von sich t, feiner oder gröber, oder nach dem sie mit andern ingen, die solchen Klang oder Schall zu hindern oder u unterbrechen vermögend sind, mehr oder weniger be- schwert ist. Keinen Klang haben. Der Klang der Harfen, Es. 14, 11. Wo es zuletzt für Töne steht. Aus der Vergleichung mehrerer Klänge ent- steht der Begriff eines Tones.

In engerer Bedeutung bezeichnet es zuweilen den Klang der Glocken. Ohne Klang und Gesang be- graben werden, ohne Läutung der Glocken und ohne Gesang.

Bey dem Notker Chlanch, bey dem Hornegk Chlunckh, im Niederf. und Dän. gleichfalls Klang. Klink klank ist ein im g. L. üblicher unabänderlicher Rede- Theil, einen Schall dieser Art durch Nachahmung auszu- drücken, wo denn das erstere Wort wegen des feinern und ründern i einen kleinern feinern, das letztere aber wegen des breitern a einen gröbern oder stärkern Klang ausdruckt. Hierin liegt zugleich der Grund von Hrn. Stosch ganz richtigen Bemerkung, daß klingen und einen Klang ha- ben nicht allemahl völlig gleichbedeutend sind, obgleich Klang das Abstractum des Zeit-Wortes ist. Von großen Glocken wird man lieber sagen, sie haben einen guten Klang, als sie klingen gut.

Ehedem wurde dieses Wort zuweilen in weiterer Be- deutung für Schall, Knall, u. s. f. gebraucht, wovon

2. Als das Frequentativum oder Intenſivum von Klemmen, wo es im g. L. zuweilen ſtatt dieſes Wortes gebraucht wird. Einem Pferde die Hoden zuſammen klammern, eine Art des Wallachens.

Klammgällig, im Bergbaue, ſehr feſt und hart. Klammgälliges Geſtein. Klammgällige Felſen. Siehe **Klamm**, **Klemmig**, und **Gällig** (im XV Th. S. 625), welche hart bedeuten, doch ſo, daß die erſtern mehr eine zähe Härte zu bezeichnen ſcheinen.

Klammherzig, } ſ. oben, S. 337.
Klammkörhig, }

Klampe, ein nur in einigen Fällen übliches Wort, ein Werkzeug oder Hülfsmittel des Feſthaltens, der Verbindung, zu bezeichnen.

In der Zimmermanns-Kunſt, ſind die **Klampen** Quer-Balken in dem Roſte zum Grunde eines Gebäudes, welche die Roſt-Pfähle mit einander verbinden.

Im Schiffbaue, ſind **Klampen**, Engl. Clamps, große Stücke Holz, wodurch die Balken im Schiffe an einander befeſtiget werden. Hals-Klampen, mit Haken verſehene Löcher an den Borden des Schiffes, die Halſen (ſ. Th. XXI, S. 307.) daran zu befeſtigen, wo **Klampe** eigentlich den Haken bedeutet. Siehe **Krampe** und **Klammer**.

Der Böttcher, nennt **Klampe**, Fig. 2092, ein einer Gabel oder Klammer ähnliches Holz, worin der erſte Stab eines zu verfertigenden Gefäßes an dem Setzbande zuſammen gehalten wird, damit ſich der folgende Stab daran lehne, und ſo die übrigen Stäbe nach der Ordnung hierauf folgen können, wo man nähmlich die Stäbe des Faſſes zu einem Ganzen aufſetzt.

Klämpener, **Klämpern**; ſ. **Klempener** u. ſ. f.

Klander, ſ. **Galander**, im XV Th. S. 651.

1. **Klang** L. Sonitus, Sonus, Fr. Son, ein klingender, d. i. angenehmer und hell lautender Schall oder Laut von einiger Dauer; eine Onomatopoiesis dieses Schalles selbst, welche sich, so wie alle Wörter dieser Art, besser empfinden als beschreiben lässet. Einen Schall oder Laut geben gewisse Dinge, insonderheit aber Glas und Metalle, wie auch alle daraus verfertigte Sachen, von sich, wenn daran geschlagen oder gestoßen wird, welches man sodann klingen, oder erklingen, und ertönen, nennt. Dieser Klang oder Schall pflegt allezeit stärker und heller, oder schwächer und düsterer zu seyn, nach dem die Materie, welche solchen von sich gibt, feiner oder gröber, oder nach dem sie mit andern Dingen, die solchen Klang oder Schall zu hindern oder zu unterbrechen vermögend sind, mehr oder weniger beschwert ist. **Keinen Klang haben.** **Der Klang der Harfen,** Es. 14, 11. Wo es zuletzt für Töne steht. Aus der Vergleichung mehrerer Klänge entsteht der Begriff eines Tones.

In engerer Bedeutung bezeichnet es zuweilen den Klang der Glocken. **Ohne Klang und Gesang begraben werden,** ohne Läutung der Glocken und ohne Gesang.

Bey dem Notker Chlanch, bey dem Hornegk Chlunckh, im Niederf. und Dän. gleichfalls Klang. Klink klank ist ein im g. L. üblicher unabänderlicher Rede-Theil, einen Schall dieser Art durch Nachahmung auszudrücken, wo denn das erstere Wort wegen des feinern und ründern i einen kleinern feinern, das letztere aber wegen des breitern a einen gröbern oder stärkern Klang ausdruckt. Hierin liegt zugleich der Grund von Hrn. Stosch ganz richtigen Bemerkung, daß klingen und einen Klang haben nicht allemahl völlig gleichbedeutend sind, obgleich Klang das Abstractum des Zeit-Wortes ist. Von großen Glocken wird man lieber sagen, sie haben einen guten Klang, als sie klingen gut.

Ehedem wurde dieses Wort zuweilen in weiterer Bedeutung für Schall, Knall, u. s. f. gebraucht, wovon

Frisch einige Beyspiele anführt, und wovon auch die Zusammensetzungen Wohlklang, Mißklang, Uebelklang, Nachklang, u. s. f. zeugen. In ältern oberdeutschen Schriften kommt Clang mehrmahls für Lärmen, Getöse, vor. Da es uns aber an Wörtern nicht fehlt, alle Arten von Lauten, Schallen und Tönen nach allen ihren Abänderungen und Schattierungen auszudrucken, so sollte man sie nicht ohne Noth mit einander verwechseln. Der Nase-Laut ng druckt das tönende eines Klanges zu bestimmt aus, als daß dieses Wort sich ohne eine harte Figur auf andere Arten anwenden liesse. Das Lat. clangor und clangere sind genau damit verwandt. Siehe Klingen.

2. **Klang**, in einigen Gegenden, derjenige Flachs, dessen Knoten in der Sonne von selbst aufspringen, daß der Lein-Same heraus fällt, wenn er gesiebet wird. Man nennt ihn auch **Klänge-** oder **Klängel-Lein**, zum Unterschiede des **Drosch-** oder **Schieß-Leines**, dessen Same ausgedroschen wird. Er giebt mehr Samen, als derjenige, den man ausdreschen muß, soll auch länger wachsen, und eine zärtere Härle (ein feineres Härchen), wie auch dünneres Holz am Halme, haben. Ein Mehreres davon wird im Art. **Lein** vorkommen.

Klang-Messer, Sonometer; s. **Ton-Messer**.

Klapf, ein nur im Oberdeutschen übliches Wort, eine Art eines Schalles auszudrücken, welcher in der Stärke eigentlich das Mittel zwischen dem schwächern Klaff und stärkern Klapp ist. Es sprang ein Stein, welcher einen Klapf gleich einem Donner gab, Bluntschli, ein schweitzer. Schriftsteller. Ein Donner-Klapf, ein Donner-Schlag. Daher das oberdeutsche klapfen, einen solchen Schall verursachen. Siehe **Klaff**, **Klappen**, **Klapps**, **Klopfen**, und **Klapp**.

Klapitt, **Klepitt**, eine Benennung des helmstädter Bieres; s. Th. V, S. 25.

Klapp,

Klapp, ein unabänderliches und nur im g. L. der Hoch- und Nieder-Deutschen übliches Wort, denjenigen Schall nachzuahmen, welcher durch das Zusammenschlagen zweyer breiter harter, oder eines harten und eines weichen Körpers verursacht wird. Engl. Clap. Er bekam eins hinter die Ohren, das sagte klapp. Daher das im Niederſ. übliche Haupt-Wort **der Klapp**, sowohl dieſer Schall, als auch deſſen wirkende Urſache, ein Schlag, wofür im Oberdeutſchen das vorige Klapf und im Hochdeutſchen Klapps üblich iſt. Siehe das letztere. Im Niederſ. iſt **Achterklapp**, der Nachklang. Ein feinerer, kleinerer Schall dieſer Art wird durch Klipp ausgedruckt, ſo wie in Klopfen ein gröberer zum Grunde liegt.

Klapp-Baum, Juſticia hyſſopifolia *Linn.*; ſ. **Juſticie**, No. 2. im XXXI Th. S. 858.

Klapp-Handſchuh, ſ. im XXI Th. S. 462.

Klapp-Heu, ſ. im XIII Th. S. 335.

Klapp-Holz, im Forſtweſen und Holzhandel, kleine Stücke geſpaltenen Eichen-Holzes, ſo wie es zu den **Faß-Dauben** gebraucht wird; zum Unterſchiede von den größern **Pipen-Stäben**. S. Th. XXIV, S. 728.

Niederſ. und Dän. gleichfalls Klappholt. Vermuthlich nicht ſo wohl von klappen, als vielmehr von klieben, ſpalten, Niederſ. Klöben, geſpaltenes Holz, wovon im Niederſ. Klave, ein Nahme verſchiedener geſpaltenen Dinge iſt. Im Schwed. iſt klapa, hauen, abhauen.

1 Ring Klapp-Holz hat 12 Schock und 48 St. à 2 bis 8 F. lang, 5 — 6 Z. breit, und gilt 27 bis 28 Rthlr. preuß. Cour.

Klapp-Mann, ſ. **Klapper-Mann**.

Klapp-Mütze, ſ. **Mütze**.

Eben dieſe Benennung führt auch eine Art **Meer-Kälber** oder **See-Hunde**, Phoca criſtata; ſ. **See-Hund**.

Klapp-Netz, zum Insecten-Fange; ſ. im XXX Th. S. 269.

Klapp-Siehl, ſ. Siehl.

Klapp-Stecken, ſ. Klapper-Stecken.

Klapp-Tiſch, ſ. Tiſch.

Klappe, im g. L. ein jeder, hinten mit einem Gewinde befeſtigter Deckel, welcher mit einem Schalle, welchen das Wort Klapp ausdrückt, zufällt; imgleichen eine kleine horizontale oder ſenkrechte Thür dieſer Art, welche auf ähnliche Art, durch ihr eigenes Gewicht von oben niederfällt, eine Fall-Thür. Die Klappe auf oder an einer Kanne, der Deckel; auch die Kanne ſelbſt; oder dasjenige, was als ein Zeichen des Wirthes aushängt. Die Klappe an einem Tauben-Schlage, die kleine Fall-Thür, der Schlag, L. Oſtiolum tractile. Die Klappe an einem Blaſe-Balge, Fr. Soupape.

In Pumpen und Druckwerken, eine Art kleiner Ventile, die in einem runden ledernen Deckelchen beſteht, welches vermittelſt eines Gewindes dergeſtalt über einer Oeffnung beweglich iſt, daß es, wenn durch dieſe Oeffnung Waſſer oder Luft gepreſſet wird, ſich in die Höhe hebt, um dieſe Flüſſigkeiten durchzulaſſen, hingegen, wenn die Preſſung aufgehört hat, von ſelbſt wieder zufällt, und hierdurch die Oeffnung auf das genaueſte verſchließt; Fr. Clapet. Es gibt auch dergleichen hölzerne und meſſingene Klappen, die ſich um Zapfen bewegen, und nur mit Leder unterlegt ſind. Iſt ein Ventil mit einer Klappe verſehen, ſo nennt man es ein Klappen Ventil; wie z. B. das Ventil an einer Feuer-Sprütze, welches vor der Röhre liegt, und an dieſe mit einem Gewinde vereinigt iſt, welches in den Keſſel einer Sprütze und ſeinem Geſchlinge ſteckt. Dieſe Klappe ruhet auf der Oeffnung der Röhre, und dieſe wird an der gedachten Oeffnung tief abgeſchnitten, damit die Klappe ſicher darauf ruhe. Durch dieſe

Röhre

Röhre kommt das Waſſer aus dem Stiefel in den Keſſel.

Die Orgel-Bauer nennen diejenigen Thürlein, womit die Kanzellen verſchloſſen werden, und welche von Holz und mit Leder belegt ſind, **Klappen**; ſ. **Orgel**.

Bey den **Borten-Wirkern**, heißt **Klappe** ein Bret, welches auf einem Bolzen beweglich hängt, und ſo lang, als die ganze Reihe von Wellen an einem Bortenwirker-Stuhle iſt.

Auch ähnliche Theile an gewiſſen Kleidungs-Stücken. Die Klappe an der ehemahligen Art von Bein-Kleidern, im g. L. die **Hoſen-Klappe**; ſ. im XXV Th. S. 305, f. Die Klappe an gewiſſen Handſchuhen der Frauenzimmer, **Klapp-Handſchuh**, ſ. im XXI Th. S. 462. In andern Fällen heißt ein ſolcher Theil an Kleidungsſtücken, der **Aufſchlag**, die **Krämpe**, u. ſ. f.

Die Schuſter pflegen den obern Theil des hölzernen Abſatzes an gemeinen Pantoffeln, welcher mit einem Stücke Kalb-Leder bedeckt wird, gemeiniglich **Klappe** zu nennen.

Im Niederſ. wird auch eine **Zug-Brücke** eine **Klappe** genannt.

Klappe, (Fall-) ſ. Th. XII, S. 155.

-- — (Fliegen) ſ. Th. XIV, S. 238.

— — (Hoſen-) ſ. oben, auf dieſer Seite.

Klappen-Kraut, **Sumpf-Drachenwurz**, **Schlangenwurz**, **Waſſer-Aron**, **Waſſer-Schlangenkraut**, **Waſſer-Dragun**, Dracunculus aquatilis *Dod.* Dracunculus paluſtris, ſ. radice arundinacea *C. B.* Provenzalia paluſtris *Petit.* wächſt an feuchten, ſumpfigen und moraſtigen Orten, in vielen Gegenden des nördlichen Europa, wo, auſſer Ellern-Holze und ſchlechtem ſauern Graſe, beynahe nichts heilſames zu wachſen ſcheint, und wohin, wegen des tiefen Moders, weder

weder Menſchen noch Vieh kommen, wenn es nicht die Nothwendigkeit erfordert. Dieſe Sumpf-Pflanze hat eine kriechende, faſerige Wurzel, welche ſich ungemein weit ausbreitet, häufig vermehrt, und einen überaus ſcharfen Geſchmack hat. Dieſe treibt 5 bis 6, oder auch wohl mehrere, aus einander gewachſene Stängel, deren jeder ſeitwärts ein Finger-langes und halb ſo breites, herzförmiges, fettes Blatt hat. Zwiſchen den ſtärkſten Stängeln formirt ſich, an einem niedrigen Stängel, im Jul., eine Art von Kappe, die die eigentliche Kolbe (den obern Theil des Stängels, Spadix) enthält, an welcher viele dem Leine gleichende Knötchen feſt aufſitzen; dadurch ſtellt die Kolbe faſt eine cylinderförmige Traube vor. Die beyden Blätter, welche die Traube formirten, breiten ſich alsdann nach Art der übrigen aus, und haben eine weiße Ober-Fläche, ſo wie die Kolbe ſelbſt endlich bey ihrer Reife weiß wird, bis die Knötchen daran endlich aufplatzen, und den Samen ausfallen laſſen. Die Beeren ſind roth.

Man findet dieſe Pflanze in Ledermüller's mikroſkop. Ergötz. Tab. 18, 19, S. 37, fgg. unter dem Tournefortiſchen Nahmen Arum aegyptiacum, beſchrieben und mit lebendigen Farben abgezeichnet. Ob ſie nun gleich billig für eine ausländiſche Pflanze angegeben wird, ſo kommt doch das Klappen-Kraut, welches vormahls ebenfalls unter das Arum gezählet, und erſt von Linné und Andern zu einer beſondern Art Calla gemacht worden iſt, (wie ſie denn von Linné, Calla paluſtris, foliis cordatis, ſpatha plana, ſpadice vndique hermaphrodito genannt wird,) in den geringſten Umſtänden mit derjenigen Pflanze überein, welche Ledermüller a. ang. O. beſchreibt. Die Kolbe an der ſeinigen könnte da, wo bloß die Staubgefäße über den Eyerſtöcken oder über den Knötchen ſitzen, etwas länger ſeyn. Der Samenſtaub ſieht auch in der unſrigen, wie in der Ledermülleriſchen Zeichnung, rund aus, und ſtellt gleichſam Körnchen vor.

In einigen Gegenden, wie z. B. im Chur-Kreise, füttert, nach dem Berichte des Wittenb. Wochenbl. v. J. 1768, S. 249, fgg. der Landmann, mit Beyhülfe dieser Pflanze, seine Aernde- und andere Schweine mit äusserster Sparsamkeit so brauchbar auf, daß sie manchmahl aus der Eichel-Mast nicht besser nach Hause kommen. Die rohrartige Wurzel, welche aus verschiedenen an einander gesetzten Stücken, wie Knien, besteht, und öfters 1 Elle lang ist, scheint beynahe gar keinen festen Grund zu brauchen, besonders wenn viele sehr dicht beysammen stehen, welches sehr gewöhnlich ist. Denn, wenn eine sich durch den Morast durchgearbeitet hat, hängt sich die nächst dabey stehende an jene, daß man öfters, bey Ausziehung einer einzelnen, einen ganzen Klumpen bekommt. Ausser dieser Haupt-Wurzel aber hängt noch unten an dem Anfange der Pflanze, eine Menge zarter, und einem Barte gleichender Fasern, wodurch sie die nöthige Nahrung vorzüglich einsauget. Der Vermehrungs-Trieb dieser Pflanze ist ausserordentlich stark. Denn, da im Belzigschen, in der Zeit von Pfingsten bis zur Aernde, täglich viele tausend derselben sammt der Wurzel ausgerissen werden, und ihre Ausrottung unvermeidlich scheint, so weiß sich doch kein Mensch auf ein Mißwachs-Jahr, in Ansehung derselben, zu erinnern. Die Ursache besteht darin, weil die Pflanze nicht nur eine gewaltige Menge Samen trägt, sondern auch das geringste Stückchen der zurück gebliebenen Wurzel in kurzer Zeit an allen Orten von frischem treibt, so, daß, wenn heute ein Platz leer gemacht worden ist, er in 12 bis 14 Tagen ganz wieder bewachsen ist. Uebrigens ist es sehr haushälterisch von der Vorsehung eingerichtet, daß diesem Gewächse in unwegsamen Gegenden sein Stand-Ort angewiesen worden ist. Da es mühsam zu hohlen ist, und das Gesinde bey dessen Einsammeln oft bis an den halben Leib im Sumpf: wadet, so muß

der

ihn mit den Händen klappen, Hiob 27, 23; wofür man im Hochdeutſchen klatſchen braucht, obgleich klappen in eben dieſer Verbindung auch Eſ. 55, 12. Klagel. 2, 15. Nahum 3, 19. und Zeph. 2, 15. vorkommt. Da wird man hören die Geißeln klappen, Nahum 3, 2. wofür man im Hochdeutſchen gleichfalls klatſchen, imgl. knallen, im Oberd. aber ſchnalzen, ſagt. Klingt es nicht, ſo klappt es doch, Sprichw. Fr. cela eſt paſſablement bien dit. Wenn es zum Klappen kommt, figürlich, im g. L., wenn es zur Sache ſelbſt kommt, wenn es Ernſt wird, wenn es zum Treffen kommt. Imgl. figürlich, für klingen, im g. L. Die Verſe klappen nicht, haben keinen Wohlklang. Das klappt nicht, ſchickt ſich nicht zur Sache. Siehe **Klappſen.**

2. Als ein Activum, dieſen Schall hervor bringen, oder vielmehr mit Hervorbringung dieſes Schalles niederlaſſen, aufmachen, u. ſ. f. beſonders in den Zuſammenſetzungen **aufklappen**, in die Höhe klappen, den Tiſch aufklappen; **niederklappen**, die Klappe niederlaſſen, einen Tiſch niederklappen, u. ſ. f. wo es von jedem Dinge gebraucht wird, welches unter dem Nahmen der Klappe bekannt iſt, oder ihr doch gleicht, auch wenn mit dieſer Handlung gleich kein merklicher Schall verbunden iſt. Die Handſchuhe aufklappen. Den Hut niederklappen, die Krämpe an dem Hute. In weiterer Bedeutung auch im g. L. für ſchlagen, doch nur von derjenigen Art des Schlagens, welche dieſen Schall hervor bringt. Mit dem Lineale auf den Tiſch klappen.

1. **Klapper**, Rhinanthus Criſta Galli; ſ. 1. Klafter, oben, S. 305.

2. **Klapper**, ein Werkzeug zum Klappern, oder damit zu klappern. Dergleichen ſind:

Die Klapper aus zwey Knochen oder Hölzern, die man zwiſchen die Finger nimmt, und gegen einander

der ſchlägt; L. Crepitaculum. Crotalum. Fr. Cliquette, Sonnette. Ehemahls mußten in Frankreich die Ausſätzigen wenn ſie auf der Straße gingen, dergleichen Klappern tragen, und damit klappern, um dadurch ein Zeichen zu geben, daß man ihnen aus dem Wege gehen konne; **Klapper-Holz**, L. Crepitaculum leprosorum.

Die **Klapper** kleiner Kinder, **Kinder-Klapper**, Fr. Hochet, ein von Elfenbein, von Silber-Blech oder andern Blech, oder von Holz verfertigtes, oder von Draht mit bunten Korallen zuſammen geflochtenes Inſtrument, welches einen hohl getriebenen Knopf mit einem Stiele, an deſſen Ende ſich gemeiniglich ein ſo genannter Wolfs-Zahn, Achat ꝛc. befindet, vorſtellt, und woran entweder kleine Schellen hängen, oder wo inwendig kleine Schellen hinein gethan werden, um nicht nur mit dem Klange, wenn man daſſelbe bewegt, die kleinen ſchreyenden Kinder zu beſänftigen, oder ſonſt zu amüſiren, ſondern auch die zahnenden Kinder das Zahn-Fleiſch daran reiben zu laſſen. Dergleichen Klapper hängt insgemein an einem Bande. Dieſes Inſtrument ſoll vom Archytas, einem pythagoriſchen Philoſophen zu Tarent, zum Zeitvertreib für ſeine Kinder erfunden worden ſeyn. Nach Anderer Erzählung, ſoll Archimedes, da ihm ſeine junge Familie immer über ſeine mathematiſche Werkzeuge kam, und dieſelben zerbrach, für ſeine Kinder die Klappern, wo nicht zuerſt erdacht, doch aber in die heutige Form gebracht haben.

Bey Erb-Theilungen, gehören die Kinder-Klappern zur Gerade. *Carpzov* P. 2, Conſt. 14, Def. 44, n. 6.

Die **Klapper**, ein hölzernes Inſtrument, dergleichen man ſich an einigen Orten am grünen Donners-Tage und Char-Freytage ſtatt der Glocken bedient; Fr. Crecelle, Crellelle.

Die **Klapper**, ein ſchnarrendes Inſtrument, welches an einigen Orten die Nacht-Wächter tragen; in einigen Gegenden Schnarre, Ratſche, im Niederſ. Ratel, Fr. Crecelle, Creſſelle, Creſſerelle.

Die **Klapper in der Mühle**, die ſtets an den Rumpf anſchlägt, **Mühlen-Klapper**, Fr. Claquet, Cliquet, Cliquette.

Auch bey den **Jägern** braucht man **Klappern**, das Wild, inſonderheit Schnepfen und Haſen in das Garn zu treiben, welche aus dünnen Bretchen mit einem hölzernen Hammer, oder mit Riemen angemachten hölzernen Kugeln beſtehen; **Klapper-Jagd**, ſ. im XXVIII Th. S. 60, f. und 180. Von dieſem iſt das **Klappen-Jagen**, eine Art des Fanges der Inſecten, inſonderheit der Nachtvögel (ſ. Th. XXX, S. 277, f.) zu unterſcheiden.

Eine **Klapper**, oder ein Klapperwerk, zum Verſcheuchen der Vögel von den Obſtbäumen, z. B. der Sperlinge von den Kirſch-Bäumen, ſ. oben, S. 98, f. und die dazu gehörige Fig. 2089.

Daher **klappern**, ein Neutrum, welches das Hülfs-Wort haben erfordert, und das Frequentativum und Intenſivum von klappen iſt, ein zitterndes und anhaltendes Klappen zu bezeichnen. Es bedeutet:

1. Einen ſolchen Schall von ſich geben, aus ſich ſelbſt hervor bringen, welches geſchieht, wenn harte Körper hurtig hinter einander auf einander ſtoßen, L. crepare, Fr. claquer, cliqueter. Die Zähne klappern mir vor Froſt; die Zähne klappern ihm, wenn er den Froſt hat, Fr. les dents lui claquent dans ſon frillon, wenn ſie vor Kälte hurtig auf einander ſchlagen; Niederſ. klappen und klätern, in der alten Sundarbiſchen Hiſt. bey dem Schilter chlofflehen, im Tatian tiriden. Ein Bäurel voll Steine klappert, wenn man ihn ſchüttelt. Im Niederſ. klätern, welches manche Arten des Klapperns beſtimmter ausdrücken

nauer ausdruckt, als das Hochdeutsche. Die Mühle klappert, u. s. f.

2. Ein Geklapper hervor bringen, machen. Mit den Zähnen, mit den Tellern klappern. Der Storch klappert; L. crepitare rostro, glocitorare; siehe Klapper-Storch.

Klapper, (Kinder-) s. oben, S. 353.

— — (Lein-) s. unter Lein.

— — (Mühlen-) } s. oben, S. 354.
— — (Nachtwächter-) }

Klapper-Baum, Cocos-Baum, s. Th. VIII, S. 208.

Klapper-Geschirr, bey den Seilern, ein zwischen zwey in die Erde gegrabenen starken Pfählen befestigtes Bret mit eisernen Haken, an welchem und dem Schlitten die einzelnen Fäden zu Litzen gedrehet werden, um hernach daraus die Taue zu drehen; wovon an seinem Orte ein Mehreres vorkommen wird.

Klapper-Heuschrecke, s. Th. XXIII, S. 383, f.

Klapper-Holz, Fr. Claquebois, ein hölzernes Geläut, welches aus 17 Stäbchen besteht, deren jedes, wenn es angeschlagen wird, einen mit seiner Dicke und Länge im Verhältniß stehenden Ton hervor bringt. Das letzte Stäbchen ist fünf Mahl kleiner als das erste, die mittlern aber sind nach Proportion eingerichtet. Zwischen jedem liegt auf beyden Seiten eine Kugel, durch welche sowohl, als durch die Stäbe, ein Faden geht, woran alles in freyer Luft gehalten, und mit einem Stecken geschlagen wird.

Klapper-Jagd, Klapper-Jagen; siehe oben, S. 354.

Klapper-Korn, Klapper-Kraut, Rhinanthus Crista galli *L.*; s. Th. XXI, S. 195, f.

Klapper-Mann. 1. Im g. L. ein Mann mit einer Klapper, dergleichen an manchen Orten die Nacht-Wächter, die Almosen-Sammler u. s. f. sind, wenn sie

ſich einer Klapper bedienen, Andern ihre Gegenwart hörbar zu machen. Zu Gardelegen in der Altmark, heißt derjenige Mann, der mit der Klapper für die Spital-Leute bettelt, **Klapp-Mann.**

2. In der komiſchen Schreib-Art wird zuweilen der Tod der **Klapper-Mann** genannt, weil man ihn gemeiniglich unter dem Bilde eines dürren klappernden Gerippes vorſtellt.

Klapper-Maul, im g. L. eine ſchwatzhafte Perſon, deren Mund in ſteter Bewegung wie eine Klapper iſt; das **Plapper-Maul.** Siehe auch das Folgende.

Klapper-Mühle, eine klappernde Mühle, ſo fern ſie ſich durch ihr klapperndes Geräuſch von andern Mühlen unterſcheidet; L. Mola crepax.

Imgl. figürlich und im g. L., wie **Klapper-Maul; Klapper-Taſche, Plauder-Maul, Plauder-Taſche,** L. Blatero, Garrulus, Nugator, Os concrepa-rium; Fr. Caqueteur, Caqueteuſe.

Klapper-Nuß, ſiehe **Pimper-Nuß.**

Klapper-Pfennig, eine braunſchweigiſche Scheide-Münze, deren 12 auf einen Marien-Groſchen gehen. Sie ſind in den Rechnungen bey dem Bergwerke noch gebräuchlich, gelten aber zum Ausgeben nirgends als in Goslar, wo ſie noch gepräget, und Struwe Pfennige genannt werden.

Klapper-Roſe, eine Art des wilden Mohnes; ſiehe unter **Mohn.**

Klapper-Schlange, Crotalus *L.*; ſ. **Schlange.**

Klapperſchlangen-Kraut, ſ. **Klapperſchlangen-Wurzel.**

Klapper-Schote, Crotalaria, von Κρόταλον, eine Klapper, weil der Same in den Schoten, wenn er reif geworden iſt, ein Geräuſch macht, wie eine Klapper, wenn man ſie ſchüttelt; oder, weil die Kinder der Indianer, die mit Schoten verſehenen Zweige dieſes Gewächſes ſtatt einer Klapper brauchen. Eine mit der

Hau-

Haubechel nahe verwandte Pflanzen-Gattung mit schmetterlingsförmigen Blumen. Der Kelch der Blume ist in 3 große Abschnitte getheilt; die beyden obern ruhen auf der Fahne; der untere ist concav, dreyspaltig, und steht unter dem Schiffchen. Die Fahne ist groß, herzförmig und spitzig; die Flügel sind eyrund, und halb so lang als die Fahne. Das Schiffchen ist spitzig, und so lang als die Flügel. Die Blume hat 10 Staubfäden, welche mit einander vereinigt sind, und sich mit einfachen Kölbchen, und einem länglichen rückwärts gebogenen Eyerstocke, welcher einen einzelnen, mit einer zugestumpften Narbe gekrönten Griffel unterstützt, endigen. Aus dem Eyerstocke wird nachgehends eine kurze, aber aufgeblasene Schote, mit einer Zelle, welche zwey Klappen hat, und wenige, nierenförmige Samen enthält. Linné hat diese Pflanzen-Gattung in die 3te Abtheil. seiner 17ten Classe gesetzt, die er Diadelphia Decandria nennt, weil die Blumen in dieser Abtheilung und Classe 10 Staubfäden, welche 2 Körper ausmachen, haben. Er bestimmt 17 Arten, deren die 11 ersten einfache, die übrigen aber zusammen gesetzte Blätter haben. Ihr Ansehen ist fein, und sie dienen zur Zierde in den Gärten.

1. Durchbohrte Klapper-Schote, mit durchstochenen, eyrunden, und am Rande rauhen Blättern; Crotalaria perforata, foliis perfoliatis, ovatis, margine scabris *Linn.* Sie kommt von dem Vorgebirge der guten Hoffnung.

2. Durchstochene Klapper-Schote, mit eyrunden, herzförmigen Blättern, durch welche die Stiele laufen; Crotalaria perfoliatae folio *Dillen.* Crotalaria perfoliata, foliis perfoliatis cordato-ovatis. Sie ist in Carolina zu Hause. Ihre Stängel sind rund und staudenartig, werden 4 bis 5 Schuh hoch, und haben eine hellbraune Rinde. Die glatten, eyrunden, herzförmigen Blätter, sind ungefähr 4 Z. lang, und

faſt 3 Z. breit; ſie umgeben den Stängel auf eine ſolche Art, als ob er mitten durch ſie hindurch lieſe. Die Blumen wachſen einzeln, ſitzen dicht an dem Grunde eines jeden Blattes, gegen den obern Theil der Zweige zu, haben eine blaßgelbe Farbe, und erſcheinen im Auguſt.

3. Aethiopiſche Klapper-Schote, deren Stamm-Blätter den Stamm umfaſſen, herzförmig ſind, und wechſelweiſe, die zunächſt an den Blumen befindlichen aber einander gerade gegen über ſtehen, und nierenförmig ſind; Crotalaria amplexicaulis, foliis caulinis amplexicaulibus cordatis alternis, floralibus oppoſitis reniformibus *L.* Ihr Stamm iſt holzig, und ihr Vaterland Aethiopien.

4. Pfeilförmige Klapper-Schote, mit einfachen und lanzenförmigen Blättern, deren Stiele an dem Stamme herunter laufen, einzeln ſind, und zwey Zähne haben; Crotalaria ſagittalis glabra, longioribus foliis, americana *Pluken.* Crotalaria ſagittalis, foliis ſimplicibus lanceolatis, petiolis decurrentibus ſolitariis bidentatis *Linn.* Man findet ſie in Braſilien, Jamaika, Carolina und Virginien, wild. Die Wurzel iſt jährig. Sie treibt einen 1½ Sch. hohen, zarten Stängel, welcher ſich in 3 bis 4 ausgebreitete Aeſte theilt, die mit länglichen, eyrunden, dicht anſitzenden Blättern beſetzt ſind. Die Blumenſtiele kommen neben an dem Stängel heraus. Die an dem untern Theile der Zweige ſind über 1 Sch., die obern aber ungefähr 6 Z. lang. Sie ſind zart, und haben oben eine, oder zwey blaßgelbe Blumen. Auf dieſelbe folgen kurze, aufgeblaſene Schoten, in welchen 3 bis 4 glatte nierenförmige Samen eingeſchloſſen ſind.

5. Sineſiſche Klapper-Schote, mit einfachen, eyrunden und ganz kurz geſtielten Blättern, und ſehr kleinen Blatt-Anſätzen; Crotalaria chinenſis, foliis ſimplicibus, ovatis ſubpetiolatis, ſtipulis minutiſſimis

Linn.

Linn. Sie kommt aus Sina. Ihre Stängel und Aeste ſind rundlich und etwas haarig; ihre Blätter ziemlich ſtumpf, mit einem glatten Rande, und auf beyden Seiten etwas haarig. Ihre Blumentrauben beſtehen aus wenigen Blumen, ſind rauh, und haben lanzenförmige Blattdecken, welche ſo lang ſind als die Blumenſtiele. Ihre Blumenkelche ſind mit weit abſtehenden Haaren beſetzt, und ſo lang als die gelbe Blumenkrone, deren Fähnchen geſtreift iſt. Ihre Blatt-Anſätze ſind pfriemförmig.

6. Binſenartige Klapper-Schote, mit geſtreiftem Stamme, und einfachen, lanzenförmigen, und geſtielten oder feſt aufſitzenden Blättern; Crotalaria bengalenſis, foliis geniſtae hirſutis *Plukn.* Crotalaria iuncea, foliis ſimplicibus lanceolatis, petiolato-ſeſſilibus, caule ſtriato *Linn.* Sie wächſt in Oſt-Indien wild. Sie macht einen faſt 4 Sch. hohen, eckigen Stamm, welcher nach oben zu in 3 bis 4 Zweige getheilt iſt, die mit ſchmahlen, lanzenförmigen, wechſelweiſe ſtehenden Blättern auf ſehr kurzen Stielen, beſetzt ſind. Sie ſind ſehr dicht mit weichen ſilbernen Haaren beſetzt. Die Blumen erſcheinen am Ende der Zweige in lockern Aehren; ſie ſind groß und dunkelgelb, und der Griffel ſteht über das Schiffchen hinaus. Auf die Blumen folgen große aufgeblaſene Schoten, die eine Reihe großer nierenförmiger Samen in ſich ſchließen. Dieſe Pflanze iſt in England jährlich; weil aber der untere Theil holzig iſt, ſo ſcheint ſie in dem Lande, wo ſie wild wächſt, von einer längern Dauer zu ſeyn, ungeachtet ſie bey uns den Winter nicht aushält. Denn wenn die Pflanzen in das Glas-Haus geſetzt werden, ſo iſt daſelbſt die Hitze für ſie zu groß, und in dem Gewächs-Hauſe verſchimmeln ſie bey dumpfigem Wetter. Miller hat Samen davon in das freye Feld geſäet, wo die Pflanzen faſt 3 Sch. hoch geworden ſind, und ſehr wohl geblühet haben; doch brachten

ſie keine Schoten. Sind ſie zärtlich behandelt worden, ſo ſind die Pflanzen weit größer geworden, und haben viele Blumen gebracht; aber dieſe tragen keinen Samen. Das einzige Mittel, Samen zu ziehen, beſtand darin, daß er Pflanzen in Töpfen in einem Miſtbeete zog, ſie zu Anfange des Jul. aus den Töpfen nahm, und in das freye Feld, auf eine warme Rabatte, unter eine Mauer ſetzte, in welcher Lage ſie ſehr wohl blüheten; auch wurden einige Schoten reif.

7. Rauhe Klapper-Schote, deren Blumen ziemlich feſt aufſitzen, und deren Blätter einfach, eyrund, ſpitzig und rauh ſind, und feſt aufſitzen; Crotalaria imbricata, foliis ſimplicibus ovatis acutis villoſis ſeſſilibus, floribus ſubſeſſilibus. Sie iſt auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung zu Hauſe, und hat einen holzigen Stamm.

8. Zugeſtumpfte Klapper-Schote, mit einfachen, länglichen, keilförmigen Blättern, die oben rückwärts gebogen ſind; Crotalaria maior *Rumph.* Crotalaria ſiliqua, floribus luteis, folio ſingulari cordiformi *Herm.* Crotalaria retuſa, foliis ſimplicibus, oblongis, cuneiformibus, retuſis *Linn.* Sie macht einen grasartigen Stängel, welcher faſt 3 Sch. hoch wird, ſich nach oben in verſchiedene Aeſte zertheilt, die mit länglichen Blättern beſetzt ſind, welche an ihrer Baſis ſchmahl, gegen den Gipfel zu aber ſtufenweiſe ſich erweitern, wo ſie zugerundet und in der Mitte wie ein Herz geſtaltet ſind. Sie haben eine blaßgrüne Farbe, und ſind glatt. Die Blumen kommen in Aehren am Ende der Zweige heraus, ſind ſehr groß und gelb; ſie kommen im Jul. zum Vorſchein. Der Same wird im Herbſte reif, wofern das Wachsthum im Frühlinge befördert worden iſt. Sie wächſt auf der Inſel Ceylon wild, iſt eine jährliche Pflanze, und geht bald nach dem Reifwerden des Samens zu Grunde.

In

In Amboina genießt man ihre Blumen als ein Zugemüſe.

9. Klapper-Schote mit feſt aufſitzender Blume, deren Stamm gleich, deren Blätter einfach und lanzenförmig ſind, und ziemlich feſt, und deren Blumen zur Seite feſt aufſitzen; Crotalaria ſeſſiliflora, foliis ſimplicibus lanceolatis ſubſeſſilibus, floribus ſeſſilibus lateralibus, caule aequali *L.* Sie iſt jährlich, und kommt aus Sina. Ihr Stamm iſt aufrecht und rundlich, wächſt kaum 1 Sch. hoch, und treibt nicht viele Aeſte. Ihre Blätter ſind lanzenförmig, auf der obern Fläche glatt, auf der untern haarig, und ſitzen beynahe feſt auf. Ihre Blatt-Anſätze ſind kaum ſichtbar. Ihre blaue Blumen ſitzen feſt in den Winkeln der Blätter auf, und haben zwey längliche Deck-Blätter.

10. Dreyblumige Klapper-Schote, deren Blätter feſt aufſitzen, und einfach, eyrund und glatt, deren Aeſte eckig ſind, und deren Blumenſtiele zu drey zur Seite ſtehen, und nur Eine Blume tragen; Crotalaria triflora, foliis ſimplicibus ovatis ſeſſilibus glabris, ramis angulatis, pedunculis ternis lateralibus unifloris *L.* Sie iſt ganz glatt, und das Vorgebirge der guten Hoffnung ihr Vaterland.

11. Warzige Klapper-Schote, mit einfachen, eyrunden Blättern, mondförmigen, abwärts hangenden Blatt-Anſätzen, und viereckigen Aeſten; Crotalaria aſiatica, foliis ſingulari verrucoſo, floribus caeruleis *Herm.* Crotalaria floribus ſolitariis ovatis acutis, caule ſulcato *Burmann.* Crotalaria verrucoſa, foliis ſimplicibus ovatis, ſtipulis lunatis declinatis, ramis tetragonis *Linn.* Sie wächſt in Indien wild. Sie iſt eine jährliche Pflanze, die einen grasartigen viereckigen Stängel hat, welcher ungefähr 2 Sch. hoch wird, und ſich in 3 bis 4 Zweige theilt. Dieſelben haben ebenfalls 4 ſpitzige Ecken, und ſind mit eyrunden, mit

der Landmann gleichſam mit Gewalt pfleglich damit umgehen; und man würde nicht ſo weit damit reichen, wenn die Hütung des Viehes mit eben der Bequemlichkeit darüber hinweg ginge, mit welcher die trocknen Gegenden übertrieben werden.

Der Gebrauch dieſer Klappen beſteht darin. Sie werden geſtampft, gebrühet, und zu Anfange der Mäſtung mit etwas Kleye, zuletzt aber mit Schrote, angemenget. Schwerlich iſt ein grünes Futter zu finden, welches die Schweine, wegen ſeiner ausnehmenden Fettigkeit, begieriger freſſen, als dieſes. Da nun die ſächſiſchen Wirthe, mit Hülfe des Klappen-Krautes, zu Unterhaltung zweyer Schlacht-Schweine, nicht mehr als 2 Scheffel Kleye, und 1 Scheffel Schrot, brauchen, hingegen ohne dieſe Beyhülfe der Pflanze drey Mahl ſo viel haben müßten: ſo wird wohl niemand zweifeln, daß dieſelbe den Landleuten, der Beſchwerlichkeit des Einſammelns ungeachtet, ein ſehr intereſſantes Gewächs ſey. Die armen Leute mengen oftmahls zu dieſem Kraute gar nichts an.

In einigen Gegenden von Schweden, in Finnland und Lappland, bedient man ſich der Wurzel zum Brod-Backen, indem ſie ſolche von den Fäſerchen und Blättern abſondern, trocknen, und klein ſtoßen, oder mahlen. Auf dieſes Mehl gießen ſie heißes Waſſer oder Branntwein-Hefen, wovon das Brod ſchmackhafter werden ſoll, kneten den Teig mit vieler Beſchwerde, bis er ganz zähe wird, miſchen darunter den dritten Theil Korn-Mehl, und backen Brod daraus, welches freylich ſchlecht ſeyn muß. Damit dieſes Brod deſto leichter im Ofen backe, und ſich deſto länger erhalten und beſſer käuen laſſe, wird es dünn aufgetrieben, und auf eiſernen Platten gebacken. Dieſe Art von Brod wird auch ſehr wenig geſäuert; denn wenn man es ſo lange, wie anderes, gähren lieſſe, würde es, wegen der wenigen Klebrigkeit, die es an ſich hat, leicht aus einander

ander gehen und zerfallen; ja, es könnte nicht einmahl ausgewirket werden.

Nach Hrn. C. R. Pallas Berichte, wächst diese Pflanze in der Gegend Tosninskoi Jam, 58 Werste von St. Petersburg, sehr häufig; und er räth an, die Wurzeln bey dem Mißwachse vom Korne, wie in Lappland geschieht, unter das Mehl zum Brode zu mahlen.

Da das Klappen-Kraut zur Gattung des Aron gehört, und man in Frankreich aus der Wurzel des gemeinen Aron eine Art Puder zu verfertigen angefangen hat, wie ich im Art. Stärke zeigen werde: so könnte man dergleichen auch wahrscheinlicher Weise, und in größerer Menge, aus dem Klappen-Kraute erhalten.

Klappen-Schnecke, s. unter Schnecke.

Klappen-Ventil, s. oben, S. 346.

Klappen, Ziegen-Klappen, eine Benennung des Fieber-Klees, Trifolium fibrinum; s. im XIII Th. S. 333.

Klappen, Klappen-Kraut; s. oben, S. 347.

Klappen (*), ist in doppelter Gestalt üblich.

1. Als ein Neutrum, mit dem Hülfsworte haben, einen solchen Schall von sich geben, als das Wort Klapp ausdruckt. Schlagen, daß es klappt. Die Thür klappt nieder, fällt mit einem solchen Schalle nieder. Die Teller klappen schon, im Ober-Deutschen, wofür im Hochdeutschen das Frequentativum klappern üblich ist, so wie in der N. A. mit den Zähnen klappen, Fr. claquer des dents, welches in dem zusammen gesetzten Zähnklappen einige Mahl in der deutschen Bibel vorkommt. Man wird über ihn

(*) Im Engl. clap, im Schwed. und Isländ. klappa, wo es aber mehrere verwandte Arten des Schalles und des Schlages bezeichnet, wohin auch das Griech. κολαπτω, das Lat. Colaphus, das Ital. Colpo, Franz. Coup, u. a. m. gehören. Siehe Klaffen, Klepper und Klopfen.

ihn mit den Händen klappen, Hiob 27, 23; wofür man im Hochdeutschen klatschen braucht, obgleich klappen in eben dieser Verbindung auch Es. 55, 12. Klagel. 2, 15. Nahum 3, 19. und Zeph. 2, 15. vorkommt. Da wird man hören die Geißeln klappen, Nahum 3, 2. wofür man im Hochdeutschen gleichfalls klatschen, imgl. knallen, im Oberd. aber schnalzen, sagt. Klingt es nicht, so klappt es doch, Sprichw. Fr. cela est passablement bien dit. Wenn es zum Klappen kommt, figürlich, im g. L., wenn es zur Sache selbst kommt, wenn es Ernst wird, wenn es zum Treffen kommt. Imgl. figürlich, für klingen, im g. L. Die Verse klappen nicht, haben keinen Wohlklang. Das klappt nicht, schickt sich nicht zur Sache. Siehe Klappsen.

2. Als ein Activum, diesen Schall hervor bringen, oder vielmehr mit Hervorbringung dieses Schalles niederlassen, aufmachen, u. s. f. besonders in den Zusammensetzungen aufklappen, in die Höhe klappen, den Tisch aufklappen; niederklappen, die Klappe niederlassen, einen Tisch niederklappen, u. s. f. wo es von jedem Dinge gebraucht wird, welches unter dem Nahmen der Klappe bekannt ist, oder ihr doch gleicht, auch wenn mit dieser Handlung gleich kein merklicher Schall verbunden ist. Die Handschuhe aufklappen. Den Hut niederklappen, die Krämpe an dem Hute. In weiterer Bedeutung auch im g. L. für schlagen, doch nur von derjenigen Art des Schlagens, welche diesen Schall hervor bringt. Mit dem Lineale auf den Tisch klappen.

1. **Klapper**, Rhinanthus Crista Galli; s. 1. Klafter, oben, S. 305.

2. **Klapper**, ein Werkzeug zum klappern, oder damit zu klappern. Dergleichen sind:

Die Klapper aus zwey Knochen oder Hölzern, die man zwischen die Finger nimmt, und gegen einander

der schlägt; L. Crepitaculum. Crotalum. Fr. Cliquette, Sonnette. Ehemahls mußten in Frankreich die Aussätzigen wenn sie auf der Straße gingen, dergleichen Klappern tragen, und damit klappern, um dadurch ein Zeichen zu geben, daß man ihnen aus dem Wege gehen konne; **Klapper-Holz**, L. Crepitaculum leprosorum.

Die **Klapper** kleiner Kinder, **Kinder-Klapper**, Fr. Hochet, ein von Elfenbein, von Silber-Blech oder andern Blech, oder von Holz verfertigtes, oder von Draht mit bunten Korallen zusammen geflochtenes Instrument, welches einen hohl getriebenen Knopf mit einem Stiele, an dessen Ende sich gemeiniglich ein so genannter Wolfs-Zahn, Achat ꝛc. befindet, vorstellt, und woran entweder kleine Schellen hängen, oder wo inwendig kleine Schellen hinein gethan werden, um nicht nur mit dem Klange, wenn man dasselbe bewegt, die kleinen schreyenden Kinder zu besänftigen, oder sonst zu amüsiren, sondern auch die zahnenden Kinder das Zahn-Fleisch daran reiben zu lassen. Dergleichen Klapper hängt insgemein an einem Bande. Dieses Instrument soll vom Archytas, einem pythagorischen Philosophen zu Tarent, zum Zeitvertreib für seine Kinder erfunden worden seyn. Nach Anderer Erzählung, soll Archimedes, da ihm seine junge Familie immer über seine mathematische Werkzeuge kam, und dieselben zerbrach, für seine Kinder die Klappern, wo nicht zuerst erdacht, doch aber in die heutige Form gebracht haben.

Bey Erb-Theilungen, gehören die Kinder-Klappern zur Gerade. *Carpzov* P. 2, Const. 14, Def. 44, n. 6.

Die Klapper, ein hölzernes Instrument, dergleichen man sich an einigen Orten am grünen Donners-Tage und Char-Freytage statt der Glocken bedient; Fr. Crecelle, Cresselle.

Die **Klapper**, ein schnarrendes **Instrument**, welches an einigen Orten die **Nacht-Wächter** tragen; in einigen Gegenden **Schnarre**, **Ratsche**, im Niederſ. Ratel, Fr. Crecelle, Creſſelle, Creſſerelle.

Die **Klapper in der Mühle**, die ſtets an den Rumpf anſchlägt, **Mühlen-Klapper**, Fr. Claquet, Cliquet, Cliquette.

Auch **bey den Jägern** braucht man **Klappern**, das Wild, inſonderheit Schnepfen und Haſen in das Garn zu treiben, welche aus dünnen Bretchen mit einem hölzernen Hammer, oder mit Riemen angemachten hölzernen Kugeln beſtehen; **Klapper-Jagd**, ſ. im XXVIII Th. S. 60, f. und 180. Von dieſem iſt das **Klappen-Jagen**, eine Art des Fanges der Inſecten, inſonderheit der Nachtvögel (ſ. Th. XXX, S. 277, f.) zu unterſcheiden.

Eine **Klapper**, oder ein Klapperwerk, zum Verſcheuchen der Vögel von den Obſtbäumen, z. B. der Sperlinge von den Kirſch-Bäumen, ſ. oben, S. 98, f. und die dazu gehörige Fig. 2089.

Daher **klappern**, ein Neutrum, welches das Hülfs-Wort haben erfordert, und das Frequentativum und Intenſivum von klappen iſt, ein zitterndes und anhaltendes Klappen zu bezeichnen. Es bedeutet:

1. Einen ſolchen Schall von ſich geben, aus ſich ſelbſt hervor bringen, welches geſchieht, wenn harte Körper hurtig hinter einander auf einander ſtoßen, L. crepi, are, Fr. claquer, cliqueter. **Die Zähne klappern mir vor Froſt; die Zähne klappern ihm, wenn er den Froſt hat**, Fr. les dents lui claquent dans ſon friſſon, wenn ſie vor Kälte hurtig auf einander ſchlagen; Niederſ. klappen und ſnätern, in der alten lombardiſchen Hiſt. bey dem Schilter chloffelun, im Tatian itridan. **Ein Beutel voll Steine klappert, wenn man ihn ſchüttelt.** Im Niederſ. klätern, welches manche Arten des Klapperns beſtimmter und genauer

ſelben nicht fortkommen. Wenn ſie die kleinen Töpfe mit ihren Wurzeln angefüllt haben, müſſen ſie heraus genommen, und in etwas größere geſetzet werden. Diejenigen, welche von einer längern Dauer ſind, müſſen im Frühlinge etwas größere Töpfe haben. Dieſe Pflanzen müſſen mit Vorſicht begoſſen werden; denn wenn man ſie zu feucht hält, ſo verfaulen die Faſern an den Wurzeln. Es iſt daher genug, wenn man ſie im Sommer bey heißem Wetter, die Woche über, drey bis vier Mahl begießt.

Klapper-Stab, ſiehe das Folgende.

Klapper-Stecken, Klapper-Stab, Klapper-Stock, im g. L. einiger Gegenden, dicke Stecken, welche die Fuhrleute, inſonderheit in gebirgigen Gegenden, wenn ſie bergab fahren, an die hintere Achſe befeſtigen, ſo, daß die Stecken in das Rad zu liegen kommen, deſſen Bewegung vermindern und erſchweren, aber zugleich ein heftiges Geklapper verurſachen; im g. L. **Klapp-Stecken, Klipp-Stecken, Klipper-Stecken.** Dieſe Stecken ſind 7 Fuß lang, und 2 Z. ſtark. Man ſteckt ſie durch die Räder quer durch, und es iſt alſo in ihnen Federkraft nöthig, vermöge welcher ſie mit den Enden in die Rad-Speichen einſchnappen, wobey ſie ein ſtarkes Getöſe erregen. Sie werden aus ſchwanken büchenen Schlag-Holze verabfolget, unter der Hand aber aus den Samen-Dickichten geraubet.

Nach der herzogl. gothaiſchen Holz-Taxe, v. J. 1765, S. 23, koſtet am thüringer Walde in den Forſten des Amtes Reinhardsbrunn, ein Schock büchene Klapper-Stäbe, 8 Groſchen.

Klapper-Stein, ein Stein, welcher zuweilen aus verwitterten Kies-Nieren entſteht, oft aber auch ein bloßer Sand-Stein iſt, welcher inwendig hohl iſt, einen feſten Kern in der Höhle hat, und daher klappert, wenn man

man ihn ſchüttelt. Siehe Adler-Stein, im I Th. S. 421, welchen Nahmen er gleichfalls führt.

Klapper-Stock, ſ. Klapper-Stecken.

Klapper-Storch, im g. L., der Storch, wegen des Geklappers, welches er durch das Zuſammenſchlagen ſeines Schnabels verurſacht, daher er in einigen Gegenden auch **Klappner**, **Kneppner** heißt. Siehe Storch.

Klapper, ſ. Klepper.

Klappern, ſ. oben, S. 354.

Klappner, ſ. Klapper-Storch.

Klapps, ein Wort, welches den Schall nachahmet, welchen man im Oberd. durch Klapf, und im Niederſ. durch Klapp ausdrückt. Daher das Haupt-Wort der Klapps, ſowohl dieſer Schall, als auch ein Schlag, welcher denſelben hervor bringt, beydes im g. L. Jemanden einen Klapps geben, einen Schlag mit der flachen Hand, mit einem Lineale oder andern breiten Werkzeuge. Fr. Claque.

Daher klappſen, einen Klapps machen, oder hervor bringen, eine Art des Schalles, welche in Anſehung der Weiche des Schalles zwiſchen klappen und klatſchen das Mittel hält.

Klar, ein Wort, welches eine doppelte Eigenſchaft der Dinge bezeichnet.

1. Eine Eigenſchaft der Dinge, wie ſie in das Gehör fallen; eine Eigenſchaft der Stimme und des Schalles, nach welcher er vernehmlich iſt, ſich ſowohl im Ganzen, als auch nach allen ſeinen Theilen, von andern unterſcheiden läſſet.

(1) Eigentlich. Eine klare Stimme, eine deutliche, vernehmliche Stimme, doch nur in einigen Gegenden. In einem andern Verſtande iſt im g. L. eine klare Stimme, eine zwar annehmliche aber dabey feine, hohe Stimme. Allzu klar reden; Fr. parler clair, eine klare Stimme haben, wie ein Frauenzimmer.

(2) Figür-

(2) Figürlich, dem Inhalte nach, verſtändlich, begreiflich, keinen Zweifeln unterworfen. Bis ihnen klare Antwort würde durch den Mund des Herrn, 3 Moſ. 24, 12. Es war nicht klar ausgedruckt, was man ihm thun ſollte, 4 Moſ. 15, 34. Der Tag wirds klar machen, 1 Cor. 3, 13. Die Sache iſt klar, leidet keinen Zweifel. Die Urſache liegt klar am Tage. Beſonders in Geſellſchaft der Wörter deutlich, offenbar, u. ſ. f. Das iſt klar und deutlich. Deutliche, klare Worte. Ich habe es mir klar und deutlich ausbedungen. In engerm Verſtande iſt in der Logik ein klarer Begriff, wenn er hinreicht, die Sache von allen andern zu unterſcheiden.

3) Fertig, von allen Hinderniſſen befreyet, doch nur im Niederſächſ. wo man klar iſt, wenn man zur Reiſe bereit und fertig iſt.

Daß dieſe Bedeutung die erſte und eigentlichſte iſt, erhellet aus der Analogie der Wörter hell, u. a. welche von der Empfindung des Gehöres auf die Empfindung des Geſichtes übergetragen worden ſind, indem es leichter iſt, die erſte, als die letzte auszudrucken, oder nachzuahmen. Klar, gehört in dieſer Bedeutung zu dem noch im g. L. einiger Gegenden üblichen lören, laren, rufen, ſchreyen, heulen, von welchem es vermittelſt des vorgeſetzten Gaumen-Lautes, der alle flüſſige Mitlauter ſo gern begleitet, abgeleitet iſt. S. Lehren, welches Wort gleichfalls dahin gehört.

2. Eine Eigenſchaft der Körper in Anſehung der Licht-Strahlen, wie ſie durch das Geſicht empfunden werden, wo es ehedem hell, glänzend, durchſichtig, u. ſ. f. überhaupt bedeutete, aber jetzt nur noch in einigen Arten dieſer Eigenſchaft gebraucht wird.

(1) Eigentlich. a) Vieles Licht habend und von ſich gebend, in welcher Bedeutung es aber veraltet iſt, weil hell dafür üblicher geworden iſt. Daß es aber dieſe Bedeutung gehabt haben müſſe, erhellet un-

ter andern auch aus dem Worte **Klarheit**, welches noch in der deutschen Bibel in diesem Verstande vorkommt. b) Viele Licht-Strahlen von seiner Oberfläche zurück werfend, für hell, glänzend, eine gleichfalls veraltete Bedeutung, in welcher man noch zuweilen im g. L. sagt, klare Augen haben, glänzende, ein klarer Spiegel. Clar als ein Spiegel glas, Struck. Klar wie ein Krystall, Offenb. 22, 1. wo aber auch der folgende Begriff der Durchsichtigkeit Statt finden kann. In Hamburg wird das Geschirr geklähret, wenn es blank gescheuert wird. c) Viele Licht-Strahlen durchlassend, einen hohen Grad der Durchsichtigkeit habend, im Gegensatze des trübe; in welchem Verstande es im Hochdeutschen am üblichsten ist. Besonders von der Luft und flüssigen Körpern. Es ist klares Wetter, wenn der Dunst-Kreis durch keine, wenigstens durch keine grobe fremde Körper getrübet wird. Wie die Gestalt des Himmels, wenns klar ist, 2 Mos. 24, 10. Klar scheint alsdann einen geringern Grad auszudrucken, als heiter. Es war stets klarer, ja die meiste Zeit auch heiterer Himmel. Klares Bier, klarer Wein, im Gegensatze des trüben. Einen flüssigen Körper klar werden lassen. d) Weiß; in welchem Verstande es doch nur noch in dem Worte **Eyerklar** oder **das Klare von einem Eye** üblich ist, das Eyweiß zu bezeichnen, im Gegensatze des Dotters.

(2) Figürlich. a) Dünne, von flüssigen Körpern; wo es im g. L. von einer fehlerhaften dünnen Eigenschaft gebraucht wird. Das Bier ist so klar als Wasser, wenn es ihm an den nöthigen nahrhaften Theilen mangelt. b) Fein, zart; auch nur im g. L., und im Gegensatze des grob. Klarer Zwirn. Klare Leinwand. Klare Spitzen. Sehr klar spinnen. Klares Mehl. Klar schreiben. Die Schrift ist mir zu klar. Die Figur ist hier von der Durch-

sicht

ſichtigkeit hergenommen. c) Lauter, unvermiſcht, gleichfalls nur im g. L. Von klarem Golde. Jemanden klaren Wein einſchenken, ihm die reine Wahrheit ſagen. Es iſt die klare Wahrheit, die reine, unverfälſchte Wahrheit. Ihre Nazaräer waren reiner denn der Schnee, und klärer denn Milch, Klagel. 4, 7. d) Dem Geſichte deutlich, was man vermittelſt des Geſichtes von allen andern Dingen unterſcheiden kann. Ich ſehe es klar und deutlich. Auch ſollt du auf die Steine alle Worte dieſes Geſetzes ſchreiben klar und deutlich, 5 Moſ. 27, 8.

In dieſer zweyten Haupt-Bedeutung im Niederſ. Dän. und Schwed. gleichfalls klar, im Engl. clear, im Lat. clarus, im Franz. clair, im Griech. γλαυκος, γαλεγος. Zu dem Geſchlechte dieſes Wortes in dieſer Bedeutung gehören noch das Engl. glare, ſcheinen, ſchimmern, das Niederſ. glaren, glühen, das Angelſ. Hlear, das Geſicht, das Niederſ. gluren, lauern, dieſes hochdeutſche Wort ſelbſt, nebſt leer, und vielen andern mehr.

Klar machen, bey der Schifffahrt, alles in Ordnung und Bereitſchaft legen, damit man unter Segel gehen könne. Ein klarirtes Segel, ein aus einander gemachtes und zum Aufziehen fertiges Segel.

Klar machen, in der Chemie; ſ. **Klären**.

Klar, (der) ein lockeres und leichtes Gewebe aus klarem, d. i. feinem, Garne, durch welches man ſehen kann; ſ. Schleyer.

Klär-Keſſel, in den Zucker-Siedereyen, ein Keſſel, worin der gereinigte Sud des Zuckers völlig abgekläret wird; ſ. im Art. Zucker.

Klär Staub, ſ. das Folgende.

Kläre. 1. In den Schmelz-Hütten, bey den Silber-Abtreibern, und in der Probier-Kunſt, eine zarte aus Beinen gebrannte Aſche, woraus die Capellen für die Schmelzer gemacht werden; von klar, ſo fern es zart, fein, bedeutet; der Klär Staub, Fr. Claire. Ein

feines Pulver, welches in den Keſſel einer Capelle, (d. i. in die, vermittelſt des Mönches, in die Capelle hinein getriebene Vertiefung, auf welche das Silber-Korn zu liegen kommt,) eingeſtampfet wird. Dieſe Kläre beſteht gemeiniglich aus calcinirtem Hirſch-Horn, oder aus wohl ausgelaugter Knochen-Aſche, von weiß gebrannten Schaf- und Kälber-Knochen, Hecht-Gräthen, u. d. gl. Sie dient, theils die unebenen Stellen auf der Oberfläche der Höhlung der Capelle auszufüllen, und hierdurch zu verhüten, daß keine Capell-Aſche oder Schlacke ſich an den Boden des Silber-Kornes anlege; theils aber, um auf dieſer Ober-Fläche gleichſam ein Sieb zu formiren, wodurch das Bley und die Glätte deſto leichter durchfließen, während daß das Gold oder Silber ſtehen bleibt.

Die Knochen müſſen gut gebrannt (calciniret) und gerieben, und alsdann das Geriebene nochmahls gebrannt werden. Die Kälber-Knochen (oder die Hirnſchale von einem Kalbs-Kopfe) und Fiſch-Gräthen, ſind eigentlich die beſten Knochen zu dieſer Bereitung. Schwein-Knochen taugen gar nicht dazu, weil ſie eine gewiſſe Fettigkeit behalten, welche der Arbeit, nähmlich dem Abtreiben, nachtheilig iſt. Wenn die Capellen aus der wohl zubereiteten Aſche gehörig verfertigt ſind, beſtreuet man die von dem Stößel gemachte Vertiefung, mit der fein geriebenen Kläre, welche man vermittelſt eines Siebes, ungefähr einen Meſſerrücken dick, darauf ſtreuet. Man ſetzt hierauf den Stößel wieder auf die Capelle, welche ſich noch in dem meſſingenen Capellen-Futter befindet, und ſchlägt einige Mahl mit einem hölzernen Hammer darauf, damit die Kläre überall feſt und glatt angedrückt werde; hernach drückt man die Capelle aus der Form, und hebt ſie zum Gebrauch auf.

2. Das Abſtractum des vorigen Bey-Wortes, doch nur ſo fern es fein, zart, bedeutet; im g. L. Die Kläre des Zwirnes, der Leinwand, des Mehles, u. ſ. f.

Klare. 1. In den Küchen Ober-Sachsens, eine dünne, mit etwas Mehl, Eyern, Milch ꝛc. vermengte und gut gewürzte Soße zu einer Speise; vermuthlich von klar, so fern es dünn, flüssig, bedeutet. Man nimmt zu derselben allezeit die schlechteste Milch, weil der Rahm und die gute Milch einige Fettigkeit besitzt, wovon die Klare schwer wird; nebst der schlechten Milch nimmt man Wasser, Weißbier und Wein, und rühret alles wohl unter einander.

Man hat auch **Klare zu allerley Backwerk**, worunter man einen dünnen Teig versteht, womit Fleisch, Früchte und Kräuter überzogen und abgebacken werden. Es wird, in dieser Absicht, feines Mehl in einer tiefen Schüssel, und ungefähr zu ½ Pfund Mehl 3 bis 4 Eyer, eines nach dem andern, nebst etwas Rosen-Wasser und beliebigem Gewürze, auch einem Löffel voll frischer Hefen, zusammen gerühret. Wäre der Teig von den Eyern noch nicht dünn genug geworden, gießt man noch etwas Bier hinzu; doch muß der Teig, damit er hernach nicht zu sehr ablaufe, wenn etwas darin abgebacken wird, nicht zu dünn seyn. Man setzt hierauf die Klare an einem warmen Orte hin, damit sie zuvörderst etwas aufgehe, ehe man damit etwas ausbacken will; doch muß sie auch nicht an einen allzu heißen Ort gestellet werden, damit sie sich nicht davon ansetze.

Oder: man nimmt zu 2 Handvoll Mehl, eine kleine Handvoll fein geriebenen Zucker, und rührt es mit dem zuvor wohl klein geschlagenen Weiß von 2 Eyern, dergestalt an, daß es etwas dick bleibe, worauf etwas Land-Wein zugegossen wird, daß es weder zu dünn noch zu dick sey. Diese Klare, da sie ohne Hefen ist, und nicht erst aufgehen darf, kann sofort gebrauchet werden. Man bedient sich derselben vornehmlich zu Früchten und Kräutern, die, weil sie süß schme-

cken sollen, nach dem Ausbacken mit Zucker überstreuet werden.

2. **Die Klare geben**, bey den Licht-Ziehern, Fr. donner le filet, oder mettre le filet au suif fondu, zu dem geschmolzenen und wohl abgeschäumten Talge eine kleine Quantität Wasser (un filet d'eau) in die Pfanne hinzu thun, damit es die Unreinigkeit des Talges vollends niederschlage.

Klären, L. clarificare Fr. clarifier, klar machen, von flüssigen Körpern, doch nur als ein Reciprocum. Der Wein, das Bier kläret sich, wenn die fremdartigen Theile zu Boden sinken. In den zusammen gesetzten **abklären**, **aufklären**, **ausklären**, **erklären**, und **verklären**, ist es zum Theil in figürlichen Bedeutungen üblich. Nieders. **klaren**, welches aber auch fertig machen bedeutet.

In der Chemie und Pharmacie, geschieht das **Klären**, die **Abklärung** oder **Läuterung** eines Saftes, (die Clarification), entweder durch das Feuer, oder durch Eyweiß, durch Weingeist, Weinstein-Rahm und allerley Säuren aus dem Pflanzen- und Mineral-Reiche, oder auch bloß durch die Ruhe.

Klaret, s. **Claret**, im VIII Th. S. 191; und **Hippokraß**, im XXIII Th. S. 582, fgg.

Klarfädig, einen klaren, d. i. feinen, zarten Faden habend; im Gegensatze des **grobfädig**.

Klarheit, die Eigenschaft eines Dinges, nach welcher es klar ist.

1. In Absicht des Gehöres. Die Klarheit der Stimme, eines Schalles, die Eigenschaft, nach welcher man ihn von allen andern unterscheiden kann. Imgl. in einem andern Verstande, die feine Beschaffenheit der Stimme. Wie auch figürlich, die Eigenschaft einer Sache, da sie bestimmt, deutlich, und keinen Zweifeln unterworfen ist. Die Klarheit eines

Satzes,

Klare. 1. In den Küchen Ober-Sachsens, eine dünne, mit etwas Mehl, Eyern, Milch ꝛc. vermengte und gut gewürzte Soße zu einer Speise; vermuthlich von klar, so fern es dünn, flüssig, bedeutet. Man nimmt zu derselben allezeit die schlechteste Milch, weil der Rahm und die gute Milch einige Fettigkeit besitzt, wovon die Klare schwer wird; nebst der schlechten Milch nimmt man Wasser, Weißbier und Wein, und rühret alles wohl unter einander.

Man hat auch **Klare zu allerley Backwerk**, worunter man einen dünnen Teig versteht, womit Fleisch, Früchte und Kräuter überzogen und abgebacken werden. Es wird, in dieser Absicht, feines Mehl in einer tiefen Schüssel, und ungefähr zu ½ Pfund Mehl 3 bis 4 Eyer, eines nach dem andern, nebst etwas Rosen-Wasser und beliebigem Gewürze, auch einem Löffel voll frischer Hefen, zusammen gerührt. Wäre der Teig von den Eyern noch nicht dünn genug geworden, gießt man noch etwas Bier hinzu; doch muß der Teig, damit er hernach nicht zu sehr ablaufe, wenn etwas darin abgebacken wird, nicht zu dünn seyn. Man setzt hierauf die Klare an einem warmen Orte hin, damit sie zuvörderst etwas aufgehe, ehe man damit etwas ausbacken will; doch muß sie auch nicht an einen allzu heißen Ort gestellet werden, damit sie sich nicht davon ansetze.

Oder: man nimmt zu 2 Handvoll Mehl, eine kleine Handvoll fein geriebenen Zucker, und rührt es mit dem zuvor wohl klein geschlagenen Weiß von 2 Eyern, dergestalt an, daß es etwas dick bleibe, worauf etwas Land-Wein zugegossen wird, daß es weder zu dünn noch zu dick sey. Diese Klare, da sie ohne Hefen ist, und nicht erst aufgehen darf, kann sofort gebrauchet werden. Man bedient sich derselben vornehmlich zu Früchten und Kräutern, die, weil sie süß schme-

wenn man mit der Hand gegen eine Wand ꝛc. ſchlägt. Daher der Klatſch, L. Contabus, Ictus reſonans, Sonus ex ictu, Fr. Claque, ſowohl dieſer Schall, als auch der Schlag, welcher denſelben hervor bringt. Jemanden einen Klatſch geben, einen ſolchen Schlag mit der flachen Hand. Lautet ein ſolcher Schlag feiner oder klärer, ſo wird er auch wohl ein Klitſch genannt. Im Engl. clath, im Holländ. Kletz. Siehe Klatſchen.

2. Klatſch, die Benennung des jenaiſchen Stadt-Bieres; ſ. Th. V, S. 26.

Klatſch-Büchſe, im g. L. ein hohles Rohr der Kinder, welches vermittelſt der zuſammen gepreßten und plötzlich befreyten Luft einen lauten Knall verurſacht; die Platz-Büchſe, im Niederſ. Ballerbüſſe, Klapp-Buſſe, Klapperbuſſe. Figürlich und in der niedrigen Sprech-Art auch wohl eine klatſchhafte, d. i. ſchwatzhafte Perſon, beſonders weibliches Geſchlechtes.

Klatſch-Form, in den Papier- und Wachstuch-Tapeten-Manufacturen, diejenige Form, mit welcher auf dem Tapeten-Papiere oder der Tapeten-Leinwand, die Stellen, wo Blumen zu ſtehen kommen ſollen, mit weißer Farbe bedrucket oder bedecket werden. Siehe im XIV Th. S. 481.

Klatſch-Keſſel, der fünfte Keſſel bey dem Zucker-Sieden, worin der Syrupp, wenn er überlaufen will, mit großen Löffeln in die Höhe geſchöpft wird, um ihn abzukühlen, welches denn einen lauten Schall verurſacht, der dem Klatſchen ähnlich iſt; ſ. im Art. Zucker.

Klatſch-Maul, ſ. Klatſcher.

Klatſch-Roſe, eine Art des wilden Mohnes; ſ. unter Mohn.

Klatſche. 1. Ein Werkzeug zum Schlagen, ſo fern es im Gebrauche klatſchet; in welchem Verſtande doch nur ein Stück Leder oder Filz an einem Stiele, womit

man

man die Fliegen todt schlägt, diesen Nahmen führt; die **Fliegen-Klatsche**, s. Th. XIV, S. 238. **Mit Einer Klatsche zwey Fliegen schlagen**, Sprichw. zwey Absichten mit Einem Mittel erreichen.

2. Figürlich, im gem. Leben, eine schwatzhafte, plauderhafte Person, besonders weibliches Geschlechtes, und im verächtlichen Verstande.

Klatschen, ist in doppelter Gestalt üblich.

1. Als ein Neutrum, mit dem Hülfsworte haben.

(1) Denjenigen Schall von sich geben, welcher durch das Wörtchen klatsch ausgedruckt wird. **Es regnet, daß es klatscht. An die Wand schlagen, daß es klatscht.**

(2) Einen solchen Schall hervor bringen. a) Eigentlich. **Mit dem Munde klatschen. Mit den Händen klatschen. In die Hände klatschen**, oder nur schlechthin **klatschen**, sowohl zum Zeichen des Beyfalles, als auch des verachtenden Mißfallens; **zuklatschen, ausklatschen. Mit der Peitsche klatschen**, im Nieders. klappen, im Oberd. schnalzen. In Dresden ist, nach dem erneuerten Wacht-Reglement, v. J. 1777, S. 55, das ungeziemende **Klatschen mit Peitschen**, besonders von Reitenden, nicht erlaubt, und haben die Wachten auf dessen Befolgung zu sehen.

Sprichw. **Alte Fuhrleute hören gern klatschen.** Von Geschäften und Handlungen, die jemand seine Lebens-Zeit hindurch verübt und gethan hat, hört er im Alter noch gern reden. Die bloße Erinnerung an Leidenschaften, denen er sonst nachhing und noch nachhängen würde, wenn er nicht das Vermögen dazu verloren hätte, erfüllt ihn mit einer Art von Wollust, die den süßesten Nach-Geschmack des vormahligen Genusses ausmacht.

b) Figürlich und im verächtlichen Verstande, besonders von dem weiblichen Geschlechte, sowohl viel und unnütz reden, als auch Dinge, welche verschwie-

gen bleiben sollen, ausplaudern; deblaterare, garrire; waschen, mit einem gelindern und anständigern Ausdrucke schwatzen. Sie klatscht den ganzen Tag. Mit einander klatschen. Klatschen gehen. Traue ihr nicht, sie klatscht alles wieder. Personen zusammen klatschen, durch ein solches Geklatsche wieder einander aufbringen. So auch in den Zusammenfügungen **ausklatschen**, ausplaudern, ausschwatzen, L. garrulitate divulgare, effutire, ein Geheimniß **ausklatschen**; **beklatschen**; **nachklatschen**; **verklatschen**, α) etwas verklatschen, eine Sache durch unzeitige Bekanntmachung, voreilige Schwatzhaftigkeit verderben. Die Sache ist schon verklatscht. β) Jemanden verklatschen, ihn durch Klätscherey in einen übeln Ruf bringen; L. garrulitate odium alicui conciliare.

2. Als ein Activum, doch nur im g. L. und in der letzten figürlichen Bedeutung, für ausplaudern. Eine Sache klatschen, eine Sache die verschwiegen bleiben soll, ausschwatzen. Es wird alles wieder geklatschet. Wofür doch ausklatschen üblicher ist.

Es ist eine Nachahmung des Schalles; siehe Klatsch. Verwandt sind damit, sowohl das Griech. κλαζειν, rufen, schreyen, als auch das Poln. Klaskanie, das Frohlocken, das Franz. Eclat, eclater, u. s. f.

Klätscher, (der) Fämin. die **Klätscherinn**, in der figürlichen Bedeutung des Zeit-Wortes, und im verächtlichen Verstande, eine Person, welche viel und unnütz plaudert. In engerer Bedeutung, welche Dinge, die verschwiegen bleiben sollten, ausplaudert. Eine solche Person pflegt man im g. L. auch wohl ein **Klatsch-Maul**, ein **Klatsch-Weib**, eine **Klatsch-Triene**, u. s. f. zu nennen; L. Delator, Nugator; Mulier garrula, loquacula.

Klatscherey, oder **Klätscherey**, im verächtlichen Verstande, ein Geschwätz, doch nur in engerer Bedeutung,

man die Fliegen todt ſchlägt, dieſen Nahmen führt; die **Fliegen-Klatſche**, ſ. Th. XIV. S. 238. **Mit Einer Klatſche zwey Fliegen ſchlagen**, Sprichw. zwey Abſichten mit Einem Mittel erreichen.

2. Figürlich, im gem. Leben, eine ſchwatzhafte, plauderhafte Perſon, beſonders weibliches Geſchlechtes, und im verächtlichen Verſtande.

Klatſchen, iſt in doppelter Geſtalt üblich.

1. Als ein Neutrum, mit dem Hülfsworte haben.

(1) Denjenigen Schall von ſich geben, welcher durch das Wörtchen klatſch ausgedruckt wird. Es regnet, daß es klatſcht. An die Wand ſchlagen, daß es klatſcht.

(2) Einen ſolchen Schall hervor bringen. a) Eigentlich. **Mit dem Munde klatſchen. Mit den Händen klatſchen. In die Hände klatſchen**, oder nur ſchlechthin **klatſchen**, ſowohl zum Zeichen des Beyfalles, als auch des verachtenden Mißfallens; **zuklatſchen, ausklatſchen. Mit der Peitſche klatſchen**, im Niederſ. klappen, im Oberd. ſchnalzen. In Dresden iſt, nach dem erneuerten Wacht-Reglement, v. J. 1777, S. 55, das ungeziemende **Klatſchen mit Peitſchen**, beſonders von Reitenden, nicht erlaubt, und haben die Wachten auf deſſen Befolgung zu ſehen.

Sprichw. **Alte Fuhrleute hören gern klatſchen.** Von Geſchäften und Handlungen, die jemand ſeine Lebens-Zeit hindurch verübt und gethan hat, hört er im Alter noch gern reden. Die bloße Erinnerung an Leidenſchaften, denen er ſonſt nachhing und noch nachhängen würde, wenn er nicht das Vermögen dazu verloren hätte, erfüllt ihn mit einer Art von Wolluſt, die den ſüßeſten Nach-Geſchmack des vormahligen Genuſſes ausmacht.

b) Figürlich und im verächtlichen Verſtande, beſonders von dem weiblichen Geſchlechte, ſowohl viel und unnütz reden, als auch Dinge, welche verſchwie-

gen bleiben ſollen, ausplaudern; deblaterare, garrire; waſchen, mit einem gelindern und anſtändigern Ausdrucke ſchwatzen. Sie klatſcht den ganzen Tag. Mit einander klatſchen. Klatſchen gehen. Traue ihr nicht, ſie klatſcht alles wieder. Perſonen zuſammen klatſchen, durch ein ſolches Geklatſche wieder einander aufbringen. So auch in den Zuſammenfügungen **ausklatſchen**, ausplaudern, ausſchwatzen, L. garrulitate divulgare, effutire, ein Geheimniß ausklatſchen; **beklatſchen**; **nachklatſchen**; **verklatſchen**. α) etwas verklatſchen, eine Sache durch unzeitige Bekanntmachung, voreilige Schwatzhaftigkeit verderben. Die Sache iſt ſchon verklatſcht. β) Jemanden verklatſchen, ihn durch Klätſcherey in einen übeln Ruf bringen; L. garrulitate odium alicui conciliare.

2. Als ein Activum, doch nur im g. L. und in der letzten figürlichen Bedeutung, für ausplaudern. Eine Sache klatſchen, eine Sache die verſchwiegen bleiben ſoll, ausſchwatzen. Es wird alles wieder geklatſchet. Wofür doch ausklatſchen üblicher iſt.

Es iſt eine Nachahmung des Schalles; ſiehe Klatſch. Verwandt ſind damit, ſowohl das Griech. κλαζειν, rufen, ſchreyen, als auch das Poln. Klaskanie, das Frohlocken, das Franz. Eclat, eclater, u. ſ. f.

Klätſcher, (der) Fämin. die **Klätſcherinn**, in der figürlichen Bedeutung des Zeit-Wortes, und im verächtlichen Verſtande, eine Perſon, welche viel und unnütz plaudert. In engerer Bedeutung, welche Dinge, die verſchwiegen bleiben ſollten, ausplaudert. Eine ſolche Perſon pflegt man im g. L. auch wohl ein **Klatſch-Maul**, ein **Klatſch-Weib**, eine **Klatſch-Triene**, u. ſ. f. zu nennen; L. Delator, Nugator; Mulier garrula, loquacula.

Klatſcherey, oder **Klätſcherey**, im verächtlichen Verſtande, ein Geſchwätz, doch nur in engerer Bedeutung,

ung, ein Andern nachtheiliges Geschwätz, wodurch Uneinigkeit und Zank gestiftet wird. Eine Klatscherey anrichten.

Klatschhaft, geneigt zu klatschen, d. i. viel und unnütz zu schwatzen, imgl. Dinge, welche verschwiegen bleiben sollen, auszuplaudern, im verächtlichen Verstande, wofür im g. L. auch **klatschicht** üblich ist; L. garrulus, loquaculus. Daher die **Klatschhaftigkeit**.

Klätt-Buch, s. Kladde.

Klatte, ein nur in den gemeinen Sprech-Arten, besonders Nieder-Sachsens, übliches Wort, verworrene Fäden, imgl. einen festen Büschel verworrener Haare, zu bezeichnen. Figürlich bedeutet es auch einen Streit, Proceß.

Daher die Nieders. **klatterig**, verwirret, zerlumpt; **klattern**, sich verwirren, u. s. f. Siehe **Klette**, zu welchem Worte es gehört.

Klatze, im Bergbaue, ein offenes Pochwerk ohne Dach im freyen Felde.

Es scheint durch eine harte Aussprache aus Glatze entstanden, und eine figürliche Bedeutung dieses Wortes zu seyn; s. Th. XIX, S. 3, f.

Klaubeln, s. das Folgende.

Klauben (*). 1. Eigentlich, mit den zwey vordern Fingern wegnehmen; L. carptim legere, digitis carpere, Fr. éplucher, monder. Das Unreine aus den Erbsen, aus den Samenkörnern, u. s. f. klauben oder herausklauben.

2. Figürlich.

(1) Auf solche Art reinigen, das Gute von dem Schlechten und Untauglichen auf solche Art absondern, im

(*) Im Nieders. kluven, wo aber auch vuken und puken, wenigstens in einigen Fällen für klauben gebraucht werden. Es gehört mit dem folgenden Klaue zu klieben, spalten, weil die zwey Finger, mit welchen das Klauben zunächst verrichtet wird, eine Zange, ein gespaltenes Ding, oder auch einen Haken vorstellen.

im g. L., beſonders Ober-Deutſchlandes; im Hoch-Deutſchen leſen. Den Salat klauben, die Erbſen klauben, die Wolle klauben.

Inſonderheit auch im Bergbaue, das Erz klauben, L. ſeligere meliores particulas, Fr. aſſortir, eine Arbeit der Berg-Jungen, die erſt zum Bergwerke kommen, da ihnen das kleine Erz auf eine, wie ein Tiſch gemachte, Bühne geſchüttet wird, und ſie das Gute vom Schlechten und von tauben Bergen, jedes in beſondere Körbe ausleſen und abſondern müſſen. Daher: **Klaube-Bühne**, eine Art Tiſche, über welche die Jungen und Anfänger die Erze ausleſen, um die Arten kennen, und das Gute vom Tauben abſondern zu lernen. **Klaube-Junge**, ein Berg-Junge, welcher die Erze auf der Klaube-Bühne ſortiret. Das **Klauberig** oder **Klaubericht**, das gute (Stuf-) Erz, welches die Berg-Jungen von den kleinen Gängen ausgeklaubet haben; Fr. Triage.

(2) Mit kleinen Biſſen nagen oder eſſen, die Speiſe bloß verſuchen, daran zwicken, beſonders im Oberdeutſchen, wo man auch die Diminutiva hat, **kläubeln, kläbeln, kläbern**, im Oeſtreich. klemenzeln, von menzeln, eſſen, klebeiſſeln, von beiſſen, L. ambedere, decerpere, dentibus abradere, carpere hinc inde aliquas particulas eſcae; Fr. ronger, pinocher; ſie iſſet nicht, ſie klaubt nur, Fr. elle ne mange pas, elle ne fait que pinocher. An einem Beine klauben, weil man ſatt iſt, oder aus Naſchhaftigkeit; nagen, L. carpere particulas carnis in oſſe adhuc pendentes; Fr. ronger un os.

(3) Grübeln, im g. L. Lange über etwas klauben. Eine Sache heraus klauben, Niederſ. klüſern, L. ſcrutando perveſtigare.

Sprichw. Er wird an dem Handel, an der Krankheit, zu klauben haben, Fr. il aura de la peine à ſe tirer d'affaire.

Da-

Daher der Klauber, Fämin. die Klauberinn, ne Perſon, welche klaubet, d. i. das Gute von dem Schlechten mit den zwey vordern Fingern abſondert. Erz-Klauber, im Bergbaue.

ube-Bühne,
ube-Junge,
uber,
ubericht, Klauberig, } ſ. im vorhergeh. Artikel.

ue, ein Wort, in welchem ſich zwey verſchiedene, er doch verwandte, Begriffe mit einander ver-nigen.

1. Des Spaltens, ſowohl eine Spalte, als auch n geſpaltenes Ding zu bezeichnen. Im Niederſ. iſt lôve und Klove, eine Spalte (im Oberd. Klinſe), nd Klave, ein geſpaltenes Ding, z. B. ein Scheit olz, eine Art Semmeln in Geſtalt eines halben Mon-es, welche mit einem Einſchnitte verſehen ſind. Im ochdeutſchen iſt die Klaue an den Pumpen, ein, n wenig winkelig zugehauenes halb geſpaltenes Stück ichen-Holz, welches den Schwängel trägt, und urch welches ein eiſerner Bolzen geht; ſ. Th. VII, 5. 98. Beſonders bezeichnet man damit den geſpal-nen Huf mancher Thiere, z. B. der Hirſche, des orn-Viehes, der Schafe, der Schweine, der Zie-en, u. ſ. f. wo denn auch die Spalte ſelbſt dieſen Nahmen führt; L. Vngula, Fr. Ongle. Thiere mit eſpaltenen Klauen, Fr. Bêtes, qui ont les pieds ourchés. Zweyklauige Thiere, L. Animalia biſul-a. Der hornige Theil an den Klauen, wird die Scha-, oft aber gleichfalls die Klaue genannt. Die Elends-Klaue, Schaf-Klaue, u. ſ. f. Figür-ch iſt die Klaue, zuweilen, ein mit ſolchen Klauen erſehenes Thier. Unſer Vieh ſoll mit uns gehen, nd nicht eine Klaue dahinten bleiben, 2 Moſ. 10, 6. Siehe Klobe, Kluft, welche in andern Fällen afür üblich ſind.

2. Des

2. Des Greifens, Faſſens, und des damit verbundenen Begriffes eines Hakens. In dieſem Verſtande führen überhaupt die Finger an den Händen, und die Zehen an den Füßen der Thiere, ſo fern ſie zum Faſſen oder Angreifen dienen, beſonders wenn ſie mit krummen, hornartigen Auswüchſen verſehen ſind, den Nahmen der Klauen. Von Menſchen braucht man es für Hände oder Finger nur in der niedrigen Sprech-Art, und im harten und verächtlichen Verſtande. Etwas in ſeine Klauen bekommen. Diebs-Klauen haben, mauſen, ſtehlen; Fr. jouer de griffe. Von Thieren iſt es beſonders von den krummen, hornigen, vorn ſpitzigen Auswüchſen an den Zehen der Raub-Vögel, und gewiſſer vierfüßigen Thiere, welche damit kratzen, ihren Raub packen, feſt halten und zerreiſſen, Fr. Griffe, Harpe, oder Patte (*), und in weiterer Bedeutung von den Zehen und dem ganzen Untertheile der Füße ſelbſt üblich. Seine Klauen einſchlagen, wie Raub-Vögel und Raub-Thiere zu thun gewohnt ſind. Mit den Klauen ergreifen, halten, Fr. empieter. Bey kleinern Vögeln und Thieren, iſt dafür im g. L. auch das Wort Kralle üblich. In weiterer Bedeutung wird auch wohl der Huf eines Pferdes oder Eſels eine Klaue, oder ungeſpaltene Klaue genannt, weil ſie damit im Gehen auf dem Boden gleichſam eingreifen.

In der zweyten Haupt-Bedeutung bey dem Notker Chlauuo, in dem alten Gedichte auf den h. Anno Clawi, im Oberdeutſchen Klaa, im Niederſ. Klaue, im Engl. Claw, im Dän. Kloe, Klov, im Schwed. Klo, Klöf im Isländ. Klö, im Angelſ. Clawe. Siehe Klieben. Im Niederſ. iſt Kluve, auch eine Handvoll. In der Bedeutung

(*) In der Jäger- und Falkenier-Sprache iſt das Wort Serres, und im Deutſchen Fänge, von Raub-Vögeln gewöhnlicher. Die Klauen eines Adlers, Falken ꝛc. les ſerres de l'aigle, du faucon. Die Hinter-Klaue eines Raub-Vogels, heißt im Fr. Avillon.

ung der Finger der Hand, gehört auch das alte Laf, die Hand, hierher.

Von verschiedenen Zufällen, denen die Klauen des Rind-Viehes unterworfen sind, folgt unten ein besonderer Artikel.

Das aus den Klauen des Rind-Viehes ausgekochte Fett, (Klauen-Fett, Klauen-Schmalz,) L. Pinguedo ex vngulis bouinis excocta, wird sowohl zum Brennen in der Lampe, als auch wieder den Rost des Eisens, Schlösser an Thüren und Schieß-Gewehre damit einzuschmieren, gebraucht.

Von dem Gebrauche der Klauen zur Düngung, s. im XXV Th. S. 261, fgg.

Wenn man bey dem Ziegel-Brennen, wenn der Brand vorbey ist, und die Schür-Löcher zugemauert werden sollen, Hörner und Klauen nebst Ellern-Wurzeln in die Schür-Löcher wirft, bekommen die Ziegel vom Rauche eine schwarzgraue Farbe.

Bey der Holz-Flöße auf der Elbe, werden drey an einander gebundene und in die Rundung zusammen geflochtene Wieden, Klauen genannt.

Bey den Juwelieren und Edelstein-Fassern, heißen Klauen, Fr. Griffes, an der Fassung (serrisure) eines Steines, die hier und da weiter heraus gehenden conischen Häkchen, welche, indem sie auf ein und andere Faßetten desselben umgebogen sind, sich fest an den Stein anschließen, daß er nicht aus der Fassung fallen kann. An einem Ringe sind gemeiniglich 8 solche Klauen.

Bey den Schlössern, führt den Nahmen Klaue, Fr. Griffe, eine Menge umgebogener Eisen, deren man sich bedient, andere Eisen in der gegebenen Stellung zu erhalten, oder auch, sie wieder in die vorige Stellung zu bringen, wenn sie daraus gewichen sind. Sie führen, nach ihrer verschiedenen Bestimmung,

ver-

verſchiedene Nahmen, als: Spreng-Gabel, d. i. ein Stück Eiſen, auf welches zwey eiſerne Nägel ſenkrecht geſchweißt ſind, welche gleichſam zwey Zähne vorſtellen, und womit man das Eiſen ſchneckenförmig oder auf andere Art beuget; ſ. Th. XVIII, S. 554; Lehre, d. i. ein eiſernes Stäbchen, welches an beyden Enden eine winkelrecht umgebogene Spitze hat, und deſſen man ſich als eines Stangen-Zirkels bedient. Auch hat man ein Inſtrument, welches die Geſtalt eines > hat, und womit die Kämme der Schlüſſel gezeichnet werden.

In Bergwerken, heißen **Klauen**, die zwey krumme Haken an der Pfote des Fall-Hammers, mit welchen die Klapper-Mühle an dem Damm-Loche des Cylinders einer Feuer-Maſchine zu rechter Zeit auf- und zugemacht wird. Dieſe Klauen bewegen den Bügel des Hammers im Hin- und Herfallen deſſelben.

Mit der Benennung **Klaue** belegt man auch ein Stück, welches von einem ſäulen- oder kegelförmigen Körper dergeſtalt geſchnitten wird, daß der Schnitt ſchräge durch die Grundfläche geht. Man hat dergleichen cylindriſche und paraboliſche Klauen.

Auch die Gärtner bedienen ſich dieſes Wortes, und nennen die Ranunkel-Zwiebeln, oder vielmehr die Senker von den zwiebelartigen Wurzeln der Ranunkeln, **Ranunkel-Klauen**, Fr. Griffes de renoncules. Auch die Wurzeln der Anemone, Griffes oder Pattes d'anémone.

Figürlich braucht man das Wort **Klaue** von der Uebermacht, die jemand über einen Andern ausübt, wie auch von der Raubſucht derer, die von der Chicane Profeſſion machen. Er hat ihn in ſeine Klauen bekommen, d. i. er hat ihn unter ſeiner Gewalt, Fr. il le tient ſous ſa griffe. Dieſer Procurator wird

ihn

ihn nicht eher aus seinen Klauen lassen, als nachdem er ihn um Habe und Gut wird gebracht haben, (als bis er ihn völlig zum armen Mann gemacht hat,) Fr. il sera ruiné avant de pouvoir sortir des griffes de ce Procureur.

Klaue, (After-) s. **Gedärme**, im XVI Th. S. 505.

Klauen-Fett, siehe oben, S. 383.

Klauen-Geld, s. **Klauen-Steuer.**

Klauen-Schmalz, s. oben, S. 383.

Klauen-Seuche, s. **Klauen-Zufälle.**

Klauen-Steuer, in einigen Gegenden, eine Steuer oder Abgabe, welche von dem zahmen vierfüßigen Viehe, besonders aber von dem Horn-Viehe, gegeben wird; das **Klauen-Geld**, der **Klauen-Thaler**, so fern sie in einem Thaler von jedem Stücke Horn-Vieh besteht, (wo **Klaue** figürlich, ein mit Klauen versehenes Thier bedeutet;) der **Vieh-Schatz**, die **Vieh-Steuer**. Siehe **Vieh-Steuer**.

Klauen-Winde, siehe unter **Winde.**

Klauen-Würmer, s. **Klauen-Zufälle.**

Klauen-Zehent, an einigen Orten der Zehent, welcher von dem mit Klauen versehenen zahmen Viehe gegeben wird.

Klauen-Zufälle, bey dem Rind- und Schaf-Viehe. Die Klauen werden entweder durch äusserliche Gewalt verletzet, oder sie spalten und schiefern sich von selbst, und das Vieh wird krumm. In beyden Fällen lässet man 2 Loth frisches Tannen-Pech, und eben so viel Schaf-Talg, nebst 1 Loth gelben Wachs, bey gelindem Feuer schmelzen, streicht davon ziemlich dick auf starke Leinwand, in Gestalt eines Pflasters, legt es über die Klauen, und bindet es oberhalb zusammen. Dieses Mittel erneuert man jeden dritten Tag, und fährt damit bis zur Besserung fort. Während dieser Zeit muß das Vieh im Stalle bleiben, und der Bo-

den des Stalles durch vieles Ueberſtreuen trocken und rein gehalten werden.

Wenn ein Stück Vieh Schaden an den Klauen bekommt, darf man es nur zwiſchen den Klauen mit warmen Oehl und Pech, welches vorher durch einander wohl zerlaſſen iſt, ſchmieren. Schiefert und ſpaltet ſich das Horn an den Klauen, ſo muß man ihm dieſe zuvor mit Salz und Weineſſig, unter einander vermiſcht, bähen, darnach alte ausgeſchmolzene Butter mit neuen Pech oder Harz zerlaſſen, und darüber ſchlagen. Oder, man ſchmiert ihnen das Gelenk unten an dem Fuße, 5 oder mehr Tage nach einander damit, ſo erweicht und mildert es das Horn, und nimmt die Schrunden weg.

Wenn das Hornvieh Schaden und Schmerzen zwiſchen den Klauen hat, ſoll man Schaf-Talg ſchmelzen, daſſelbe ſo warm darauf gießen, als es ſolches leiden kann, und einen Lappen darüber nähen, auch ſoll man es 1 oder 2 Mahl des Tages waſchen, und mit Thran beſchmieren.

Das Weide-Vieh beſchädigt ſich öfters die Klauen durch das Antreten derſelben, auch Eintreten ſpitziger ſcharfer Sachen, als: Steine, Dornen, Nägel, u. ſ. f. Es geſchieht aber auch zuweilen von Stall-Kühen, daß ſie nur daran hinken, ſondern auch ſo ſehr Schmerzen leiden, daß ſie darüber die Freß-Begierde verlieren, an Kräften abnehmen, und daher mit Milchgeben ſehr nachlaſſen. So bald man das Hinken eines Thieres wahrnimmt, muß man den Fuß unterſuchen, reinigen, und die fremden Körper heraus bringen. Iſt aber nur das Horn eingeriſſen oder angeſpalten, muß man es ſo weit ab- und gerade ſchneiden, als der Riß geht. Zuweilen iſt der Schade an der einen Spitze der Klauen, wo eine Oeffnung entſtanden iſt, welche Sand und Steinchen bis auf das Leben kommen läſſet, wovon die Thiere am meiſten leiden. Hat man

das

das Eingetretene ausgeschnitten oder heraus gezogen, und die beschädigte Stelle gerade geschnitten, nimmt man ein heißes Eisen, wogegen ein Stück Rinds- oder Hammel-Talg gehalten wird, daß das Abträufelnde des Talges auf die beschädigte Stelle komme. Man nimmt auch von dem steifen, von den Wagen-Achsen abgemachten, Theer, überdeckt damit den Schaden, umwickelt sodann den Fuß mit einem Lappen, und lässet das Thier so lange im Stalle ruhig stehen, bis es nicht mehr hinkt. Sollte der Schade schon zu Eiter gegangen seyn, so wird Fäll-Wasser (*) hinein gegossen, wovon das Leben zurück getrieben wird, als welches in solchem Falle gern hervor dringt.

Wenn bey Ochsen oder Kühen die Klauen von einander reissen und aufspalten, welches man eine Horn-Kluft nennt, kann man entweder oben beschriebene Mittel, oder folgende Horn-Salbe, gebrauchen. Man nimmt gelbes Wachs, gelbes Pech-Harz, Hirsch-Talg, von jedem ¼ ℔.; ungesalzene Butter, ½ ℔., und eben so viel Terpenthin, lässet es in einem neuen Tiegel über einem Kohlfeuer wohl zergehen, bis es die rechte Dicke einer Salbe hat. Oder: man nimmt Schaf-Talg und weißes Tannen-Pech, von jedem 1 ℔.; Wachs und Wagenschmier, von jedem 1½ ℔., lässet alles wohl unter einander zergehen, und rührt es um, bis es gesteht.

(*) Fäll-Wasser, ist dasjenige blaue Wasser, welches zurück bleibt, wenn Silber in Scheide-Wasser aufgelöset, sodann mit 8 bis 12 Mahl so viel oder mehr Brunnen-Wasser vermischt, und alsdann eine Kupfer-Platte hinein gelegt worden, bis das Silber sich wieder zu Boden gesetzt hat, wovon das Wasser über dem Silber von dem Kupfer blau wird. Kann man dieses Wasser, welches besonders von den Roß-Aerzten sehr gesucht wird, nicht aus den Münzen haben, so darf man nur Scheide-Wasser mit 12 Mahl so viel, oder mehr, Brunnen-Wasser mischen, und Kupfer hinein legen, bis das Wasser blau wird, so hat man das Fäll-Wasser, welches auch bey andern Zufällen gebraucht wird.

Das Kerbweh, (oder, wie es die Landleute im Braunſchweigiſchen nennen, Karfeihen, oder Karfweih,) iſt ein Zufall, den das Rindvieh an den Füßen in der Spalte zwiſchen den Klauen bekommt, und der ihm Hinken verurſacht. Es wird ihm alsdann die Kerbe inwendig zwiſchen den Klauen entzündet, geſchwollen, und zuweilen gar wund, ſo, daß die Thiere nicht auf den Fuß treten können. Das Uebel entſteht, wenn das Vieh lange im Naſſen gehen muß, und äuſſert ſich inſonderheit in naſſen Jahren und auf ſumpfigen Weiden. Das beſte Mittel dagegen iſt, wenn man große ſchwarze Schnecken, die bey naſſen Jahren häufig zu ſeyn pflegen, in Salz umwendet, und ſolche dem kranken Viehe, theils zwiſchen die Klaue in die Spalte, theils um die äuſſern Theile des beſchädigten Fußes legt, und mit einem leinenen Lappen ſo feſt umwindet, daß der Umſchlag nicht abfallen kann; und auf dieſe Weiſe das Vieh 24 Stunden ſtehen läſſet. In Ermangelung der Schnecken, nimmt man in Salz umgewandten Speck.

Von einer beſondern Art einer mit Hinken begleiteten Klauen-Seuche, ſ. im XXIII Th. S. 561, fgg.

Von dem Fiek an der Spitze der Klauen, ſ. im XIII Th. S. 338, f.

Wenn Ochſen zum Mäſten lange in Ställen ſtehen, dann weit auf heißen Boden gehen, und wieder in feuchte Gegenden kommen, ſo entſteht eine Entzündung in der Oberfläche des gereiften Fleiſches an den Klauen, und das Horn fällt von dem letzten Finger-Knochen ab. Wenn man bemerkt, daß ein Ochs zu hinken anfängt, muß man ihn in einen trocknen Stall ſtellen, eine Salbe aus 1 Th. Honig, und 2 Th. Wein-Hefen, um den Fuß ſchlagen, und dieſen Umſchlag alle 12 Stunden erneuern, bis das Thier nicht mehr hinkt. Iſt die Klaue weggefallen, ſo ſchlage man feines Leinen oder Werg mit einer Salbe von Honig und Ofen-Ruß,

zu

zu gleichen Theilen vermiſcht, etwas dick beſtrichen, um, und beſprenge dieſen Verband täglich mit Brannt-Wein. Den erſten Verband muß man bis zum 5ten Tage liegen laſſen. Wenn ſich neues Horn zeigt, hat man nur mit gezupftem Werg zu verbinden, und das Vertrocknen deſſelben zu hindern. Alle Oehle, Fette, andere Salben und zuſammenziehende Mittel, ſind hier ſchädlich.

Hrn. Vitet's Unterricht in der Viehartzeneykunſt, aus dem Franz. überſ. von D. Hennemann, 2 Th. 1 B. Lemgo, 1785, 8. S. 557, f.

Es gibt auch **Klauen-Würmer.** Es entſteht nähmlich zwiſchen den Klauen der Schafe zuweilen ein kleines Loch, woraus bey dem Aneinanderreiben der Klauen, Eiter, und eine Art von langen Haaren, die aber wahre kleine Würmer ſind, hervor kommen. Nach Hrn. Vitet Erzählung, wurde ein fünfjähriger Ochs, im J. 1765, bey der großen Sommer-Hitze von einer Entzündungs-Geſchwulſt befallen, welche die ganze innere und vordere Seite des rechten Schenkels einnahm; nach 8 Tagen bemerkte man eine Oeffnung an der innern Seite der äuſſerſten Klaue, und am folgenden Morgen wurde man noch mehr in Verwunderung geſetzt, als durch ſtarkes Zuſammendrücken der benachbarten Theile ein Wurm aus dem Loche heraus gedränget wurde. Man empfiehlt wieder dieſe in oder zwiſchen den Klauen befindlichen Würmer, die Klauen rings um die Oeffnung bis auf das Blut abzuraſpeln oder abzuſchneiden, und ſodann Oehl, oder einen Tobacks-Aufguß mit Koch-Salz einzugießen; Vitet aber hält es für beſſer, eine Oeffnung mit einem guten Biſtouri zu machen, die Höhle mit einer Salbe von Ofen-Ruß und Honig auszufüllen, und die Wunde mit Terpenthin-Tinctur bis zur völligen Vernarbung zu verbinden. Dieſe Methode iſt bey dem Rindviehe, bey Ziegen und Schafen, mit Nutzen zu gebrauchen.

Vitet, a. ang. O. S. 528, f.

Klauſe. 1. Ehedem überhaupt ein enger eingeſchloſſener Raum: in welcher veralteten Bedeutung Walther von der Vogelweide den Leib der Jungfrau Maria eine Klus nennet.

In dem Bergbaue, iſt die **Klauſe** eine Grube, in welcher die Fluth, d. i. das fließende Waſſer, bey den Zwitter-Wäſchen aufgefangen wird.

Am üblichſten iſt es noch von der Zelle in einem Kloſter, oder von dem Orte, wo die Ordens-Geiſtlichen in einer Gemeinſchaft leben müſſen, und in den, wenn es ein Manns-Kloſter iſt, kein Frauenzimmer, die vornehmſten Fürſtinnen und Prinzeſſinnen ausgenommen, gehen darf; iſt es aber ein Frauen-Kloſter von ſtrengerer Obſervanz, ſo darf auch kein Fremder, und nur im Nothfalle, und in Gegenwart mehrerer Kloſter-Jungfrauen, der Beicht-Vater und der Leib-Arzt, hinein; in andern Klöſtern von minderer Strenge werden mit Erlaubniß der Obern auch zuweilen Fremde eingelaſſen. Die einzelnen Wohnungen der Einſiedler nannte man auch **Klauſen** oder **Kluſen**.

2. Ein enger Paß in einem Gebirge, in welchem Verſtande es noch im Oberdeutſchen häufig iſt.

3. **Klauſen**, heißen auch feſte Schlöſſer auf hohen ſteilen Felſen; ſ. im Art. Schloß.

Es iſt ungewiß, ob dieſes Wort zunächſt aus dem mittlern Lat. Clauſa und Cliſa, oder dieſes von jenem, abſtamme. Das Zeit-Wort klauſen, welches das Stamm-Wort von ſchließen und Schleuſe iſt, war ehedem nicht ſelten, und iſt allem Anſehen nach mehr ein Seiten-Verwandter, als ein Abkömmling von dem Lat. claudere. S. Schleuſe und Schließen.

Im Holländ. iſt Kluyſe ein jeder enger Eingang. Im Engl. iſt Cloſet, ein enges, geheimes Zimmer.

Klauſener, (der) zuſammen gezogen **Klauſner**, Fämin. die **Klauſnerinn**, im g. L., beſonders Ober-Deutſchlandes, ein Einſiedler; ein Mönch, der aus beſonderer

rer Liebe zum einſamen und beſchaulichen Leben, ſich allen Umgang mit Menſchen, auch ſo gar mit ſeinen eigenen Mitbrüdern unterſagte, und in einen mehrentheils unterirdiſchen Behälter einſchließen ließ.

Klauſener-Sauer-Brunnen. In dem Dorfe Klauſen, oder Glauſen, unweit Gleichenberg in Steyermark, befindet ſich ein vortrefflicher Stahl-Brunnen, welcher ſehr ſpirituös iſt, einen angenehm ſäuerlichen Geſchmack hat, und ſich verführen läſſet.

Nach Hrn. D. v. Gleisner Verſuchen, hat dieſes hellklare Waſſer einen ſalzigen, etwas zuſammenziehenden Geſchmack. Wenn es in einer Flaſche wohl verwahrt unter einander geſchüttelt wird, brauſet es ſehr heftig, mit Gefahr die Flaſche zu zerſprengen. Alsdann verliert es von dem flüſſigen Weinſtein-Salze ſeine Helle und Klarheit nicht, auch macht es keine Aufwallung; auch wird es von dem Veilchen-Safte nicht verändert; auch von eingetröpfelter Vitriol-Säure entſteht nicht die mindeſte Bewegung; auch die Milch wird durch dieſes Waſſer nicht verändert; von dem hinein geſtreueten Galläpfel-Pulver aber entſteht ſogleich eine purpurfarbige Tinctur; und wenn man es mit dem Galläpfel-Decocte vermiſcht, kommt eine ſchwärzliche Farbe zum Vorſchein. Alſo ſcheint dieſer Brunnen von einer vitrioliſchen und flüchtigen Art zu ſeyn. Hr. v. Cranz ſchätzt dieſes Waſſer in manchen Fällen dem Spa-Waſſer gleich.

J. F. Zückert ſyſtemat. Beſchreib. aller Geſundbrunnen und Bäder Deutſchlands, Königsb. 1776, gr. 8. S. 592, f.

H. J. v. Cranz Geſundbrunnen der öſterreich. Monarchie, Wien, 1777, gr. 4. S. 101, f.

Klauskopf, im g. L. einiger Gegenden, z. B. im Lauenburgiſchen, eine Art Aale mit einem dicken Kopfe, von Kloß, Klotz; ſ. dieſe Wörter.

Klausrapp, Corvus Eremita; ſiehe Wald-Rabe, im Art. Rabe.

Klauſtern, in Schleſien, ſchlechte Kleidungsſtücke.
Klauſur, ſiehe **Clauſur**, im VIII Th. S. 192.
Klave, ſiehe **Klaue**.
Klavier, ſiehe **Clavier**, im VIII Th. S. 193.
Kleback, wird, in den Zucker-Siedereyen, die Thon-Erde genannt, die zur Reinigung der Zucker-Hüte in den Formen gebraucht wird, und mit welcher dieſelben bedecket werden. Siehe im Art. **Zucker**.
Klebe, Cuscuta; ſ. **Flachs-Seide** im XIV Th. S. 5.
Kleben, iſt in doppelter Geſtalt üblich.

1. Als ein Neutrum, welches im Hochdeutſchen ſowohl als auch im Oberdeutſchen, die Hülfs-Wörter haben und ſeyn bekommt. Im Hochdeutſchen gemeiniglich das Hülfs-Wort haben. Es hat nicht lange geklebet, ſondern iſt bald abgefallen. Aber auch das Hülfs-Wort ſeyn, wenn der Ort, wo etwas klebt, dabey genannt wird; z. B. das Pech iſt ihm an den Fingern geklebet. Die Zunge iſt mir an den Gaumen geklebet. Die Kletten ſind an dem Kleide geklebet.

1. Eigentlich, hangen bleiben, am eigentlichſten von Dingen, welche vermittelſt einer zähen Feuchtigkeit an andern hangen bleiben. An etwas kleben bleiben. Die Zunge klebte mir vor Durſt an dem Gaumen. Das Pech klebt an den Händen, der Koth an den Kleidern. Er klebt von Kothe, im g. L., wenn man ihn angreift, bleibt die Hand an ihm kleben. Imgl. vermittelſt eines oder mehrerer Haken hängen bleiben. So bleibt in der Feuerwerks-Kunſt eine Anker-Kugel kleben, wenn ſie ſich mit ihren Haken anhängt; **Klebe-Kugel**, ſ. unter **Kugel**. Die Kletten kleben, wenn ſie ſich vermittelſt kleiner Haken anhängen. Die Lerchen bleiben in dem Klebe-Garne kleben, wenn ſie ſich mit den Flügeln in deſſen weiten Maſchen verwirren, und darin hängen bleiben; ſ. **Klebe-Garn**.

2. Figürlich. (1) An einem Orte kleben bleiben, im g. L., sich länger als nöthig daselbst aufhalten. (2) Die Hände kleben lassen, gern heimlich etwas entwenden; gern etwas an den Fingern kleben lassen, kleberige Hände oder Finger haben. (3) Es bleibt nichts bey ihm kleben, er behält nichts, fasset nichts in dem Gedächtnisse; auch nur im g. L. (4) An etwas kleben, sein Herz daran hängen, demselben auf eine dauerhafte Art ergeben seyn, gemeiniglich im verächtlichen Verstande. An alten Sitten und Gewohnheiten kleben. (5) Auf eine dauerhafte Art mit etwas verbunden seyn, doch nur noch am häufigsten in den zusammen gesetzten ankleben, und bekleben.

Ankleben. 1. Vermittelst eines Klebers, oder einer zähen Feuchtigkeit an etwas befestigt seyn. Das Papier klebet an der Wand an. 2. Imgl. in weiterer Bedeutung, für anhangen. Die Kletten kleben gern an die Kleider an. Wie auch 3. in figürl. Bedeutung, auf sittliche Art mit etwas verbunden seyn. Diese Unart klebet ihm noch von seiner Jugend an. Diese Schwachheit klebet mir nicht an. Einem ankleben, im g. L. ihm anhangen, seine Partey nehmen.

Bekleben, kleben bleiben, sowohl in eigentlicher Bedeutung, als figürlich, für anwachsen, fortdauern, u. s. f.

In beyden Bedeutungen ist dieses Wort von bekleiben größtentheils verdränget worden. Indessen heißt es nach Hiob 31, 7. nach Luther's Uebersetzung: Ist etwas in meinen Händen beklebet? wofür Hr. Ritter Michaelis setzt: blieb etwas an meinen Händen kleben?

II. Als ein Activum, kleben machen, vermittelst einer zähen Feuchtigkeit befestigen; in welchem Verstande es im Hochdeutschen sehr häufig für das richtigere kleiben gebraucht wird; siehe dasselbe.

Bekleben, vermittelst einer klebenden Sache mit etwas überziehen, welche Bedeutung aber nur dem Worte bekleiben zukommen sollte. Mit Papier,

mit Leinwand bekleben. Daher die Beklebung, in dieſer thätigen Bedeutung.

Als ein Neutrum bey dem Ottfried kliwan und kleban, bey dem Notker chleben, im Niederſ. kliven und kleven, im Angelſ. cleofan, im Dän. klæbe, im Schwed. klibba, im Poln. kleie, ich klebe. Ottfried braucht es auch theils für ankleben, theils für anhangen, mit der dritten Endung der Perſon, theils für liegen. Im Griech. iſt γλια Leim, Lat. Glus, Gluten, Franz. Glu. Bemerkt man, daß der Gaumen-Buchſtab ſich in manchen Mund-Arten ſo gern an die flüſſigen Mit-Lauter hängt, ſo wird man den Stamm dieſes Wortes in Lab, liefern, geliefern, finden. S. dieſe Wörter. Im Wendiſchen iſt lepiu, lepenza, kleben, ohne Gaumen-Laut. Siehe auch Klamm, Kleiben, Kleiſter, Klette, Kley, Leim, u. ſ. f.

Klebe-Auſter. Dieſe Baſtard-Muſchel, Anomia Ephippium *Linn* iſt einiger Maßen rund, runzelig gefalten, am glatten Deckel mit einer Oeffnung verſehen, gebogen, gekräuſelt, inwendig ſilber- auswendig goldfarbig, auch perlenfarbig, grün, bernſteinartig, purpurroth. Man findet einige, welche eine flache Hand breit; andere, welche nur 1 oder 1½ Zoll groß ſind. Das Loch in der platten Schale iſt ein großer, bogenförmiger Ausſchnitt gleich am Schloſſe. Man erhält ſelten beyde Schalen, gemeiniglich nur die vertiefte; und dieſe wird in den Cabineten gemeiniglich die Zwiebel-Schale, Fr. Pelure d'Oignon, genannt. Es werden dergleichen beſonders an der Küſte von Dalmatien gefunden.

Klebe-Feuer, in der Feuerwerks-Kunſt, ein Zünd-Feuer, welches, wenn es angezündet und an Gegenſtände geworfen wird, an denſelben bleibt, und ſie anzündet. Das griechiſche Feuer (ſ. Th. XIII, S. 17, f.) iſt eine Art deſſelben.

Klebe-Garn, Klebe-Netz, im Jagdweſen, eine Art feiner Lerchen-Garne mit ſehr weiten Maſchen, in welchen die Lerchen, wenn ſie auffliegen wollen, kleben oder hängen bleiben. Siehe Lerche.

Ein

Ein hohes Klebe-Garn, womit die Feld-Hühner gefangen werden, wird das Hoch-Garn genannt; ſ. unter Repphuhn.

Klebe-Kraut, ein Nahme verſchiedener Pflanzen, deren Theile ſich gern an die Kleider anhängen.

1. Einer Art des Lab-Krautes, mit rauhen Blättern und rauhen Knoten und Früchten, welche mit ſteifen Borſten beſetzt ſind; **Kleber, Kleber-Kraut, Kleberich,** Galium Aparine *L.* ſ. im II Th. S. 279, fgg.

2. Einer Art des Dreh-Krautes, welches auf den Ruinen in den Feldern wächſt, Tordylium Anthriſcus *L.*

3. Einer Art des Kletten-Kerbels, Valantia Aparine *L.*; ſ. unter **Klette.**

4. Auch die kleine Klette, Xanthium ſtrumarium *L.* iſt unter dem Nahmen des **Klebe-Krautes** bekannt; ſiehe **Klette.**

Klebe-Läppchen, ein nur im g. L. in der R. A. üblices Wort, jemand ein Klebe-Läppchen anhängen, ſowohl ihm etwas nachtheiliges nachſagen, als auch ihn verſpotten. Im Oberd. ein Klamperle.

Klebe-Laus, Filz-Laus; ſiehe **Laus.**

Klebe-Lychnis, ſ. Lychnis.

Klebe-Netz, ſ. Klebe-Garn.

Klebe-roth, ſ. Klee-roth.

Klebe-Spindel, ſ. Spindel.

Klebe-Werk, ſ. Kleibe-Werk.

Klebe-Wurzel, Färber-Röthe; ſ. Röthe.

Kleber. 1. Im g. L. einiger Gegenden, das Gummi, wegen ſeiner klebrigen Eigenſchaft.

2. Bey den Tuchmachern werden die Haken an den Rähmen, woran das Tuch ausgeſpannet wird, **Kleber** genannt, weil das Tuch daran gehänget wird; in welcher Bedeutung es zunächſt zu Klaue zu gehören ſcheint.

Kleber-Klee, (türkischer) s. Esparsette.

Kleber-Kraut, Kleberich; s. Klebe-Kraut.

Klebericht, dem Kleber, oder einer zähen Feuchtigkeit ähnlich. Im Oberd. klebicht.

Kleberig, Kleber, d. i. eine zähe, bindende Feuchtigkeit enthaltend; L. viscosus. Fr. visqueux, gluant, glueux, glutineux. Pech, Leim, Gummi ꝛc. sind kleberige Materien. Kleberige Hände haben, von einem zähen Schweiße, Nieders. klamm. Im Oberd. klebig, im Nieders. klevisk, klefok.

Kleck, (der) ein Flecken, welcher von einem Tropfen eines flüssigen Körpers herrührt, im g. L. auch ein **Klecks.** Einen Kleck mit Tinte auf das Papier machen.

Es ahmet, wie so viele andere, den Laut nach, welcher dadurch, wenigstens in einigen Fällen, entsteht. Siehe Klack, welches einen gröbern Schall dieser Art ausdruckt.

Bey den Tuch-Bereitern, heißt Kleck, Fr. Machure, wenn die Schere das Haar bey dem Scheren nur zwischen die beyden Blätter drückt, ohne solches zu schneiden.

Figürlich, jemanden einen Kleck, einen Klecks, oder im Diminut. ein Kleckschen anhängen, ihm etwas nachtheiliges nachsagen, oder ihn verspotten. S. Klebe-Läppchen und Klette.

Im Nieders. Klack, Klacks, im Dän. Klik, Klak. Im Schwed. ist Klikka, ein Flecken, und Kiaek, Schande, im Isländ. aber Hblak, und im Schwed. Lack, ein Fehler.

Daher 1. **klecken,** einen Kleck oder Klecks machen, Fr. barbouiller. Die Feder kleckt, wenn sie ganze Tropfen Tinte auf das Papier fallen lässet. Im Schreiben klecken, Klecke machen. **Beklecken,** Nieders. beklacken, mit Klecken bewerfen, und in weiterer Bedeutung, beflecken. Das Kleid mit Kothe, das Papier mit Tinte beklecken.

Figürlich und im g. L. schlecht schreiben, für das niedrige schmieren. Das Papier beklecken, Fr. barbouiller

bouïller ãu papier. Dieſer Ausdruck kann bedeuten, a) eine elende oder unleſerliche Hand ſchreiben; b) ohne Bedacht ſeine noch rohe Gedanken auf das Papier entwerfen; vulgo nur ſo was hinſchmieren.

In der Mahler-Sprache, und faſt allemahl aus Verachtung, etwas mit Farbe oder mit Firniß nur grob überſtreichen oder anſtreichen; übertünchen, z. B. eine Mauer, oder einen Fußboden. Ueberhaupt: ſudeln, Sudeley machen, ſchlecht und tünchermäßig mahlen. Die Farbe iſt nur aufgeklecke. Das iſt nicht gemahlt, ſondern gekleckt.

Daher der Klecker, Fr Barbouïlleur, einer der ſchlecht ſchreibt, (es ſey der Hand nach, oder der Sache nach,) oder ſchlecht mahlt, im g. L. und mit Verachtung, beſonders in den Zuſammenſetzungen Tinten-Klecker, Farben-Klecker, ein Kleck-Macher, Kleck-Mahler, Gurken-Mahler, Sudler Schmierer, Schmiermärten, im Niederſ. ein Klack-Schilder (*).

In eben dieſem Verſtande heißt Kleckerey, eine ſchlechte Art zu ſchreiben, oder zu mahlen; Sudeley, Schmiererey, Geſchmiere; Gemählde, in welchen man wie von ungefähr, ohne irgend einen beſtimmten Inhalt, und ohne alle Kunſt, etwas hingeſchmiert (geſchmadert) hat. Die Franzoſen nennen dergleichen elende Arbeit Croûte, Barbouïllage (eine tünchermäßige Arbeit), Enſeigne à bière, (ein Bier-Zeichen). Eine Zeichnung von dieſer Art nennen ſie verachtungsweiſe Charbonnée.

Im Niederſ. klacken, klicken. Bey dem Feſtus iſt cloacare, beſudeln. So fern klecken bloß ein Ausdruck eines

(*) Entweder von Schilder, ein Mahler, oder von Schild, weil die Schilder, oder ausgehängten Zeichen der Handwerksleute, meiſtentheils nichts anders, als etliche ungeſchickte Pinſel-Striche, oder Klecke, ſind.

nes Schalles ist, bedeutet ziklekan bey dem Ottfried zerbrechen, platzen. Siehe Klack, Klaffen, Klicken.

2. Klecken, welches im Oberdeutschen und Niedersächsischen bekannter ist, als im Hochdeutschen. 1. Die Absicht merklich befördern. Das kleckt nicht viel, hilft nicht viel. Das kleckt, das bringt viel ein. 2. Hinreichen, zureichen. Das kleckt noch nicht. Die Einkünfte wollen dazu nicht klecken. Der Zeug hat nicht geklecket, nicht zugelanget. Es waren ihrer hundert, wenn es nur kleckt, es waren ihrer auf das wenigste hundert.

Bey dem Ottfried in der zweyten Bedeutung kleken, im Niederf. klicken, im Schwed. klaecka, im Isländ. kleka. Wachter leitet es auf eine äusserst gezwungene Art von dem alten kenuachan, genug seyn, ab; Frisch eben so sonderbar von Loch, Lücke, die Löcher des Mangels füllen. Es scheint das Stamm-Wort von schlagen, in den zusammen gesetzten anschlagen, verschlagen, zu seyn. Im Niederf. sagt man es verklickt nicht viel, wo der Hochdeutsche sagt, es verschlägt nicht viel. Es kann alsdann eine Figur des Zeit-Wortes klecken seyn, so fern es die Nachahmung eines gewissen Schalles ist. Im Niederf. ist Klick eine jede kleine Masse, ein Bißchen. Klicken und klecken würde also eigentlich seyn, durch kleine Massen vermehren. Sagt man doch im g. L. mehrmahls, das klimpert nicht, das klappert nicht, das schäppert nicht, d. i. das bringt kein bares Geld ein, ist nicht einträglich.

Erklecken. 1. Nützen, Nutzen bringen, eine im Hochdeutschen unbekannte Bedeutung. 2. Hinreichen, zulangen, im Oberdeutschen, und zuweilen auch, obgleich selten, im Hochdeutschen. Die Einkünfte wollen zu den Abgaben nicht erklecken. Es will nicht erklecken.

Erklecklich. 1. Zureichend, hinlänglich, auch nur am häufigsten im Oberdeutschen. So sollte dieser Vorgang allein erklecklich seyn, dieselben zu überzeugen, u. s. f. 2. Ansehnlich, viel, der Zahl und Summe

Summe nach, auch nur im Oberdeutschen. Er hat ein Erkleckliches dazu beygetragen. Einen erklecklichen Beytrag thun.

Kleck-Buch, ein Buch, worin die täglichen Vorfallenheiten ohne Kunst und Zierlichkeit eingetragen, und gleichsam nur eingeklecket werden; bey den Kaufleuten mit einem ital. Kunst-Worte eine Strazze. Siehe **Kladde**.

Kleck-Macher, Kleck-Mahler; s. oben, S. 397.

Klecken, s. oben, S. 396.

Klecker, s. oben, S. 397.

— — (Leim-) s. **Kleiber**.

Kleckerey, s. oben, S. 397.

Klee, ein Nahme, welchen im Deutschen sehr viele Pflanzen führen, welche sich durch ihre drey Mahl gespaltene Blätter von andern unterscheiden; daher auch die Benennungen im L. Trifolium, im Ital. Trifoglio, im Fr. Trefle, Treffle, und im Engl. Trefoil, entstanden sind.

Der hoch- und oberdeutsche Nahme ist sehr zusammen gezogen. Im Nieders. lautet er vollständiger Klever, im Angels. Claefer-wyrt, im Engl. Claver, Clivers, im Holl. Klaver, im Schwed. Klöfver. Woraus zugleich erhellet, daß er seinen Nahmen nicht, wie Frisch glaubt, von Kley, fettes Land, hat, weil er gern im fetten Lande wächst, sondern von Klaue, oder unmittelbar von Klieben, Nieders. Klöven, spalten, weil die drey Mahl gespaltene Figur seiner Blätter zu merklich in die Augen fällt, als daß sie nicht den Grund der Benennung hätte abgeben sollen.

Sowohl mit dem deutschen Nahmen **Klee**, als auch dem lat. Trifolium, haben die ältern Schriftsteller viele, und unter sich verschiedene Pflanzen beleget, indem sie gemeiniglich alle diejenigen also zu nennen pflegten, welche drey Blätter auf einem gemeinschaftlichen Stiele tragen. Und ob man gleich nachher die Anzahl der Klee-Pflanzen, weil bey verschiedenen die Blumen ganz anders beschaffen sind, einiger Maßen vermindert, oder durch angebrachte Beynahmen von

den

den übrigen unterſchieden, wie z. B. der Sauer-Klee, Fieber-Klee ꝛc. iſt, und deswegen zu einer Klee-Pflanze nicht nur drey, auf einem gemeinſchaftlichen Stiele befeſtigte, Blättchen, ſondern auch eine ſchmetterlingförmige Blume und hülſenartige Frucht erfordert hat, ſind doch noch einige übrig geblieben, bey welchen die Neuern hinlängliche Merkmahle eines weſentlichen Unterſchiedes angetroffen, ſolche deswegen von denſelben abgeſondert, und einige beſondere Gattungen, als: den Klee-Schnecken-Klee ꝛc. daraus gemacht, und das eigentliche Klee-Geſchlecht dadurch zwar vermindert, doch auch wieder durch andere, ehedem mit beſondern und andern Nahmen belegte, Pflanzen vermehrt haben. Aller dieſer Bemühungen ungeachtet, iſt und bleibt das Klee-Geſchlecht, in Anſehung der weſentlichen Kennzeichen eines der ſchwerſten, und deswegen ſtimmen die neueſten Kräuter-Lehrer nicht durchgehends mit einander überein, wie denn Hr. v. Haller einige Arten, welche Linné zu dem Klee rechnete, wieder davon abgeſondert hat, auch Derſelbe und Andere die nahe verwandten Gattungen anders beſtimmt haben. Es gibt auch wahre Klee-Arten, welche nicht, wie das Wort Trifolium andeutet, drey, ſondern fünf Blättchen auf der Spitze eines gemeinſchaftlichen Stieles zeigen; daher das deutſche Wort beſſer, als das lateiniſche, iſt, und man vielleicht das letzte, wie bey vielen andern unſchicklichen Nahmen, als: dem Pentaphyllum, geſchehen iſt, lieber ganz ausrotten, und ein anderes dafür erwählen ſollte. So ſchwer aber die Gattungs-Kennzeichen des Klees anzugeben ſind, eben ſo viele Schwierigkeiten finden ſich auch bey Beſtimmung der Arten, inſonderheit heut zu Tage, da in den Schriften vom Anbau der Wieſen und der Futter-Kräuter ſo viele Klee-Sorten mit verſchiedenen Beynahmen angeführt worden ſind, von welchen man nicht füglich ſagen kann, ob es wahre Arten,

oder ob es Spiel-Arten (Varietäten) sind, oder welche ohne allen Grund für andere und neue ausgegeben worden sind.

Linné setzt diese Pflanzen-Gattung in die 3te Abtheilung seiner 17ten Classe, welche diejenigen Pflanzen in sich schließt, deren Blumen 10 Staubfäden haben, die zwey Körper ausmachen. Zu dieser Gattung hat er auch des Micheli Foliastrum, einige Sorten von Tournefort's Melilotus, und von Buxbaum's Lupinaster, gesetzt. Die Gattungs-Kennzeichen des Klees, Trifolium, sind folgende. Die Blumen stehen niemahls einzeln, sondern mehrere derselben bey einander, und stellen bey einigen ein Köpfchen, bey andern eine Aehre oder einen Strauß, auch eine Dolde, vor. Der röhrenförmige, einblätterige Kelch endigt sich mit 5 Zähnen, und bleibt bey den meisten Arten stehen. Die Blumenblätter sind schmetterlingförmig gestellt, und fallen bey vielen nicht ab, sondern sitzen noch verwelkt an der Frucht. Bey einigen sind sie unter einander verwachsen. Das Fähnchen ist rückwärts geschlagen; die beyden Flügel sind kürzer, und das Schiffchen ist noch kürzer. Neun Staubfäden sind mit einander verbunden, und machen eine Scheide aus; der zehente steht besonders. Der aufwärts steigende Griffel trägt einen einfachen Staub-Weg. Die Hülse ist kurz, bey einigen länger, bey andern kürzer als der Kelch, öffnet sich gar nicht, und enthält wenige rundliche Samen.

Einige Sorten der Klee-Gattung wachsen in verschiedenen Gegenden von Europa wild; andere werden entweder des Nutzens wegen, auf den Feldern, oder um der Schönheit willen, in den Gärten gezogen. Linné hat 46 Arten; bey den 7 ersten ist die Hülse nackend, oder kaum merklich von dem Kelche umgeben. Die 7 folgenden haben bedeckte Hülsen mit vielen Samen; die 18 folgenden, nebst den 2 letzten, haben

rauche, und die übrigen bauchige, aufgeblaſene Kelche.

1. **Wohlriechender Klee, blauer Meliloten-Klee, wilder Stein-Klee, Pferde-Klee,** Trifolium caballinum *Geſn.* Trifolium Dioſcoridis *Tragi.* Trifolium odoratum *Fuchſ. Turner.* & *Lonicer.* Trifolium odoratum alterum *Dod.* & *Dalech.* Lotus ſativa, ſ. odorata caerulea, Lotus hortenſis odorata *C. B.* Melilotus odorata violacea *Tourn.* Trifolium ſpicis oblongis, leguminibus ſeminudis mucronatis, caule erecto *Royen.* Trifolium Melilotus caerulea, racemis ovatis, leguminibus ſeminudis mucronatis, caule erecto, ſpicis oblongis *Linn.* Sie wächſt urſprünglich in Böheim und Oeſtreich, und iſt ſchon längſtens in den engliſchen und deutſchen Gärten, als eine zur Arzeney gebräuchliche Sorte gezogen worden, ungeachtet ſie jetzt ſelten mehr verordnet wird. Sie iſt jährig, und treibt 2 bis 3 Schuh hohe, aufrecht ſtehende, von den anſitzenden Blätterſtielen einiger Maßen eckige, oberwärts in viele Zweige abgetheilte Stängel. Bey dem Blattſtiele ſtehen zwey platt und breit anſitzende, lanzenförmige, eingekerbte Blatt-Anſätze, und der Stiel ſelbſt zeigt ſowohl an dem Orte, wo dieſe, als auch die 3 eigentlichen Blättchen anſitzen, eine Art von Gelenke, wodurch es denn geſchieht, daß dieſe letztern ſich ausbreiten und zuſammen ziehen, oder gegen einander richten können. Die Blätter ſtehen wechſelweiſe, und die drey Blättchen ſind bläulich angelaufen, breit, oval, ſtumpf und zart eingekerbet, die obern mehr länglich, und ihre Blatt-Anſätze völlig ganz. Die Blumen ſtehen in einem länglichen kurzen Köpfchen bey einander. Der gemeinſchaftliche, lange, nackende, geſtreifte Stiel entſpringt aus dem Blätter-Winkel. Die Blumen ſelbſt ſind weißlich, mit blauen Adern durchzogen. Die Frucht-Hülſe endigt ſich mit einer zurück gebogenen Spitze, und iſt ungefähr

bis

bis zur Hälfte von dem Kelche bedeckt. Die Blumen erscheinen im Jun. und Jul.; und es erfolgen auf dieselben kleine gelbe, nierenförmige Samen, deren 2 bis 3 in einer kurzen Schote beysammen stehen. Der Same wird zu Anfange des Sept. reif. Blumen und Kraut haben einen sehr starken, dabey aber angenehmen Geruch, wie das griechische Heu, und einen scharfen Geschmack. Man glaubte ehedem, daß diese Pflanze ihren Geruch in Einem Tage sieben Mahl verändere, nähmlich sieben Mahl verliere und wieder bekomme, so lange sie frisch sey; und daher hat man sie auch Siebengeruch, Siebengezeit, Siebenzeit, und Siebenstunden-Kraut, genannt.

Wenn man den Samen dieser Sorte selbst ausfallen lässet, werden die Pflanzen für sich aufgehen, und weiter keine Cultur erfordern, als daß man das Unkraut fleißig ausreute, und die Pflanzen, wenn sie zu dicht beysammen stehen sollten, verdünnere.

In unsern Apotheken findet man diese Art nicht; sie könnte aber füglich an statt der gemeinen (s. weiter unten, No. 4.) gebrauchet, und vielleicht derselben noch vorgezogen werden, indem ihr Geruch auch in dem getrockneten Zustande dauert, und viele wirksame und nützliche Bestand-Theile andeuter. Die Alten zählten sie unter harntreibende, schmerzstillende und Wund-Mittel, und gebrauchten sie sowohl innerlich als auch äusserlich. Ehrhardt hat die blauen Blümchen mit Rauten-Blättern in Ziegen-Butter gekocht, und diese Salbe bey bösen triefenden Augen, auch in dem Falle, wenn die Horn-Haut mit einem Felle überzogen gewesen ist, nützlich befunden. Zwinger hat die Blumen in Oehl eingeweicht, etwas Terpenthin dazu gemischt, und solches als einen Wund-Balsam äusserlich, auch bey Kolik- und Stein-Schmerzen innerlich gebraucht. Vorzüglich schickt sich die ganze Pflanze, als ein erweichendes und linderndes Mittel,

zu äuſſerlichen Verhärtungen, Erweichung der Geſchwüre, und zu allen Fällen, bey welchen die Aerzte die andern Meliloten zu gebrauchen pflegen.

In der Schweiz iſt dieſe Pflanze das vornehmſte Gewürz des grünen Käſes und glarner Schabziegers, daher ſie auch Schabzieger-Pflanze, oder Schabzieger-Kraut, genannt wird. Ihren Gebrauch hierzu, habe ich im XXXV Th. S. 490, f. beſchrieben.

Die Bienen lieben dieſe, gleich andern Arten der Meliloten, und ſie könnte leicht häufig zu deren Nutzen gebauet werden.

2. **Oſtindiſcher Stein-Klee**, deſſen Stängel aufrecht, und deſſen Hülſen nackend ſind, nur Einen Samen enthalten, und an Trauben-Kämmen beyſammen ſtehen; Trifolium Melilotus indica, leguminibus racemoſis nudis monoſpermis, caule erecto *L.* Dieſes Sommer-Gewächs findet ſich in Oſt-Indien und Afrika wild. Sein Stängel iſt rundlich, und kriecht doch zuweilen auf der Erde. Seine Blätter ſind bald gröſſer und breiter, bald kleiner und ſchmähler. Seine Blumenſtiele ſind breit gedrückt und eckig. Seine Blumen haben einen guten Geruch, und gemeiniglich eine gelbe, zuweilen eine weiſſe Krone. Seine Hülſen ſind rund, runzelig, und von verſchiedener Gröſſe.

3. **Polniſcher Stein-Klee**, mit aufrechtem Stängel, und nackenden lanzenförmigen Hülſen, welche zwey Samen enthalten, und an Trauben-Kämmen beyſammen ſtehen; Trifolium Melilotus polonica, leguminibus racemoſis nudis diſpermis lanceolatis, caule erecto *L.* Er iſt in Polen und dem ſüdlichen Rußland zu Hauſe, und unterſcheidet ſich von dem gemeinen Stein-Klee, No 4, mit welchem er in der Dauer, in der Stellung, und in dem Geruche überein kommt, daß ſein Stängel ganz rundlich iſt; daß ſeine Blätter kleiner und ſcharf zugeſpitzt ſind, und

nach

nach oben zu ſpitzige ſägenartige Zähne haben; daß ſeine Blumen in einer größern Entfernung von einander, und auf längern Stielen, welche keine Furchen haben, ſitzen; daß ihre Krone ſehr blaßgelb iſt; daß an dieſer das oberſte Blättchen zurück gebogen, und die Seiten-Blättchen ſchief aus einander geſperrt ſind; daß die Hülſen länger und ſpitziger, aber nicht ſehr runzelig ſind.

4. **Deutſcher Stein-Klee, gemeiner gelber Stein-Klee, Bären-Klee, goldener Klee, Meliloten, Meloten-Klee, officineller Meliloten-Klee,** Trifolium odoratum primum *Dod.* & *Thal.* Melilotus vulgaris officinarum Germaniae *C. B. Touru.* Trifolium odoratum, ſ. Melilotus vulgaris flore luteo *J. B.* Melilotus germanica *J. B.* Melilotus vulgaris *Parkinſ. Raj.* Melilotus germanica *Gerard.* Lotus urbana *Matthiol.* Trifolium Melilotus officinalis, leguminibus racemoſis nudis diſpermis rugoſis acutis, caule erecto *Linn.* Fr. Melilot, Mirlirot, Engl. Melilot, wächſt in ganz Europa, und auch in Aegypten, in mancherley Boden, auf den Feldern, Hecken, und an den Wegen, wild. Sie iſt gemeiniglich eine zweyjährige Pflanze. Sie treibt aus der faſerigen Wurzel, einen aufrecht ſtehenden, geſtreiften, harten, oft holzigen, 3 bis 6 F. hohen, und mit vielen Zweigen verſehenen Stängel. Die drey Blättchen, welche auf dem gemeinſchaftlichen Stiele ruhen, ſind ſchmahl, länglich, ſpitzig, zart eingekerbet, und bläulich angelaufen. Die kleinen Blumen ſtehen ährenweiſe, hangen unterwärts, und ſind gemeiniglich gelb. Das Fähnchen iſt gefalten und eingekerbet; die Flügel ſind faſt von gleicher Größe; das Schiffchen iſt am Ende rundlich. Man findet auch Stöcke mit weißen Blumen; und obgleich dieſe höher wachſen, weniger Geruch haben, auch die Blättchen mehr eyförmig, und die Blumen noch kleiner ſind, kann man dieſelbe doch

nicht für eine beſondere Art annehmen, ſondern nur als eine Spiel-Art betrachten. Die unterwärts hangende Hülſe iſt kurz, nackend, runzelig, ſpitzig, und enthält gemeiniglich 2, auch nur 1 Samen, die im Auguſt reif werden. Die gelblichen Stöcke werden von den Apothekern geſammelt. Der ſtarke, doch eben nicht wiedrige Geruch, auch der bitterliche, etwas ſcharfe Geſchmack, zeugen von ihren wirkſamen Beſtand-Theilen. Die getrocknete Pflanze riecht ſtärker, als die friſche.

In der von Hrn. Geoffroy angeſtellten chemiſchen Unterſuchung, ſind von 5 Pfund blühenden Meliloten ohne Wurzeln, welche aus einer Retorte deſtilliert wurden, 14 Unzen klarer, riechender, bitterer, ſcharfer, kaum merklich ſaurer, und etwas ſalziger Liquor; 3 Pf. 4 U. 7 Drachm. klarer, bitterer, etwas ſchärferer, offenbar ſaurer, und immer mehr und mehr herber Liquor; 1 U. 6 Dr. rothbrauner, und mit häufigem flüchtigen urinöſen Salze erfüllter Liquor; 36 Gr. feſtes, flüchtiges, urinöſes Salz, nebſt 1 U. 7 Dr. 54 Gran Oehl, übergegangen. Die übrig gebliebene ſchwarze Maſſe hat 5 U. 2 Dr. gewogen, welche, nachdem ſie gehörig waren calcinirt worden, 1 U. 6 Dr. 60 Gr. Aſche zurück lieſſen, woraus durch das Auslaugen 2 Dr. 45 Gr. fixes, bloß alkaliſches Salz gezogen wurden. Der Verluſt der Theile hat in der Deſtillation 4 U. 18 Gr., in der Calcination aber 3 U. 3 Dr. 12 Gr. betragen.

Die Meliloten-Blätter färben das blaue Papier kaum roth. Sie ſind riechend, ſcharf, bitter, etwas zuſammen ziehend, und, wenn ſie lange gekäuet werden, ekelhaft. Sie enthalten ein weſentliches, weinſteinartiges, vitrioliſches, ammoniakaliſches Salz, welches mit vielem, ſowohl dünnen als auch dicken Oehl, und mit einer ziemlichen Portion Erde, verbunden iſt.

Dieſe

Diese Pflanze löset gelinde auf, digerirt, erweicht, und stillt die Schmerzen; wird aber innerlich jetzt fast gar nicht gebraucht. Zuweilen verschreiben noch Einige von den blühenden Meliloten-Spitzen eine Handvoll, welche sie mit gleichen Theilen Kamillen-Blumen in 2 Pf. gemeinem Wasser kochen, und bey Entzündungen des Unterleibes, wie auch bey Stein- und rheumatischen Schmerzen gebrauchen lassen. Michaelis, in den Noris ad Schroederum, lobt das Decoct der Meliloten-Blumen in dem weißen Flusse ganz besonders, und preiset es zum Trinken an.

Aeusserlich wird sie, wegen der erweichenden, schmerzstillenden und auflösenden Kraft, worin sie mit den Hasen-Pappeln und dem Eibisch-Kraute überein kommt, gar häufig gebraucht; und da sie mehr dünnere und flüchtigere Theile besitzt, so löset sie auch mehr auf. Die Blätter und Blumen werden mit gutem Nutzen zu erweichenden, windtreibenden und lindernden Klystieren, wie auch zu erweichenden, digerirenden und auflösenden Umschlägen, Bähungen und Bädern, gebraucht, und auch oft mit den Kamillen-Blumen verbunden. **Ettmüller** preiset bey einer Entzündung der Gebärmutter, des Hodensackes, des Ausganges vom Mastdarme und der Eingeweide, eine aus dem Meliloten-Decocte bereitete Bähung an, vornehmlich wenn man Odermennige und Kamillen zusetzt, als welche, wenn sie in Wein oder Wasser gekocht werden, die Entzündung stillen. **Pauli** preiset, bey Nachwehen und Entzündungen der Gebärmutter, eine aus blühenden Meliloten-Spitzen und Bockshorn-Samen bereitete Bähung an. Eben Derselbe schlägt auch zur Milderung des Seitenstechens, eine andere Bähung vor, welche also bereitet wird: Man nimmt blühende Meliloten und Nachtkraut (Parietaria), von jedem 2 Händevoll; Betonien, 1 Handvoll; Eibisch-Kraut, 1½ Handvoll; Kamillen-Blumen, ½ Handvoll;

voll; vermiſcht es, kocht es in Waſſer, und läſſet es oft auf die Bruſt legen. Der Saft der Blumen, oder das Infuſum von denſelben, lindert die Augen-Schmerzen, vornehmlich wenn man etwas Campher-Spiritus hinein tröpfelt.

In den Apotheken hat man ein riechendes Waſſer von den Meliloten-Blumen, welches ſelten gebraucht wird. Man nimmt es nur zum Räuchern; es erhöhet durch ſeine ſubtile Theilchen den Geruch von andern Dingen, und dehnt ihn aus. Hauptſächlich gebraucht man dieſen Klee zu dem von ihm benannten Pflaſter Meliloten- Meloten- oder Steinklee-Pflaſter, Empl. de meliloto. Dieſes Pflaſter iſt eine alte Vorſchrift, ſelbſt über die Zeiten des Galenus hinaus, die aber nachher durch den Meſue und Andere, mannichfaltige Veränderungen erlitten hat. Die Dispenſatorien ſind daher auch in der Zuſammenſetzung deſſelben ſehr von einander verſchieden. Die einfachſte und ihres Nahmens würdige Zuſammenſetzung iſt das einfache Meliloten-Pflaſter, Empl. de melil. ſimplex, *Cod. med. Pariſ.* p. 145, welches aus den obern Spitzen des Stein-Klees, Rinder-Talge, Harze und Wachſe, beſteht. Die übrigen mehr zuſammen geſetzten, in der *Pharm. Dan.* p. 159. *Ph. Suec.* p. 192. *Ph. Würt.* p. 67, enthalten insgeſammt, ob ſie gleich von einander abweichen, verſchiedene zertheilende und erweichende Mittel. Ueberhaupt riecht es ſtark. Man gebraucht es zum Zertheilen und Erweichen der Geſchwulſten, beſonders der Kinnladen- und Ohr-Drüſen. Dieſe Wirkungen ſcheint es aber mehr von den andern ihm zugemiſchten Mitteln, als von dem Stein-Klee, zu haben. Dem blaſenziehenden Pflaſter beygemiſcht, lindert es die von deſſen Wirkung entſtehenden Schmerzen. Da das Steinklee-Pflaſter vor ſich allein, auf der Haut nicht anklebt, ſondern leicht abfällt, kann man, nach Beſchaffenheit,

ent-

entweder das zertheilende Seifen-Pflaſter, oder Diachylon, damit vermiſchen, auch auf dieſe Weiſe die verſchiedene Wirkung befördern.

Unter allen Klee-Arten verdiente dieſer Stein-Klee in friſchem niedrigen Boden den Vorzug, weil er am längſten daſelbſt dauert, und ſich von andern Gräſern und Kräutern weniger verdrängen läſſet; allein, er hat den Haupt-Fehler, daß er der Milch und Butter unter allen Klee-Arten den übelſten Geſchmack und Geruch mittheilt; wo aber güſtes Vieh im Stalle zu unterhalten wäre, da würde er mit größtem Nutzen zu gebrauchen ſeyn. Für melke Kühe iſt der Stein-Klee mit weißen Blumen eher anzurathen.

Die Bienen beſuchen die Blumen dieſes Klees gern. Schreber behauptet (*) wieder diejenigen Schriftſteller, welche ſagen, daß das Vieh dieſen Klee nicht leicht berühre, das Gegentheil, worin ihm Hr. Paſt. Germershauſen (**) beypflichtet. Letzterer verſichert, ſchon vor langen Jahren geſehen zu haben, daß das Weide-Vieh, wenn es in die Sommer-Felder gekommen ſey, und auf den Meliloten-Klee in den Rainen und Seiten-Fahren der Frucht-Aecker geſtoßen, ſolchen vorzüglich heraus geſucht, bis auf den Grund abgefreſſen, und andere bekannte gute Kräuter und Gräſer dagegen ſtehen gelaſſen habe.

Es wächſt dieſer Klee auch auf einem Sand-Boden, wenn dieſer nur nicht zu brennend oder zu leicht iſt, eben ſo gut, als auf einem Lehm-Boden. Und da die Gegenden des Sand-Bodens gemeiniglich wenig Wieſewachs haben, ſo iſt in denſelben der Anbau dieſes Futter-Krautes vorzüglich anzurathen, da es auch von den Pferden ſolcher Gegend, die gemeiniglich nicht durch beſſere Kräuter und Gräſer verwöhnt ſind,

(*) Im 3 Th. ſeiner Sammlung ꝛc. S. 55.

(**) Im 3 B. des Hausvaters, S. 297.

ebenfalls gern gefreſſen wird. Auch an ſolchen Orten, wo die Stall-Pferde, ſtatt des Heues, im Sommer Gras in die Raufen bekommen, iſt, nach Hrn. Germershauſen Bemerkung, dieſer Klee, wenn er zur Veränderung gegeben wurde, von den Pferden ſehr gern und gierig gefreſſen worden. Auch hat Derſelbe an den Weide-Schafen geſehen, daß ſie dieſen Klee ungemein lieben. Bey der grünen Fütterung aber muß dasjenige, was ich weiter unten bey dem gemeinen rothen Land-Klee (ſ. No. 19) empfehlen werde, und auch bey allen übrigen zum Vieh-Futter beſtimmten Klee-Arten Statt findet, ebenfalls beobachtet werden.

Wenn man von dieſem Klee zum erſten Verſuche Samen haben will, darf man nur von den wild wachſenden Stöcken, wenn ſie noch jung ſind, einige im Felde aufgraben, und in den Garten verpflanzen.

Der Stein-Klee wächſt in vielen Gegenden von England, beſonders um Cambridgeſhire, für ſich unter dem Getreide in großer Menge, und iſt daſelbſt ein ſehr beſchwerliches Unkraut. Denn wenn das Getreide eingeſammelt wird, hält es ſehr ſchwer, ſolches von dieſem Klee abzuſondern; derſelbe wird alſo mit dem Getreide eingeführt; und da der Same des Klees zugleich mit dieſem reif wird, wird ſolcher mit dem Getreide ausgedroſchen, von dem er ſich, da er ſehr ſchwer iſt, nicht leicht abſondern läſſet; und wenn etwas von dem Samen mit dem Getreide gemahlen wird, verdirbt er das Mehl. Denn das Brod, oder was ſonſt davon gemacht wird, bekommt einen ſtarken Geſchmack davon, wie das Meliloten-Pflaſter.

In der Moldau, wo beſonders viel Pelzwerk getragen wird, pflegt man wieder die Motten, welche gern das Pelzwerk verwüſten, den Stein-Klee zu gebrauchen, welcher den Motten dermaßen zuwieder iſt, daß alle Kiſten und Schränke, wo Stein-Klee mit zu den Kleidern eingelegt iſt, von ihnen verſchont bleiben.

Die

Die Moldauer nennen den Stein-Klee deshalb eigentlich Motten-Kraut, und versichern, daß ihre Kleider, wenn sie auch nur damit bestrichen wären, von diesen feindseligen Thierchen verschont bleiben.

5. **Italiänischer Stein-Klee,** Trifolium Melilotus italica, leguminibus racemosis nudis dispermis rugosis obtusis, caule erecto, foliolis integris *L.* kommt ursprünglich aus Italien, und ist ein Sommer-Gewächs. Der aufrecht stehende Stängel wird selten über 1 F. hoch, treibt auch wenig Zweige, und ist am untern Theile röthlich. Mit den beyden eingekerbten Blatt-Ansätzen ist der Blatt-Stiel durch ein Gelenk vereinigt, und mit diesem sind auch die drey blau angelaufenen Blättchen, auf Art eines Gelenkes, verbunden. Die Blätter bestehen aus 3 verkehrt eyförmigen, mit einer Spitze sich endigenden Blättchen, welche bey den untern völlig ganz, bey den obern aber eingekerbet sind. Die gelben Blumen hangen unterwärts, und stellen eine Aehre vor. Die beyden untern Zähne des Kelches sind kleiner, als die übrigen. Bey der Hülse erscheint der Kelch oberwärts zerrissen, und umgibt den untern Theil der Frucht, welche stumpf mit Furchen und erhabenen Linien oder Runzeln besetzt ist. Man findet darin 2, auch nur 1 Samen. Diese Klee-Art hat keinen bekannten Nutzen, und wird in hiesigen Gärten ohne Kunst, im freyen Lande jährlich aus dem Samen erzogen.

6. **Cretischer platthülsiger Stein-Klee,** Trifolium Melilotus cretica, leguminibus racemosis nudis dispermis membranaceis, caule erectiusculo *L.* wächst in Candien (Creta), ist ebenfalls ein Sommer-Gewächs, und gleicht, dem Ansehen nach, der 5ten Art, lässet sich aber gar leicht durch die Frucht unterscheiden. Diese ist platt, breit, tellerförmig, und an der einen Seite oder dem einen Rande, wo die Samen sitzen, gleichsam geflügelt. Weil nun die Gestalt der

Hülſe von allen andern Arten des Klees abgeht, könnte man dieſe von der Klee-Gattung wohl füglich abſondern, und mit Hrn. Böhmer daraus, und einigen andern, welche eine ähnliche Frucht-Hülſe haben, ein beſonderes Geſchlecht machen, und daſſelbe Meliloten nennen. Der Stängel iſt ungefähr 1 F. hoch, mit Zweigen beſetzt, und weißlich. Die Blatt-Anſätze ſitzen breit und platt auf, ſind mit ſchmahlen ſpitzigen Zähnen ausgezackt, und durch ein Gelenk mit dem Blatt-Stiele vereinigt. Die drey Blättchen ſind bläulich angelaufen, faſt keilförmig geſtaltet, ſtumpf und zart eingekerbet. Die Blumen-Aehre iſt kurz. Die geſtielten, gelblichen Blumen hängen unterwärts. Auch dieſe Art wird jährlich aus dem Samen im freyen Lande erzogen.

7. **Vogelfußartiger Stein-Klee**, mit unter ſich geneigten Stängeln und nackenden Hülſen, welche acht Samen enthalten, meiſtens zu drey ſtehen, und noch einmahl ſo lang als die Blumenkelche ſind, Trifolium ſiliquoſum, loto affine, ſiliquis ornithopodii *Pluken.* Trifolium Melilotus ornithopodioides, leguminibus nudis octoſpermis ſubternis, calycibus duplo longioribus, caulibus declinatis *Linn.* wächſt in England und Frankreich wild, und gehört unter die Sommer-Gewächſe. Er iſt mit dem griechiſchen Heue nahe verwandt, und kriecht niedrig auf der Erde. Seine Hülſen ſtehen aufrecht zu drey auf einem Stiele, und ſind gekrümmt.

8. **Fünfblätteriger Klee, ſibiriſcher fünfblätteriger Lupinen-Klee**, Trifolium leguminibus polyſpermis, foliis pluribus *Gmel.* Trifolium Lupinaſter, capitulis dimidiatis, foliis quinatis ſeſſilibus, leguminibus polyſpermis *Linn.* wächſt in Sibirien. Der aufgerichtete, mit wenigen Zweigen beſetzte Stängel wächſt 1, auch 1½ F. hoch, und hat, der Länge nach, viele erhabene Gelenke, welche die grüne und mit ſchwar-

ſchwarzen Streifen beſetzte, am Rande gefranſete Blatt-Scheide umgeben. Auf dieſer ruhen fünf ſchmahle, ganz zart eingekerbte Blättchen. An den Enden der Zweige und des Stängels ſitzen flache röthliche Blumenknöpfe. Die faſerige Wurzel dauert viele Jahre, und die Stöcke erhalten ſich bey uns im freyen Lande ohne Wartung. Wir erhalten zwar ſelten Samen, die Stöcke aber laſſen ſich leicht durch die Wurzeln theilen. Man findet auch eine Spiel-Art mit weißen Blumen.

9. **Umgebogener Klee**, deſſen Blumenköpfchen ſich umbiegen, wenn der Same zu reifen anfängt, und deſſen Hülſen drey Samen enthalten, Trifolium leguminibus polyſpermis, foliolis obverſe ovatis denticulatis, floribus tetrapetalis, capitulis fructiferis *Gronov.* Trifolium montano ſimile virginianum, floribus amoene purpureis amplioribus & magis patulis ſummo caule glomeratis per maturitatem reflexis *Pluken.* Trifolium reflexum, capitulis fructiferis reflexis, leguminibus triſpermis *Linn.* Virginien iſt ſein Vaterland. Seine Blätter ſind weich und fein gezackt; ihre Blättchen, umgekehrt eyrund. Die Blumen ſind groß, und ſchön purpurroth. Seine Hülſen enthalten zuweilen nur 2 Samen.

10. **Senkrechter oder ſchnurgerader Klee**, deſſen Blätter rautenförmige Anſätze haben, und fein ſägenartig gezahnt ſind; deſſen Blumenköpfchen ſo lang, als die Blumenkrone, ſind, und deſſen Hülſen 2 Samen enthalten, Trifolium pratenſe annuum minimum, foliis longis anguſtis venoſis tenuiſſime ſerratis, floribus albis congeſtis, ſiliquis minoribus diſpermis *Micheli.* Trifolium ſtrictum, capitulis globoſis, leguminibus diſpermis, calycibus longitudine corollae, foliolis ſerrulatis, ſtipulis rhombeis *Linn.* Man findet ihn in Italien und Spanien auf Wieſen und Weiden wild. Er hält nicht über den Winter aus. Sein

Stäm-

Stängel ist glatt, und treibt unten Aeste, welche weit von dem Stängel ab stehen. Seine Blätter sitzen auf langen Stielen, und sind glatt und gestreift, zu unterst eyrund, und zu oberst lanzenförmig; sie haben sehr breite Ansätze mit einer pfriemförmigen Spitze. Seine Blumen haben sehr schmahle und spitzige Blättchen zwischen sich, welche länger, als die Blumen selbst, sind. Ihre Krone ist weiß und sehr klein. Ihr Kelch ist nackend und hat pfriemförmige Zähne; von diesen sind die zwey obern länger als die Krone, und legen sich zurück, wenn die Blühe-Zeit vorüber ist.

11. Bastard- oder unächter Klee, Trifolium flore albo *Rivin.* Trifolium hybridum, capitulis umbellaribus, leguminibus tetraspermis, caule adscendente *Linn.* wächst hin und wieder in den Gärten und andern angebaueten Oertern, auch in den Hecken an den Wiesen-Rändern Europens; und wird in Frankreich als ein Futter-Kraut angebauet. Der Stängel ist ganz, oder wenigstens zur Hälfte aufgerichtet, 1 E. hoch, inwendig hohl, und in Zweige abgetheilt. Die Blatt-Ansätze sind groß, lanzettförmig, geschwänzt und aderig. Die drey Blättchen sitzen auf einem langen Stiele, sind ohne Flecken, und fast herzförmig. Die Blumen kommen an langen Stielen aus dem Blätter-Winkel, in Gestalt einer kugelförmigen Traube oder Dolde, hervor. Der Kelch ist weiß oder purpurfarbig, glatt, und dessen obere und kürzere Zähne sind von den drey untern und längern durch einen kleinen Zwischenraum abgesondert. Die Blumenblätter sind anfangs weiß, werden hernach roth, und endlich, wenn sie verwelken, bräunlich. Die Hülse raget aus dem Kelche hervor, und enthält 2, auch 4, nierenförmige Samen.

Dieser wenig bekannte Klee besitzt alle gute Eigenschaften der andern, zum Vieh-Futter dienlichen, Arten; doch ist er etwas härter, minder süß, und dauert

nur

nur 1 Jahr. Indeſſen iſt er, da er 1 Elle hoch wächſt, um der davon fallenden Menge des Futters willen, nicht zu verachten. Es können Felder ſeyn, die, wegen der Hütung im Auguſt, zur Weide offen ſeyn müſſen. Säet man nun dieſen Klee im vorhergehenden Sommer unter das Sommer-Getreide, oder in die Sömmerung, ſo wird man immer Nutzen davon haben.

12. **Weißer holländiſcher Klee, weißer Feld- oder Wieſen-Klee, kleiner weißer Klee, weißblumiger geſtreckter Klee, kriechender Wieſen-Klee,** weiße Fleiſch-Blume, Trifolium acutum *Lonicer.* Trifolium capitulis ſubrotundis, floſculis pedunculatis, leguminibus tetraſpermis, caule procumbente *Royen.* Trifolium maius primum *Cluſ.* Trifolium pratenſe album *Dod. Fuchſ. Turner. J. Camerar.* & *C. Bauh.* Trif. pratenſe album vulgare odoratum *Moriſ.* Trif. pratenſe alterum *Trag. Matthiol.* & *Lacun.* Trif. pratenſe flore albo, minus et foemina, glabrum *J. B.* Trifolium pratenſe primum *Duraut.* Trif. pratenſe vulgare, flore candido *Thal.* Trifolium repens, capitulis vmbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente *Linn.* iſt eine von dem rothen Wieſen-Klee (ſ. unten, No. 19.) ganz verſchiedene Art, und nicht bloß eine Varietät davon, mit welchem er von Vielen verwechſelt wird, leidet aber ſelbſt mancherley Abänderungen, und hat mit der vorhergehenden 11ten Art viele Aehnlichkeit. Er blühet lange Zeit auf den Brach-Feldern und erhabenen Gras-Plätzen, auf Wieſen und in Wäldern. Der Stängel kriecht auf der Erde hin, treibt hin und wieder Wurzel-Faſern, und aufgerichtete lange Blätter und Blumenſtiele. Die Blätter ſpielen ſehr, ſind aderig, eingekerbet, runzelig oder herzförmig, öfters mit einem weißen bogenförmigen Flecke bezeichnet, und die Blatt-Anſätze eyförmig zugeſpitzt

gespitzt und aderig. Das Blüthköpfchen ist kugelförmig, oder etwas eingedrückt. Die Blumen stehen zuerst aufwärts, und biegen sich nachher unterwärts. Der Kelch ist weiß, auch röthlich. Die zwey obern Zähne sind kürzer, als die drey mehr entferntern untern. Die Blumenblätter sind anfangs ganz weiß, werden hernach purpurroth, und endlich bräunlich. Das Fähnchen ist lang, gefalten, nicht rückwärts geschlagen, und das Schiffchen kürzer, als die Flügel. Die Hülse raget über den Kelch hervor, und enthält gemeiniglich 4, selten 2 Samen. An statt der drey, stehen zuweilen vier, auch wohl gar fünf Blättchen auf Einem Stiele. Die Blume erscheint zuweilen ungestaltet, indem eines oder mehrere der Blumenblätter sich vergrößern, und das Ansehen eines Blattes annehmen. Die Landleute bedienen sich dieses Klees hin und wieder statt eines Wetter-Glases; bey warmer heiterer Witterung nähmlich hängen die Blättchen und breiten sich aus, bey herannahender feuchter aber richten sich dieselben in die Höhe, und falten sich zusammen, welches auch die Blätter des Sauer-Klees thun; s. Th. I. S. 269.

Für die Bienen ist keine einzige Wiesen-Blume so honigreich, als die von dem weißen Klee.

Der Anbau dieses Klees verdient allgemeiner zu werden, weil er dem Viehe nicht nur gesunder, als alle vorhergehende Klee-Arten ist, sondern auch in der Fütterung besser anschlägt. Milch und Butter bekommen auch nicht den so genannten geilen Geschmack davon, der ihnen von den meisten andern Klee-Arten zugezogen wird. Er wächst zwar nur bey guter Wartung 1 bis 1½ F. hoch, dagegen steht er aber dicker, als andere Klee-Arten, wenn er nähmlich, wie es allemahl seyn muß, recht dick gesäet wird. Man kann von ihm 2 bis 3 gute Aernden haben, so, daß die letztern immer der ersten gleich sind. Unter allen Klee-

Arten

Arten ist dieser weiße Klee am leichtesten zu Heu zu machen.

Man kann den weißen Klee mit und unter allen Getreide-Arten aussäen; vornehmlich aber ist anzurathen, daß er, wenn man nur eine einzige Gras-Art anbauen will, mit derselben vermenget werde. Der Boden muß zu diesem Klee weder zu naß, noch zu trocken seyn, da er denn 10 und mehrere Jahre dauern wird, da er im Gegentheil auf allzu nassem oder trocknen Lande nur 5 bis 6 Jahr besteht. Auf einem kalten Lehm-Boden hält er sich sehr gut, wie man, nach Hrn. P. Germershausen Versicherung, unter andern in seiner Nachbarschaft auf dem Fläminge sieht. Daselbst ist er recht zu Hause, wird gar nicht ausgesäet, sondern erhält sich durch sich selbst auf den Korn-Feldern, als woselbst diese nach gemeiner Art mit der Brache abwechselnd sind. Wenn nun die Brache nach dem Sommer-Getreide einfällt, ist der weiße Klee fast nur das einzige Gewächs, womit die Brache bedeckt ist. Kommt sodann eine fruchtbare Witterung dazu, so machen die Fläminger einen Theil dieses weißen Klees zu Heu. Ihr Weide-Vieh wird aber auf der mit Klee bewachsenen Weide binnen 6 oder 8 Wochen fett seyn; und eben diese Fläminger bürgen für die Gesundheit dieses Klees. Denn die Pferde werden sowohl des Nachts, als auch bey Regen-Wetter, auf den Klee-Schlägen geweidet, ohne daß der nasse Klee ihrer Gesundheit im geringsten nachtheilig sey, wovon man bey andern Klee-Arten das Gegentheil bemerkt. Manche Dörfer lassen ihre Zug-Ochsen ebenfalls zur Nacht-Zeit auf diesem Klee weiden; man hat aber nie gehört, daß ein Stück Rindvieh vom nassen weißen Klee aufgeblähet und schwellend geworden wäre. Mit den Schafen ist es eben so, welche sowohl im Sommer des Morgens um 4 Uhr, so bald sie aus den Dörfern heraus kommen, den bethaueten Klee vorfinden, als auch an Regen-Tagen

keine andere Weide, als diesen weißen Klee haben, und haben können. Fällt aber eine große anhaltende Dürre des Sommers ein, so kommt den Flämingern nur der erste Wuchs, oder die erste Aernde, zu gute, und der Nachwuchs bleibt entweder ganz aus, oder ist nur sparsam und geringe. Eben so ist es, wenn die ersten Frühlings-Monathe nicht warm genug, sondern kalt sind. Denn alsdann bleibt dieser Klee auf dem an und vor sich sehr kalten Flämings-Boden dermaßen zurück, daß auch derselbe bey nachfolgender gedeihlicher Witterung gar nicht im ersten Wuchse gemähet werden kann; er ist alsdann nicht nur sehr kurz, sondern steht auch ungemein dünn. Dagegen findet man am Fuße dieses Fläming-Gebirges eben diesen Klee auf den niedrigen Wiesen bey gedachter Witterung sich immer gleich, weil daselbst der Boden warm ist, und wegen seiner Niederung mehr Feuchtigkeit in dürren Sommern behält.

In andern Gegenden wird dieser Klee nicht zum Vieh-Futter ausgesäet, sondern nur zu Bleich-Plätzen, Terrassen und Boulingrin-Anlagen gebraucht.

Die Blumen dienen getrocknet, den Lappländern statt des Brodes.

13. **Amerikanischer Klee**, mit doldenförmigen oder kugelrunden Blumenköpfchen, in welchen die Blumen wie Hohl-Ziegel auf einander liegen, mit unter sich gebogenen Knöpfchen an der Blumenkrone, welche an den Hülsen bleiben, und mit 4 Samen in den Hülsen; Trifolium comosum, capitulis umbellato-globosis imbricatis, vexillis deflexis persistentibus, leguminibus tetraspermis *L.* Er kommt aus Amerika und hat ziemlich große Blumen.

14. **Pyrenäischer oder Alpen-Klee**, mit gleichbreit-lanzenförmigen Blättern, nacktem Blumenschafte, doldenförmigen Blumenköpfchen, und unter sich hängenden Hülsen, welche nur 2 Samen haben; Berg-Süßholz; Trifolium alpinum, flore magno, radice dulci.

C.

C. B. Trif. glycyrrhizites *Pervae.* Trif. glycyrrhizites Parkinſonii *Moriſ.* Trif. ſcapis radicatis, floribus racemoſis, foliis ellipticis lanceolatis integerrimis *Hall.* Trif. ſcapo nudo ſimpliciſſimo, foliis linear-lanceolatis *Sauvag.* Trifolium alpinum, capitulis umbellaribus, ſcapo nudo, leguminibus diſpermis pendulis, foliis linear-lanceolatis *Linn.* Engl. Mountain Trefoil. Er wächſt auf den ſchweitzeriſchen, pyrenäiſchen und italiäniſchen Alpen, auch auf dem Baldus-Berge wild. Seine Wurzel hält mehrere Jahre aus; ſie iſt ſüß, ziemlich gerade, ſehr groß, und oft gegen 1 Sch. tief; ſie theilt ſich in Aeſte, welche, wie Arme, ausgeſtreckt ſind. Die Blätter ſitzen auf eigenen Stielen; ſie ſind ſchmahl, glatt, unzertheilt und geadert. Die Blumenkrone iſt gemeiniglich purpurroth, zuweilen weiß. Die Hülſen ſind kurz und aufgedunſen. In Rouſſillon und Auvergne verkauft man ſeine Wurzel für Süßholz.

15. **Erdfrucht-, oder unterirdiſcher Klee,** Trifolium album tricoccum ſubterraneum gaſtonium retienſium *Moriſ.* Trif. bleſenſe *Dodart.* Trif. pratenſe ſupinum cathobleſis *Barrel.* Trif. pumilum ſupinum, floſculis longis albis *Raj.* Trifolium ſemen ſub terra condens *Hort. Pariſ.* Trif. ſubterraneum *Ricin.* Trif. ſubterraneum ſ. folliculos ſub terram condens *Magnol.* Trifolium ſubterraneum, capitulis villoſis quinqueflo ris, coma centrali reflexa rigida fructum obvolvente *Linn.* Engl. Dwarf Trefoil, wächſt in Frankreich und Italien. Die jährige Wurzel treibt viele ausgeſtreckte Stängel, welche ſowohl, als die drey herzförmigen Blättchen, mehr oder weniger haaricht ſind. Gemeiniglich ſtehen 5 weiße Blümchen doldenweiſe bey einander auf einem Stiele, welcher, wenn die Blumenblätter abgefallen ſind, ſich vorwärts biegt, die Erde durchbohrt, das Fruchtköpfchen mit ſich zieht, aus der Spitze 5 Schuppen treibt, welche ſich

Brunfelſ. Trifolium pratenſe, *Matthiol. Dod. Turner. Lacun. Lobel. Dalech. Ceſalp. Theod. & Gerard.* Trifolium pratenſe alterum *C. Durant.* Trif. pratenſe, flore monopetalo *Tourn.* Trifolium pratenſe purpureum *Trag. Fuchſ. Penae & C. B.* Trif. pratenſe purpureum vulgare *Moriſon.* Trif. pratenſe rubrum *Thal.* et *J. Camerar.* Trif. purpureum vulgare *J. B.* Trif. ſpicis villoſis, caule diffuſo, foliolis integerrimis *Royen.* Trif. caule obliquo, foliis ovatis hirſutis, ſupremis coniugatis, vaginis ariſtatis *Hall.* Trifolium pratenſe, ſpicis globoſis ſubvilloſis, cinctis ſtipulis oppoſitis membranaceis, corollis monopetalis *L.* Engl. Honeyſuckle Trefoil, or Clover. Dieſer Klee erhält einige Veränderungen, und auch andere Nahmen. Die bekannteſte Spiel-Art davon iſt: der **ſpaniſche, holländiſche, niederländiſche,** oder **brabanter Klee,** (weil der Same dieſes Klees aus Spanien nach Flandern und Holland, und von da nach

her auf seiner Wiese noch nicht zugegen gewesen, sondern erst von der Asche erzeuget worden sey.

v. P.*** Ueber die Art, wie auf frisch gelüngten Wiesen der Klee entstehe, st. im 47 St. des 1 B. der ökon. Nachr der patriot. Gesellsch in Schles. a. d. J. 1773. S. 372—376.

Die lange faserige, kriechende, holzige Wurzel dauert nicht über drey Jahr, und stirbt alsdann ab, wenn auch kein anderer Zufall, z. B. die darauf sich ansetzende Flachs-Seide, dieselbe tödtet. Die Blatt-Ansätze sind weißlich, mit rothen Adern durchzogen, und endigen sich mit einer grannenartigen Spitze. Die drey (*) weichen, haarichten Blättchen sitzen auf einem kurzen Stiele, und zeigen eine veränderliche Gestalt. Die untern sind mehr eyförmig, die obern länger, spitziger, oft mit einem herzförmigen, weißen oder schwarzen Flecke bezeichnet (**), meistentheils völlig ganz, zuweilen auch eingekerbet. Der runde Blumen-Kopf, welcher sich öfters in zwey Köpfchen theilt, sitzt ganz platt zwischen zwey einander gegenüber gestellten Blättern, deren Blatt-Ansätze ausgebreitet sind, und gleichsam einen gemeinschaftlichen Kelch vorstellen. Der Kelch ist gestreift, haaricht, auch die Zähne desselben sind am Rande mit Haaren besetzt, und der unterste ist länger als die vier übrigen. Die blaßrothen Blumenblätter sind unter einander verwachsen, und machen zwar nur Ein Blumenblatt aus, doch ist die Einrichtung wie bey den übrigen; und daher kann man diese, die vorhergehenden, und andere damit überein kommende Arten nicht füglich trennen, wiewohl Knaut und Pontedera solches gethan, welche ein eigenes Geschlecht daraus gemacht, und dasselbe Trifolioides oder Triphylloides genannt haben. Aus der langen, dün-

(*) Dieser Klee hat zuweilen vier Blätter, und wird bey dem gemeinen Manne zu allerley Aberglauben gemißbraucht.

(**) Daher dieser Klee auch Herz-Klee genannt wird, welche Benennung der Sauer-Klee ebenfalls führt.

nen Röhre erhebt ſich das lange, ſchmahle, zuſammen gefaltene und am Rande zurück geſchlagene Fähnchen; jeder Flügel hat ſeinen Wiederhaken; das Schiffchen iſt gerade und zugeſpitzt. Der Staubweg iſt gleichfalls mit zwey Warzen beſetzt. Auf dem Boden der Blume und der Röhre der verwachſenen Blumenblätter befindet ſich viel Honigſaft. Die Hülſe iſt eyförmig, und der Same nierenförmig.

Dieſe Klee-Art wird zum Futter für Rindvieh, Pferde, Schafe, Schweine ꝛc. vorzüglich empfohlen, und in verſchiedenen Ländern gebauet; nur iſt es Schade, daß ſie nicht länger, als drey oder vier Jahr, genutzet werden kann, indem ſie in nachfolgenden Jahren abgeht, doch belohnt ſie in dieſer Zeit die Mühe reichlich, inſonderheit wenn ſie wohl anſchlägt.

Der Anbau des Klees geſchieht auf zweyerley Art. Entweder man wünſcht dergleichen zwiſchen andern Futter-Kräutern auf den natürlichen Wieſen zu haben,



Zu den **Klee-Kämpen** oder **Klee-Koppeln** müssen die besten, und dem Dorfe am nächsten belegenen Ackerflecke gewählet werden, weil der Klee nicht allein einen guten tragbaren Boden verlangt, sondern auch die natürliche Bequemlichkeit in dem Verbrauche dessen Nähe erfordert. Der Klee hält nicht gern länger, als drey Jahr, aus, indem er in dem vierten schon mit Gras vermengt, und folglich zur Fütterung nicht mehr vollkommen tauglich ist. Mit den sämmtlichen Klee-Koppeln muß daher die Einrichtung getroffen werden, daß man solche alle vier Jahr wieder auf das frische zu besäen im Stande sey. Um dieses bewirken zu können, wird die ganze Klee-Wirthschaft in vier Koppeln einzutheilen seyn. Nur zwey davon können genutzet werden; die dritte aber ist in dem ersten Jahre, wo sie mit Klee besäet worden ist, noch nicht nutzbar, und die vierte muß zur künftigen Saat wieder gepflüget und zubereitet werden. Dergleichen Koppeln erfordern gemeiniglich auch eine eigene Einhägung, und verursachen hierdurch mancherley Kosten und Ausgaben, wovon diejenigen, die ihren Klee in dem gewöhnlichen Acker-Felde unter die Gerste säen, nichts wissen.

An denen Orten, wo die Acker-Hütung noch unter einer schädlichen Gemeinschaft steht, sind diese Klee-Koppeln gewisser Maßen nothwendig, weil diejenigen, die ein Mithütungs-Recht haben, einen Theil des in Ansehung der Hütung gemeinschaftlichen Feldes nicht gern mit Klee besäen, und denselben dadurch der Gemein-Weide entziehen lassen wollen. Ausser dem aber sind die Klee-Koppeln mit vielen Beschwerlichkeiten verknüpft, die alsdann, wenn der Klee in das freye Feld gesäet wird, nicht vorhanden sind. Bey den Koppeln kann niemahls eine recht große Klee-Wirthschaft getrieben werden, weil dadurch dem Getreide-Baue gar zu viel Acker, und zwar von dem besten, entgehen würde. Da gedachter Maßen, von den Kop-

geſpitzt und aderig. Das Blüthköpfchen iſt kugelförmig, oder etwas eingedrückt. Die Blumen ſtehen zuerſt aufwärts, und biegen ſich nachher unterwärts. Der Kelch iſt weiß, auch röthlich. Die zwey obern Zähne ſind kürzer, als die drey mehr entferntern untern. Die Blumenblätter ſind anfangs ganz weiß, werden hernach purpurroth, und endlich bräunlich. Das Fähnchen iſt lang, gefalten, nicht rückwärts geſchlagen, und das Schiffchen kürzer, als die Flügel. Die Hülſe raget über den Kelch hervor, und enthält gemeiniglich 4, ſelten 2 Samen. An ſtatt der drey, ſtehen zuweilen vier, auch wohl gar fünf Blättchen auf Einem Stiele. Die Blume erſcheint zuweilen ungeſtaltet, indem eines oder mehrere der Blumenblätter ſich vergrößern, und das Anſehen eines Blattes annehmen. Die Landleute bedienen ſich dieſes Klees hin und wieder ſtatt eines Wetter-Glaſes; bey warmer heiterer Witterung nähmlich hängen die Blättchen und breiten ſich aus, bey herannahender feuchter aber richten ſich dieſelben in die Höhe, und falten ſich zuſammen, welches auch die Blätter des Sauer-Klees thun; ſ. Th. I. S. 269.

Für die Bienen iſt keine einzige Wieſen-Blume ſo honigreich, als die von dem weißen Klee.

Der Anbau dieſes Klees verdient allgemeiner zu werden, weil er dem Viehe nicht nur geſunder, als alle vorhergehende Klee-Arten iſt, ſondern auch in der Fütterung beſſer anſchlägt. Milch und Butter bekommen auch nicht den ſo genannten geilen Geſchmack davon, der ihnen von den meiſten andern Klee-Arten zugezogen wird. Er wächſt zwar nur bey guter Wartung 1 bis 1½ F. hoch, dagegen ſteht er aber dicker, als andere Klee-Arten, wenn er nähmlich, wie es allemahl ſeyn muß, recht dick geſäet wird. Man kann von ihm 2 bis 3 gute Aernden haben, ſo, daß die letztern immer der erſten gleich ſind. Unter allen Klee-

Arten

Arten ist dieser weiße Klee am leichtesten zu Heu zu machen.

Man kann den weißen Klee mit und unter allen Getreide-Arten aussäen; vornehmlich aber ist anzurathen, daß er, wenn man nur eine einzige Gras-Art anbauen will, mit derselben vermenget werde. Der Boden muß zu diesem Klee weder zu naß, noch zu trocken seyn, da er denn 10 und mehrere Jahre dauern wird, da er im Gegentheil auf allzu nassem oder trocknen Lande nur 5 bis 6 Jahr besteht. Auf einem kalten Lehm-Boden hält er sich sehr gut, wie man, nach Hrn. P. Germershausen Versicherung, unter andern in seiner Nachbarschaft auf dem Fläminge sieht. Daselbst ist er recht zu Hause, wird gar nicht ausgesäet, sondern erhält sich durch sich selbst auf den Korn-Feldern, als woselbst diese nach gemeiner Art mit der Brache abwechselnd sind. Wenn nun die Brache nach dem Sommer-Getreide einfällt, ist der weiße Klee fast nur das einzige Gewächs, womit die Brache bedeckt ist. Kommt sodann eine fruchtbare Witterung dazu, so machen die Fläminger einen Theil dieses weißen Klees zu Heu. Ihr Weide-Vieh wird aber auf der mit Klee bewachsenen Weide binnen 6 oder 8 Wochen fett seyn; und eben diese Fläminger bürgen für die Gesundheit dieses Klees. Denn die Pferde werden sowohl des Nachts, als auch bey Regen-Wetter, auf den Klee-Schlägen geweidet, ohne daß der nasse Klee ihrer Gesundheit im geringsten nachtheilig sey, wovon man bey andern Klee-Arten das Gegentheil bemerkt. Manche Dörfer lassen ihre Zug-Ochsen ebenfalls zur Nacht-Zeit auf diesem Klee weiden; man hat aber nie gehört, daß ein Stück Rindvieh vom nassen weißen Klee aufgeblähet und schwellend geworden wäre. Mit den Schafen ist es eben so, welche sowohl im Sommer des Morgens um 4 Uhr, so bald sie aus den Dörfern heraus kommen, den bethaueten Klee vorfinden, als auch an Regen-Tagen

keine andere Weide, als dieſen weißen Klee haben, und haben können. Fällt aber eine große anhaltende Dürre des Sommers ein, ſo kommt den Flämingern nur der erſte Wuchs, oder die erſte Aernde, zu gute, und der Nachwuchs bleibt entweder ganz aus, oder iſt nur ſparſam und geringe. Eben ſo iſt es, wenn die erſten Frühlings-Monathe nicht warm genug, ſondern kalt ſind. Denn alsdann bleibt dieſer Klee auf dem an und vor ſich ſehr kalten Flämings-Boden dermaßen zurück, daß auch derſelbe bey nachfolgender gedeihlicher Witterung gar nicht im erſten Wuchſe gemähet werden kann; er iſt alsdann nicht nur ſehr kurz, ſondern ſteht auch ungemein dünn. Dagegen findet man am Fuße dieſes Fläming-Gebirges eben dieſen Klee auf den niedrigen Wieſen bey gedachter Witterung ſich immer gleich, weil daſelbſt der Boden warm iſt, und wegen ſeiner Niederung mehr Feuchtigkeit in dürren Sommern behält.

In andern Gegenden wird dieſer Klee nicht zum Vieh-Futter ausgeſäet, ſondern nur zu Bleich-Plätzen, Terraſſen und Boulingrin-Anlagen gebraucht.

Die Blumen dienen getrocknet, den Lappländern ſtatt des Brodes.

13. **Amerikaniſcher Klee,** mit doldenförmigen oder kugelrunden Blumenköpfchen, in welchen die Blumen wie Hohl-Ziegel auf einander liegen, mit unter ſich gebogenen Knöpfchen an der Blumenkrone, welche an den Hülſen bleiben, und mit 4 Samen in den Hülſen; Trifolium comoſum, capitulis umbellato-globoſis imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, leguminibus tetraſpermis *L.* Er kommt aus Amerika und hat ziemlich große Blumen.

14. **Pyrenäiſcher oder Alpen-Klee,** mit gleichbreit-lanzenförmigen Blättern, nackten Blumenſchafte, doldenförmigen Blumenköpfchen, und unter ſich hängenden Hülſen, welche nur 2 Samen haben; Berg-Süß-Holz; Trifolium alpinum, flore magno, radice dulci

C.

C. B. Trif. glycyrrhizites *Penae.* Trif. glycyrhizites Parkinſonii *Moriſ.* Trif. ſcapis radicatis, floribus racemoſis, foliis ellipticis lanceolatis integerrimis *Hall.* Trif. ſcapo nudo ſimpliciſſimo, foliis lineari-lanceolatis *Sauvag.* Trifolium alpinum, capitulis umbellaribus, ſcapo nudo, leguminibus diſpermis pendulis, foliis lineari-lanceolatis *Linn.* Engl. Mountain Trefoil. Er wächſt auf den ſchweitzeriſchen, pyrenäiſchen und italiäniſchen Alpen, auch auf dem Baldus-Berge wild. Seine Wurzel hält mehrere Jahre aus; ſie iſt ſüß, ziemlich gerade, ſehr groß, und oft gegen 1 Sch. tief; ſie theilt ſich in Aeſte, welche, wie Arme, ausgeſtreckt ſind. Die Blätter ſitzen auf eigenen Stielen; ſie ſind ſchmahl, glatt, unzertheilt und geadert. Die Blumenkrone iſt gemeiniglich purpurroth, zuweilen weiß. Die Hülſen ſind kurz und aufgedunſen. In Rouſſiglol und Auvergne verkauft man ſeine Wurzel für Süßholz.

15. **Erdfrucht-, oder unterirdiſcher Klee,** Trifolium album tricoccum ſubterraneum gaſtonium reticulatum *Moriſ.* Trif. bleſenſe *Dodart.* Trif. pratenſe ſupinum cathobleſis *Barrel.* Trif. pumilum ſupinum, floſculis longis albis *Raj.* Trifolium ſemen ſub terra condens *Hort. Pariſ.* Trif. ſubterraneum *Rivin.* Trif. ſubterraneum ſ. folliculos ſub terram condens *Magnol.* Trifolium ſubterraneum, capitulis villoſis quinquefloris, coma centrali reflexa rigida fructum obvolvente *Linn.* Engl. Dwarf Trefoil, wächſt in Frankreich und Italien. Die jährige Wurzel treibt viele ausgeſtreckte Stängel, welche ſowohl, als die drey herzförmigen Blättchen, mehr oder weniger haaricht ſind. Gemeiniglich ſtehen 5 weiße Blümchen doldenweiſe bey einander auf einem Stiele, welcher, wenn die Blumenblätter abgefallen ſind, ſich vorwärts biegt, die Erde durchbohrt, das Fruchtköpfchen mit ſich zieht, aus der Spitze 5 Schuppen treibt, welche ſich

Fütterung einer nur etwas ansehnlichen Heerde wird, wenn man sich dieser Methode des Kleebaues nicht bedient, jederzeit sehr schwer fallen, und ich muß daher dieselbe einem Jeden, der die Stall-Fütterung einführen will, als nothwendig anrathen.

Soll diese Art des Kleebaues möglich gemacht werden, so ist zweyerley dabey voraus zu setzen. Zuerst wird, wie schon oben bey Gelegenheit der Klee-Koppeln bemerkt worden ist, erfordert, daß alle Gemeinschaft in Ansehung der Acker-Hütung aufgehoben, und der Eigenthümer, der die Stall-Fütterung einführen, und sich zu solchem Ende des Kleebaues bedienen will, dadurch auf keinerley Weise eingeschränkt seyn müsse. Die mit Klee besäeten Aecker müssen, natürlicher Weise, so lange der Klee nutzbar ist, von allem Viehe gänzlich geschonet werden. Diese Schonung aber werden diejenigen, mit welchen der Eigenthümer in Ansehung der Hütung in einer Gemeinschaft steht, sie mögen Dorf-Nachbarn oder Unterthanen seyn, sich niemahls gutwillig gefallen lassen. Ein Recht, sie dazu anzuhalten, hat er, so lange die Gemeinschaft dauert, ebenfalls nicht, und es würde auch solches bey einer vermischten Heerde von Vieh deshalb sehr schwer fallen, weil diese Schonung eben in die Zeit der Brache, wo das gemeinschaftlich weidende Vieh seine vornehmste Acker-Hütung hat, trifft. Wer also von dieser Methode des Kleebaues einen Gebrauch machen, und dadurch die Stall-Fütterung möglich machen will, muß sich vorher ausser aller Hütungs-Gemeinschaft mit seinen Nachbarn oder Unterthanen zu setzen suchen. Hat er dieses bewirkt, und dadurch freye Hände bekommen, mit seinem Acker nach freyem Gefallen zu schalten, so wird ihm von dieser Seite weiter nichts im Wege stehen, diese Art des Kleebaues in der erforderlichen Maße zu unternehmen, und auch beständig fortzusetzen. Die Nützlichkeit und Nothwendigkeit der Aufhebung

der

J. B. Trifolium Cherleri, capitulis villoſis globoſis terminalibus ſolitariis, calycibus omnibus fertilibus, caulibus procumbentibus, foliis obcordatis *L.* iſt in der Gegend von Montpellier zu Hauſe, und dauert nicht über den Winter. Unter ſeinen Blumenköpfchen ſteht ein zirkelrundes Deckblatt; ſeine Blumenkelche ſind ganz haarig.

18. **Röthlicher Klee, großer Berggras-Klee,** Trifolium montanum, ſpica longiſſima rubente *C. B.* Trifolium purpureum maius, folio et ſpica longiore *J. B.* Trif. purpureum montanum, pinnatum lagopodioides, ſpica longiſſima *Moriſ.* Trif. ſpicatum *Thal.* Trif. foliis nervoſis ciliatis, ſpicis ovatis obeſis, calycis denticulis plumoſis, imo longiſſimo *Hall.* Trifolium rubens, ſpicis villoſis longis, corollis monopetalis, caule erecto, foliis ſerrulatis *L.* wächſt in Languedok, Italien, in der Schweiz und in Schwaben wild. Seine Wurzel dauert nicht über den Winter. Sein Stängel iſt feſt, und wächſt aufrecht, 1 bis 2 Sch. hoch. Seine Blätter ſind ſchön, ganz glatt, fein geadert und gerippt. Seine Blumenähren zeigen ſich im May und Jun. an dem Gipfel des Stängels und der Aeſte, und ſind 2 Z. lang, oder auch noch länger; der Blumenkelch iſt beynahe ganz glatt, ſeine Zähne federartig, und der unterſte am längſten, und ſo lang, als die Blumenkrone; dieſe iſt purpurroth, und raget weit über den Kelch hervor. Dieſe Klee-Art iſt ein ſehr angenehmes Futter für das Vieh, vornehmlich für das Woll-Vieh.

19. **Großer Wieſen-Klee, brauner Wieſen-Klee, großer rother Wieſen-Klee, gemeiner Wieſen-Klee, gemeiner rother Land-Klee,** rothes Geisblatt, Himmelsbrod; (bey den alten Galliern, dem Marcellus Enpirikus zu Folge, Viſumarus, und noch jetzt in einigen Gegenden Wieſenpreis, von Mare, Maere, (Ruhm, Preis,) Trifolium maius

Brunfels. Trifolium pratenſe, *Matthiol. Dod. Turner. Lacun. Lobel. Dalech. Cæſalp. Theod. & Gerard.* Trifolium pratenſe alterum *C. Bauhin.* Trif. pratenſe, flore monopetalo *Tourn.* Trifolium pratenſe purpureum *Trag. Fuchſ. Penae & C. B.* Trif. pratenſe purpureum vulgare *Moriſon.* Trif. pratenſe rubrum *Thal.* et *J. Camerar.* Trif. purpureum vulgare *J. B.* Trif. ſpicis villoſis, caule diffuſo, foliolis integerrimis *Royen.* Trif. caule obliquo, foliis ovatis hirſutis, ſupremis coniugatis, vaginis ariſtatis *Hall.* Trifolium pratenſe, ſpicis globoſis ſubvilloſis, cinctis ſtipulis oppoſitis membranaceis, corollis monopetalis *L.* Engl. Honeyſuckle Trefoil, or Clover. Dieſer Klee erhält einige Veränderungen, und auch andere Nahmen. Die bekannteſte Spiel-Art davon iſt: der **ſpaniſche, holländiſche, niederländiſche,** oder **brabanter Klee,** (weil der Same dieſes Klees aus Spanien nach Flandern und Holland, und von da nach England und Deutſchland gekommen iſt,) Trifolium purpureum maius ſativum pratenſi ſimile *Raj.* Fr. Treſle de Flandre, welcher der Stamm-Art völlig ähnlich, und nur in der Größe und Länge, auch den härtern Stängeln nach, davon unterſchieden iſt.

Man findet dieſen Klee in ganz Europa auf den Feld-Rainen und feuchten Wieſen wild, und den ganzen Sommer über blühend. Hier liegen ſeine Stängel beynahe auf der Erde, und er wird auch zum Theil von Gräſern und Kräutern überzogen, daß er wenig oder gar nicht in die Augen fällt. So bald aber natürliche Wieſen mit einem guten Dünger, z. B. mit Seifenſieder-Aſche, beleget werden, wird er hiervon dermaßen hervor gelocket, daß er ſeine ehemahlige Unterdrücker überwindet, und ſich dem Auge zur Verwunderung hervorſtechend darſtellt. Der gemeine Mann ſteht daher in dem Wahne, daß dieſer Klee vor-

her

lichen Grasung, den Sommer hindurch mit Klee unterhalten, und für 2 Pferde mehr nicht, als einen magdeb. Morgen, nöthig gehabt habe, da doch der Klee, besonders in dem letzten Jahre, wegen einer eingefallenen Dürre, eben nicht der beste gewesen sey. Eben diese Futter-Menge, welche zur reichlichen Unterhaltung zwey großer Reiter-Pferde hinlänglich ist, hält er für drey Kühe vollkommen zureichend. Der von ihm angegebene Satz kann also ganz sicher angenommen, und darnach von einem Jeden, nach der Anzahl der auf Stall-Fütterung stehenden Kühe, diejenige Morgen-Zahl, die er jährlich zu Klee gebraucht, bestimmet werden. Für einen Stall von 50 Kühen, werden solchemnach, 13 mit Klee besäete magd. Morgen das richtige und gehörige Maß seyn.

Die Erfahrung lehrt, daß der Klee in einem kalten Frühlinge und dürren Sommer öfters mißräth. Da aber der Klee bey der Stall-Fütterung das Haupt-Fütterungsmittel ist: so muß ein vernünftiger Landwirth, bey der Ungewißheit, ob der Klee gerathen werde, oder nicht, jederzeit einige Morgen mehr, als es sonst die Nothwendigkeit und der oben angenommene Satz erfordert, mit Klee besäen lassen. Bey dieser nöthigen Vorsicht wird er allemahl wohl thun, seinen jährlichen Kleebau für 50 Stück Kühe, an statt 17 Morgen, auf 18 zu erweitern. Der Ueberfluß, den er etwa davon übrig behalten möchte, wird ihn niemahls gereuen dürfen. Die Vortrefflichkeit und Vorzüglichkeit des Klee-Heues ist Jedermann bekannt, und ich werde weiter unten ein Mehreres davon zu sagen Gelegenheit haben. Eben so nützlich ist auch der Anbau des Klee-Samens. Schon vorhin muß ein jeder Wirth, der dergleichen Klee-Wirthschaft mit Nutzen und Ordnung treiben will, auf die Gewinnung des jährlich dazu erforderlichen Samens bedacht seyn. Bliebe aber auch der nicht zur Stall-Fütterung nöthige Klee in solcher Menge übrig, daß der davon gewonnene Same weit mehr, als das jährliche Aus-

nen Röhre erhebt sich das lange, schmahle, zusammen gefaltene und am Rande zurück geschlagene Fähnchen; jeder Flügel hat seinen Wiederhaken; das Schiffchen ist gerade und zugespitzt. Der Staubweg ist gleichsam mit zwey Warzen besetzt. Auf dem Boden der Blume und der Röhre der verwachsenen Blumenblätter befindet sich viel Honigsaft. Die Hülse ist eyförmig, und der Same nierenförmig.

Diese Klee-Art wird zum Futter für Rindvieh, Pferde, Schafe, Schweine ꝛc. vorzüglich empfohlen, und in verschiedenen Ländern gebauet; nur ist es Schade, daß sie nicht länger, als drey oder vier Jahr, genutzet werden kann, indem sie in nachfolgenden Jahren abgeht, doch belohnt sie in dieser Zeit die Mühe reichlich, insonderheit wenn sie wohl anschlägt.

Der Anbau des Klees geschieht auf zweyerley Art. Entweder man wünscht dergleichen zwischen andern Futter-Kräutern auf den natürlichen Wiesen zu haben, und in dieser Absicht streuet man zuweilen den Samen auf dieselben, damit immerfort neuer Zuwachs erfolge, oder überlässet die Vermehrung dem auf der Weide gehenden Viehe, indem dieser Same, wenn das Vieh dergleichen auf der Hütung gefressen hat, unverdauet wieder von ihm geht, und mit dem Miste auf die Wiesen gebracht wird; oder man will davon künstliche Wiesen anlegen, und ihn allein erziehen.

Der Klee kann entweder auf gewisse dazu bestimmte und eingehägte Plätze, welche man in hiesigen Gegenden Koppeln, an andern Orten Kämpe, nennt, oder auch in freyen Acker-Feldern und mit unter der Gerste oder andern Früchten gesäet werden. Das erste ist noch bis jetzt in den meisten Wirthschaften die gewöhnlichste, das letzte aber, besonders für diejenigen, welche sich mit der Stall-Fütterung abgeben wollen, die beste und vortheilhafteste Art des Kleebaues.

Zu den **Klee-Kämpen** oder **Klee-Koppeln** müssen die besten, und dem Dorfe am nächsten belegenen Ackerflecke gewählet werden, weil der Klee nicht allein einen guten tragbaren Boden verlangt, sondern auch die natürliche Bequemlichkeit in dem Verbrauche dessen Nähe erfordert. Der Klee hält nicht gern länger, als drey Jahr, aus, indem er in dem vierten schon mit Gras vermengt, und folglich zur Fütterung nicht mehr vollkommen tauglich ist. Mit den sämmtlichen Klee-Koppeln muß daher die Einrichtung getroffen werden, daß man solche alle vier Jahr wieder auf das frische zu besäen im Stande sey. Um dieses bewirken zu können, wird die ganze Klee-Wirthschaft in vier Koppeln einzutheilen seyn. Nur zwey davon können genutzet werden; die dritte aber ist in dem ersten Jahre, wo sie mit Klee besäet worden ist, noch nicht nutzbar, und die vierte muß zur künftigen Saat wieder gepflüget und zubereitet werden. Dergleichen Koppeln erfordern gemeiniglich auch eine eigene Einhägung, und verursachen hierdurch mancherley Kosten und Ausgaben, wovon diejenigen, die ihren Klee in dem gewöhnlichen Acker-Felde unter die Gerste säen, nichts wissen.

An denen Orten, wo die Acker-Hütung noch unter einer schädlichen Gemeinschaft steht, sind diese Klee-Koppeln gewisser Maßen nothwendig, weil diejenigen, die ein Mithütungs-Recht haben, einen Theil des in Ansehung der Hütung gemeinschaftlichen Feldes nicht gern mit Klee besäen, und denselben dadurch der Gemein-Weide entziehen lassen wollen. Ausser dem aber sind die Klee-Koppeln mit vielen Beschwerlichkeiten verknüpft, die alsdann, wenn der Klee in das freye Feld gesäet wird, nicht vorhanden sind. Bey den Koppeln kann niemahls eine recht große Klee-Wirthschaft getrieben werden, weil dadurch dem Getreide-Baue gar zu viel Acker, und zwar von dem besten, entgehen würde. Da gedachter Maßen, von den Kop-

peln nur die Hälfte derſelben beſtändig nutzbar iſt, die andere Hälfte aber theils auf das neue zubereitet werden muß, und theils in dem erſten Jahre noch nicht brauchbar iſt, ſo iſt, natürlicher Weiſe, hierzu noch einmahl ſo viel Acker nöthig, als wenn der Klee im freyen Felde unter die Gerſte geſäet wird. Die Koppeln müſſen auch beſtändig, ſo oft man ſie umzupflügen und zu beſäen für nöthig findet, wieder von friſchem bedünget werden, ohne daß dieſe Bedüngung dem Getreidebaue auf einige Art zu Nutzen kommt. Der in das freye Feld geſäete Klee will zwar auch einen fetten und wohl gedüngten Acker haben; allein, dieſe Düngung geſchieht nicht bloß des Klees wegen, ſondern hauptſächlich der darein geſäeten Gerſte und nachher anderer Feld-Früchte wegen. Dem Klee kommt dieſe Düngung nur mit zu Statten, ohne daß der Getreide-Bau das geringſte darunter verliert. Die Koppeln werden überdieß durch den 3 bis 4 Jahr ſtehenden Klee dermaßen verwildert, daß ſie nachher, wenn ſie, um dieſelben mit friſchem Klee zu beſäen, wieder umgepflüget werden müſſen, in der Bearbeitung viel Mühe und Beſchwerlichkeiten verurſachen. Bey dem in dem Felde unter der Gerſte geſäeten Klee, welcher ſchon in dem zweyten Jahre, nachdem er ausgeſäet worden iſt, wieder umgepflüget und mit Rocken beſtellet wird, verſpüret man dieſes nicht; man wird vielmehr ein ſolches Klee-Land vollkommen mürbe finden, und auch der nur auf Eine Fahre darein geſäete Rocken ſehr gut gerathen. Die Einhägung, welche die Klee-Koppeln nöthig haben, iſt ebenfalls eine Beſchwerlichkeit, welche öfters an denen Orten, wo kein eigenes Holz vorhanden iſt, koſtbar fällt.

Da ein Theil der Klee-Stauden leicht ausgeht, und er daher gemeiniglich wieder umgebrochen wird, wenn er 3 Jahr geſtanden hat, ſo kann man,

nach

wenn man das Klee-Säen einem geschickten und geübten Gärtner anvertrauet.

Zeuget man den auszusäenden Klee-Samen selbst, so ist nicht nöthig, daß man denselben enthülse, in welcher Absicht Einige denselben an der Sonne, Andere im Ofen trocknen, und hernach dreschen lassen, und noch Andere denselben auf eine Stampf-Mühle bringen, wovon weiter unten gehandelt werden wird; sondern es ist rathsamer, wenn man die Hülsen des Klees, worin der Same eingeschlossen ist, mit der Gerste vermenget, und mit dieser zugleich ausstreuet. Die Körner des Klee-Samens leiden theils durch die Hitze, der man sie bey dem Enthülsen aussetzen muß, theils auch durch das Dreschen, oder Stampfen, allerley Schaden, der ihnen hernach bey dem Aufgehen hinderlich ist. Die Reinigung der Körner des Klee-Samens von den Hülsen, ist nur alsdann nöthig, wenn der Same verkaufet, und in solcher Absicht sein Maß oder Gewicht bestimmet werden soll. Diese Ursache aber fällt bey dem eigenen Gebrauche des Samens weg. Die viele Mühe, die man sich, um denselben aus den Hülsen zu bringen, geben muß, kann alsdann füglich gesparet werden. Nachdem die Klee-Köpfe von dem Strohe zur bequemen Zeit abgedroschen worden sind, dürfen die davon abgefallenen und schon von selbst getrennten Hülsen, nur so lange, bis die Zeit des Klee-Säens heran kommt, an einem trocknen Orte aufbehalten werden. Alsdann menget man unter 1 Scheffel Gerste etwa 3 gute Metzen von solchen Kleesamen-Hülsen, mischet beydes recht tüchtig unter einander, und säet es nachher zusammen aus. Es müssen aber die Säer die in dem Säe-Laken befindliche vermischte Masse beständig und fast bey jedem Wurfe umrühren, weil es sonst sehr schwer fallen würde, einen allenthalben gleichen Klee-Wuchs zu erhalten.

Jahre vorher allemahl Kartoffeln auf dem Stücke geweſen ſeyn, damit das Unkraut zum voraus, ſo viel möglich, vertilget werde. Wenn dann der Klee 3 Jahr lang geſtanden hat, und wieder in Abnehmen kommt, laſſe man das Stück vor Winter tief umpflügen, ſolches im Frühjahre wiederhohlen, und dann wieder Kartoffeln hinein ſtecken. Dieſe werden von vortrefflichem Ertrage ſeyn, weil ſie nirgends beſſer, als in einem Neubruche und friſch umgepflügeten Gras-Boden, wachſen. Es wird alsdann durch dieſen Kartoffelbau das Land wieder von allem Graſe befreyet, und zu abermahliger Einſäung des Klees zubereitet, ſo, daß ſolches auf alle Zeiten alſo getrieben werden kann, wie folgende Vorſtellung zeigt.

	1	2	3	4
Jahr 1787.	Kartoffeln			
1788	Klee	Kartoffeln		
1789	Klee	Klee	Kartoffeln	

auf 5 Theile einzutheilen, und dasjenige Theil, welches 4 Sommer hindurch gestanden hat, vor Winter umzubrechen, und in dem darauf folgenden 5ten Jahre mit Kartoffeln anzubauen seyn; allein, es ist besser, es bey 3 Jahren bewenden zu lassen, weil der Kleewuchs in dem 4ten Jahre nicht ergiebig genug seyn wird.

Weil der Maulwurf ein Klee-Feld gewaltig durchwühlt, und einen Haufen Erde bey dem andern aufwirft, müssen diese im Frühlinge mit einer verkehrten Harke aus einander geschlagen und geebnet werden, damit der darunter befindliche Klee nicht ersticket werde. Alsdann fährt man mit einer schweren Walze über den Klee, damit der im Winter etwas aufgefrorne Klee wieder niedergedrückt und seine Wurzeln befestiget werden.

Hat man auch das Unglück, daß die Mäuse sich auf ein Klee-Feld einnisten, so können solche eine ganze Strecke zu Grunde richten. Sie fressen die Pflanze bis an die Wurzel ab; und wenn alsdann eine Nässe darauf folgt, so kommt eine Fäulniß dazu, und die Wurzel schlägt nicht wieder aus. Dürfte man es wagen, die Schafe ohne Nachtheil auf ein Klee-Stück zu treiben, so würden solche den Boden so fest treten, daß die Mäuse keinen Schaden thun könnten. Weil aber die Schafe gar zu scharf scheren, und wohl gar die Pflanzen selbst ausreissen würden, ist diese Methode nicht wohl anzurathen.

Ohngefährer Vor- und Ueberschlag des Nutzens eines Klever- oder Klee-Gartens, worin alle 2 Quadrat-Ruthen ein Maulbeer-Baum, und also ihrer vier 32 Fuß im Quadrat weit von einander zu stehen kommen, welcher 40 Morgen groß seyn soll, st. im 155 S. der Lpz. Samml. 1758, S. 954—956.

Den mit dem Kleebaue auf Kämpen oder Koppeln verknüpften Beschwerlichkeiten entgehen diejenigen, welche den Klee im freyen Acker-Felde unter der Gerste säen, ihn in der nachherigen Brache nutzen, und damit jährlich ununterbrochen fortfahren. Die Stall-

Fütter-

Fütterung einer nur etwas ansehnlichen Heerde wird, wenn man sich dieser Methode des Kleebaues nicht bedient, jederzeit sehr schwer fallen, und ich muß daher dieselbe einem Jeden, der die Stall-Fütterung einführen will, als nothwendig anrathen.

Soll diese Art des Kleebaues möglich gemacht werden, so ist zweyerley dabey voraus zu setzen. Zuerst wird, wie schon oben bey Gelegenheit der Klee-Koppeln bemerkt worden ist, erfordert, daß alle Gemeinschaft in Ansehung der Acker-Hütung aufgehoben, und der Eigenthümer, der die Stall-Fütterung einführen, und sich zu solchem Ende des Kleebaues bedienen will, dadurch auf keinerley Weise eingeschränkt seyn müsse. Die mit Klee besäeten Aecker müssen, natürlicher Weise, so lange der Klee nutzbar ist, von allem Viehe gänzlich geschonet werden. Diese Schonung aber werden diejenigen, mit welchen der Eigenthümer in Ansehung der Hütung in einer Gemeinschaft steht, sie mögen Dorf-Nachbarn oder Unterthanen seyn, sich niemahls gutwillig gefallen lassen. Ein Recht, sie dazu anzuhalten, hat er, so lange die Gemeinschaft dauert, ebenfalls nicht, und es würde auch solches bey einer vermischten Heerde von Vieh deshalb sehr schwer fallen, weil diese Schonung eben in die Zeit der Brache, wo das gemeinschaftlich weidende Vieh seine vornehmste Acker-Hütung hat, trifft. Wer also von dieser Methode des Kleebaues einen Gebrauch machen, und dadurch die Stall-Fütterung möglich machen will, muß sich vorher ausser aller Hütungs-Gemeinschaft mit seinen Nachbarn oder Unterthanen zu setzen suchen. Hat er dieses bewirkt, und dadurch freye Hände bekommen, mit seinem Acker nach freyem Gefallen zu schalten, so wird ihm von dieser Seite weiter nichts im Wege stehen, diese Art des Kleebaues in der erforderlichen Maße zu unternehmen, und auch beständig fortzusetzen. Die Nützlichkeit und Nothwendigkeit der Aufhebung

der

der Gemeinheiten rechtfertigt sich hierdurch ganz besonders.

Der Klee wächst nicht in jedem Boden; besonders ist der leichte und sandige dazu nicht geschickt, wenn er auch gleich noch so stark wäre gedünget worden. Dieses Futter-Kraut verlangt zwar nicht schlechterdings einen starken, lehmigen oder thonigen Weitzen-Acker; indessen wird doch wenigstens ein guter wohlbedüngter Mittel-Boden dazu erfordert; kurz ein jeder Acker, in welchen die kleine oder vierzeilige Gerste mit Nutzen gesäet werden kann, trägt auch guten und vielen Klee. Zwar kann auch ein an sich unfruchtbarer Boden durch Fleiß und Mühe zum Kleebau tüchtig gemacht werden, wie Hr. Graf v. Borck auf seinem Gute Stargord gezeigt hat; allein, dergleichen Industrie ist nicht ein jeder Wirth, wegen der damit verknüpften Kosten, auszuüben im Stande, und ein solches Beyspiel ist daher nur zu den besondern Fällen zu rechnen, worauf im Allgemeinen keine Rücksicht genommen werden kann. Es gibt aber viele Land-Güter, welche fast durchgehends dergleichen leichten und sandigen Boden haben. Sind gleich dabey einige Acker-Flecke von besserer Güte befindlich, so liegen selbige doch gemeiniglich ausser dem allgemeinen Acker-Schlage hin und her verstreuet. Bey einer solchen Lage und Beschaffenheit eines Land-Gutes wird solchemnach diese Art des Kleebaues in dem freyen Acker-Felde viele Schwierigkeiten finden, und der Eigenthümer davon, auf Anlegung besonderer Klee-Koppeln nach der sonst gewöhnlichen Art bedacht zu seyn, sich genöthigt sehen.

Der beste Boden zum Kleebau, ist wohl die schwarze oder fette und lehmige Erde, welche aber nicht zu niedrig liegen muß, oder auch ein schwarzer sandiger Grund, welcher von keinem Wasser überschwemmet wird. Die Erde macht in diesem, so wie in andern Fällen, einen großen Unterschied in der Fruchtbarkeit; denn ein schwerer Boden trägt, wegen seiner Fett- und Feuchtigkeit, allezeit bessere

Früchte

Früchte, als ein leichter; doch ist ein mittelmäßig schwerer Boden gleichfalls nicht zu verwerfen, wenn er gehörig bearbeitet wird. Ein hoher sandiger Boden aber dient gar nicht dazu. Wer einen solchen sandigen Boden hat, kann einen Theil der magern Wiesen zu diesem Gewächse anwenden, wenn nur das Wasser gehörig durch Gräben abgeleitet wird; und wenn man aus den Gräben mürbe sandige Erde erhalten kann, auf diesen Wiese-Grund zu legen, so ist aus dieser Vermischung eine reiche Klee-Aernde zu erwarten. Die Ursache, warum dieses Gewächs an hohen Stellen nicht fortkommen will, ist der Mangel an Feuchtigkeit.

Steht dem Kleebaue, in Ansehung der beyden vorhin bemerkten Erinnerungen nichts im Wege, so ist die beste und wichtigste Verfahrungs-Art davon folgende. Zuvörderst muß diejenige Morgen-Zahl, die man jährlich entweder zur Stall-Fütterung, oder auch sonst für anderes Vieh, an Klee nöthig hat, richtig und genau bestimmet werden. Ich will jetzt nur bey der Stall-Fütterung stehen bleiben. Der Klee geräth, wie alle andere Gewächse, nicht alle Jahre gleich, sondern man kann seine Aernde in drey Classen, nähmlich: gute, mittlere und schlechte, eintheilen. In allen ungewissen Fällen dieser Art muß man, wenn etwas beständiges und zuverlässiges bestimmet werden soll, nur den mittlern Ertrag annehmen, indem gute und schlechte Jahre sich hierunter von selbst ausgleichen, und folglich im Durchschnitte jederzeit der mittlere Satz der wahre und immerwährende bleibt. Dieses findet denn auch bey dem Kleebaue Statt. Man kann, der Erfahrung zu Folge, annehmen, daß in solchen Jahren, wo der Klee mittelmäßig geräth, ein magdeb. Morgen, zu 180 Quadrat-Ruthen gerechnet, auf 3, in Stall-Fütterung stehende Kühe vollkommen hinreichend sey.

Hr. Präs. v. Benckendorf erzählt, im 5 B. der berl. Beytr. zur Landwirthschaftswiss. S. 364, daß er auf seinem in der Neumark belegenen Gute, 2 Jahr hinter einander 40 königl. Cavallerie-Pferde, an statt der gewöhnlichen

lichen Grasung, den Sommer hindurch mit Klee unterhalten, und für 2 Pferde mehr nicht, als einen magdeb. Morgen, nöthig gehabt habe, da doch der Klee, besonders in dem letzten Jahre, wegen einer eingefallenen Dürre, eben nicht der beste gewesen sey. Eben diese Futter-Menge, welche zur reichlichen Unterhaltung zwey großer Reiter-Pferde hinlänglich ist, hält er für drey Kühe vollkommen zureichend. Der von ihm angegebene Satz kann also ganz sicher angenommen, und darnach von einem Jeden, nach der Anzahl der auf Stall-Fütterung stehenden Kühe, diejenige Morgen-Zahl, die er jährlich zu Klee gebraucht, bestimmet werden. Für einen Stall von 50 Kühen, werden solchemnach, 13 mit Klee besäete magd. Morgen das richtige und gehörige Maß seyn.

Die Erfahrung lehrt, daß der Klee in einem kalten Frühlinge und dürren Sommer öfters mißräth. Da aber der Klee bey der Stall-Fütterung das Haupt-Fütterungsmittel ist: so muß ein vernünftiger Landwirth, bey der Ungewißheit, ob der Klee gerathen werde, oder nicht, jederzeit einige Morgen mehr, als es sonst die Nothwendigkeit und der oben angenommene Satz erfordert, mit Klee besäen lassen. Bey dieser nöthigen Vorsicht wird er allemahl wohl thun, seinen jährlichen Kleebau für 50 Stück Kühe, an statt 17 Morgen, auf 18 zu erweitern. Der Ueberfluß, den er etwa davon übrig behalten möchte, wird ihn niemahls gereuen dürfen. Die Vortrefflichkeit und Vorzüglichkeit des Klee-Heues ist Jedermann bekannt, und ich werde weiter unten ein Mehreres davon zu sagen Gelegenheit haben. Eben so nützlich ist auch der Anbau des Klee-Samens. Schon vorhin muß ein jeder Wirth, der dergleichen Klee-Wirthschaft mit Nutzen und Ordnung treiben will, auf die Gewinnung des jährlich dazu erforderlichen Samens bedacht seyn. Bliebe aber auch der nicht zur Stall-Fütterung nöthige Klee in solcher Menge übrig, daß der davon gewonnene Same weit mehr, als das jährliche Aus-

saats-Quantum beträgt, ausmachte, so wird derselbe allemahl Liebhaber und Kauflustige genug finden.

So viel Morgen, als nach der jetzt gegebenen Anweisung zu der eingeführten Stall-Fütterung jährlich nöthig sind, werden demnach in dem Sommer-Felde mit Klee unter der Gerste besäet. In dem ersten Jahre, in welchem die Aussäung des Klee-Samens auf gedachte Art geschehen ist, bekümmert man sich um den aufgegangenen Klee weiter nicht, weil derselbe zu dem bestimmten Nutzen in diesem Jahre nicht angewendet werden kann. Man lässet ihn mit der Gerste aufwachsen, und diese, ohne sich weiter um den Klee zu bekümmern, reif werden. Man hat also von dem auf solche Art angebaueten Klee in dem ersten Jahre gar keinen absonderlichen Nutzen. Bloß das Stroh-Futter der Gerste wird durch den darunter aufgeschlagenen Klee beträchtlich verbessert; und dieses kommt ebenfalls dem Rindviehe, da das Gersten-Stroh das vorzüglich für dasselbe bestimmte Winter-Futter ist, zu Nutzen.

Bey der Säung des Klees unter der Gerste ist weiter nichts zu beobachten, als daß der Acker, wenn der darein gesäete Klee ein gehöriges Gedeihen haben soll, recht mürbe und klar gemacht seyn müsse. Schon die Gerste selbst erfordert dergleichen genaue Zubereitung des Ackers. Uebrigens muß der unter der Gerste gesäete Klee-Same weder, wie sonst bey der Gerste selbst gewöhnlich ist, mit untergepflüget, noch auf die uneingerissenen Furchen ausgestreuet werden. Man lässet vielmehr das Gersten-Land, in welchem die Gerste bereits gesäet und untergepflüget worden ist, mit der Ege in der Länge beziehen, und denselben dadurch, wie es in der gemeinen Wirthschafts-Sprache genannt wird, einreissen; alsdann wird erst der Klee-Same übergesäet, und durch einen zweyten Egg[illegible]richt eingeeget. Die kleine und zarte Figur

des

des Klee-Samens gibt es von selbst an die Hand, daß derselbe nicht allzu tief von der Erde bedecket und gleichsam vergraben werden müsse. Auch ist ihm das allzu viele Egen deshalb höchst nachtheilig, weil er durch die Fußstapfen der Pferde gar leicht zu tief eingetreten, und an der gehörigen Hervorkeimung gehindert werden kann.

Was die Quantität des auszustreuenden Klee-Samens betrifft, so hat Hr. v. Benckendorf nach vieljähriger Erfahrung bemerkt, daß das rechte Maß für einen magdeb. Morgen, wenn übrigens der Same rein und frisch ist, in einer brandenb. Metze, oder 6 berl. Pfund, bestehe. Denn bey einem reinen und frischen Klee-Samen wird 1 berl. Metze jederzeit 6 berl. Pfund, und folglich der berl. Scheffel 96 Pfund, betragen. Bey dieser gewöhnlichen Bestimmung wird auch der Klee-Same zu jetzigen Zeiten selten mehr nach Pfunden, sondern nach Metzen und Scheffeln, verkauft. Ist jedoch der Same nicht vollkommen rein, sondern, wie nicht selten zu seyn pflegt, mit allerley andern Gesäme untermischt, so trifft auch dieses Verhältniß der Pfunde mit den Metzen oder Scheffeln nicht allemahl überein, sondern es geschieht sehr oft, daß eine berl. Metze nur 5 bis $5\frac{1}{2}$ Pf. wiegt. Diejenigen also, welche den Klee-Samen kaufen müssen, gehen hierunter am sichersten, wenn sie denselben nicht nach dem Maße, sondern nach dem Gewichte, erhandeln. Die Vermischung des Klee-Samens mit allerley andern Gesäme rührt hauptsächlich daher, wenn der zum Samentragen bestimmte Klee gar zu geil gewachsen ist. Auf diesen geilen Flecken wachsen allerley Arten von Unkraut mit hervor, und werden mit dem Klee-Samen zu gleicher Zeit reif. Bey der Ausmachung des Klee-Samens können diese falsche Samen-Arten sehr schwer davon abgesondert werden, und hieraus entsteht denn diese schädliche Vermischung.

Wer demnach reinen und unverfälschten Klee-Samen erzeugen will, muß es sich zur Regel nehmen, daß er zum Samentragen keinen allzu geilen, viel weniger Lager-Klee, sondern einen solchen, welcher in Ansehung seines Wachsthumes zum Mittel-Klee gehört, wähle. Auch gibt die erste Aernde des Klees einen weit vollständigern, und folglich schwerern Samen, als die zweyte.

Wenn der Klee gut gerathen soll, hat man nicht allein auf eine gehörige Quantität und Qualität des Samens, sondern auch darauf, daß derselbe auf eine gleiche Art ausgestreuet werde, zu sehen. Hierunter versehen es Viele, und sind daher selbst Schuld daran, wenn sich auf ihren Klee-Aeckern derselbe an einigen Stellen in überhäufter Menge, an andern aber gar nichts davon findet. Dieses verursachet in dem Klee-Baue einen beträchtlichen Schaden. Denn auf denen Stellen, wohin der Same zu dick gefallen ist, bleibt der Klee nur kleinhalmig, wie solches die Erfahrung bey allen andern Gewächsen, und auch selbst bey dem Getreide, beweiset. Das Erdreich hat demselben keine genugsame Kräfte, um sich gehörig zu bestauden und starke Halme zu treiben, mittheilen können. Diejenigen Plätze hingegen, die von dem ausgestreueten Samen zu wenig oder gar nichts empfangen haben, bleiben unnutzbar. Zum Ausstreuen des Klee-Samens schickt sich nicht ein Jeder, der auch sonst wohl in Ansehung des Getreides ein guter Säe-Mann seyn mag. Es wird dazu eine gewisse Fertigkeit und Uebung erfordert, die nur denjenigen, die öfters damit umgegangen sind, eigen seyn kann. Der Klee muß nicht mit voller Hand, wie bey dem Getreide gewöhnlich ist, gesäet, sondern nur, auf eben die Weise, der man sich bey den Garten-Samen zu bedienen pflegt, mit den Fingern ausgestreuet werden; und man thut daher wohl,

wenn

wenn man das Klee-Säen einem geschickten und geübten Gärtner anvertrauet.

Zeuget man den auszusäenden Klee-Samen selbst, so ist nicht nöthig, daß man denselben enthülse, in welcher Absicht Einige denselben an der Sonne, Andere im Ofen trocknen, und hernach dreschen lassen, und noch Andere denselben auf eine Stampf-Mühle bringen, wovon weiter unten gehandelt werden wird; sondern es ist rathsamer, wenn man die Hülsen des Klees, worin der Same eingeschlossen ist, mit der Gerste vermenget, und mit dieser zugleich ausstreuet. Die Körner des Klee-Samens leiden theils durch die Hitze, der man sie bey dem Enthülsen aussetzen muß, theils auch durch das Dreschen, oder Stampfen, allerley Schaden, der ihnen hernach bey dem Aufgehen hinderlich ist. Die Reinigung der Körner des Klee-Samens von den Hülsen, ist nur alsdann nöthig, wenn der Same verkaufet, und in solcher Absicht sein Maß oder Gewicht bestimmet werden soll. Diese Ursache aber fällt bey dem eigenen Gebrauche des Samens weg. Die viele Mühe, die man sich, um denselben aus den Hülsen zu bringen, geben muß, kann alsdann füglich gesparet werden. Nachdem die Klee-Köpfe von dem Strohe zur bequemen Zeit abgedroschen worden sind, dürfen die davon abgefallenen und schon von selbst getrennten Hülsen, nur so lange, bis die Zeit des Klee-Säens heran kommt, an einem trocknen Orte aufbehalten werden. Alsdann menget man unter 1 Scheffel Gerste etwa 3 gute Metzen von solchen Kleesamen-Hülsen, mischet beydes recht tüchtig unter einander, und säet es nachher zusammen aus. Es müssen aber die Säer die in dem Säe-Laken befindliche vermischte Masse beständig und fast bey jedem Wurfe umrühren, weil es sonst sehr schwer fallen würde, einen allenthalben gleichen Klee-Wuchs zu erhalten.

Ein ganz friſcher, und erſt in dem vorigen Jahre gewonnener Klee-Same, thut freylich zwar die beſten Dienſte; indeſſen kann doch ein zwey- und allenfalls auch noch ein dreyjähriger Same, wofern er nur gut und trocken aufbehalten worden iſt, ohne Bedenken gebraucht werden. Man nimmt aber von dem dreyjährigen auf jeden Morgen 1 Pfund mehr zur Ausſaat. Einen ältern Samen zu ſäen, iſt allemahl mißlich. Man lieſet zwar in allen Zeitungen und Intelligenz-Blättern, daß hier und da recht friſcher Klee-Same zu verkaufen ſey. Dieſer Anzeige aber muß ein Wirth, der ſolchen aus fremden Orten kommen laſſen muß, nicht trauen, ſondern er muß, vorher, ehe er denſelben wirklich ausſäet, einen Verſuch im Kleinen anſtellen, ob er auch noch aufgehe. Das Schlimmſte hierbey iſt, daß die Klee-Händler gemeiniglich ihren friſchen und alten Vorrath mit einander vermengen, und auf ſolche Art beydes an den Mann zu bringen ſuchen. Man hat ſich daher bey den deshalb angeſtell-

eingetheilt ist, das mit Gerste besäete Feld in dem darauf folgenden Jahre brach liegen. Der Klee zeigt in dem zweyten Jahre nach seiner Aussäung das beste und stärkste Wachsthum; und dieses trifft gerade in das Jahr, in welchem das Feld, worein er gesäet worden ist, brach liegt.

Ein Landwirth, der diese Methode des Kleebaues erwählt, kann daher jederzeit den Klee in seinem besten Zustande nutzen, ohne daß ihm dadurch in dem Getreidebaue das geringste abgeht, indem die Brache ohne dieß müßig liegt, und in demselben Jahre zum Getreidebau nicht bestimmt ist. Fährt er nun alle Jahre damit fort, daß er die bestimmte Morgen-Zahl mit Klee unter der Gerste besäet, so kann es ihm nie an der zur Stall-Fütterung erforderlichen Quantität von Klee mangeln. Dieses Futter-Kraut kann, ehe der Acker wieder zum Getreidebau umgeworfen und zubereitet werden darf, ganz füglich zwey, und in fruchtbaren Jahren auch wohl drey Mahl abgeschnitten und genutzet werden. Diese Nutzung des Klees wird ganz sicher bis in die Mitte des Sept. fortgesetzt; und alsdann muß schon zum voraus für andere Mittel, womit die Stall-Fütterung bis zum Eintritt des Winters fortgesetzet werden kann, gesorget seyn.

Denjenigen, die hiervon keine eigene Erfahrung haben, wird es vielleicht seltsam vorkommen, daß der Klee bis in die Mitte des Sept. genutzet, und dem ungeachtet solches Klee-Land noch in eben demselben Jahre wieder mit Getreide besäet werden soll, und man wird schwerlich glauben, daß ein solches Getreide gerathen könne. Allein, die Sache hat ihre Richtigkeit. Die Mitte des Sept. habe ich deshalb als das Ende der Klee-Nutzung festgesetzt, damit der nach dem Abmähen wieder ausgeschlagene junge Klee theils von dem Zug-Viehe, theils auch von den Schafen, recht rein abgehütet werden könne, wozu ungefähr eine Zeit

von 8 Tagen gehören wird. Sobald solches geschehen ist, lässet man dieses Klee-Land auf eben die Art, wie bey dem Erbsen-Acker gewöhnlich ist, umstürzen, und etwa 14 Tage liegen, damit die von unten herauf gebrachten Erd-Theile von Luft und Sonne aufs neue durchdrungen und aufgelöset werden können. Alsdann besäet man dasselbe, ohne weitere Zubereitung, mit Rocken, und eget es gehörig ein. Da dieses ganz füglich 8, oder längstens 14 Tag nach Mich. geschehen kann, so ergibt sich von selbst, daß solches noch die beste Saat-Zeit für das Winter-Getreide ist, und man also nicht befürchten darf, daß es kein gehöriges Gedeihen haben werde. Der Rocken wird sich vor allen andern Stücken auf dem ganzen Felde, und auch selbst denjenigen, die frisch gedünget sind, hervor thun, und man wird in dergleichen Klee-Stücken öfters schon Lager-Korn haben. Die Ursachen dieser besondern Fruchtbarkeit des Klee-Landes sind noch immer problematisch.

Vielleicht entsteht diese vorzügliche Düngungs-Kraft von den fetten und substanziösen Wurzeln des Klees, welche, wenn sie in dem Lande verfaulen, dem darein gesäeten Getreide eine so überflüssige Menge von Nahrungs-Säften mittheilen. Da sie aber, wenn sie solche bloß aus dem Erdreiche erhielten, dem Acker nicht mehr Kräfte wieder geben konnten, als sie von ihm empfangen hätten: so ist wahrscheinlich, daß der Klee überhaupt eine besondere Eigenschaft besitze, die in der Luft befindlichen, zur Nahrung der Pflanzen dienlichen Theilchen an sich zu ziehen, und das ihm zu seinem Wachsthum übergebene Erdreich damit zu bereichern. Andere aber haben solches nicht für hinlänglich gehalten, sondern vielmehr diese Fruchtbarkeit auf die Menge der Schmetterlinge, die sich des Sommers auf die Blüthen und Blätter des Klees zu setzen pflegen, gründen wollen. Dem sey wie ihm wolle, so bleibt es doch allemahl eine in der wirthschaftlichen Erfahrung gegründete Wahrheit, daß in einem solchen Klee-Acker nicht allein gutes, sondern auch das beste Getreide wächst, folglich der Kleebau auf die angezeigte Weise dem Getreidebaue nicht

nur

nur unschädlich, sondern auch so gar nützlich und vortheilhaft sey.

Der Einwand, den sonst Unerfahrne deshalb, daß dadurch, wenn gleich dem Getreidebaue nichts entginge, doch die so nützliche und unentbehrliche Brach-Weide gar sehr geschmählert würde, ist an sich sehr ungegründet und unerheblich. Man muß ja rechnen, daß die Kühe, die jetzt auf dem Stalle gefüttert werden, auch an der Brach-Weide ihren Antheil haben müssen; sie würden aber gewiß eine weit größere Morgen-Zahl, als jetzt bey der Stall-Fütterung zu ihrer Unterhaltung nöthig ist, gebraucht haben. Das übrige Vieh hat daher einen offenbaren Vortheil dabey, und genießt von der Brach-Weide mehr, als es sonst davon genossen haben würde. Diejenigen Wirthe, die ihre ganze Glückseligkeit auf die Schäferey gründen, und daher den futtergierigen Schäfern ein allzu leichtes Gehör geben, pflegen bey dem Vorschlage einer solchen Klee-Wirthschaft besonders aufzuwachen, und auf die Gedanken zu gerathen, daß dadurch die Schäferey sehr leiden und zu Grunde gehen werde. Allein, auch diese Bedenklichkeit ist ungegründet. Die Schäferey verliert nicht nur an der für sie bestimmten Brach-Weide nichts, sondern gewinnt vielmehr dabey sehr. An denen Orten, wo Brach-Hägungen gewöhnlich sind, hat die Schäferey an dem auf den fetten Ackerstücken, wo auch der Klee gezeuget wird, gewachsenen Grase gar keinen Antheil, sondern sie muß sich ordentlicher Weise bloß mit den magern Hinter-Aeckern behelfen. Nur alsdann, wenn die Hägungen von dem Rindviehe ausgehütet werden, wird den Schäfern erlaubt, solche auf einige Tage, und bis der Pflug hinterher kommt, zu behüten, und das etwa übrig gebliebene Gras mit den Schafen abzuweiden. Diese Schäferey-Gerechtigkeit aber wird durch den angezeigten Kleebau auf keine Weise ge-

ſchmählert, ſondern es werden derſelben vielmehr durch die Behütung der abgebrachten Kleeſtücke, ehr ſie zur Getreide-Einſaat umgeſtürzet werden, weit mehrere Vortheile, als ſie vorher gehabt hat, geſtiftet. In fruchtbaren Jahren ſchlägt der Klee nach der letzten Aernde noch gemeiniglich dermaßen ſtark auf, daß ein ſolches Kleeſtück der beſten Wieſe ähnlich iſt; und 1 Morgen von ſolchem wieder ausgeſchlagenen Klee-Lande iſt gewiß den Schafen nützlicher, als 10 Morgen von dem vorhin ausgehüteten gewöhnlichen Brach-Lande.

Ueberhaupt iſt dieſe Art des Kleebaues keinem Viehe, und auch ſelbſt demjenigen nicht, welches nicht auf dem Stalle gefüttert, ſondern auf die Weide getrieben wird, auf irgend eine Weiſe nachtheilig. Die wenigen Morgen Acker, die zur Stall-Fütterung erfordert werden, und dadurch der Hütung entgehen, wollen auf einem Felde, welches nur einiger Maßen einen weiten Umfang hat, ſo viel als nichts ſagen. Dieſer geringe Abgang wird auch ſchon, wie ich bereits erwähnt habe, durch denjenigen Klee, welcher nach dem letzten Schnitte nachwächſt, und dem weidenden Viehe zur Abhütung frey bleibt, hinlänglich erſetzt. Ueberdem iſt gewiß, daß an denen Orten, wo dieſe Klee-Wirthſchaft einige Jahre nach einander getrieben worden iſt, zuletzt der größte Theil der Acker-Weide mit Klee vermenget, und dieſelbe dadurch gar ſehr verbeſſert wird. Man fängt, wie unten mit mehrerm bemerket werden wird, den Klee nicht gern ehr, als bis er Blumen geſetzt hat, zur Fütterung zu gebrauchen an. Ganz natürlich iſt es daher, daß, ehe man mit dem Abmähen eines ganzen Stückes fertig wird, der letzte Klee ſchon zu einer gewiſſen Reife gelanget, und folglich bey dem Abhauen einen Theil ſeiner Samen-Körner auf den Acker verſtreuet. Man wird ſolchemnach unter dem Getreide eines Acker-Fleckes,

auf

auf welchem vorher Klee gebauet war, jederzeit eine Menge frisch aufgeschlagenen Klee wahrnehmen. Auch schlagen die bey dem Umstürzen von dem Pfluge nicht berührten, und also unbeschädigt gebliebenen Klee-Wurzeln wieder von frischem aus, und thun eine gleiche Wirkung, als der ausgefallene Klee-Samen selbst. Dieser unter dem Getreide mit aufgeschlagene Klee ist demselben so wenig schädlich, daß er vielmehr das Stroh-Futter davon gar sehr verbessert, und folglich für alle Arten von Vieh, welche bey ihrer Winter-Fütterung dieses Stroh-Futter zu genießen haben, mancherley Nutzen stiftet. Ein Wirth, besonders ein solcher, der allenthalben zum Kleebau tauglichen Acker hat, bleibt damit nicht immer auf einerley Stücken, sondern wechselt damit alle Jahre ab, und dadurch, so viel möglich, seinem ganzen Felde diese Wohlthat wiederfahren zu lassen. Hieraus ergibt sich von selbst, daß in einigen Jahren, bey einer solchen fortgesetzten Klee-Wirthschaft, der größte und beste Theil der Acker-Weide mit Klee vermenget werden müsse. Ist aber der Klee nur einmahl in dem Lande, so besamet er sich nachher von selbst, und wird so leicht nicht wieder ausgehen, sondern jederzeit eine gute und nahrhafte Acker-Weide enthalten.

Es ist nur zu beklagen, daß unsern Bauern hiervon nichts zu Nutzen kommt, oder sie sich vielmehr diese Vortheile, die sie eben so gut, als die Herrschaft genießen könnten, aus Dummheit und Vorurtheilen nicht zu Nutzen machen wollen. Man findet zwar, daß die Bauern in ihren Gärten und Achter-Höfen oder Wörden, einigen Klee anzubauen pflegen, weil sie durch das Beyspiel der Herrschaft dazu angereitzet worden sind. Dieses Klees bedienen sie sich aber bloß als einer Neben-Hülfe in der Fütterung; und selten pflegt, ausser den Pferden, den andern Vieh-Arten etwas davon zu Nutzen zu kommen. Von einem Klee-

Baue

Baue in dem freyen Acker-Felde wollen sie nichts wissen, und sie halten es für weit nützlicher, wenn sie einen Theil ihrer Brach-Felder mit überflüssigen Erbsen besäen können und dürfen. Die Unvernunft des Bauern legt sich in diesem Stücke um so mehr zu Tage, als er nicht allein durch das überflüssige Erbsen-Säen den Acker gar sehr aussauget, und zum Getreidebau untüchtiger macht, sondern ihm auch der Vorwand wegen des für die Schäferey nutzbaren Erbsen-Strohes, dessen die Herrschaften, und noch mehr deren Pächter, zur Beschönigung einer übermäßigen Erbsen-Aussaat sich zu bedienen pflegen, nicht zu Statten kommen kann, indem den Bauern an den meisten Orten entweder gar keine, oder doch nur sehr wenige Schafe zu halten, erlaubt ist. Die Absicht der Bauern bey dem vielen Erbsen-Säen geht also nur dahin, von dem Ertrage der Körner, den sie gewinnen, und der durch die künftigen schlechtern Früchte in der Rocken-Aernde öfters doppelt verloren geht, einigen Nutzen zu ziehen. Auf die bessere Unterhaltung ihres Viehes, die doch eben sowohl, als bey den Herrschaften, ihre wahre Wohlfahrt ausmacht, denken sie fast gar nicht. Sie lassen alles bloß auf die gemeine Feld- und Acker-Weide ankommen, und beklagen sich unaufhörlich, daß solche schlecht, und zur Erhaltung ihres nöthigen Viehstandes nicht hinlänglich, sey. An vielen Orten ist dieses zwar wahr; indessen aber ist auch gewiß, daß die Bauern durch eine vernünftige Industrie, und besonders durch einen angelegten Kleebau, eben so wohl, als es den Herrschaften möglich ist, einen verhältnißmäßigen Viehstand reichlich zu unterhalten, im Stande seyn könnten. Nach der Verfassung in der Mark Brandenburg, sollte billig ein Bauer, der 2 Hufen besitzt, auf seinen Acker mehr nicht, als 2 Scheffel Erbsen, auszusäen befugt seyn. Bey einer nachgebenden, und nicht auf alles so genau

Acht

Acht habenden, Herrschaft, fiel er aber gemeiniglich gewiß 4 Scheffel aus, und verdirbt sich dadurch aus einem unverständigen Eigennutze seinen Acker. Sein Vieh hingegen leidet, in Ansehung der Hütung, Noth, woran er zum Theil, wegen des übermäßigen Erbsen-Säens, selbst Schuld ist. Man lasse indessen dem Bauer die bisher mit Erbsen in der Brache bestellte Saat in so weit zwar frey, doch mit der ausdrücklichen Bedingung, daß er nur die Hälfte davon mit Erbsen besäen, die andere Hälfte aber zum Klee-Bau anwenden müsse. Auf diese Art wird ein jeder Bauer beynahe 2½ Morgen Klee-Land im Felde haben. Hat er dieses, so darf er niemahls wegen einigen Futter-Mangels für sein Vieh bekümmert seyn. Will die Weide in der Brache ein Ende nehmen, so darf er nur anspannen, und einen Wagen voll Klee herein hohlen. Hierdurch wird aller Futter-Mangel, worüber fast an allen Orten von den Unterthanen so sehr geklaget wird, gestillet, und diese werden in die Verfassung, ihr sämmtliches Vieh, auch bey ermangelnder genugsamer Weide reichlich zu erhalten, gesetzet werden. Diejenigen Grund-Herrschaften, denen das Recht des Eigenthumes an ihren Bauern-Gütern zusteht, können eine so vernünftige Einrichtung von selbst einführen, und die Bauern, die ihr eigenes Bestes verkennen, und sich nicht selbst in Güte dazu bequemen wollten, mit der Schärfe dazu anhalten, weil ihnen an der Aufrechterhaltung der Bauer-Wirthschaft sehr viel gelegen ist. Da aber nicht in allen Ländern und Provinzen die Bauer-Höfe den Herrschaften zugehören, sondern solche gemeiniglich den Bauern selbst eigenthümlich zuständig sind, so würde es sehr heilsam seyn, wenn eine allgemeine Landes-Verordnung, wodurch dieses gesetzlich verfüget und zur Nothwendigkeit gemachet würde, erginge. Die herrschaftlichen Schäfereyen haben ebenfalls keinen Nach-

theil davon, weil ihnen der Klee-Aufſchlag nach dem letztern Schnitte auch auf den Bauer-Aeckern jederzeit zum Abhüten frey bleiben muß, es wäre denn, daß die gemeinſchaftliche Hütung auch in Anſehung des Schaf-Viehes gänzlich wäre aufgehoben worden. Alsdann aber ſtände auch den herrſchaftlichen Schäfern ohnedieß kein Recht der Behütung auf den Bauer-Aeckern zu. Damit indeſſen dergleichen Klee-Ausſaat der gemeinſchaftlichen Hütung der Unterthanen unter ſich keinen Eintrag thun möge, wäre ſolche Einrichtung zu treffen, daß die Klee-Stücke eben ſo, wie das Erbſen-Land, in einem Striche zu liegen kommen. Wären die Bauern des auf ſolche Art im Felde erzeugten Klees nicht überall benöthigt, ſo würden ſie ſolchen doch, um ihre Kühe in einen deſto beſſern Stand zu ſetzen, anwenden können.

Was ich bisher von dem Kleebaue geſagt habe, beziehet ſich bloß auf ſolche Gegenden, wo, vermöge der

Er setzt nähmlich, 1. voraus, daß man die Aecker durch die Mischung der verschiedenen Erd-Arten in den Stand gesetzt habe, die Nahrungs- und Bestand-Theile der Pflanzen in reicherm Maße empfangen, in sich verwahren, und den Gewächsen übergehen und mittheilen zu können.

2. Hierauf wäre im ersten Jahre im Herbste auf das erste Viertel Rocken, Dinkel, Winter-Weitzen; im folgenden Frühlinge in das zweyte Viertel Sommer-Rocken, Sommer-Dinkel, Weitzen, Gerste; in das dritte aber Haber, Erbsen, Linsen; und auf das vierte, lauter Gemenge von Haber, Erbsen, Wicken ꝛc. solches aber nach und nach von 14 zu 14 Tagen, zu säen, um beständig frisches Futter für das Vieh zu haben. In das zweyte Viertel würde zugleich Klee gesäet.

3. Wie nun das Gemenge nach und nach abgegraset würde, so müßte auch die Stelle von 14 zu 14 Tagen mit Miste befahren, umgeackert, und zur Winter-Saat zubereitet werden. Würde nun nach Bartholomäi dieses Futter ein Ende nehmen, so müßten die Wiesen etwas beytragen; um Jacobi bis Mich. würde man auch schon den Klee auf dem einen Viertel abmähen können, insonderheit wenn dasselbe im Frühlinge mit Gypse wäre bestreuet worden; folglich würde man für den ersten Sommer Futter genug haben, zumahl, wenn man sich mit Vieh sogleich nicht überstellen würde.

4. Wenn nun also das zweyte Jahr herbey kommt, so hat man auf dem einen Viertel Klee; auf dem zweyten, Winter-Getreide; auf das dritte wird Sommer-Getreide, und darunter wieder Klee, gesäet; in das vierte aber, welches gleich im Frühlinge gedünget wird, kommen

5. Kartoffeln, Turnips oder Dickrüben, Sommer-Reps, auch Früh-Gerste ꝛc.

6. Alle Herbst wird das Klee-Viertel umgestürzet, und wie an demselben Herbste vorher, wo Kartoffeln, Turnips, und d. gl. stand, Winter-Getreide gesäet wird, so werden auf dem im folgenden Jahre im Herbste herum geworfenen Klee-Viertel wieder Kartoffeln ꝛc. gebauet. So fährt man nach dem Schema alle Jahre fort, und dünget nach Belieben 1 oder 2 Viertel.

Es iſt aber nicht immer nöthig, bloß des Kleebaues wegen dieſe Acker-Eintheilung einzuführen, ſondern es iſt dieſelbe bereits in vielen Gegenden in einer landüblichen Verfaſſung und Gewohnheit gegründet.

In wie weit auch bey dieſer Acker-Eintheilung ein Kleebau im freyen Felde auf eine bequeme und nützliche Art möglich zu machen ſey, wird daher, ohne in der allgemein gebräuchlichen Acker-Verfaſſung ſolcher Gegenden etwas abändern zu dürfen, nur mit wenigem unterſuchet werden müſſen. Ein Beyſpiel hiervon gibt uns die ganze in Hinter-Pommern an der Oſt-See-Küſte belegene Gegend. Daſelbſt haben die zum Getreidebau beſtimmten Aecker durchgehends vier Felder oder Schläge. Das eine wird mit Winterung, das zweyte mit Sommerung, das dritte mit verſchiedenen Arten von Erbſen, Wicken, Linſen und andern dergleichen Hülſen-Früchten beſäet, das vierte aber liegt brach, und dabey zugleich dem Viehe zur Weide. In dieſen Gegenden wird keines der drey Felder zum Kleebau angewendet; denn es fehlt dort an den wenigſten Orten an hinlänglicher und zugleich nahrhafter Weide, daher die dortigen Einwohner auch ihren ſämmtlichen Acker in einer vollkommenen vierjährigen Düngung zu unterhalten im Stande ſind. Durch dieſe Acker-Eintheilung wird auch der Getreidebau, wie nach dem Mayerſchen Vorſchlage geſchehen würde, nicht verkürzet, ſondern offenbar vermehret. Sie nutzen alle Jahr drey Viertel des ganzen Feldes zum Getreidebau, da hingegen ſolches, bey der ſonſt gewöhnlichen Eintheilung des Ackers in drey Felder, nur auf zwey Drittel geſchieht. Dieſes wird durch den ſtarken Vieh-Stand, und vielen Miſt, den die dortigen Einwohner gewinnen, möglich gemacht. Bey ſo bewandten Umſtänden haben ſie alſo die Stall-Fütterung, mithin auch den Kleebau, nicht nöthig. Indeſſen iſt eines Theils der Ueberfluß guter und nahrhafter Weide,

auch

auch in der dortigen Gegend nicht allenthalben gleich, und andern Theils beruhet die Haupt-Sache in der dortigen Weide auf das vierte jährlich brach liegende Feld, welches wegen der starken Neigung, die der dortige Acker zum Gras-Wuchs hat, gemeiniglich gleich der besten Wiese bewachsen, und mit Grase bedeckt ist.

Ausser dieser Brach-Weide, und den dortigen Wiesen nach abgebrachtem Heu, haben die dasigen Einwohner nur selten andere Hütungs-Plätze, auf welchen sie ihr Vieh in der Zwischenzeit, wenn das Brach-Gras aufgehört hat, und das Heu von den Wiesen noch nicht abgebracht worden ist, unterhalten könnten. Die Stoppel-Weide ist das einzige Unterhaltungs-Mittel, wozu sie in dieser Zwischenzeit ihre Zuflucht mit ihrem Viehe nehmen können. Vor der Aernde also, welche aber in dortigen Gegenden, wegen der von der benachbarten Ost-See entstehenden kalten Witterung, später, als an andern Orten, einzutreten pflegt, können sie die Brach-Weide nicht wohl entbehren, sondern sind, aus dieser Ursache, einen großen Theil des Brach-Feldes bis dahin ungepflügt zu lassen, genöthigt. Wie schädlich dieses dem Getreidebaue werden müsse, fällt von selbst in die Augen. Der dortige Acker sollte, wegen seiner besondern grasartigen Beschaffenheit, nicht allein zeitig bestellet werden, sondern es würde auch dem größten Theile davon ein viermahliges Pflügen sehr dienlich seyn. Beydes aber kann aus vorerwähnten Ursachen nicht geschehen. Luft und Sonne behalten nicht Zeit genug in das Erdreich zu wirken, und die darin befindlichen Nahrungs-Säfte aufzulösen, sondern es muß alles übereilet werden, wenn man nicht, mit der Saat einzufrieren, Gefahr laufen will. Aus diesen späten Saat-Zeiten entstehen wieder späte Aernden, und es wird folglich das Uebel, welches, der Fruchtbarkeit der dortigen Aecker

ungeachtet, doch gemeiniglich nur ſchlechte Aernden verurſachet, von Zeit zu Zeit immer vermehret. Aus dieſem Grunde würde es nicht undienlich ſeyn, wenn die dortigen Einwohner ſich ebenfalls des Kleebaues befliſſen, um damit zu der Zeit, wenn nach wirthſchaftlicher Ordnung die Brache ungepflüget ſeyn muß, ihr Vieh, bis zur Stoppel-Weide und Wieſen-Behütung, auf dem Stalle unterhalten zu können. Einer ordentlichen und beſtändigen Stall-Fütterung, die ſonſt an Orten, wo es an zureichender und nahrhafter Hütung gänzlich fehlt, nothwendig iſt, bedarf es zwar hier nicht; doch findet ſie, aus vorerwähnten Gründen, in ſo weit, als ſonſt der Ackerbau darunter leidet, ebenfalls Statt.

Auch bey dieſen vier Feldern kann, ohne die bisherige Ordnung im Getreidebaue zu verrücken, der Kleebau im freyen Felde gar füglich ausgeübet werden. Man ſäet eben ſo, wie bey der Acker-Eintheilung in drey Felder, den Klee im zweyten Felde unter die Gerſte. Dieſes zweyte oder Gerſten-Feld iſt in den nächſt darauf folgenden Jahren, nach der oben erwähnten Ordnung, zu Erbſen und andern Hülſen-Früchten beſtimmt. Durch den alsdann nutzbaren Klee würde es zwar geſchehen, daß einige Scheffel Erbſen weniger geſäet werden könnten. Allein, hierbey würden die Beſitzer der dortigen Güter gewiß keinen Schaden haben, ſondern dieſer geringe Abgang in der Erbſen-Saat würde durch den Vortheil, der ihnen durch eine beſſere und richtigere Acker-Beſtellung in der Winter-Saat nothwendig davon zufallen müßte, reichlich erſetzet werden. Das an den dortigen Orten gewöhnliche überhäufte Erbſen-Säen iſt ohnedieß eine Urſache, welche die natürliche Fruchtbarkeit des daſigen Bodens gar ſehr hindert.

In denjenigen Gegenden, wo der Getreide-Acker nur in zwey Felder eingetheilt iſt, hat der Kleebau im freyen Felde Schwierigkeiten wieder ſich, die ſich

bey

bey den andern Feld-Eintheilungs-Arten nicht finden. Indessen kann man doch auch fast mit Gewißheit voraus setzen, daß an solchen Orten die Besitzer nicht allein sehr guten, sondern auch nur wenigen Acker haben müssen; denn nur dieses allein kann sie zu einer solchen Eintheilung, bey welcher sie ihren Acker alle Jahr zu nutzen im Stande sind, vernünftiger Weise bewogen haben. Bey einer solchen Acker-Eintheilung kann man ferner annehmen, daß es nicht an der gehörigen Düngung, folglich auch nicht an dem verhältnißmäßigen Vieh-Stande fehlen müsse. Ein Acker, welcher alle Jahr Früchte tragen soll, und dem keine Ruhe, um wieder neue Kräfte sammeln zu können, gelassen werden will, muß natürlicher Weise in einem weit bessern Düngungs-Zustande stehen, als ein anderer, der nur wechselweise genutzet, und dem nachher wieder Ruhe gelassen wird. Es ist daher nicht leicht zu vermuthen, daß die Stall-Fütterung an solchen Orten nothwendig seyn werde. Sollte jedoch dieselbe erforderlich, und mithin auch ein verhältnißmäßiger Kleebau nöthig seyn, so wird er zwar nicht ganz unmöglich fallen, aber doch nicht dergestalt eingerichtet werden können, daß dadurch dem Getreidebaue gar nichts abgehen sollte. Da man bey dieser Einrichtung von keiner Brache etwas weiß, sondern der sämmtliche Acker alle Jahr mit Getreide besäet wird, so muß nothwendig jährlich von dem Getreidebaue so viel Acker, als zu dem verhältnißmäßigen Kleebaue erforderlich ist, abgehen. Indessen geht doch, auch bey der Methode, den Klee im Felde anzubauen, nur immer eine Tracht an Getreide verloren, da sich hingegen solches bey den gewöhnlichen Klee-Koppeln auf alle Trachten erstreckt. Nur wird es darauf ankommen, in welcher Getreide-Sorte, diesen Verlust der einen Tracht zu leiden, am rathsamsten sey. Das Winter-Getreide hat wohl vor dem Sommer-Getreide, in Ansehung sowohl seiner Nutzbarkeit, als

auch Werthes, jederzeit einen unſtreitigen Vorzug. Es iſt daher vernünftig, daß man dieſes auch in dem gegenwärtigen Falle beobachte. Alsdann aber kann der zu erzeugende Klee, welcher in dem folgenden Jahre genutzet werden ſoll, nicht, wie es ſonſt die Natur der Sache bey den andern vorhin erwähnten Acker-Eintheilungs-Arten mit ſich bringt, unter die Gerſte geſäet werden, ſondern es iſt dazu in dem Winter-Felde ein bequemer Fleck auszuſetzen. Auf ſolche Art leidet der Eigenthümer nur an der Gerſte, niemahls aber an dem Rocken oder Weitzen, durch den Kleebau einigen Verluſt. Die Erfahrung lehrt, daß der im Winter-Felde unter dem Rocken geſäete Klee ebenfalls nicht allein gut aufgeht, ſondern auch in dem folgenden Jahre, wo er genutzet werden ſoll, ein gehöriges Wachthum hat. Die jungen Klee-Pflanzen können zwar, wenn der Klee nur erſt kurz vor den Winter geſäet worden iſt, vor Eintritt deſſelben nicht eine ſolche Stärke, als die im Frühlinge unter der Gerſte aufgegangenen, erlangen; dagegen aber haben ſie auch den Vortheil, daß ſie, da ſie den Winter hindurch von der Saat bedeckt ſind, und unter derſelben gegen alle Arten von Witterung mehr Schutz haben, nicht ſo leicht vom Froſte gerühret, und beſchädiget werden können.

Hr. Graf v. Mattuſchka, macht im 2 Theile ſeiner Flora Sileſiaca, Bresl. und L. 1777, gr. 8 S. 163, f. ſeine Feld-Eintheilung bekannt, die er ſeit 8 Jahren auf einem 5 Meilen von Breslau entfernten Land-Gute eingeführt hat, wo er den Vortheil zu haben verſichert, für die Schafe den Vertrieb auf den Aeckern ſeiner Unterthanen zu genießen, und auſſer dieſem ſelbige theils auf einem mit Kiefern bewachſenen Berge, theils auf magern Kleeſtücken, theils auf Winter- und Sommer-Stoppeln mit hinlänglicher Weide zu verſorgen, dergeſtalt, daß der völlige dritte Theil des geſammten Acker-Terrains jährlich als Klee-Wieſe genutzet

genutzet werden kann. Um, wie gewöhnlich, einen dritten Theil des Feldes mit Winter-Saat, und den andern mit Sommer-Saat jährlich bestellen zu können, mußte die Eintheilung in sechs Schläge geschehen. Folgende Tafel zeigt die Bauart derselben durch 6 hinter einander folgende Jahre; im 7ten ist der Zustand des Feldes wieder so beschaffen, wie im ersten.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
1 J.	Weitzen.	Gerste.	Korn.	Haber mit Klee.	Klee-Wiese.	Klee-Wiese. *
2 J.	Gerste.	Korn.	Haber mit Klee.	Klee-Wiese.	Klee-Wiese. *	Weitzen.
3 J.	Korn.	Haber mit Klee.	Klee-Wiese.	Klee-Wiese. *	Weitzen.	Gerste.
4 J.	Haber mit Klee.	Klee-Wiese.	Klee-Wiese. *	Weitzen.	Gerste.	Korn.
5 J.	Klee-Wiese.	Klee-Wiese. *	Weitzen.	Gerste.	Korn.	Haber mit Klee.
6 J.	Klee-Wiese. *	Weitzen.	Gerste.	Korn.	Haber mit Klee.	Klee-Wiese.

Die Kleestücke, welche mit einem * bezeichnet sind, werden im Jul. umgebrachet, und mit Winterung für das

zukünftige Jahr bestellt, nachdem selbige vorher gehörig bedünget worden sind.

Hr. Schreve, in Nienburg, beschreibt, in der 6ten Samml. der zellischen Landwirthschaftsgesellsch. Nachr. den Nutzen des rothen holländ. Kleebaues in den niedern Marsch-Gegenden der Grafschaft Hoya. Die Art der Benutzung der Marsch-Ländereyen ist in der Grafschaft Hoya sehr verschieden. In den Aemtern Stolzenau und Nienburg wird solche alljährlich zur Saat gebraucht, ausser daß einzele Einwohner aus Mangel der Weide wohl einen Theil abwechselnd dreeschen. Dagegen ist in den Aemtern Hoya und Syke der allgemeine Gebrauch, die Marsch nur 4 Jahr zu besäen, und dann 4 Jahr zu weiden. Der Grund dieses Unterschiedes beruhet allein darin, daß in den ersten Aemtern die Weser sich frey ergießt, und den jährlichen Abgang der Fettigkeit dem Lande durch ihren Schlick wieder ersetzt. Weil aber in den letztern Aemtern der Fluß durch die Teiche von der Ueberströhmung abgehalten wird, so müssen dem Lande die in den 4 Saat-Jahren abgegangenen Kräfte durch die Ruhe in den 4 folgenden Weide-Jahren, und durch den Dünger des darauf zu treibenden Viehes, ersetzet werden, um es sodann wieder zur Saat gebrauchen zu können. Die gewöhnliche Nutzung der Weide-Jahre besteht bloß darin, daß das von der Natur hervor gebrachte Gras mit dem Viehe abgehütet werde. Und da solches in den beyden ersten Jahren wenig beträgt, so ist der Ertrag eines Stück Landes in den Weide-Jahren nur zur Hälfte gegen die Saat-Jahre zu rechnen. Um nun die Nutzung der Weide-Jahre ergiebiger zu machen, haben einige Bürger zur Hoya angefangen, den großen holländ. rothen Klee zu bauen; und die Erfahrung hat gelehrt, daß dadurch sehr großer Vortheil erhalten worden ist.

In den 4 Saat-Jahren wird das Land auf folgende Art bestellt: in dem ersten mit Bohnen, im zweyten mit Weitzen, im dritten mit Gerste, und im vierten wieder mit Weitzen. Wenn im 4ten Jahre das Land im Herbste mit Weitzen bestellt ist, wird alsdann zeitig im Frühlinge der Klee-Same darüber gestreuet; und man hat befunden, daß der Klee alle die Zufälle ertragen könne, wodurch der Weitzen nicht beschädigt wird. Auf 1 Morgen von 120 Quadrat-Ruthen werden 4 ℔ Klee-Same erfordert.

Da die Dauer dieser Art Klees eigentlich nur auf 3 Jahr gerechnet wird, obgleich in dem 4ten noch ein guter Theil davon übrig ist, und dann das 4te Saat-Jahr das erste Klee-Jahr mit ist, so erstreckt sich dessen Dauer nur auf die zwey ersten Weide-Jahre. In dem ersten Klee-Jahre wird also der Klee zugleich mit dem Weitzen abgemähet, und die Stoppel mit Vieh betrieben. In dem zweyten Klee- oder ersten Weide-Jahre ist es am vortheilhaftesten, den Klee ein Mahl zu mähen, und sodann zu weiden. In dem dritten Klee- oder zweyten Weide-Jahre wird das Land gleich anfangs mit Vieh betrieben. Ein gleiches geschieht in den zwey übrigen Weide-Jahren, in welchen man zwar auf den Klee nicht mehr rechnet, die aber doch weit ergiebiger bleiben, als wenn das Land nur auf die gewöhnliche Weise gedreeſcht worden ist.

Im J. 1760 hatte ein gewisser Bürger zur Hoya, einen Kamp von 5 Molt oder 20 Morgen auf die beschriebene Art mit Weitzen und Klee bestellt. Er genoß also davon: 1) in dem ersten Klee-Jahre eine so viel bessere Stoppel-Weide, als wenn nur der Weitzen allein auf dem Felde gestanden hätte. 2) In dem zweyten Klee- oder ersten Weide-Jahre ärndete er anfangs 26 Fuder trocknen Klee, und betrieb den Kamp darauf mit 22 Kühen und 7 Pferden. 3) In dem dritten Jahre betrieb er solchen gleich anfangs mit 18 Stück Kühen. Wäre aber dieser Kamp nach der gewöhnlichen Art gedreeſcht worden, so wäre nicht allein die Stoppel in dem letzten Saat-Jahre so viel schlechter gewesen, er hätte auch in jedem der zwey ersten Weide-Jahre nur mit 10 Kühen betrieben werden können.

Nach der gewöhnlichen Art zu dreeſchen hätte dieser Kamp in den beyden erstern Weide-Jahren jedes Mahl nur 50 Thlr. eingetragen, weil auf dergleichen Weiden für eine Kuh nicht mehr als 5 Thlr. bezahlt werden. Da-

gegen iſt die Nutzung des Klees folgender Geſtalt anzuſchlagen:

1. In dem erſten Klee- oder dem letzten Saat-Jahre, ſind die Beſtellungs-Koſten bloß auf den Werth der 80 ℔ Klee anzuſchlagen, weil ſolche keine weitere Arbeit erfordern, als der Weitzen erfordert hätte. Den Klee-Samen erzieht der Hauswirth ſelbſt. Wenn aber auch deſſen Werth, das ℔ zu 6 Mgr. mit 13⅓ Thlr. in Anſchlag kommt, ſo werden doch dieſe Koſten durch die ſo viel ergiebigere Stoppel-Weide überflüſſig wieder erſetzet.

2. In dem zweyten Klee- oder erſten Weide-Jahre, war die reine Nutzung,

a) für 26 Fuder Heu, das Fuder aufs geringſte zu 5 Thlr. = = = = = 130 Thlr.

b) für 22 Kühe Weide-Geld, das Stück 3 Thlr. = = = = = = 66 Thlr.

c) für 7 Pferde auf 9 Wochen, das Stück wöchentlich 1 Thlr. = = = 63 Thlr.

259 Thlr.

3. In dem dritten Klee- oder zweyten Weide-Jahre, für 18 Kühe Weide-Geld, das Stück 6 Thlr. = = = 108 Thlr.

Summa von beyden Jahren 367 Thlr.

Dagegen hätten dieſe beyde Jahre nach der gewöhnlichen Art zu dreeſchen nur eingetragen = = = = = 100 Thlr.

Iſt alſo durch den Kleebau mehr gewonnen 267 Thlr.

wenn gleich auf die in dem dritten Weide-Jahre noch übrigen Klee-Stauden gar nichts gerechnet wird.

Es bleibt auch noch ein wichtiger Vortheil des Kleebaues, daß dadurch die Marſch von aller Art des Unkrautes, und ſonderlich des Köcks, gereinigt wird, der ſonſt auf keine Weiſe zu vertilgen iſt. Und eben deswegen iſt es nützlich, den Klee in dem erſten Weide- oder zweyten Klee-Jahre anfangs ein Mahl zu mähen. Denn weil eben zu der Zeit, da er gemähet wird, der Köck in der Blüthe ſteht, ſo wird die Beſamung dieſes höchſt ſchädlichen Unkrautes verhindert. Und weil der Klee ſich nunmehr genug beſtaudet hat, und geſchwinder als das Unkraut hervor wächſt, ſo

wird

wird letzteres, von was für Art es auch sey, gänzlich erstücket.

„Obgleich der Nutzen des Kleebaues überhaupt anerkannt wird, so wollen doch Einige behaupten, daß der Klee das Land eben so stark aussauge, als die Korn-Früchte, und man verlöre also in den folgenden Saat-Jahren, was man von dem Klee gewonnen, weil das Land die Ruhe nicht genossen habe, die man ihm durch die Dreesch-Jahre ertheilen wollen. Es ist nun zwar überhaupt noch nicht ausgemacht, ob der Klee das Land mehr dünge, als aussauge. Wenn aber auch das letztere wäre, so würde doch obiger Einwurf nur alsdann Statt finden, wenn der Klee beständig gemähet würde. Wird er aber auf die vorbeschriebene Art geweidet, so wird diese Bedenklichkeit völlig ausgeschlossen. Denn nach den oben gemachten Vergleichungen könnten bey der gewöhnlichen Art zu dreeschen in den beyden ersten Weide-Jahren 20 Morgen jährlich nur mit 10 Kühen betrieben werden. Dagegen ist die Weide auf diesen 20 Morgen durch den Klee also verstärkt, daß solche in dem ersten Weide-Jahre mit 22 Kühen und 7 Pferden, und in dem zweyten mit 18 Kühen betrieben worden. Wenn nun statt eines Pferdes zwey Kühe wären getrieben worden, so würde dieses Land in solchen beyden Jahren den Dünger von 54 Kühen, also von 34 Kühen mehr, als bey der gewöhnlichen Art zu dreeschen, genossen haben. Und da der Klee in solchen beyden Jahren unmöglich den Dünger von 34 Kühen verzehren können, so ist es offenbar, daß jene Bedenklichkeit bey dieser Methode, die Klee-Jahre zu nutzen, nicht eintreten könne. Die Erfahrung lehrt auch, daß ein auf diese Weise benutzter Klee-Kamp in den folgenden Saat-Jahren sich von allen schlechthin gedreeschten Kämpen dergestalt auszeichne, daß die augenscheinlichen Vortheile des Kleebaues nicht können in Zweifel gezogen werden.

„Man dürfte wohl glauben, daß diese Vortheile des Kleebaues auch auf der Geest an denen Orten erhalten werden könnten, wo die Unterthanen wegen Mangel der Hude und Weide genöthiget werden, einen ansehnlichen Theil ihres Saat-Landes zu dreeschen. Wenigstens würde es wohl eines Versuches werth seyn, ob die Art der Geest-Länderey, welche in hiesiger Grafschaft gedreescht zu werden pflegt, Kraft genug habe, diese große Art des Klees

hervor

hervor zu bringen. Auf einer fetten Geeſt hat es, nach Hrn. Reichart, B. 5, S. 207, f. keinen Zweifel, daß er wohl gerathe. Die gröſte Schwierigkeit auf der hieſigen mehrentheils geringen Geeſt würde darin beſtehen, woher man den erſten Dünger für den Klee nehmen wollte? Denn in der Folge würde ein ſo viel ſtärkerer Vieh-Stapel den Abgang des erſten Düngers reichlich genug erſetzen".

Wenn ein Landmann gern frühzeitig Klee haben, und ihn auch zugleich mit Korne beſäen will, iſt es, nach der Angabe der allgem. Haushalt. und Landwiſſ. 2 Th. S. 568, am beſten, ihn mit ſchwarzem Hafer zu ſäen, und denſelben, ſo bald als möglich, in die Erde zu bringen.

Das Sommer-Korn iſt, erwähnter Maßen, nicht das einzige, worunter Klee geſäet werden kann. Er wächſt auch gut unter Weitzen und Winter-Rocken, wenn er im Anfange des Oct. damit geſäet wird. Es ſind in der That Vortheile mit dieſer Methode verknüpft, die man bey andern nicht hat. Man hat angemerkt, daß ein trockner Sommer dem jungen Klee ſehr ſchädlich iſt. Keine Pflanze erfordert mehr Regen zur Zeit ihres erſten Aufſchießens, einige Monathe hindurch. Aus dieſer Urſache kommt der Klee allezeit gut fort, wenn er frühzeitig mit ſchwarzem Hafer geſäet wird, weil er alsdann den Vortheil des Frühlings-Regens genießt; wird er aber im Anfange des Winters mit Weitzen oder Rocken geſäet, ſo iſt es noch beſſer; denn alsdann hat er gewiß eine lange Zeit Näſſe, ehe die Sonne oder Dürre ihm ſchaden kann. In dieſem Falle verſtärkt er ſich auch in dem Boden gar ſehr, und wird bey der Korn-Aernde allezeit dick und blühend gefunden. Man darf übrigens nicht befürchten, daß, wenn der Klee dick unter dem Weitzen wächſt, der Weitzen, oder auch der Klee, wegen der vielen Nahrung, die er erfordert, leiden möchte; denn der Klee wurzelt viel tiefer, als der Weitzen.

Von

wird letzteres, von was für Art es auch sey, gänzlich erstücket.

„Obgleich der Nutzen des Kleebaues überhaupt anerkannt wird, so wollen doch Einige behaupten, daß der Klee das Land eben so stark aussauge, als die Korn-Früchte, und man verlöre also in den folgenden Saat-Jahren, was man von dem Klee gewonnen, weil das Land die Ruhe nicht genossen habe, die man ihm durch die Dreesch-Jahre ertheilen wollen. Es ist nun zwar überhaupt noch nicht ausgemacht, ob der Klee das Land mehr dünge, als aussauge. Wenn aber auch das letztere wäre, so würde doch obiger Einwurf nur alsdann Statt finden, wenn der Klee beständig gemähet würde. Wird er aber auf die vorbeschriebene Art geweidet, so wird diese Bedenklichkeit völlig ausgeschlossen. Denn nach den oben gemachten Vergleichungen könnten bey der gewöhnlichen Art zu dreeschen in den beyden ersten Weide-Jahren 20 Morgen jährlich nur mit 10 Kühen betrieben werden. Dagegen ist die Weide auf diesen 20 Morgen durch den Klee also verstärkt, daß solche in dem ersten Weide-Jahre mit 22 Kühen und 7 Pferden, und in dem zweyten mit 18 Kühen betrieben worden. Wenn nun statt eines Pferdes zwey Kühe wären getrieben worden, so würde dieses Land in solchen beyden Jahren den Dünger von 54 Kühen, also von 34 Kühen mehr, als bey der gewöhnlichen Art zu dreeschen, genossen haben. Und da der Klee in solchen beyden Jahren unmöglich den Dünger von 34 Kühen verzehren können, so ist es offenbar, daß jene Bedenklichkeit bey dieser Methode, die Klee-Jahre zu nutzen, nicht eintreten könne. Die Erfahrung lehrt auch, daß ein auf diese Weise benutzter Klee-Kamp in den folgenden Saat-Jahren sich von allen schlechthin gedreeschten Kämpen dergestalt auszeichne, daß die augenscheinlichen Vortheile des Kleebaues nicht können in Zweifel gezogen werden.

„Man dürfte wohl glauben, daß diese Vortheile des Kleebaues auch auf der Geest an denen Orten erhalten werden könnten, wo die Unterthanen wegen Mangel der Hude und Weide genöthiget werden, einen ansehnlichen Theil ihres Saat-Landes zu dreeschen. Wenigstens würde es wohl eines Versuches werth seyn, ob die Art der Geest-Länderey, welche in hiesiger Grafschaft gedreescht zu werden pflegt, Kraft genug habe, diese große Art des Klees

hervor

hervor zu bringen. Auf einer fetten Geeſt hat es, nach Hrn. Reichart, B. 5, S. 207, f. keinen Zweifel, daß er wohl gerathe. Die gröſte Schwierigkeit auf der hieſigen mehrentheils geringen Geeſt würde darin beſtehen, woher man den erſten Dünger für den Klee nehmen wollte? Denn in der Folge würde ein ſo viel ſtärkerer Vieh-Stapel den Abgang des erſten Düngers reichlich genug erſetzen".

Wenn ein Landmann gern frühzeitig Klee haben, und ihn auch zugleich mit Korne beſäen will, iſt es, nach der Angabe der allgem. Haushalt. und Landwiſſ. 2 Th. S. 568, am beſten, ihn mit ſchwarzem Hafer zu ſäen, und denſelben, ſo bald als möglich, in die Erde zu bringen.

Das Sommer-Korn iſt, erwähnter Maßen, nicht das einzige, worunter Klee geſäet werden kann. Er wächſt auch gut unter Weitzen und Winter-Rocken, wenn er im Anfange des Oct. damit geſäet wird. Es ſind in der That Vortheile mit dieſer Methode verknüpft, die man bey andern nicht hat. Man hat angemerkt, daß ein trockner Sommer dem jungen Klee ſehr ſchädlich iſt. Keine Pflanze erfordert mehr Regen zur Zeit ihres erſten Aufſchießens, einige Monathe hindurch. Aus dieſer Urſache kommt der Klee allezeit gut fort, wenn er frühzeitig mit ſchwarzem Hafer geſäet wird, weil er alsdann den Vortheil des Frühlings-Regens genießt; wird er aber im Anfange des Winters mit Weitzen oder Rocken geſäet, ſo iſt es noch beſſer; denn alsdann hat er gewiß eine lange Zeit Näſſe, ehe die Sonne oder Dürre ihm ſchaden kann. In dieſem Falle verſtärkt er ſich auch in dem Boden gar ſehr, und wird bey der Korn-Aernde allezeit dick und blühend gefunden. Man darf übrigens nicht befürchten, daß, wenn der Klee dick unter dem Weitzen wächſt, der Weitzen, oder auch der Klee, wegen der vielen Nahrung, die er erfordert, leiden möchte; denn der Klee wurzelt viel tiefer, als der Weitzen.

Von der Aussaat des Klees, unter Haber und Wicken, ertheilt Hr. v. F. im 3 B. der ökon. Nachr. der patriot. Ges. in Schlesien, a. d. J. 1775, S. 150, f. folgende Nachricht: „Nach den Erfahrungen, welche ich bey eigenem Anbau des Klees durch einige Jahre gesammelt habe, geräth dieses überaus nützliche Futter-Kraut alsdann am besten, wenn es unter Menge-Getreide von Haber und Wicken, das zum Abgrasen bestimmt ist, gesäet wird. Weder wenn es allein, noch wenn es unter Korn, Gerste oder Haber, steht, in so fern diese Gewächse reif eingeärndet werden sollen, gedeihet es so gut, und wuchert so vortheilhaft, ob auch schon der Acker von gleicher Güte ist, und mit gleich sorgfältiger Pflege behandelt wird. Inzwischen getraue ich mir doch nicht zu entscheiden, ob dieß allgemein richtig sey, oder durch die Verschiedenheit des Bodens und dessen Cultur, Abänderungen leide? Ich schließe bloß aus meinen Versuchen, und nach den Verhältnissen des Ackers, auf welchen sie gemacht worden sind, und theile ihre Geschichte mit, weil ich glaube, daß sie manchem Landwirthe nützlich seyn könne.

„Der Acker, auf den ich bisher den Klee gebauet habe, besteht aus einer Vermischung von feinem Sande mit etwas Lehm, ist von Farbe dunkelgrau, und hat zur Unterlage einen feinen gelb und weiß melirten Sand. Hieraus läßet sich leicht der Schluß auf dessen Beschaffenheit machen. Er ist warmer und trockner Art, folglich dem Klee, wenn er im ersten Jahre ohne Bedeckung vor der Sonnen-Hitze stehen muß, oder nicht genugsamen Regen bekommt, wenig dienlich. Hingegen schadet ihm auch in der Folge das Getreide, unter welchem er wachsen soll, je höher dieses über ihn empor kommt, und ihm Nahrung und Luft benimmt. Die Geschichte meiner letztern Proben, die ich deshalb angestellt habe, ist diese: Ich ließ im zeitigen Herbst einige Ackerstücke düngen, den Dünger sodann unterstürzen, und im folgenden Frühjahre das Land sehr enge ruhren. Auf diese Ruhr-Furchen wurde Haber und Wicken unter einander ausgesäet, der Acker klar ausgeeget, und nach diesem der Klee, theils rein gemacht, theils mit der Spreu, oben auf gestreuet und eingerechet. Durch dieses Verfahren habe ich, der großen und langen Dürre ohnerachtet, die im vorigen Sommer war, sehr reichliches Futter für

mein

mein Vieh erhalten. Ich bekam drey vortreffliche Gras-Aernden, davon die erſte in Wicken und Haber-Gras beſtand, die zweyte ſchon mit Klee-Blättern vermiſcht war, und die dritte der Klee beynahe allein ausmachte. Die Klee-Pflanzen auf dieſem Acker ſtanden nach der letzten Schur ſtark, dicht bey einander, und verſprechen durch ihre Munterkeit für dieſes Jahr ſehr vieles. So ſieht es aber hingegen auf dem Lande nicht aus, wo ich das Getreide habe reif werden, und dürre abmähen laſſen. Hier ſteht der Klee ſparſam und kränklich, indeſſen doch noch beſſer und mit mehr Hoffnung, als auf dem Stücke, worauf der Klee allein geſäet worden iſt, obſchon, wie vorher geſagt, auf allen drey Stücken der Boden von einerley Beſchaffenheit iſt, und gleiche Cultur erhalten hat".

Viele, wenn ſie ein Stück Korn-Land zum Graſe gebrauchen wollen, beſäen es mit Ray-Graſe (Lolch, Lolium perenne) und Klee; in dieſem Falle aber iſt die beſte Methode, beydes zu verſchiedenen Zeiten zu ſäen, ob es gleich nachher zuſammen aufwachſen muß. Das beſte Korn mit Ray-Graſe und Klee zu beſäen iſt Weitzen, und die beſte Methode dabey iſt folgende. Wenn der Weitzen zu ſeiner natürlichen und gehörigen Zeit geſäet wird, ſäe man den Samen des Ray-Graſes zugleich mit. Dieſes geſchieht natürlicher Weiſe bisweilen im October. Den Klee kann man im folgenden Frühlinge ſäen; dieſes muß aber gleich im Anfange deſſelben geſchehen, damit der Klee bey ſeinem erſten Wuchſe noch den Vortheil des Frühlings-Regens genießen, und im Sommer ſchon zu einiger Höhe aufgeſchoſſen ſeyn möge. Man hat auch noch eine andere Urſache, in dieſem Falle den Klee gleich im Anfange des Frühlinges zu ſäen, weil zur Bedeckung deſſelben nichts beſſer iſt, als das Feld zu walzen. Nun iſt das Walzen dem Korne, wenn es noch ſehr jung iſt, zuträglich; iſt es aber ſchon ziemlich aufgewachſen, ſo werden ſeine Halme durch das Walzen zerbrochen, und der Schade iſt alsdann nicht wieder zu erſetzen. Will der Landmann zweyerley Arten von Gras mit ſeinem Weitzen

tzen säen, muß er es mit der letztern Art eben so machen, als wenn er sie mit Gerste säet. Er kann also sein Ray-Gras mit dem Weitzen im Oct. säen; wenn er aber im Frühlinge auch seinen Klee säen will, muß solches nicht auf Gerathewohl mit der bloßen Hand geschehen, sondern er muß sich eines Hand-Bohrers dazu bedienen.

Der Zusatz des Ray-Graſes zum Klee ist in aller Absicht vortheilhaft, vornehmlich aber in Ansehung der Gesundheit des Viehes, welches davon frißt. Das Ray-Gras hat mehr von der Natur des gemeinen Graſes unserer Weiden, welches das eigentliche Futter des Viehes ist, an sich. Wenn es also mit dem Klee vermischet wird, so wird der Reichthum desselben dadurch gemäßiget, und ist gewisser Maßen so gut, als das Stroh, welches damit vermischet werden sollte. Zu gleicher Zeit, daß dasselbe den Klee gesunder macht, vergrößert es auch die Quantität desselben, denn es breitet die Wurzeln unter der Erde aus, da hingegen die Wurzeln des Klees in die Tiefe dringen, daß es also eben so gut mit dem Klee wächst, als das Korn, und die Quantität gar sehr auf dem Boden vermehrt wird; denn die Blätter wachsen so natürlich und so gut, als die Wurzeln, zusammen, und sind einander im geringsten nicht hinderlich. Der Klee verbreitet sich auf eine offene und lockere Art, und seine Zweige beschützen den Boden, wo die Wurzeln des Ray-Graſes stehen, so, daß es feucht und voller Nahrung ist; und zu gleicher Zeit schießen die schmahlen und dünnen Blätter des Ray-Graſes in die Höhe, und zeigen sich durch den Klee, ohne die geringste Beschwerlichkeit. Beyde wachsen mit einander, und lassen sich auch zusammen zum Trocknen abmähen, oder auch von dem Boden abfressen. Das muß sich aber der Landmann zur Nachricht dienen lassen, daß beyde zusammen nicht so gut sind, das Land zum Korne zu zubereiten, als Klee allein. Der Klee verbessert den Erdboden dadurch, daß die Oberfläche desselben dadurch beschützet, und die Nahrung aus der Tiefe desselben gezogen wird, daß also der obere Theil, indem er beschützet wird, unerschöpft bleibt. Dieses geht aber nur mit Klee allein an; denn die Wurzeln des Ray-Graſes gehen, eben so wie die Wurzeln des Kornes, nicht tief, und daher ist der Boden einiger Maßen erschöpft, wenn das Korn seine

Nahr-

Nahrung davon haben soll. Ich sage dieses nicht so uneingeschränkt, als wenn das Ray-Gras niemahls mit Klee müßte gemischet werden, wenn nachher Korn auf ein solches Land gesäet werden soll. Der Klee ist alsdann allein gut zu säen, wenn das Land bald darauf wieder Korn tragen soll. Will man es aber länger zum Grase liegen behalten, so ist es gut, Ray-Gras und Klee zugleich zu säen. Mischet man Ray-Gras mit Klee, wenn Korn bald darauf folgen soll, so muß die Quantität des erstern nur klein seyn; soll aber der Boden lange Gras tragen, so muß die Quantität desselben groß seyn.

Ausser den Methoden, den Klee entweder allein, oder auch mit Korne, zu säen, haben Einige ihn auch mit Erbsen, und Andere mit Pferde-Bohnen, gesäet. In dem ersten Falle pflegen die Erbsen den Klee wohl zu verderben; doch finden sich Gelegenheiten, wo es gut ist, ihn damit zu säen. Da die Bohnen nicht so, wie die Erbsen, auf dem Boden liegen, so kann man diese Einwendung nicht wieder sie machen. Da aber ein Bohnen-Land nicht so gut bereitet wird, als ein Land für Erbsen, der Klee aber ein wohl bearbeitetes Land erfordert, so hat er nicht so gute Art darauf. Wenn die Veränderung der Gewächse es nothwendig macht, so lässet sich dieses wohl thun, indem solcher Gestalt ein Boden gebraucht werden kann, welcher sonst müßig liegen würde; allein, dieses sind nur zufällige Dinge. Die guten und nützlichen Methoden sind diejenigen, die ich angezeigt habe, den Klee entweder allein, oder mit Gerste, Haber, Weitzen, oder mit Ray-Grase, nach der gemeinen Art, zu säen.

Nach Mills Nachricht (*), besäete Hr. v. Pontbriant, zu Rennes in Bretagne, ungefähr ½ Morgen Landes mit Flachs und Hanf, worunter Klee-Same gemengt war. So bald man den ersten gerauft hatte, kam der Klee hervor, und wuchs so schön, daß er im Nov.

(*) Im vollständ. Lehrbegriff von der prakt. Feldwirthschaft, 3 B. S. 243.

Nov. eben deſſelben Jahres gehauen wurde. Im Febr. gätete man ihn, und im Anfange des Mayes wurde er wieder gehauen. Weil er zu dick ſtand, machte er dazwiſchen Gänge, die 1 Fuß breit waren. Aus dieſen Gängen bekam er ſo viel Pflanzen, daß er mehr als 1½ Morgen Landes damit beſetzen konnte; daſelbſt wurden ſie 1½ F. von einander geſetzt, wodurch Platz genug zu hacken blieb, und ſie kamen ganz vortrefflich fort.

Ueber die Ausſaat des Klees in die Brach-Felder, hat Hr. Landvogt Chriſt von Mönchenſtein, Erfahrungen angeſtellt, und folgende Nachricht davon an die berneriſche ökonom. Geſellſch. aus Baſel eingeſchickt. Ein Stück Acker, 2½ Juchart groß, die Juchart auf 30000 Quadrat-Schuh gerechnet, das im J. 1761 mit Winter-Getreide beſäet geweſen war, ließ er zur Hälfte im Sept. deſſelben Jahres mit Winter-Gerſte, die andere Hälfte im folgenden Frühlinge mit Sommer-Gerſte beſäen. Den 30 März 1762, wurde der ganze Acker, da die Winter-Gerſte ſchon ziemlich ſtark war, bey gutem Wetter mit 16 Pfund Klee-Samen beſäet, und mit einer von Dornen gemachten Buſch-Ege überfahren. Den 19 Jun. wurde die Winter-Gerſte, und den 23 Jul. die Sommer-Gerſte geſchnitten. Das Jahr war ſehr trocken. Nach der Aernde ſahe man kaum einige zerſtreute ſeltene Klee-Stauden, die aber nach dem bald darauf erfolgten Regen mit ſolcher Gewalt hervor rückten, daß er zu Ende des Sept. in voller Blüthe ſtand, ſo daß er eingeärndet werden mußte. Ein Wagen voll vom beſten Futter, wofür 18 Franken gebothen wurden, zahlte den Samen und den Anbau reichlich. Im folgenden Jahre iſt dieſer Klee zwey Mahl gemähet und gedörret worden; das erſte Mahl zu Ende des Mayes, das zweyte in der Mitte des Auguſtes, und hat jedes Mahl 1½, mit 3 Pferden beſpannte, Wägen

guten Futters abgeworfen; und also, der Wagen zu 18 Franken gerechnet, 54 L. Nach dieser Aernde ist das Feld gepflüget und mit Getreide besäet worden, und zwar ohne dasselbe zu düngen. Nach einer guten Aernde ist es mit Rocken besäet worden, welcher das schönste Ansehen hatte. Hieraus ersieht man, daß der Klee mit großem Vortheile in Brach-Feldern gebauet werden kann. Hr. Christ räth, an statt des ersten Kornes, das zweyte oder Nach-Korn zu düngen, weil dadurch der Dünger dem Klee zu Statten kommt, dessen verfaulte Wurzeln dem folgenden Getreide Nahrung genug schaffen; auch daß man den Anbau des Feldes so einrichte, daß zu dem Weitzen oder Spelte der Boden nur zwey Mahl gepflüget, auf diesem aber nicht Winter- sondern Sommer-Getreide gebauet werde, damit der Acker drey Mahl gepflüget werde, zwey Mahl nach der Aernde, und ein Mahl im Frühlinge, so wird das Feld, wie bisher in 3 Jahren fünf Mahl gepflüget, und man hat nicht zu befürchten, daß der Boden zur Klee-Saat zu grasig werde. Der Klee muß weder zu dick, noch zu dünn, gesäet seyn. Nach dieser Erfahrung sind 6 bis 7 Pfund auf eine Juchart von 30000 Qu. Sch. hinreichend. Der Klee hat nicht nur das Feld reichlich bedeckt, sondern alles Unkraut, auch die Disteln, denen dieser Boden sonst ausgesetzt ist, erstickt, so, daß das darauf folgende Getreide von solchen rein geblieben ist. Den Grind (Cuscuta minor *C. B.*), den gefährlichsten Feind des Klees, zu vertilgen, hält Hr. Christ für das beste Mittel, daß man solchen, wie in den Wicken, ausgäte. Das wohlfeilste ist, den Klee-Samen selbst durch ein Haar-Sieb davon zu reinigen. Es fügt Derselbe folgende Berechnung bey.

Unkosten.

Unkosten.			Ertrag.		
16 ℔. Klee-Samen à 5 Bz.	L.	8 ″	1762. ein Wagen Futter	L.	18 ″
Drey Mahl zu mähen, 5 Mann ½ Tag, à 3 Bz.		4 10	1763. drey Wägen Futter		54 ″
Solchen zu verspreiten, dörren ꝛc. für alle drey Aernden		3 ″	Summa der Einnahme		72 ″
Fuhr- und Laderlohn für alle 3 Aernden, à 2 L.		6 ″	Summa der Ausgabe		21 10
	L.	21 10			50 10

NB. Der schweitz. Franke zu 10 Batzen gerechnet.

Der Pflüger-Lohn ist darum nicht gerechnet, weil der Acker für die Gerste mußte gepflüget werden, und also keine weitere Vermehrung der Arbeit erfordert wurde, als die Aussaat des Klees und das Einegen desselben, die noch sollte abgezogen werden.

Diesen Erfahrungen fügt Hr. Tscharner die seinigen bey, weil solche auf verschiedenem Boden, von verschiedener Lage gemacht worden sind.

„Auf einem Bauern-Gute, so ich vor einigen Jahren gekauft hatte, um eigene Erfahrungen im Anbaue des verschiedenen Bodens anzustellen, befindet sich ein Acker von 8 Jucharten, die Juchart zu 31250 Quadrat-Schuh gerechnet, der, wegen seiner Lage und der nachläßigen Wirthschaft der Besitzer, in vielen Jahren nicht angebauet worden, sondern seinem Viehe, nach Abtrag von ein Par Klaftern Heu, zur Weide diente. Diesen Acker, der einen guten starken, wegen seiner erhöhten Lage aber gegen Mitternacht, kalten Boden hat, habe ich in 4 Theile getheilt, von denen jeder in 4 Jahren ein Mahl Sommer-, ein Mahl Winter-Getreide, und hernach zwey Mahl Gras trägt. Unter dem Sommer-Getreide gab ich dem Haber den Vorzug, der die Erde locker macht, und in dieser kalten Gegend auf starkem Boden sehr viel abträgt; unter dem Winter-Getreide denn dem Spelte (Dinkel), der den Winter besser aushält, als Weitzen und Gerste. Nun

war es noch um die Auswahl des beſten Futter-Graſes zu thun. Da dieſes Land, nach meiner Einrichtung, nur 2 Jahre Gras tragen ſollte, ſo wählte ich mir den Klee; damit ich aber ſolchen 2 Jahre nutzen könnte, ſo ſäete ich den Klee in den Spelt zu Anfange des Maymonathes 1764. Gleich nach der Aernde, auf den erſten Regen, deckte der Klee meinen Acker; er wuchs ſehr dicht auf, konnte aber, wegen dem früh eingefallenen Winter, nicht gemähet werden. In dieſem laufenden Jahre iſt er zum erſten Mahl, zu Ende des Maymonathes, zum zweyten in der Mitte des Auguſtmonathes eingeärndet worden; ob er zum dritten Mahl wird können gemähet werden, iſt ungewiß, wenigſtens fand ſich doch wirklich eine ſehr reiche Weide, wenn ich ſolchen wollte abweiden laſſen.

„Ich ſäe 10 ℔. auf die Juchart; vielleicht iſt es zu viel. Es iſt aber nicht nur vortheilhaft, ſondern nothwendig, alle künſtliche Gras-Arten dicht zu ſäen, damit man andern ihnen ſchädlichen Pflanzen nicht Raum gebe, zu ihrem Nachtheile aufzuwachſen.

„Der Klee wächſt auf dieſem Acker nicht über 1 Schuh hoch. Wie viel ein ſolcher Acker in dürrem Futter abtrage, kann ich nicht ſagen, weil ich den Klee grün gefüttert habe; doch ſchätze ich, die Juchart trüge wohl 1 Klafter jedes Mahl ab. Jetzt war ich bemüht zu erfahren, ob ich nicht durch eine frühere Ausſaat eine Aernde im erſten Jahre erhalten möchte. Ich habe deswegen nun zu Ende des Märzen, und alſo 6 Wochen früher als vor einem Jahre, meinen Klee in den Spelt geſäet, aber die trockne Witterung hat ſolchen ſeit der Zeit der Getreide-Aernde dergeſtalt zurück gehalten, daß ich an dieſem Raub zweifle. Ungeachtet deſſen finde ich dieſe Art, den Klee zu bauen, ſehr vortheilhaft, auf ſolchem Boden, den man 2 Jahre will ruhen laſſen; aufs wenigſte hat man 2 Aernden, und eine gute Weide.

„Der Abtrag wird ſich nach dem Boden, und deſſen Werth, verhalten. Die Juchart koſtet mich 100 Livr., und trägt aufs wenigſte in 2 Jahren 60 L. ab; davon ſind

für den Samen abzuziehen	5
für die Ausſaat und das Egen	1
für die 4 Aernden	5
für Fuhr- und Lader-Lohn	6
	Liv. 17

Bleiben 43 L. für den Abtrag von einer Juchart, in 2 Jahren; solcher ist nicht groß in Absicht auf die Größe des Ackers, wohl aber in Absicht auf den Kauf-Schilling.

„Auf einem andern Stücke, so 6 Jucharten hält, das ich auch in 4 Theile getheilt habe, und eben so anbaue wie das erste, (ausgenommen, daß ich statt Haber, Gerste, statt Speltes Weitzen säe, weil die Lage und der Boden ungleich besser sind,) auf diesem wächst der Klee bis 20 Z. hoch, ehe er blühet, und gibt 3 Aernden, jede aufs wenigste 1 Klafter gedörrten Futters werth, von einer Juchart; davon trägt also die Juchart ab:

im 1sten Jahre nach der Getreide-Aernde, 1 Klafter	Liv. 15	ß
im 2ten, 3 Klafter	45	ß
im 3ten, 2 Klafter	30	ß
	Liv. 90	ß

Ausgabe:

Samen	Liv. 5	ß
Aussaat	1	ß
Sechs Aernden Mäher-Lohn	7	10
Sechs Aernden Fuhr-Lohn	9	ß
Summa der Ausgabe Liv.	22	10
Bleiben also zu gut Liv.	67	10

„Hier nun ist der Abtrag größer in Absicht auf das Land, kleiner in Absicht auf die Haupt-Summe, indem die Juchart 300 Liv. kostet. Nichts desto minder ist auch hier der Abtrag groß, und der Anbau nützlich.

„Dieses Land wird nicht wie die Brach-Felder, sondern nach der engländischen bey uns längst üblichen Weise angebauet, und zu jeder Saat nur ein Mahl gepflüget. Im ersten Jahre wird der Acker noch vor dem Winter tief gepflüget, im Frühlinge der Haber über die Furchen gesäet, eingehaket, und doppelt geeget. Nach der Aernde wird jede Juchart mit 8 großen Fudern Mist gedünget, der sogleich ausgebreitet und untergepflüget wird. Wegen seiner späten Lage, und dem langen Winter, säe ich zu Anfange des Herbstmonathes beym ersten schönen Wetter, nachdem der Acker zuvor wohl gehaket worden, hernach wird der Same mit der eisernen Ege untergebracht; im folgenden Frühlinge, sobald möglich, der Klee in das Ge-

treide gesäet, und der Acker mit einer schweren mit Dornen unterflochtenen Ege doppelt befahren. Das dritte und vierte Jahr trägt er Klee.

„Ich rechne den Klee was er aufs wenigste bezahlt würde, wenn man solchen verkaufen wollte, sonst könnte ich solchen zu 12 Liv. rechnen, welches der ordentliche Preis meines Futters ist, das ich dem Küher verkaufe, und einem verständigen Landwirth, der solches durch eigenes Vieh füttert, soll er nicht weniger werth seyn.

„Noch habe ich der Vermehrung des Düngers nicht gedacht. Eine Jüchart mit Klee auf diese Weise angesäet, gibt 6 Kl. Futter; diese 9 Wagen Mist, welcher das Land reichlich dünget, wenn solches zu Winter-Getreide angebauet wird.

„Viele Landwirthe, die, an statt ihr Land im ersten Jahre mit Sommer-Getreide, solches auch mit Spelt, und also 2 Jahre nach einander mit Winter-Getreide besäen, düngen das erste Mahl nicht, weil sie den Boden durch den eingepflügten Klee-Rasen genug angebauet zu seyn schätzen; ich habe aber solches nicht versucht; glaube auch, dieses gehe nur auf fettem und von Natur reichem, wohlgelegenen Boden an, wo der Klee in dem ersten Jahre eine reiche Aernde, im zweyten 3 Aernden, und im dritten 2 gibt; auch alle Jahre noch eine gute Weide, die im letzten Jahre den Boden zu düngen dient; auf solchem Boden ist auch die Klee-Saat noch weit erträglicher."

Abhandl. und Beobacht. durch die ökon. Gesellsch. zu Bern gesammelt, des 7ten Jahrg. 1766. 4ten St. S. 153, sqq.

Man kann auch Klee in einen anzulegenden Weinberg säen, und ihn hernach statt einer Düngung wieder hinunter pflügen; welches besser ist, als wenn dieses mit Korn oder Weitzen vorgenommen wird. Denn wenn der Klee etliche Jahre gestanden hat, so hat man hernach einen geruheten Boden, welcher durch die starken Wurzeln des Klees mürbe erhalten wird, welche auch bey dem Hinunterpflügen besser düngen. Der Erfahrung zu Folge, sind auf dergleichen Land angelegte Weinberge vorzüglich wohl gerathen. Schon Petrus de Crescentiis hat dieses von dem Klee als einen großen Vortheil angegeben.

End-

Endlich kann auch der Kleebau in Teichen, welche wechselweise besäet und wieder bewässert werden können, mit vorzüglichem Nutzen getrieben werden. Hr. Graf v. Dyhrn (*) ertheilt folgende Nachricht davon aus seiner eigenen Erfahrung. „Der Klee pflegt in den Teichen, wenn sie nur nicht etwa gar zu sandigen oder zu trocknen Boden haben, vortrefflich zu gerathen. Ich habe ihn öfters in einem Sommer bis vier Mahl abhauen oder abgrasen lassen. Ihn etwa schon das erste Jahr unter den Haber zu säen, dazu möchte wohl der Boden gemeiniglich noch zu roh seyn. Hingegen das zweyte Jahr kann man ihn sicher in einem Teiche unter das darein zu säende Getreide säen. Wenn er gut fortgeht, kann man ihn wohl schon dasselbe Jahr im Herbste, wenn das Getreide weg ist, ein Mahl abgrasen oder abhauen, ausserdem aber abhüten lassen. Das folgende Jahr aber kann dieser Klee den ganzen Sommer hindurch, so oft als er, nach Beschaffenheit des Bodens und der Witterung, wieder aufwächst, genutzet werden; und ich stehe dafür, daß ein Teich dasselbe Jahr durch den Klee mehr einbringen wird, als wenn er mit Getreide, ja selbst mit Weitzen, besäet gewesen wäre. Allein ich will es niemanden rathen, den Klee alsdann noch ein Jahr stehen zu lassen, indem er im dritten Jahre im Teiche noch viel unsicherer, als auf dem Acker, fortkommt. Hingegen hat man alsdann das beste Getreide nach dem Klee zu hoffen, indem es eine ausgemachte Wahrheit ist, daß die grasartigen Getreide-Sorten, als: Weitzen, Rocken, Gerste, Haber ꝛc. auf einer Seite, und die Kräuter und Gewächse mit Papilions-Blumen, als: Erbsen, Wicken, Linsen, Bohnen, Tartoffeln, Rüben, Kraut, Klee ꝛc. auf der andern Seite einander nicht die Nahrung benehmen, und sich einander im Wachsthum nicht hindern. Deswegen säen auch in England die guten Wirthe niemahls auf denselben Acker zwey Mahl hinter einander Getreide. Unsere alte schlesische Wirthe werden mir zwar hierwieder einwenden, daß nach den Rüben und Tartoffeln gemeiniglich schlechtes Korn wachse. Allein, nicht die Rüben und Tartoffeln sind es, die den Acker in Ansehung des darauf folgenden Getreides

(*) In seiner Anleit. zur Teichwirthschaft.

aussaugen, sondern das Gras und das Unkraut thut es, welches zwischen den Rüben und Tartoffeln wächst, welches aber gute Wirthe in England und in Deutschland alsdann nicht in dem Acker leiden. Eben dieses ist die gröste Vollkommenheit der Teich-Wirthschaft, wenn man die Teiche zu der Zeit, wenn sie unbewässert liegen, wechselsweise mit Getreide, mit Küchen-Gewächsen und mit Klee, nach Beschaffenheit des Bodens und der Umstände benutzet. Alsdann und auf diese Art kann man es dahin bringen, daß ein Teich jederzeit mehr einbringen muß, als der beste Acker und die beste Wiese. Und wie man sonst zu sagen pflegt: Die Art weicht dem Pfluge, der Pflug weicht der Sense; so kann man noch hinzu setzen: die Sense weicht dem Käscher. Endlich, ob man wohl die vorhin gedachte engländische Wirthschaft bey uns, theils wegen des Unterschiedes des Bodens an vielen Orten, theils und hauptsächlich aber wegen des noch zu wohlfeilen Preises des Mastviehes, noch keinesweges auf den Aeckern nachahmen kann, so schickt sie sich doch insbesondre ganz vortrefflich für die Teiche."

Ich komme nun auf die gewöhnliche Methode des Kleebaues im freyen Felde wieder zurück. Es ist nicht genug, daß der Klee in verhältnißmäßiger Menge auf einen dazu schicklichen Acker gesäet werde, und daß bey der Bestellung derselben alle mögliche Vorsicht gebraucht werde; man hat auch dafür zu sorgen, daß alle Hindernisse, die seinem Wachsthume entgegen stehen können, aus dem Wege geräumet werden. Zu diesen Hindernissen gehören hauptsächlich starker Frost, und allzu viele Nässe. Erstlich leidet derselbe bey starkem trocknen Winter-Froste in seinen Wurzeln ganz ungemein, und man spüret öfters nach einer solchen gewesenen Winter-Witterung eben alsdann, wenn der Klee den meisten Nutzen bringen soll, fast gar nichts davon. Zweytens aber kann der Klee auch keine große Nässe vertragen; diese ist ihm eben so nachtheilig, als der trockne Frost.

Das

Das Erstieren der Klee-Wurzeln kann dadurch verhütet werden, wenn man den Klee bey Antritte des Winters mit langem Pferde- oder Schaf-Miste überfährt, und ihn dadurch gleichsam bedeckt. Bey einem starken Kleebaue hat zwar die Anwendung dieses Mittels viele Schwierigkeiten, indem dazu nicht allein viel Mist, sondern auch viele Fuhren, um solchen Mist auf das Klee-Land zu bringen, erfordert werden. Man irret aber, wenn man glaubt, daß der zu diesem Behuf gebrauchte Mist für die übrigen Aecker gänzlich verloren sey. Wenn das Frühjahr vorbey ist, und folglich der zu dieser Absicht auf den Klee gefahrne Mist seine Dienste gethan hat, kann derselbe wieder abgeharket, und auf den nächst belegenen Acker zur gewöhnlichen Düngung gebracht werden. Bey dieser Vorsicht geht also in der gewöhnlichen Düngung selbst nichts verloren. Der Zweifel wegen der Fuhren fällt auch weg, weil der Mist doch allemahl auf das Feld gefahren werden muß. Bloß wegen der wenigen Mühe, den Mist wieder von dem Klee-Lande abzuharken, und denselben auf die benachbarten Aecker zu bringen, bleibt dem Eigenthümer etwas mehreres zu übernehmen übrig, welches aber, wenn man den dabey zur Absicht habenden Nutzen in Betrachtung zieht, nicht der Rede werth ist. Der Einwand, daß dieses Ueberfahren des Klees mit Miste, einem Wirthe bey einem starken Kleebaue zu schwer fallen möchte, kann ebenfalls nicht als erheblich angesehen werden, weil in einer verhältnißmäßigen Wirthschaft auch alle Theile verhältnißmäßig seyn müssen. Wo ein starker Klee-Bau ist, wird auch vieles Vieh, und wo vieles Vieh vorhanden ist, auch viel Dünger voraus gesetzt. Es fällt also die Anwendung dieses Mittels niemahls unmöglich.

Die allzu viele Nässe ist, gedachter Maßen, gleichfalls ein Hinderniß, warum der ausgesäete Klee in

seinem Wachsthume kein gehöriges Gedeihen hat, sondern nicht selten im Frühlinge ganz und gar ausgeht, und den Guts-Besitzer auf seinen Zuwachs vergeblich warten lässet. Die in der Nässe stehenden Klee-Wurzeln faulen sehr leicht aus, und werden dadurch zur Hervortreibung der Klee-Pflanzen ganz untüchtig gemacht. Der Klee muß daher niemahls in tiefe Gegenden, welche, im Frühjahre unter Wasser gesetzt zu werden, in Gefahr sind, gesäet werden. Es liebt derselbe zwar einen etwas feuchten und frischen Grund, und es ist daher nicht übel gethan, ihn in senkigen Gegenden des Feldes anzulegen; allein, diese Senkungen müssen jederzeit wasserfrey seyn, und davon weder im Winter, noch im Frühlinge, etwas zu befürchten haben. Am sichersten verfährt man, wenn man zu dem Kleebaue eine vollkommene Ebene erwählt; denn die Niederungen können ihm aus vorerwähnten Ursachen leicht nachtheilig werden, und auf Bergen hat man auch keinen reichen Zuwachs von Klee zu erwarten.

Um sich wieder das Ungeziefer, (es sey Fliege oder Wurm,) welches zuweilen den Klee-Samen aus der Erde ausfrißt, zu verwahren, schlägt der Verf. des neuen Lehrbegriffes vom Ackerbau (*) vor, den Samen eine Nacht lang in Ruß, und so viel Urin, als jenen flüssig macht, einzuweichen.

Die in Deutschland bekanntesten Futter-Kräuter, sind allerhand Arten von Klee, insonderheit der rothe spanische, von welchem ich hier handle, die Esparsette, und die Lucerne; der Vorzug unter denselben aber gebührt dem Klee. Denn

1. Es führt derselbe genugsame Fettigkeiten und Nahrungs-Säfte, um das Kuh-Vieh in einen milchreichen Zustand zu setzen und darin zu erhalten, bey sich;

(*) New System of Agriculture. p. 208.

sich; und er kann auch dem Melk-Viehe zu allen Zeiten, ohne davon die geringste Gefahr zu befürchten, zum Futter überlassen werden. Der Esparsette und Lucerne werden zwar noch mehrere Fettigkeiten und nahrhafte Bestand-Theile, als dem Klee, zugeschrieben, welches auch an und vor sich nicht zu läugnen ist; allein, eine allzu große Fettigkeit kann dem Viehe zuletzt sehr leicht schädlich werden; und man bedient sich daher eines Futter-Krautes, welches, wie der Klee, eine gemäßigtere Fettigkeit besitzt, mit weit mehrerer Sicherheit.

2. Der Klee kann, ohne daß dem Getreidebaue das geringste dadurch abgeht, wie im Vorhergehenden gezeigt worden ist, in dem offenen Acker-Felde in gehöriger Menge erbauet werden. Die Esparsette und Lucerne hingegen verlangen, wegen ihrer längern perennirenden Kraft, zu ihrem Anbaue besondere Plätze. Wer nur einen Stall von 50 Kühen mit diesen beyden Futter-Kräutern, den Sommer hindurch, unterhalten wollte, würde schon seinem Getreide-Felde einen ansehnlichen Theil entziehen, und ihn bloß hierzu bestimmen müssen. Bey dem Klee ist solches nicht nöthig, sondern es kann derselbe in Menge erzeuget werden, ohne daß die Bestellung des Feldes im geringsten darunter leiden darf; ja, was noch mehr ist, der Kleebau vermindert nicht nur den Getreidebau nicht, sondern er erhöhet auch den Ertrag desselben, wie aus dem Vorstehenden zur Genüge erhellet.

3. Der Kleebau verursachet unter allen andern Futter-Kräutern die wenigste Mühe und Kosten. Die Esparsette sowohl, als auch die Lucerne, erfordern eine ganz besonders genaue Zubereitung des Bodens, in welchem man dieselben erzeugen will. Der dazu bestimmte Acker muß nicht allein durch öfteres Pflügen sehr mürbe gemacht, sondern auch von allen Gras- und Unkraut-Wurzeln, wovon diese Futter-Kräuter

nicht

nicht das geringſte neben ſich leiden können, mit der größten Sorgfalt gereiniget werden. Dieſe Reinigung von Graſe und Unkraute bleibt auch noch nachher nöthig. Der Kleebau hingegen erfordert keine dergleichen Mühe noch Koſten. Der dazu beſtimmte Acker muß zwar ebenfalls gut zubereitet werden; indeſſen bedarf es dabey nicht der beſondern Sorgfalt, die bey der Eſparſette und Lucerne nöthig iſt. In einem Acker, welcher zur Gerſten-Saat eine gute Zubereitung erhalten hat, wird auch der Klee jederzeit gedeihen. An ein Gäten des Klees iſt gar nicht zu denken. Kommt gleich hin und wieder etwas Gras und Unkraut zum Vorſchein, ſo wird doch ſolches durch die Klee-Pflanzen, welche ſich gleich im Frühlinge zu ſtauden und auszubreiten anfangen, gar bald erſtickt, und unterdrückt. Wenn der Klee länger als drey Jahr ſteht, ſo pflegt ſich zwar unter demſelben ebenfalls vieles Gras mit unter zu mengen; allein, ſolches iſt ſchon ein Merkmahl, daß der Klee ſeine Zeit ausgehalten hat, und er wieder umgepflüget, ſtatt ſeiner aber friſcher geſäet werden muß. Doch iſt dieſes bey derjenigen Methode des Kleebaues, da der Klee nur Ein Jahr ſtehen bleibt und genutzt wird, nicht zu befürchten.

Der Klee wird entweder zur friſchen Stall-Fütterung für Rind-Vieh und Pferde, oder trocken und zu Heu gemacht, als Futter für verſchiedene Arten des Viehes, gebraucht. Den Klee abweiden zu laſſen, iſt in vieler Abſicht nachtheilig.

Man rechnet die grüne Stall-Fütterung der Kühe mit dem Klee gewöhnlich von der Mitte des Mayes an, bis zur Mitte des Sept., folglich auf 4 Monathe, im Jahre. Ueberhaupt iſt anzumerken, daß der Klee keiner Art von Vieh eher zur Fütterung geſtattet werden muß, als bis er Blumen bekommen hat. Die Säfte, die er vor dieſer Zeit bey ſich führt, ſind theils zu häufig, und theils noch nicht genug digerirt, folglich

für

für das Vieh, wenn er in Menge genossen wird, gefährlich. Zwar ist dieser junge Klee den melken Kühen weniger, als andern Vieh-Arten, schädlich; indessen ist es doch allemahl rathsamer, daß man auch bey der Fütterung der Kühe erst die Blumen desselben abwarte, um so mehr, als der junge, noch keine Blumen habende, Klee sehr zusammen fällt, und man, um das Vieh nach Nothdurft zu sättigen, eine weit größere Menge davon gebraucht, als wenn er schon Blumen gesetzt hat. In unsern Gegenden kommen die Blumen des Klees selten vor Ausgang des Mayes zum Vorschein; bis dahin muß also schon ein Landwirth mit genugsamen Winter-Futter versorgt seyn, wozu ihm besonders die vorjährigen Kartoffeln, wenn sie gut aufbehalten sind, und auf die im XXXV Th. S. 366, fgg. angezeigte Weise zubereitet werden, nützliche Dienste leisten können. Ist man indessen, wie solches nicht allemahl voraus gesehen werden kann, schon vor der Blüthe-Zeit mit der Klee-Fütterung den Anfang zu machen genöthigt, so muß, um die allzu fetten Säfte des Klees einiger Maßen zu mäßigen, Stroh dagegen geschnitten werden.

Es ist eine Haupt-Regel, daß alles Gras und alle Futter-Kräuter, die zur Stall-Fütterung gebrauchet werden sollen, zu einer solchen Tages-Zeit abgemähet werden, wo der Thau und Nebel schon von denselben abgetrocknet ist. Hierbey liegt die Gesundheit des Viehes, die, nach der Erfahrung, durch die giftigen Nebel und Ausdunstungen öfters gar sehr leidet, zum Grunde. Die Bewahrung des Viehes vor allerley Krankheiten und Seuchen, ist mit ein Haupt-Vortheil der Stall-Fütterung; dieser aber würde bey Unterlassung gedachter Vorsicht offenbar verfehlt werden. Man thut daher am besten, daß man den Klee und andere zur Stall-Fütterung bestimmte Kräuter nicht anders, als in den Nachmittags-Stunden, ab-

Hiernächst ist die Verfütterung des Klees in Häcksel, auch zur Ersparung des Futter-Krautes eben so nothwendig, als rathsam. Den Kühen darf deshalb an ihrem gehörigen Maße der Fütterung nichts abgebrochen werden, sondern sie müssen jederzeit reichlich davon bekommen. Daß aber, wenn der Klee ungeschnitten vorgeworfen wird, die Hälfte davon in den Mist komme, ist ganz begreiflich, und hierzu ist dieses Futter-Kraut zu kostbar. Bey dem Häcksel-Füttern hingegen geht nicht das geringste verloren, sondern es kommt dem Viehe alles zu Nutzen. Daher gebraucht ein Landwirth, der seine Kühe mit Klee-Häcksel füttert, nur halb so viel Klee, als ein anderer, welcher denselben ungeschnitten vorwirft. Man glaube nicht, daß die Kühe den Klee-Häcksel nicht eben so gern, als den bloßen ungeschnittenen Klee, fressen sollten. Sie werden gewiß, wenn nur nicht auf ein Mahl zu viel eingeschüttet, sondern die oben angezeigte Ordnung dabey beobachtet wird, nichts davon in den Krippen zurück lassen, sondern alles rein auslecken, und dabey zugleich bey einer beständigen Freß-Begierde erhalten werden. Im Anfange, so lange der Klee noch sehr weich ist, muß zwar, damit derselbe in der Häcksel-Lade gehörig folgen könne, etwas Stroh mit untergeschnitten werden; nachher aber, wenn die Stängel schon stärker geworden sind, ist solches nicht mehr nöthig. Die Kühe fressen auch das bey dem fetten und weichen Klee mit untergeschnittene wenige Stroh, weil solches fast nicht merklich ist, vollkommen gut, und es dient ihnen zugleich, zu ihrer Erhaltung und Gesundheit.

Eben so wie, und aus eben dem Grunde, warum man den Weide-Kühen das im Sommer in die Raufe gesteckte, und von ihnen übrig gelassene, Stroh wegnehmen, und solches nicht darin lassen, oder mit neuem Strohe vermischen muß, muß auch, wenn den Kühen im Stalle geschnittener Klee mit Häcksel vermengt vorgeschüttet wird, die Krippe

Was für eine Ordnung bey dieser Abwechselung zu beobachten sey, lehrt Hr. Präs. v. Benckendorf (*) aus eigener Erfahrung. Er sagt:

„Ehe ich auf meinem Gute, welches mit einer starken Holländerey versehen ist, die Kühe verpachtet hatte, und folglich für deren ordentliche Fütterung, die ich nunmehr dem Pachter überlassen hatte, selber Sorge tragen mußte, hatte ich es dergestalt eingeführt, daß dieselben in den Früh-Stunden von 5 Uhr an, drey Häcksel-Futter hinter einander bekamen. Gegen 8 Uhr wurden ihnen einige Bünde bloßer Klee in die Raufen eingesteckt. Um 9 Uhr bekamen sie wieder 2 Häcksel-Futter; und um 11 Uhr waren die Raufen abermahl mit bloßem Klee, doch nur ganz mäßig, angefüllt, worauf sie alsdann gegen 12 Uhr zur Tränke getrieben wurden. Um 2 Uhr nachmittags bekamen sie aufs neue drey Häcksel-Futter, und gegen 6 Uhr bloßen Klee in den Raufen. Nachdem sie hierauf zur Tränke getrieben worden, erhielten sie abermahl zwey Häcksel-Futter, und nach vollbrachtem Melken die Raufen mit bloßem Klee angefüllt. Bey dieser Futter-Ordnung habe ich meine Kühe jederzeit in dem besten und milchreichsten Zustande erhalten, bin dabey aber auch stets versichert geblieben, daß sie niemahls überfüttert werden können.

„Man wird zwar, wenn man diese Futter-Ordnung näher überlegt, wahrnehmen, daß die Krippen und Raufen fast den ganzen Tag nicht von Futter leer gewesen. Allein, man muß sich dabey nicht die Vorstellung machen, als wenn sowohl bey der Häcksel- als auch bloßen Klee-Fütterung, die Krippen und Raufen, nach der gewöhnlichen Schlendrians-Art, jedesmahl völlig angefüllet und voll gestopfet worden. Von beyden wurde dem Viehe immer nur wenig, und kaum der dritte Theil desjenigen, so in den gemeinen Wirthschaften gewöhnlich ist, vorgegeben, dergestalt, daß dasselbe beständig bey Appetit, daß ich es so nennen darf, oder ihrer natürlichen Freß-Begierde, blieb.“

Hier-

(*) Im 1 B. der zuverlässigen Nachrichten von wichtigen Landes- und Wirthschafts-Verbesserungen, (Stett. 1778, 8.) S. 326. f.

noch Schaden, verursacht, sondern ihm vielmehr offenbar vortheilhaft ist, geschehen. Man stelle nähmlich im Frühlinge, so bald die Stall-Fütterung angeht, bey den Kühen zugleich 4 tüchtige Ochsen, die vorhin schon zum Ziehen gewöhnt sind, auf. Diese Ochsen füttere man, eben so wie die Kühe, mit Klee-Häckfel; und man wird sie im Herbste, bey zu Ende gehender Stall-Fütterung, in dem besten schlachtbaren Zustande finden, so, daß sie mit Nutzen verkaufet werden können. Denn wie sehr der Klee die Ochsen mäste, und wie auch sogar die Schweine, wenn man sie damit mästen will, bis zum Erstaunen fett werden, werde ich weiter unten zeigen. Mit diesen 4 Ochsen nun kann aller Klee, welcher zur Stall-Fütterung nöthig ist, ganz füglich heran gebracht werden. Zu diesem Fuhrwerke sind auch keine eigene Leute nöthig, indem die beyden Häckfel-Schneider, welche des Nachmittags zum Einbringen des Klees bestimmt sind, selbige anspannen, und das Fahren mit denselben ganz füglich verrichten können. Wegen ihrer Pflege und Fütterung darf ebenfalls die oben festgesetzte Stall-Ordnung nicht unterbrochen, noch eine eigene Person dazu geordnet werden. Der Vieh-Wärter kann diese Fütterung und Wartung der Ochsen als ein Neben-Geschäft sehr bequem mit übernehmen. Man darf nicht befürchten, daß die täglichen Klee-Fuhren diesen Ochsen an ihrer Mästung hinderlich seyn werden, vielmehr wird ihnen diese tägliche Bewegung dazu beförderlich seyn, denn sie fressen darnach mit mehrerm Appetite, und mithin muß ihnen auch das genossene Futter desto gedeihlicher seyn. Indessen ist es billig, daß ihnen, in Ansehung dieser Neben-Arbeiten sowohl, als auch ihrer vorzüglichen Größe, täglich 1 Scheffel Klee-Häckfel mehr, als den Kühen, gegeben werde, so, daß sie an statt 2, 3 Scheffel bekommen. Das Wurzelwerk, welches man, bey der Sommer-Stallfütterung, in den letzten 6 Wochen den

Kühen

Kühen zu geben pflegt, wird die Mast dieser Ochsen noch vollkommener machen. Auf solche Weise erspart nicht allein der Eigenthümer ein ganzes Gespann Pferde, nebst Knecht, die er den Sommer hindurch zur Einbringung des Klees halten müßte, sondern er kann auch überdieß von dem Verkaufe der aufgestallten vier Ochsen, einen ganz angenehmen kleinen Gewinn, den man für jedes Stück wenigstens auf 8 Thlr. rechnen darf, erwarten.

Sollte etwa an einem und andern Orte ein Mangel an Leuten, oder der Kuhvieh-Stand von solcher Wichtigkeit seyn, daß das gewöhnliche Häckſel-Schneiden zu kostbar fallen würde, so haben wir ja in unsern Tagen die nützliche Erfindung von Hand-Häckſel-Mühlen, oder solchen Mühlen, welche von Pferden oder Ochsen getrieben werden, worauf alle Stunden 4 Wispel geschnitten, und wodurch also täglich ganz füglich für 500 und mehr Stück Rindvieh das benöthigte Häckſel-Futter geschaffet werden kann; s. Th. XX, S. 629, fgg. Hr. Graf v. Borcke hat auf seinem Gute Stargord, in Hinter-Pommern, eine Häckſel-Mühle anlegen lassen, welche von 8 Ochsen getrieben wird, und alle Stunden 100 gehäufte Scheffel Häckſel liefert. Man findet davon, a. ang. O. S. 615, fgg. eine Beschreibung, und in Fig. 1113 a) und b) eine Abbildung.

Nach Hrn. v. Benckendorf vieljähriger Erfahrung, gebraucht auch die größte und stärkste Kuh zu ihrer täglichen reichlichen Unterhaltung, mehr nicht, als 2 berl. Scheffel Klee-Häckſel. Hierbey wird sie niemahls Hunger leiden, und auch Milch genug geben. Nur muß dem Viehe niemahls zu viel Futter eingeschüttet, sondern ihm solches zwar oft, aber immer nur in einer solchen Quantität, die sie jedes Mahl mit Appetit ausfressen, gegeben werden. Das auf Sommer-Stall-Fütterung stehende Vieh, wenn es gehörig gepfleget werden soll, muß täglich 16 Futter bekommen. Wenn

man nun die auf den ganzen Tag beſtimmte 2 Sch. Häckſel in 16 Theile eintheilt, ſo beſteht jede Fütterung aus 2 berl. Metzen. Dieſes iſt eher noch zu viel, als zu wenig. Da auch die Erfahrung lehrt, daß ein Stück Vieh immer fräßiger, als das andere, iſt, ſo muß zur Beſorgung der Fütterung eine vernünftige Perſon, die eine gewiſſe Art von Ueberlegung beſitzt, beſtellet werden. Dieſe muß auf das Vieh, ob es mehr oder weniger fräßig iſt, gehörig Acht geben, und, nach dieſer Beobachtung, dem letztern von dem beſtimmten Maße verhältnißmäßig abbrechen, und ſolches dem erſtern zuſetzen. Auf ſolche Weiſe wird das beſtimmte Futter-Maß im Ganzen jederzeit vollkommen hinreichend ſeyn. In ſolcher Abſicht muß das mehr oder weniger fräßige Vieh nicht unter einander ſtehen, ſondern jede Gattung muß ſeinen eigenen Kumm, an welchem es beyſammen gefüttert wird, haben. Ein aufmerkſamer Landwirth kann entweder ſelbſt, oder doch durch ſeinen Wirthſchafter, wenn er nur bey der Fütterung einige Mahl gegenwärtig bleibt, das mehr oder weniger fräßige Vieh gar bald von einander unterſcheiden lernen; alsdann aber wird es ſehr leicht fallen, das fräßigere von dem weniger fräßigen auf die vorhin vorgeſchlagene Art abzuſondern, und einer jeden Sorte das Futter nach dem Maße ihrer Freßbegierde einzutheilen. Die weniger fräßigen, z. B. bekommen, auf eine jede Fütterung, nur $1\frac{1}{2}$, die fräßigern aber $2\frac{1}{2}$ Metze. Ferner iſt hierbey als eine nothwendige Regel anzunehmen, daß das Vieh niemahls eher ein friſches Futter bekomme, als bis es das vorige rein ausgefreſſen hat. Nur ſehr ſelten wird ſolches von dem unvernünftigen Geſinde beobachtet, ſondern, wenn die Futter-Stunde gekommen iſt, das Vieh mag ausgefreſſen haben oder nicht, das friſche Futter immer wieder auf das alte geſchüttet. Da es nun der Natur des Viehes zuwieder iſt, das alte von ſeinem Athem erwärmte Futter zu freſſen,

sen, und das frisch darauf geschüttete ebenfalls davon angesteckt wird: so wird zuletzt das auf solche Art verdorbene Futter aus der Krippe in den Mist geworfen. Wie viel Futter auf diese Art an solchen Orten, wo keine richtige Ordnung eingeführt ist, unnützer Weise, und ohne daß es dem Viehe auf einige Weise zu Nutzen kommt, verschwendet werde, ist aus der Erfahrung zur Genüge bekannt. Billig muß dem Viehe nicht eher von frischem eingeschüttet werden, als bis es seinen Hunger durch ein gewöhnliches Brummen von selbst anmeldet; dieses ist das sicherste Zeichen, daß es wieder Appetit habe; alle Nahrungsmittel aber, sowohl bey Menschen als Vieh, gedeihen besser, wenn sie mit Appetit genossen werden.

Da an vielen Orten, auch für die Zug-Ochsen, neben der Weide eine Sommer-Stallfütterung immer nöthig bleibt, so schickt sich in unsern deutschen nördlichen Gegenden der spanische rothe Klee am besten dazu. Durch dieses Mittel können die Zug-Ochsen, wenn die Weide durchgehends sparsam, oder für sie nicht tauglich ist, gar füglich den ganzen Sommer hindurch auf dem Stalle unterhalten werden. Die beste Weide wird ihnen nicht so viele Kräfte, als sie von diesem Klee-Futter zu erwarten haben, geben können. Ihr Wohlstand wird dadurch noch um so mehr befördert werden können, da sie, nachdem sie ausgespannet worden sind, nicht erst, um ihr Futter zu suchen, weit umher getrieben werden dürfen, sondern solches in dem Stalle auf eine bequeme Art genießen, und sich dabey zugleich von ihren Ermüdungen ausruhen. Die Hütungs-Plätze liegen öfters von dem bestimmten Arbeits-Orte weit entfernt, und die Ochsen werden, bey solchen Umständen, bey untergespannten Pflügen durch das weite hin und her treiben mehr, als durch die Arbeit selbst, ermüdet. Bey der Klee-Fütterung auf dem Stalle aber sind sie dieser Unbequemlichkeit überhoben,

und können gleich von dem Stalle aus zur Umwechselung getrieben werden.

An denen Orten, wo zwar gutes, aber nicht hinlängliches, Gras für die Zug-Ochsen vorhanden ist, ist zwar diese Stall-Fütterung nicht für den ganzen Sommer anzurathen, es wäre denn, daß man das vorhandene Gras für eine andere Vieh-Art auf eine eben so nützliche Weise anwenden könnte; indessen bleibt sie doch zu denen Zeiten, wenn das vorhanden gewesene Gras zu Ende gegangen, und die Zeit, das Vieh auf Winter-Futter zu setzen, noch nicht da ist, allemahl nothwendig. Wenn in dergleichen Wirthschaften alles ordentlich zugehen sollte, müßte die Brach-Schonung bis zu den Winter-Stoppeln, diese bis zur Sommer-Stoppel, und die Sommer-Stoppel bis zum gewöhnlichen Winter-Futter währen, und zureichend seyn; allein, man trifft solches an den wenigsten Orten an. Das Brach-Gras ist wohl schon 14 Tage bis 3 Wochen vor der Aernde aufgezehrt, und die Winter-Stoppeln sind eben so bald, als das Korn selbst vom Felde ist, ausgehütet, zumahl auf das Acker-Gras niemahls eine sichere Rechnung gemacht werden kann, sondern man, nach dem die Jahre naß oder dürre sind, bald Mangel, und bald Ueberfluß daran hat. Zu diesen Zeiten befindet sich ein Landwirth in der größten Verlegenheit in Ansehung der Unterhaltung seiner Zug-Ochsen, welche nicht besser, als durch einen zureichenden Vorrath von Klee, um sie dadurch auf dem Stalle zu ernähren, gehoben werden kann. Es muß aber mit dieser Klee-Fütterung, besonders wenn sie den ganzen Sommer hindurch währen soll, mit einer gewissen Behutsamkeit und Vorsicht verfahren werden. Den Kühen schadet, nach des Hrn. v. Benckendorf Urtheil, dieses Futter-Kraut nicht, weil die vielen Fettigkeiten, die dasselbe bey sich führt, hauptsächlich zur Milch schlagen, und folglich keine so schädliche Wirkung in dem

Blute

Kühen zu geben pflegt, wird die Mast dieser Ochsen noch vollkommener machen. Auf solche Weise erspart nicht allein der Eigenthümer ein ganzes Gespann Pferde, nebst Knecht, die er den Sommer hindurch zur Einbringung des Klees halten müßte, sondern er kann auch überdieß von dem Verkaufe der aufgestallten vier Ochsen, einen ganz angenehmen kleinen Gewinn, den man für jedes Stück wenigstens auf 8 Thlr. rechnen darf, erwarten.

Sollte etwa an einem und andern Orte ein Mangel an Leuten, oder der Kuhvieh-Stand von solcher Wichtigkeit seyn, daß das gewöhnliche Häckſel-Schneiden zu kostbar fallen würde, so haben wir ja in unsern Tagen die nützliche Erfindung von Hand-Häckſel-Mühlen, oder solchen Mühlen, welche von Pferden oder Ochsen getrieben werden, worauf alle Stunden 4 Wispel geschnitten, und wodurch also täglich ganz füglich für 500 und mehr Stück Rindvieh das benöthigte Häckſel-Futter geschaffet werden kann; s. Th. XX, S. 629, fgg. Hr. Graf v. Borcke hat auf seinem Gute Stargord, in Hinter-Pommern, eine Häckſel-Mühle anlegen lassen, welche von 8 Ochsen getrieben wird, und alle Stunden 100 gehäufte Scheffel Häckſel liefert. Man findet davon, a. ang. O. S. 615, fgg. eine Beschreibung, und in Fig. 1113 a) und b) eine Abbildung.

Nach Hrn. v. Benckendorf vieljähriger Erfahrung, gebraucht auch die größte und stärkste Kuh zu ihrer täglichen reichlichen Unterhaltung, mehr nicht, als 2 berl. Scheffel Klee-Häckſel. Hierbey wird sie niemahls Hunger leiden, und auch Milch genug geben. Nur muß dem Viehe niemahls zu viel Futter eingeschüttet, sondern ihm solches zwar oft, aber immer nur in einer solchen Quantität, die sie jedes Mahl mit Appetit ausfressen, gegeben werden. Das auf Sommer-Stall-Fütterung stehende Vieh, wenn es gehörig gepfleget werden soll, muß täglich 16 Futter bekommen. Wenn

Stalle getränket, und nicht an die freye Luft haben kommen laſſen: ſo hat Hr. v. B. die Geſundheit ſeiner Kühe hiernächſt wohl ferner noch der Einrichtung zu zuſchreiben, daß er ſie des Tages ſo oft ausbinden, und zur Tränke treiben läſſet. Daß aber bey ihm die Ochſen nur allein von der Klee-Fütterung fäulich geworden ſind, kommt vermuthlich daher, daß ſie nicht ſo oft zum Saufen, als die Kühe, kommen können, und daran entweder durch ihre Spann-Zeit verhindert worden ſind, oder daß ſie, da der Klee, nebſt dem Ziehen im Pfluge, ſehr hitzet, auf ein Mahl zu viel haben ſaufen müſſen.

Wenn man in einen Stall kommt, in welchem die Thiere mit Klee gefüttert werden, ſo empfindet man eine dicke, ſtrenge, und gleichſam auch ganz geil auffallende Luft, welche ſowohl von der beſondern Ausdunſtung der Thiere, als auch den Excrementen derſelben bey der Klee-Fütterung, herrühret. Das beſtändige Einathmen einer ſolchen mit ſehr verdächtigen Dünſten geſchwängerten Luft, kann auf die innern Theile der beſtändig eingeſperrten Thiere eben nicht die beſte Wirkung thun. Daher dient es nicht nur zur Geſundheit des Viehes, daß daſſelbe zum öftern in die freye Luft komme, ſondern man muß auch einen Luft-Wechſel im Stalle beſorgen, dergleichen man auch zur Verminderung der Wärme in den Kälber-Ställen zur Sommers-Zeit anzubringen pflegt.

Wird das Rindvieh mit friſchem unvermiſchten Klee häufig gefüttert, ſo erzeugen ſich in den Gedärmen deſſelben Winde, welche endlich die Häute durchdringen, die Bauch-Höhle anfüllen, die Haut bis zum Zerplatzen ausdehnen, und alſo eine gefährliche Windſucht, auch Darm-Gicht verurſachen. Im Anfange des Uebels, ſind abführende Mittel wirkſam. Oder man nehme ein Talg-Licht für 6 Pfenn., und ſtecke ſolches mit dem unterſten dicken Ende, ohne es zu zerbrechen, ſo ganz der Kuh oder dem Ochſen in den Rachen, welcher von einer andern Perſon aufgeſperret ſeyn muß, halte alsdann den Rachen zu, und halte des Thieres Kopf in die Höhe, damit es das Licht hinunter ſchlucke, ſo iſt in einer Viertel-Stunde das Thier gewiß

wiß ganz wieder beſſer. Man kann die Ochſen an demſelben Tage wieder vor dem Pfluge gebrauchen. Ein anderes ebenfalls unfehlbares Mittel iſt, dem Viehe einige Maß friſch gemolkene Milch laulich einzugießen, es ¼ Stunde im Hofe herum zu führen, und ihm in 8 bis 9 Stunden nichts, alsdann aber einige Mahl nur Heu vorzulegen. Man hält auch dieſes für ein gutes Mittel, wenn man Butter oder Schmalz, in der Größe eines Eyes, von einem geſchnittenen Schweine mit ungefähr ½ Maß Branntwein dem kranken Thiere einſchüttet. Von mehrern hier dienlichen Mitteln, iſt im II Th. S. 748, ſqq. und im V Th. S. 519, ſqq. Anzeige geſchehen. Bey der Gefahr des Zerplatzens, ſticht man mit einem Trocar eine Oeffnung, auf der linken Seite, zwiſchen den Rippen und dem Kreutz-Knochen, ſenkrecht in den von Winden ausgedehnten Leib, und hält die Wunde eine Zeitlang offen. Dieſes Mittel findet man ebenfalls a. aug. O. beſchrieben, und Fig. 22 abgebildet.

Nach Hrn. v. Benckendorf Verſicherung, iſt der Klee auch für Pferde ein geſundes und kräftiges Nahrungs-Mittel. Er bezeuget aus vieljähriger eigener Erfahrung, daß Pferde, die mit Klee gefüttert werden, keines andern Futter-Kornes bedürfen, ſondern bloß bey dieſem Gewächſe die nöthigen Arbeiten, eben ſo wie bey dem Hart-Futter, verrichten können. Man hat nicht zu befürchten, daß ſie dabey von Kräften kommen; vielmehr werden ſie dabey, auch mitten unter der Arbeit muthig, und nehmen augenſcheinlich zu. Bey dem gemeinen Graſe bekommen die Pferde zwar auch ein gutes Anſehen; bey der geringſten Arbeit aber ermüden ſie, und wenn ſie nur ein wenig in der Arbeit angegriffen werden, ſo gehen Fleiſch, Muth und Kräfte in kurzer Zeit verloren. Der Klee hingegen gibt den Pferden wahre und wirkliche Kräfte, die bey allen Arten von Arbeiten gegenhalten.

Nach

Nach Pelegus Berechnung, im 2 B. des Kopenhag. Magaz. S. 210, kann ein Pferd, den Sommer über, mit ſo viel Klee gefüttert werden, als auf 2 bis 3 Scheff. Gerſten-Landes wachſen kann, da man hingegen zu der Graſung eines Pferdes auf dem Felde, bisweilen wohl 24 Sch. Land braucht; man erſparet alſo dabey viel Land, welches nach Gutbefinden des Eigenthümers zu einem andern Gebrauche angewendet werden kann.

Nach Hrn. v. Schönfeld Vorſtellung, im Lpz. Int. Bl. v. J. 1773, iſt der Klee ein vortreffliches Mittel zur Beförderung der Kraft und Geſundheit aller Claſſen der Pferde, wenn man ihn im Winter getrocknet, und im Sommer grün, geben kann. Geht man vorſichtig mit dieſem nahrhaften Futter um, ſo hat man ſich keinesweges vor den ſchlimmen Folgen zu fürchten, die insgemein denſelben beygemeſſen werden. Man hüte ſich daher nur überhaupt, daß man die Pferde auf jungem oder naſſen Klee weiden laſſe, und gebe ihm von erſterm im Stalle nicht viel, den letztern aber niemahls, wenn er nicht vorher trocken gemacht iſt. Das ſicherſte Verfahren, wodurch aller Schade vermieden wird, iſt dieſes: Man ſtampft vom Klee, ſo lange er jung iſt, anfänglich, wie an vielen Orten mit den jungen Diſteln geſchieht, nur etwas weniges unter das Futter, und nach und nach, wie der Klee im Stängel ſtärker wird, werden die Portionen davon vergrößert. Trägt er aber bereits Blumen, ſo kann man ohne Beſorgniß ſo viel davon füttern, als die Pferde freſſen wollen; nur darf man niemahls unmittelbar darauf tränken, ſondern es muß dieſes zuvor, und unter Vorlegung von etwas Heu, geſchehen. Hr. v. Sch. hat die Klee-Fütterung auf ſolche Art betrieben, bey allen Gattungen der Pferde, ſelbſt bey Fohlen-Stuten und Fohlen, überaus nützlich befunden. Sie trägt nicht nur zur Erſparung des Habers oder anderer Körner ſehr vieles bey, ſondern ſichert auch die Pferde vor gefährlichen Drüſen, ſtellt haarſchlägige Pferde ohne Gebrauch anderer Arzeney-Mittel wieder her, und erhält überhaupt die Geſundheit und Stärke derſelben.

Weil die Pferde den Klee ſehr gern freſſen, und damit faſt nicht zu erſättigen ſind, ſo iſt nicht rathſam, daß man ihnen ſolchen ſo bloß, wie mit dem Graſe zu geſchehen pflegt, vorwerfen laſſe, weil ſie leicht darin

zu

Blute haben können. Bey den Pferden nimmt man ebenfalls keine schädliche Folgen davon wahr, welches wohl hauptsächlich ihrem hitzigen Magen, der alles weit besser verdauen kann, zu zuschreiben ist. Nur in Ansehung der Ochsen lehrt die Erfahrung, daß solche, wenn sie 3 bis 4 Jahr den ganzen Sommer hindurch mit Klee gefüttert worden sind, davon anbrüchig, und zuletzt gar fäulisch werden. Um dieses, so viel möglich, zu verhüten, muß man genau darauf Acht haben, daß die Ochsen nicht eher mit Klee gefüttert werden, als bis er Blumen bekommen hat; denn die ersten Säfte sind es hauptsächlich, welche vorerwähnten Schaden anrichten. Demnächst muß der Klee auch alsdann, wenn er schon Blumen hat, den Ochsen doch nicht bloß vorgeworfen, sondern gegen etwas Stroh zu Häcksel geschnitten werden. Sie fressen diesen Häcksel eben so gern, als den ihnen bloß vorgeworfenen Klee selbst. Das mit untergeschnittene Stroh aber mäßigt durch seine bey sich führende Salze die allzu große Fettigkeit des Klees. Ein Landwirth, der die Zug-Ochsen des Sommers meistentheils mit Klee zu füttern genöthigt ist, thut überhaupt wohl, wenn er seine Einrichtung dergestalt macht, daß er seine Ochsen-Heerde alle 3 oder 4 Jahr umwechseln, und mit neuen versehen kann; alsdann hat er auch bey diesen Thieren keinen Schaden von der Klee-Fütterung zu befürchten. Denn da dieselben dadurch ungemein zunehmen und ansehnlich werden, so wird ihr Verkauf, wenn man nur dabey die vorhin bemerkte Zeit beobachtet, jederzeit mit Vortheile geschehen können.

Daß die Kühe des Hrn. v. B. von der Klee-Fütterung nicht fäulisch oder anbrüchig geworden sind, hat zwar wohl seinen Haupt-Grund darin, daß die Fettigkeit des Klees bey den Kühen zur Milch schlagen, und ihnen deshalb unschädlich werden könne. Da indessen aber doch von andern glaubwürdigen Wirthen die Schädlichkeit des Klees bey den Kühen versichert worden ist, und zwar, wenn sie solche im

und wachsen schnell auf. Anfangs Octobers kann man alte und junge mit merklichem Vortheil gebrauchen.

Der Klee wird nicht nur, auf die jetzt beschriebene Art, grün verfüttert, sondern auch zu Heu gemacht, und getrocknet, genutzet.

Will man den Klee zu Heu machen, welches in Einem Jahre zwey, auch wohl drey Mahl geschehen kann, so hat man nicht nur auf bequemes, anhaltend warmes und trocknes Wetter, wo er geschwinde auf einander dörren kann, sondern auch auf die Beschaffenheit des Klees selbst, zu sehen, als bey welchem zum Niederhauen die beste Zeit diejenige ist, wenn er eben in die Blüthe zu gehen anfängt, weil alsdann seine Stängel und Blätter voll Kraft sind, auch die Wurzeln sich in einem stärkern und lebhaftern Zustande erhalten, um hernach desto geschwinder und stärker aufzuschießen, als woran vieles gelegen ist; da hingegen bey längerm Warten, und bis alle mehrentheils ungleich kommende Köpfe in der völligen Blüthe stehen, oder einige gar in den Samen schießen, welches gleich nach der Blüthe geschieht, das Futter rauher und unkräftiger wird, und die Wurzeln durch den in die Köpfe hinauf gezogenen Nahrungs-Vorrath erschöpfet werden. Bey dem Mähen des Klees, sowohl zu grünem, als auch trocknem Futter, ist vornehmlich darauf zu sehen, daß derselbe nicht verstrunkt oder ungleich, sondern so eben und niedrig auf dem Boden hinweg, als es nur seyn kann, abgehauen werde, weil dieses den bessern Wuchs und das Ausschlagen der jungen Schüsse gar sehr befördert. Der erste Schnitt geschieht etwa im Anfange des Jun.; der zweyte gegen die Mitte des Jul.; und der dritte, in der Mitte des Augustes. Der zweyte und dritte Schnitt, sind nicht so ergiebig, als der erste.

Bey dem Trocknen des Klees zu Heu, wird nicht überall einerley Art des Verfahrens beobachtet. In

Ober-

wiß ganz wieder besser. Man kann die Ochsen an demselben Tage wieder vor dem Pfluge gebrauchen. Ein anderes ebenfalls unfehlbares Mittel ist, dem Viehe einige Maß frisch gemolkene Milch laulich einzugießen, es ½ Stunde im Hofe herum zu führen, und ihm in 8 bis 9 Stunden nichts, alsdann aber einige Mahl nur Heu vorzulegen. Man hält auch dieses für ein gutes Mittel, wenn man Butter oder Schmalz, in der Größe eines Eyes, von einem geschnittenen Schweine mit ungefähr ¼ Maß Branntwein dem kranken Thiere einschüttet. Von mehrern hier dienlichen Mitteln, ist im II Th. S. 748, fgg. und im V Th. S. 519, fgg. Anzeige geschehen. Bey der Gefahr des Zerplatzens, sticht man mit einem Trocar eine Oeffnung, auf der linken Seite, zwischen den Rippen und dem Kreutz-Knochen, senkrecht in den von Winden ausgedehnten Leib, und hält die Wunde eine Zeitlang offen. Dieses Mittel findet man ebenfalls a. ang. O. beschrieben, und Fig. 22 abgebildet.

Nach Hrn. v. Benckendorf Versicherung, ist der Klee auch für Pferde ein gesundes und kräftiges Nahrungs-Mittel. Er bezeuget aus vieljähriger eigener Erfahrung, daß Pferde, die mit Klee gefüttert werden, keines andern Futter-Kornes bedürfen, sondern bloß bey diesem Gewächse die nöthigen Arbeiten, eben so wie bey dem Hart-Futter, verrichten können. Man hat nicht zu befürchten, daß sie dabey von Kräften kommen; vielmehr werden sie dabey, auch mitten unter der Arbeit muthig, und nehmen augenscheinlich zu. Bey dem gemeinen Grase bekommen die Pferde zwar auch ein gutes Ansehen; bey der geringsten Arbeit aber ermüden sie, und wenn sie nur ein wenig in der Arbeit angegriffen werden, so gehen Fleisch, Muth und Kräfte in kurzer Zeit verloren. Der Klee hingegen gibt den Pferden wahre und wirkliche Kräfte, die bey allen Arten von Arbeiten gegenhalten.

Nach

gleich die kleinen Haufen aufgeladen werden, und deshalb mit dem Wagen von einem zum andern hingefahren wird, bis die Fuhre voll ist. Denn das Zusammenstoßen des getrockneten Klees verursacht nur mehrern Abgang an Blättern.

Die beste Verfahrungs-Art das Klee-Heu zu machen, lehrt uns der herzogl. Sachsen-Coburg-Saalfeldische geh. Rath, Joh. Christ. v. Schubart, edler Herr von dem Kleefelde (*). Will man den Klee zum Winter-Futter dürre machen, so wird er gemähet, so bald er nur einige Blumen zeigt; und man wartet nicht, bis er völlig in der Blüthe steht, weil sonst das Futter nicht so kräftig ist. Dieses Mähen geschieht nicht mit der gewöhnlichen Gras-, sondern mit einer Getreide-Sense, welche mit einem hölzernen Gestelle (mit Haken) versehen seyn muß, damit der Klee sich in ordentliche Schwaden lege. Nach Beschaffenheit der Witterung, bleibt derselbe in diesen Schwaden 4, 8, 10, mehr oder weniger, Tage unangerührt liegen, bis er oben ganz dürre, und nicht der geringste Saft mehr in den Stängeln ist. Sollte er aber durch ein unterdessen eingefallenes starkes oder anhaltendes Regen-Wetter sehr zusammen gedrückt seyn, so lüftet man entweder mit den Händen, oder mit einem umgekehrten Harken-Stiele, oder mit einer hölzernen Streu-(Schütt-) Gabel ein wenig. Doch darf dieses Lüften nicht in den heißen Mittags-Stunden, sondern in den Früh- oder Abend-Stunden, wenn Thau gefallen ist, geschehen, weil sonst zu viel Blätter, als das Beste, abfallen und verloren gehen würden. Sind nun die Klee-Schwaden auf der einen Seite ganz dürre, so werden dieselben mit einem Stecken, Harken-Stiele, oder einer Streu-Gabel, des Morgens oder

(*) Im 2 Th. seiner ökonomisch-kameralistischen Schriften, (Lpz. 1784, gr. 8.) S. 96, fgg.

zu viel thun, und sich verfangen können. Ehe der Klee Blumen bekommt, ist das bloße Vorwerfen desselben gefährlich. Das sicherste ist, daß man ihn im Anfange, wenn er noch weich und zart ist, gegen etwas Stroh zu Häcksel schneiden, und auf solche Art verfüttern lässet, wodurch zugleich viel Klee, den sonst die Pferde aus den Raufen werfen und unter die Füße treten, ersparet wird. Nachdem die Stängel des Klees schon zu ihrer Vollkommenheit und einer gewissen Härte gelanget sind, kann er auch ohne Vermischung mit Stroh zu Häcksel geschnitten, und auf solche Art verfüttert werden. Uebrigens kehre man sich nicht daran, wenn die Pferde im Anfange davon dünne misten; sie behalten doch ihre Kräfte, und man kann bey starken Reit- und Zug-Pferden 2½ bis 3 Monathe lang, wenigstens das halbe, bey kleinern Arbeits-Pferden aber das ganze Hart-Futter ersparen.

Man nehme an, daß auf einem Land-Gute 12 Pferde gehalten werden müssen. Unter 2 Wispel Menge-Futter, an Rocken, Gerste, Haber und Wicken, kann ein, auch nur zu sehr mäßiger Arbeit bestimmtes Pferd jährlich nicht bestehen. Das Futter-Korn von 12 Pferden beträgt also jährlich 24 Wispel. Wenn nun durch die Klee-Wirthschaft dieses Futter-Korn auf 4 Monathe, folglich ⅓ davon mit 8 Wsp. wegfällt, der Wsp. aber nur nach dem niedrigsten Preise zu 12 Rthlr. gerechnet wird, so ist offenbar, daß von den jährlichen Wirthschafts-Ausgaben 96 Rthlr. wegfallen, folglich der Werth des Gutes à 4 pro Cent gerechnet, auf 2400 Rthlr. erhöhet wird.

Bey vorfallenden Reisen kann zwar diese Klee-Fütterung, weil der Klee-Häcksel sich gar bald erhitzt und verdirbt, nicht fortgesetzet werden, sondern es ist dazu allerdings Hart-Futter nöthig. Es pflegen aber in den Sommer-Monathen, wo die Klee-Fütterung Statt findet, keine besondere Reisen in der Wirthschaft vorzufallen, sondern man gebraucht die Pferde alsdann nur hauptsächlich zur Feld-Wirthschaft. Mit Grun-

Zucht- und Arbeits-Vieh. Man nehme ſich aber nur in Acht, daß man den Klee nicht auf Feimen bringe, wenn er nicht ganz raſſeldürre geweſen iſt, damit er ſich nicht erhitze. Auf Böden muß er noch weniger, nur halb trocken, gebracht werden, indem, wenn der hölzerne Roſt des Feimen 1 Elle von der Erde ab ſteht, die Luft unter demſelben weg und mitten durch zieht, folglich weniger Gefahr, als auf Böden, iſt. Einige meinen zwar, daß ihm die Erhitzung auch in dem Grade, wenn er rauche, oder daß er ſich gelb oder braun brenne, nicht ſchade; allein, dieſes iſt ein Irrthum, denn der Klee verliert dadurch ſeine beſte Kraft, und läuft leicht an. Der dürre Klee muß von Rechts wegen allemahl grün bleiben, und ſo hält er ſich viele Jahre, ohne daß er ſeine Kraft verliert, oder anläuft. Indeſſen beobachte man, wenn er unter Dach gebracht wird, die Vorſicht, daß man nach dem Abladen nicht ſo ſehr auf ihn herum, und ihn gleich feſt trete, ſondern locker auf einander werfe; nach Verlauf etlicher Wochen ſetzt er ſich von ſelbſt zuſammen.

Im 42 St. des Hannov. Magaz. v. J. 1784, ſteht folgende Nachricht von einem Verſuche, halb trocknen Klee in einer Time im Freyen aufzubewahren, von W. in W. „Bey der bekannten großen Trockniß im vorigen Sommer fing der Klee, der zum zweyten Mahl gemähet werden ſollte, erſt gegen die Mitte des Auguſts an zu wachſen, und wurde, ungeachtet der nachherigen häufigen Regen, doch erſt gegen das Ende des Sept. zeitig; wenigſtens konnte ich hier den meinigen, den ich zu Heu machen wollte, erſt am 28 Sept. zu mähen anfangen; und wurde, da ſich wegen der damahligen ſtarken Nebel täglich nur einige Stunden mähen ließ, erſt am 4 Oct. damit fertig. Der gemähete Klee blieb 8 Tage lang im Schwade ganz ungerührt liegen, trocknete aber bey der Fortdauer der feuchten Witterung in dieſer Zeit faſt gar nichts. Dem ungeachtet machte ich d. 6 Oct. den Anfang, denſelben nach und nach umzuwenden, und wurde d. 8 Oct. damit fertig. Am 13 und 14ten wurde das Wenden wiederhohlt; am

17ten

17ten wurde der Klee in kleine, und am 18ten in große Haufen zusammen gebracht.

„Zu diesem Verfahren hatte ich zwar nach der jedesmahligen Beschaffenheit der Umstände meine Ursachen; indessen war doch der Klee, wegen der erwähnten Nebel, meistens noch sehr naß, und dabey schien es d. 20 Oct. des Morgens zu einem Land-Regen an, dem ich dieses kaum halb trockne Heu, besonders bey der späten Jahrszeit, nicht mehr überlassen konnte.

„Ich entschloß mich daher, dasselbe an diesem Morgen noch einzubringen, aber nur das allertrockenste auf den Heu-Boden zu nehmen; das mittelmäßige hingegen auf die Schleiten in den Scheuern dünn auszubreiten; und das ganz feuchte endlich in eine Fime auf dem Hofe zu bansen. Von diesem letztern fanden sich 6½ starke vierspännige Fuder; und es war noch so frisch, daß man aus den meisten Stängeln Saft ausdrücken konnte.

„Ich suchte nun zuerst eine ziemlich trockne freye Stelle auf dem Hofe von 24 Fuß im Durchmesser zur Fime aus, und ließ solche, obgleich der Boden gepflastert war, doch 2 F. hoch mit trocknen, büchenen Wasen bedecken, und darüber Stroh legen, in der Mitte aber einen Leuerbaum von 24 F. Höhe aufrichten. Hierauf wurde das Klee-Heu abgeladen, in Armen voll gehörig über und neben einander bis dicht an den Baum in eine kegelförmige Fime gelegt; in Schichten, jede von einem halben Fuder, so fest als möglich, eingetreten, und schichtweise mit einem halben Himten salzhemmendorfer Salze gesalzt (*). So kamen 13 Schichte über einander, wovon die obern immer eine größere Höhe, aber kleinere Grundfläche, als die untern, erhielten. Die ganze Höhe der Fime betrug von der Stroh-Lage an, so weit als das Klee-Heu in die Höhe ging, 18 Fuß; an Salze wurden überhaupt 6½ Himten verbraucht; und die Fime wurde noch desselben Tages, nähmlich d. 20, zu Mittage fertig.

„Da es, wie gesagt, zu einem Land-Regen anließ, auch d. 20 und 21 wirklich immer hin naß nieder ging, so ließ ich die Deckung der Fime mit Stroh auf die gewöhn-

(*) Man vergleiche hiermit dasjenige, was im XXIII Th. S. 184, fgg. von dem Einsalzen des Heues gesagt worden ist.

de kann alſo hieraus kein Zweifel, noch Einwendung, gegen dieſe aus beſtätigter Erfahrung als vortheilhaft angeprieſene Klee-Fütterung hergenommen werden.

Von der Fütterung der Schafe mit Klee, werde ich weiter unten, wo ich vom Klee-Heu handle, ſprechen.

An denen Orten, wo man den Klee auf dieſe Art dem größern Viehe zuerſt gegeben hat, hat man bemerkt, daß die Schweine ihn ſehr gern freſſen. Wenn ſie dazu kommen können, freſſen ſie dasjenige, was von den Krippen abfällt, mit großer Begierde. Dieſes hat Anlaß gegeben, einen Verſuch anzuſtellen, ſie mit Klee zu mäſten, und es hat ſich gezeigt, daß derſelbe ein ſehr gutes Futter für ſie ſey. Einige ſind ſogar ſo weit gegangen, daß ſie ſich von dieſem Gebrauche des Klees einen ganz auſſerordentlichen Vortheil verſprochen haben. So gibt z. B. Patullo (*) eine Berechnung,

sen gewiß, daß sie, wenn sie auf gehörige Art damit gefüttert werden, sehr gut darnach zunehmen.

Nach dem 1 Th. der allgem. Haushalt. und Landwiss. (Hamb. und L. 1763, gr. 8.) S. 802, ist Klee ein vortreffliches Futter für die Schweine, aber es ist am besten, wenn derselbe nicht als das einzige Futter gebraucht wird; denn es gibt gern dem Fleische eine gelbe Farbe, welche ihm im Verkaufe Schaden thut. Die beste Methode, den Schweinen Klee zu geben, ist zu eben der Zeit, da sie sonst zu andern Stunden des Tages mit anderm Futter gefüttert werden. Sie müssen also, ohne ihr Frühstück von Spühl-Wasser, des Morgens aus dem Stalle getrieben werden, damit sie eine gute Begierde zu dem Klee haben; und zur rechten Jahrszeit muß man sie mit dem Rindviehe auf das Feld treiben. Des Abends muß man sie eintreiben, und mit Spühl-Wasser, mit Korne oder Malze vermischt, füttern; oder, an statt des Spühl-Wassers, kann man ihnen einen guten Theil abgerahmte Milch oder Molken geben. Dieses ist die beste Art, wie die Schweine zum größten Vortheile mit Klee gefüttert werden können.

Hr. Sprenger schreibt, in seinem Unterricht für den Land- und Bauersmann a. d. J. 1773, S. 22: „Auch Schweine füttert man vortheilhaft mit Klee. Man schneidet ihn in kleinen Schneidstühlen, dergleichen die Strohschneidstühle sind, und wirft ihn den Schweinen, auch ihren Ferkeln, vor; aber jedesmahl nur so viel als sie wirklich auffressen, daß keiner verdorben wird. Man füttert sie so in Ställen, oder im Hofe, oder pfercht sie beständig an einem Orte, wie Schafe, streuet auch so frischen Grund auf den Boden des Pferchs. Macht man dergleichen Pferche länglich viereckig, so kann man sie leicht mit Stroh decken, daß der Regen nicht auf die Thiere fällt. Man kann auch auf 1 Morgen eingemachten Kleestück, besonders eines das nächstens umzubrechen ist, aber doch noch gut steht, zu Ende Aprils 2 tragende Schweinmütter (Sucken) lassen, daß sie nach Belieben darauf weiden können; man macht ihnen an einem Ecke des Stückes eine Schupfe, darunter sie zur Zeit des Regens liegen können, und setzt einen Trog mit Wasser dahin. Im May werfen sie Junge, z. E. Eine 5 bis 8 Ferkeln. Die Sucken geben vom Klee viel Milch, die Ferkeln fressen auch bald begierig vom Klee,

und

ſchriebene von 20 bis 24 Fuß im Durchmeſſer der Grund-Fläche, und von 18 F. Höhe machen. 2. In der Mitte keinen Baum dulden, indem ſich daran zu viel Luft von auſſen in die Fime zieht, und auch der Qualm von innen in Tropfen anſetzt, wodurch die Fäulung befördert wird. 3. Noch viel weniger würde ich wieder einen Schornſtein in der Spitze der Fime anlegen, indem ſolcher auf beyderley Art noch weit mehr ſchadet, als der Baum. 4. Endlich würde ich die Bedeckung der Fime nie eher wieder verfertigen laſſen, bis die Fime völlig ausgequalmt hätte. Denn die Feuchtigkeiten, welche die innere Hitze heraus treibt, ſetzen ſich auf die Oberfläche der Klee-Fime in Tropfen. Kann dieſe nun vor dem übergedeckten Strohe an der freyen Luft nicht austrocknen, ſo muß ſie bey dem bleibenden Zutritte einiger Luft in Fäulniß übergehen. Bey dem obigen Verſuche entſtand daher dieſe Fäulniß oben in der Spitze der Fime, welche wegen der dicken Bedeckung nicht austrocknen konnte; nicht aber an den Seiten, wo die Bedeckung ſo dünn war, daß die ausgequalmten Feuchtigkeiten auch darunter noch von der Luft verzehret wurden. Dabey iſt vom Regen für die Fime wenig zu fürchten; denn ſo weit als dieſelbe einregnen kann, ſo weit kann ſie auch an der freyen Luft wieder abtrocknen. 5. Die Austrocknung des Klee-Heues in einer Fime hat übrigens große Aehnlichkeit mit der Verkohlung des Holzes im ſtehenden Meiler; auf dieſer Spur muß man die Theorie dazu ſuchen.

In einigen Gegenden, z. B. in Bayern, pflegt man, um den Klee zu dörren, dicke Stangen in die Erde zu graben, in welche, alle 2½ Schuh hoch, Löcher gebohrt werden, um hölzerne Arme dadurch zu ſtecken. Dieſe Arme ſind wechſelweiſe ſo angebracht, daß ſie über einander kreuzweiſe zu ſtehen kommen. An dieſen Armen wird der Klee von unten bis oben aufgehängt, damit er, weil er dem Durchſtreichen der Luft ausgeſetzt iſt, und der Regen immer abfließen kann, abtrockne. Die Stangen werden im Herbſte nach Hauſe in Sicherheit gebracht, um ſolche mehrere Jahre brauchen zu können. Dieſe Art, Klee zu dörren,

ren, ist recht gut, so lange man nicht eine noch bessere Art, mit wenigern Umständen und Kosten, weiß. Die oben, aus Hrn. v. Schubart Schriften angeführte, lehrt sie ins Große, nach welcher es bey 20 und mehr 1000 Centn. sehr leicht und geschwinde geht. Die Stangen und das Arbeits-Lohn würden zu viel kosten.

Das a. ang. O. erwähnte Gerüst zu einem Klee-Heu-Feimen, welches Hr. Ober-Amtmann Holzhausen zu Gröbzig erfunden hat, sieht man, nebst dem von Hrn. v. Schubart verbesserten Werk-Stuhle, Fig. 2093 abgebildet.

A. Gemauerte Grund-Pfeiler, welche, nach Beschaffenheit der Festigkeit des Bodens, 1, 2 bis 3 Fuß in der Erde, und 2 F. ausser der Erde, seyn müssen.

B. Säulen, welche unten so stark wie möglich bleiben, auf 4 bis 5 F. gebrannt, und dergestalt an die Pfeiler eingegraben und damit verbunden werden, daß von dem gebrannten Holze 1 F. hoch über der Erde heraus stehen bleibt.

C. Schwellen.

D. Balken.

E. Streben.

F. Obere Futter-Rahmen des Gehäuses, woran die Sparren I. befestigt, und am besten von Rüstern- oder Büchen-Holze sind.

G. Unterer Futter-Rahmen, woran die Sparren, durch K. abgesteift.

L. Dach von Schindeln, Bretern oder Stroh, zur Bedeckung des Luftzuges und Seiles.

M. Untere, und N. obere Kloben, welche von Eisen oder Messing am besten sind.

O. Welle, wodurch das weit gelattete, mit Stroh gedeckte Dach in die Höhe gezogen, oder herab gelassen wird.

P. Löcher, worein eiserne Bolzen gestecket werden, damit das Dach vermittelst des untern Futter-Rahmens darauf ruhen könne.

Q. Das Futter, worin die Welle vorn geht, damit sie sich nicht heben kann.

Auf einen dergleichen Feimen, von 28 F. oder 14 Ellen im Durchmesser, und 42 E. in der Runde, nebst 20 E. Höhe, können 50 Fuder oder 1000 Entn. dürres Futter gebracht werden. Wenn etwa 30 Fuder darauf geladen sind, wird derselbe voll seyn, aber in kurzer Zeit wird er sich um ein Drittel gesetzt haben, wo er dann wieder voll gefüllet wird.

Bey Gelegenheit dieses Holzhausischen Kleeheu-Feimens, hat, nach dem Berichte des leipz. Int. Bl. v. J. 1786, S. 136, ein angesehener und erfahrner Landwirth in der Ober-Lausitz, der Sache weiter nachgedacht, und gefunden, daß einerley Absichten mit wenigern Kosten erreicht werden können, wenn ein dergleichen Feimen-Gestell ins Viereck gebauet, mit einem Getriebe wie eine Wagen-Winde, anstatt Seiles und Klobens, versehen würde. Weil jedoch der Einwurf sogleich gemacht werden könnte, daß die Schwierigkeit, ein allzu schweres Dach zu heben, dergleichen Feimen in Absicht der Größe zu sehr einschränken würde, so hat ihn dieß auf den Gedanken gebracht, das Dach jedes Mahl erst auf den schon gefüllten Feimen von beweglichen Stücken zusammen zu legen, und zu binden, und nach Erforderniß herunter gleiten zu lassen, worauf es denn im folgenden Jahre wieder aus einander genommen, und von neuem aufgeleget werden kann, und zwar ohne Zimmerleute. Ein anderer Landwirth hatte den Vorschlag gethan, einen Schoppen zum Klee-Heu, mit Luft-Essen und Rost versehen, statt eines Feimens zu erbauen. Weil man aber alsdann das Dach nicht auf die Oberfläche des abnehmenden Vorrathes niederlassen könnte, so würde, wegen einwehenden Schnees und Regens, Schade geschehen.

Um das getrocknete Klee-Heu gut aufzubewahren, hat man auch besondere Scheunen. Man lässet, in dieser Absicht, eine der Quantität des jährlich aufzubehalten:

oder Abends um- und allemahl 2 Schwaden gegen einander zusammen gewendet, folglich enger zusammen gebracht. Wenn er nach Verlauf einiger Tage auf der andern Seite völlig dürre ist (*), so wird derselbe des Abends, wenn der Thau gefallen ist, auf kleine Haufen zusammen geschoben, oder gerollt, und das liegen gebliebene kleine Gebröse nachgeharket, und des Morgens, wo auch allenfalls das Zusammenhäufen geschehen kann, eingefahren, welches aber bey heißen Tagen nicht länger, als bis um 8, höchstens 9 Uhr, zu bewerkstelligen ist, weil er sonst die Blatter und Blumen-Knospen, als das Beste, verlieren würde. Der Thau, welcher vorher auf den ganz dürre gewesenen Klee gefallen ist, schadet demselben im geringsten nicht, sondern dunstet gar bald wiederum hinaus, wenn er entweder auf luftige Böden, oder in Feimen gebracht wird, welche letztere inwendig ein Luft- oder Zug-Loch, nach dem Maße ihrer Größe, von 36 bis 48 Zoll in der Runde, oder ins Gevierte, haben müssen. Diese Feimen werden sodann entweder mit einem besonders dazu gemachten Messer, wie in England, und zu Wörlitz im Dessauischen geschieht, um und um behauen, oder die Feimen werden mit einem beweglichen Dache versehen, wozu man die besten Modelle in dem Anhalt-Dessauischen Amte Gröbzig unweit Halle findet, immaßen daselbst (im J. 1783) von der ersten Klee-Aernde 800 Fuder dürrer Klee eingefahren, und in 8 Feimen gebracht worden sind, oder vom Boden verfüttert, und auf diese Art hat man eines der kraftvollesten, besten, gesundesten, am leichtesten, häufigsten und vortheilhaftesten erbaueten Winter-, auch, wenn es gebrechen sollte, Sommer-Futter für alles

(*) In einer Anmerkung sagt Hr. v. Schubart hierbey, daß er 1782 seinen Klee am Montage und Dinstage habe hauen, und bereits des Sonnabends sämmtlich können einfahren lassen. Es war aber dieses ein recht trocknes Jahr.

nach eingeſchoben; hierauf werden ſtarke Stangen g
leget, welche zu beyden Seiten in den Klee eingeſte
werden; darauf wird Strauchwerk geleget, und d
Klee ſo lange hinein geſtopft, bis die ganze Schee
ſo voll iſt, daß kaum ein Menſch heraus kriechen kan
Die innere Einrichtung dieſer Scheune, ſtellt Fi
2094 dar.

a, die Grundlage von dem Umfange der an der Häck
Mühle angränzenden Klee-Scheune.

b, die Tenne, welche gleichfalls mit Klee auf Böcken v
geſtopft wird.

c, die zwey Taße, worin der Klee aufbehalten wird.

d, die Grundlage einer aus Latten zuſammen genagelt
Quadrat-Röhre, durch welche der Klee ſeine noch
wanige Feuchtigkeit ausſchwitzt, damit er ſich nicht
hitzen könne.

e, iſt eine dergleichen in ihrer Höhe perſpectiviſch vorg
ſtellt; weil aber die Kleinheit ſolche nicht deutlich g
nug macht, iſt daneben eine andere nach einem größe
Maßſtabe vorgeſtellt, als:

f, die Grundlage.

g, die Erhöhung perſpectiviſch; wobey ſich von ſelbſt ve
ſteht, daß die ganze Höhe nach der Höhe der Kle
Scheune befindlich ſeyn muß, doch nicht bis an da
Dach.

h, die Röſte, welche durch die Taße gehen. Auf de
Flur werden Böcke von gleicher Höhe in die Länge ge
gen einander geſetzt.

Hr. v. Borcke macht zu dieſer Abbildung folgende An
merkung. „In dem Grundriß der Klee-Scheune iſt ei
„Fehler begangen. Der Zeichner hat Unterſchiede zwiſche
„Täße und Tenne angedeutet, welche aber nicht exiſtiren
„Es iſt ein ganz hohles Gebäude. Die Roſten in den Tä
„ßen ſtehen auch nicht auf ſchiefen Füßen, ſondern an je
„der Seite 12 an der Zahl liegen auf eingegrabenen Pfö
„ſten, ſo wie im Texte beſchrieben iſt. Dieſer Fehler rühr
„daher, daß ſchon der Klee in der Scheune lag, als di
„Zeichnung gemacht wurde, und der Zeichner ſich auf ſei
„Gedächtniß verließ, ich aber damahls nicht genug darau
„achtete.“

Der

17ten wurde der Klee in kleine, und am 18ten in große Haufen zusammen gebracht.

„Zu diesem Verfahren hatte ich zwar nach der jedesmahligen Beschaffenheit der Umstände meine Ursachen; indessen war doch der Klee, wegen der erwähnten Nebel, meistens noch sehr naß, und dabey schien es d. 20 Oct. des Morgens zu einem Land-Regen an, dem ich dieses kaum halb trockne Heu, besonders bey der späten Jahrszeit, nicht mehr überlassen konnte.

„Ich entschloß mich daher, dasselbe an diesem Morgen noch einzubringen, aber nur das allertrockenste auf den Heu-Boden zu nehmen; das mittelmäßige hingegen auf die Schleiten in den Scheuern dünn auszubreiten; und das ganz feuchte endlich in eine Fime auf dem Hofe zu banfen. Von diesem letztern fanden sich 6½ starke vierspännige Fuder; und es war noch so frisch, daß man aus den meisten Stängeln Saft ausdrücken konnte.

„Ich stichte nun zuerst eine ziemlich trockne freye Stelle auf dem Hofe von 24 Fuß im Durchmesser zur Fime aus, und ließ solche, obgleich der Boden gepflastert war, doch 2 F. hoch mit trocknen, büchenen Wasen bedecken, und darüber Stroh legen, in der Mitte aber einen Leiterbaum von 24 F. Höhe aufrichten. Hierauf wurde das Klee-Heu abgeladen, in Armen voll gehörig über und neben einander bis dicht an den Baum in eine kegelförmige Fime gelegt; in Schichten, jede von einem halben Fuder, so fest als möglich, eingetreten, und schichtweise mit einem halben Himten salzhemmendorfer Salze gesalzt (*). So kamen 13 Schichte über einander, wovon die obern immer eine größere Höhe, aber kleinere Grundfläche, als die untern, erhielten. Die ganze Höhe der Fime betrug von der Stroh-Lage an, so weit als das Klee-Heu in die Höhe ging, 18 Fuß; an Salze wurden überhaupt 6½ Himten verbraucht; und die Fime wurde noch desselben Tages, nähmlich d. 20, zu Mittage fertig.

„Da es, wie gesagt, zu einem Land-Regen anließ, auch d. 20 und 21 wirklich immer hin naß nieder ging, so ließ ich die Deckung der Fime mit Stroh auf die gewöhn-

(*) Man vergleiche hiermit dasjenige, was im XXIII Th. S. 184, fgg. von dem Einsalzen des Heues gesagt worden ist.

Der Erfahrung nach, gewöhnen ſich dieſe Thiere ſehr an einander.

Man hat hin und wieder den Nutzen der Stall-Fütterung der Schafe, und inſonderheit mit Klee, in Zweifel ziehen wollen. Ein ſolches wirthſchaftliches Bedenken von einem angeſehenen Landwirthe im glogauiſchen Fürſtenthume, findet man im 1 B. der ökon. Nachr. der patriot. Geſellſch. in Schleſien, a. d. J. 1773, S. 292. Der Verf. deſſelben verneint, daß durch die Stall-Fütterung bey den Schafen die Wolle vermehrt und verbeſſert werde. Das beſtändige Liegen der Schafe ſoll die Wolle ſchlechter machen; und in Abſicht auf die Vermehrung der Wolle, wird auf 100 Schafe höchſtens 1 Stein zugegeben, der aber im Werth gegen den viel größern Aufwand bey dem dazu erforderlichen Kleebaue, gar nicht in Betrachtung komme. Inſonderheit iſt ſein Einwurf gegen die Klee-Fütterung gerichtet. Er ſtellt theils die Gefahr vor, welche dabey für die Schafe zu befürchten iſt, theils die viele und beſchwerliche Mühe, die mit ihr übernommen werden muß, und theils die Koſtbarkeit derſelben.

Unter dieſe Gegner gehört auch Hr. D. Röſſig, wieder welchen folgender Aufſatz von J. C. Müller, in Nieder-Leſchwitz, in Hrn. Amts-Rath Riem phyſik. ökon. Zeitung, v. Apr. 1786, S. 64, fgg. gerichtet iſt.

„Es hat Hr. D. Röſſig Bedenken in Abſicht der Fütterung der Schafe mit grünem oder dürrem Klee geäuſſert. Wahrſcheinlich hat Hr. D. Röſſig keine Wirthſchaft, und noch weniger mag Derſelbe die Schafzucht verſtehen; denn angenommen, (aber nicht eingeräumt,) daß die Klee-Fütterung der Feinheit der Wolle nachtheilig ſey, ſo iſt es gar nicht ökonomiſch richtig, ſeine Schafe der feinern Wolle wegen hungern zu laſſen.

„Es entſteht alſo erſtlich die Frage: Warum muß ein Wirth Vieh halten? Allerdings ſeines Feldes wegen. Was nützt ihm ſein Feld ohne Dünger; und wie viel nützt ihm wohl Dünger von ſchlecht gefüttertem Viehe? etwas mehr, als gar nicht gedünget. Alſo der Haupt-Zweck iſt: ein Wirth muß alle Sorten von Vieh halten, um gehörigen guten Dünger, ſeine Felder dadurch in einen tragbaren Zuſtand zu ſetzen, zu bekommen. Iſt dieſes nun richtig, wie ich wohl nicht glauben will, daß dieſen Satz zu beſtrei-

8. So wie der Klee in Armenvoll eingebanſet worden war, ſo hatte er ſich zuſammen gewirret; und auf der Oberfläche dieſer Gewirre fand ſich hier und da ein weißer Staub, den man ohne genaue Unterſuchung für Schimmel hätte halten können. Nach dem genauern Urtheile des Auges, nach dem Geſchmacke und Geruche, war es aber kein Schimmel, ſondern diejenige Erde, die in jedem Küchen-Salze, vornehmlich aber in dem ſalzhemmendorfer, enthalten iſt, und die ſich bey der Auflöſung des eingeſtreueten Salzes nicht hatte in den Klee mit einſaugen können.

9. Gegen den Fuß der Fime war der Klee ſalziger, auch mehr ſolcher weißer Staub.

„Von dieſem Klee-Heue ließ ich den Pferden, Füllen und Schafen, einige Mahl etwas zum Verſuche vorlegen, und ſie fraßen es ſehr begierig. Die ganze Quantität, die ich auf 120 Centner rechnen konnte, wurde aber dem hieſigen Hornviehe vom 10ten bis zum 25 Apr. ſtatt des Heues zum Sommer-Strohe zugeſchnitten. Solches hat nun dieſes Futter nicht allein recht gern gefreſſen, ſondern ſich auch wohl dabey befunden; und es iſt darauf weiter keine Veränderung an dem Viehe wahrgenommen worden, als daß es ſtärker als ſonſt geſoffen hat, welches ohne Zweifel von dem eingeſtreueten Salze gekommen iſt.

„Hieraus ergibt ſich alſo, daß man auch halb trocknen Klee auf dieſe Weiſe ohne Gefahr im Freyen aufbehalten kann; bey weiterm Nachdenken über den Erfolg glaube ich aber doch, daß ſich dabey noch folgende Verbeſſerungen anbringen laſſen. Ueberhaupt meine ich, daß das Klee-Heu bey dem obigen Verſuche nicht von dem eingeſtreueten Salze geſund erhalten worden iſt, ſondern, weil es durch ſeine baldige innere Erhitzung alle überflüſſige Feuchtigkeiten ausgequalmt hat. Nach dieſer Vorausſetzung, die jedoch auch weiter nichts als meine Meinung ſeyn ſoll, würde ich alſo dergleichen Klee-Heu fürs erſte nicht wieder einſalzen laſſen, zumahl das Salzen überdies koſtbar iſt, und beym Verfüttern des Klees mit dem milchenden Viehe die Erzeugung der Milch gewiß nicht befördert. Dagegen würde ich dem baldigſten Ausqualmen vielmehr zu Hülfe zu kommen ſuchen, und in dieſer Rückſicht 1, die Fimen weder zu groß, noch zu klein, ſondern vielmehr wie die be-

Schaden der Schäferey, wenn auch gleich nicht im erſten Jahre, um.

„Es iſt mir dieſes alles ſelbſt paſſiret, und um ſo mehr kann ich mit Gewißheit davon reden; es ſind mir aus dieſen beyden angeführten Urſachen einige Mahl die Lämmer verdorben worden.

„Dieſem Uebel nun zuvor zu kommen, habe ich meine Lämmer ſchon einige Jahre im Stalle behalten, und mit nichts als Klee und Klee-Heue gefüttert, und habe nicht nur ſchöne, große, und geſunde Lämmer gezogen, ſondern auch ſeit dieſer Zeit kein drehendes mehr gehabt; ich berufe mich auf meinen Schaf-Stamm, und bin erböthig, einem Jeden mein Vieh von 3 Jahren her zu zeigen. Hat alſo der Klee, wie Hr. D. Röſſig wohl vermuthet, einen ſo ſchädlichen Einfluß auf die Geſundheit der Schafe, ſo müßte man an meinem Viehe, beſonders an den zwey- und vierzähnigen, es gewiß wahrnehmen können, denn bey dieſem Viehe müßte es am meiſten zu ſehen ſeyn; ich aber rufe denjenigen, der an der Sache noch zweifelt, auf, es zu beſehen, oder beſehen zu laſſen. Ich und andere meiner Nachbarn haben ſchon ſeit 8 und mehr Jahren ſpaniſche Stähre unter unſern Schafen; und auch hier rufe ich den Zweifler auf, meine Schafe zu beſehen, ob die Wolle nicht von Generation zu Generation feiner geworden iſt, denn der Augenſchein lehrt alles. Müßte nicht meine Wolle ſchon ſehr zurück gekommen ſeyn, wenn der Klee die Wolle verſchlechterte, da ſowohl Lämmer als Schafe bey mir viel Klee freſſen müſſen, die erſtern im Stalle, und die letztern auf dem Felde? Ja was noch mehr iſt, ich habe einen ächten ſpaniſchen Stähr unter meiner Heerde, der vorher bey einem guten Freunde, und nachher bey mir doch wenigſtens 6 bis 7 Jahr im Sommer grünen Klee, und im Winter mit unter Klee-Heu gefreſſen hat; dieſer müßte nun, wenn der Klee ſo ſchädlich wäre, lange todt und die Wolle ganz grob ſeyn; wer aber Luſt hat, kann dieſen Stähr bey mir ganz vollkommen geſund, (ohnerachtet derſelbe wenigſtens doch 15 Jahr alt iſt,) und mit ſo feiner Wolle ſehen, als ſie ein ſpaniſcher Stähr nur immer haben kann, und ich verſichere, daß ich keine beſondere Arcana beſitze, die Schafe geſund zu erhalten, ſondern es kommt nur auf eine regelmäßige Wartung an.

„Es

Es hat die Erfahrung uns schon lange gelehrt, daß der Klee den Schafen weder an der Wolle noch an der Gesundheit schädlich sey; denn wenn man die Schafe auf nassen oder bethauten Klee treibt, so ist die richtige Folge davon, daß sie entweder gleich auf dem Platze bleiben, oder, wie gewöhnlich, von allem Futter, und wenn es Heide, auch der Thau nicht abgetrocknet ist, die Wassersucht bekommen, oder an Lunge und Leber faul werden. Aber nicht so verhält es sich, wenn der Klee gehörig gefüttert oder abgehütet wird. Hastfer rühmt den Klee als ein gutes Futter für die Schafe, und ein jeder praktischer Wirth weiß gewiß, daß der Klee bey vernünftigem Gebrauche den Schafen unschädlich, noch der Wolle in Absicht der Feinheit nachtheilig sey. Und ohne meine Meinung absolut behaupten zu wollen, da gerade jetzt der Klee-Periodus ist, wo nichts anders geschrieben und betrieben werden will, als Stall-Fütterung und Kleebau, und nicht ein Jeder den gehörigen Unterschied zwischen Stall-Fütterung und Stall-Hunger zu machen weiß, so haben unsere Schafe schon vor 15 und 20 Jahren, und ehe der Kleebau bey uns im Ganzen und zweckmäßig betrieben worden ist, Klee genug gefressen, ja es haben mich, da ich die Oekonomie eifrig zu betreiben gesucht habe, meine Schäfer vor dem Gebrauche des Klees für die Schafe sorgfältig gewarnet, indem einem Schäfer auf meinem Gute, vor meiner Zeit, einmahl 20 Schafe vom Kleefressen auf dem Platze geblieben sind; dieses aber kann einem Jeden noch heute geschehen, wenn er es darnach anfängt, und die Schafe auf nassen Klee treibt. Die Schafe haben aber damahls von dem Kleefressen weder geringere noch bessere Wolle bekommen, sondern da ich nach der Zeit spanische Stähre unter meine Schafe gebracht habe, so hat sich die Wolle von Generation zu Generation bey Klee- und nicht Kleefressen geändert und gebessert".

Im Anhalt-Dessauischen, hat Hr. Oberamtmann Holzhausen zu Gröbzig sich im Anbaue des Klees und des Heu-Gewinnes bisher unter allen Landwirthen am meisten hervor gethan. Es hat nähmlich Derselbe im 1782sten so trocknen Jahre, ausser der täglichen grünen Fütterung, für mehr als 2000 Schafe, 200 Stück Rind-Vieh, und 100 Pferde, noch 1000 vierspännige Fuder, jedes

zu 20 Centn. gerechnet, und folglich 20000 Cnt. getrockneten Klee einfahren, und auf dem dazu gehörigen Vorwerke Pfaffendorf, an den öffentlichen Land-Straßen, in Feimen, Häusern ähnlich, bringen lassen. Im folgenden Jahre hat er 50 Ctn. Klee-Samen ausstreuen lassen, um den Viehstand zu erhöhen, und um auf 3 Jahr dürres Futter vorräthig zu haben. Auf 1 Morgen Feld von 36000 Quadrat-Schuh, worauf insgemein 1 dresdn. Scheffel Korn gesäet wird, bedarf es, wenn der Same gut ist, nicht mehr als $3\frac{1}{2}$ bis 4 Pfund, wovon 100 Ctn. Klee-Heu gewonnen werden. Eine Kuh bekommt davon täglich 12 Pfund, welches in 7 Monathen, ungefähr 23 Ctn. beträgt; folglich können 4 Kühe durch 7 Monathe von dem Ertrage eines Morgens reichlich ernähret werden. Ein Schaf braucht täglich 2 Pf., und sind 20 Acker zu 1000 Stück hinlänglich. Jedes Stück erwachsenes Zucht-Zug- oder Nutz-Rindvieh bekommt im Winter täglich, auf 3 Futter, 12 Pfund dürres geschnittenes Klee-Heu mit 12 Pf. Spreu oder Kaff, oder, in dessen Ermangelung, mit Häcksel vermischt, und 6 Pf. Gersten- oder Haber-Stroh; die Schafe und Hammel, jedes Stück täglich 2 Pf. Klee-Heu, und 1 Pf. Wicken-Gerst-Stroh, welches ihnen im Hofe oder im Stalle vorgeleget wird. Die Fohlen erhalten in 24 Stunden, jedes 7 Pfund Klee-Heu.

Eben Derselbe hat in die umgebrochene Klee-Stoppel Korn gesäet, und solches so schön, groß und reichhaltig an Körnern gefunden, als wenn es in ein am besten gedüngtes Feld gesäet gewesen wäre. Nach der Klee-Fütterung bekam er von 100 Schafen 2 Stein Wolle mehr, als sonst. Die Schafe gaben so viel Milch, daß sie, wieder die Gewohnheit, zu einem ansehnlichen Melk-Pacht ausgethan; und die Lämmer wuchsen so augenscheinlich, daß sie bereits in der 8ten Woche abgesetzet werden konnten. Er hatte schon zu

An-

Anfange des Jan. Lämmer, weil er Futter besaß, Mutter und Lamm zu ernähren: und gegen Joh. lammten die Schafe zum zweyten Mahl. Die Jährlinge waren fast so groß, wie die Stech-Hammel; und von diesen hatte schon zu Anfange des Febr. ein ohne Wahl aus dem Haufen genommener, 6 Pf. Talg und 41 Pfund Fleisch. Er erhielt dabey, wie ganz natürlich ist, weit mehrern und bessern Dünger, sowohl vom Rind- als auch Schaf-Viehe, und konnte also seine Getreide-Felder reichlich düngen. Er vermied bey dieser Klee-Futterung die Krankheiten, denen die Schafe durch die Triften, durch das Einfallen in faule Sümpfe, oder durch den Genuß schädlicher Gras-Arten ausgesetzt sind. Er ersparte das Füttern mit Getreide, wozu oft der Futter-Mangel nöthigt. Er hatte nicht nöthig, seine Brache zur Hut liegen zu lassen, und konnte also alles Feld, ausser den Klee-Aeckern, zum Getreidebau nutzen.

Ein Acker von 360 Ruthen, kann bey zweymahliger Klee-Aernde 5½ Fuder Heu, jedes zu 20 Ctn., liefern; den Ctn. nur zu 6 Gr. gerechnet, beträgt 27 Rthlr. 12 Gr. Der Landwirth würde nicht wohl thun, wenn er den Klee oft jung abfüttern wollte. Ein Stückchen Feld, worauf der Klee in den ersten 14 Tagen 1 ℔ wiegt, gibt, wenn er stehen bleibt, in 4 Wochen 11 ℔, und in 6 Wochen 30 ℔. Wer ihn also in 6 Wochen drey Mahl abschneidet, bekommt 3 ℔, an statt 30 ℔, wenn er ihn hätte stehen lassen.

Um das bisher Vorgetragene mit Einem Blicke übersehen zu können, füge ich folgende kurz gefaßte Vorstellung des Kleebaues hinzu. Es verlangt der Klee einen guten Grund; denn auf magern, auch sumpfigen und nassen Boden gedeihet er nicht. Man bestellt denselben wie einen andern Brach-Acker. Gemeiniglich wird der Acker ohne Düngung zum künftigen Wachsthum unvermögend seyn, und muß daher mit verrottetem Miste fruchtbar gemacht werden. Man kann hierzu Pferde- und Kuh-Mist nehmen, indem es

abergläubig ist, wenn man vorgibt, daß der Klee, welcher auf einem mit Pferde-Miste gedüngten Acker wachse, von keinem Pferde, und hingegen wenn man Rinds-Dünger dazu gewählt hat, von keinem Rindviehe gefressen werde. Der zugerichtete Boden wird zuerst mit Winter-Korn bestellet. Wenn dieses eingeärndet ist, werden die Stoppeln umgeackert, und das Land im folgenden Frühlinge nach der gewöhnlichen Art mit Gerste bestellet, und kurz darauf der Klee-Same ausgestreuet, und das Erdreich mit der umgekehrten Ege überfahren. Wenn die Gerste aufwächst, gibt sie dem dazwischen keimenden Klee Schatten, und erhält die Erde feucht. Man lässet beydes mit einander wachsen, bis zur Aernde, bis dahin der Klee ungefähr 1 F. Höhe erreicht hat. Beydes wird mit einander abgemähet, getrocknet, in Garben gebunden, eingefahren und gedroschen, der Gersten-Same aber geworfelt, und, wie es sonst üblich ist, ins Reine gebracht; das unter einander vermischte Stroh aber für Rindvieh und Pferde verfüttert. Der Acker, wovon Gerste und Klee abgemähet worden ist, bleibt den folgenden Herbst und Winter über ruhig liegen, und man lässet weder Schafe noch anderes Vieh darauf treiben, damit die Klee-Stöcke sich recht bestocken, und in folgenden Jahren gedeihlich wachsen können. Ein großer Schade für dergleichen Klee-Acker ist, wenn das Wild dahin kommen kann, indem die jungen Keime von demselben begierig gefressen, dadurch aber die Stöcke in ihrem Wachsthume gehindert werden. Die unbeschädigten Stöcke wachsen bis in das vierte Jahr gleichsam in einem fort, und bedürfen weiter keiner Wartung. Um den Klee grün zu verfüttern, kann man das Abschneiden mit der Sichel oder Sense in Einem Sommer über vier Mahl wiederhohlen. Will man aber davon Heu machen, muß das Abmähen nicht eher geschehen, als bis die Stöcke zu verblühen angefangen haben. In Frankreich

reich pflegt man in einigen Gegenden den Klee mit Lein auszusäen. Die Bearbeitung, welche der Klee dadurch bekommt, wenn man den Lein ausrauft, soll ihm sehr zuträglich seyn. Einige pflegen auch Ray-Gras und Klee unter einander auszusäen, und fahren dabey gewiß nicht übel. Das Ray-Gras nimmt die Oberfläche ein, der Klee dringt mehr unter sich, er beschützt das Gras und dessen Wurzeln, beydes wächst gut mit einander, und eines ist dem andern auf keine Weise hinderlich. Beyde lassen sich mit einander besser abmähen und trocknen, auch ohne Nachtheil verbrauchen. Nach der öftern, indem man den Klee jährlich zwey, auch drey und vier Mahl abschneiden kann, und 4 Jahr hinter einander geschehenen Benutzung der Klee-Stöcke, werden solche endlich erschöpfet; und ob die Wurzeln gleich nicht absterben, thut man wohl, wenn man solche ausgräbt, oder umackert, oder durch die darauf getriebenen Schafe die wenigen Triebe vollends abfressen, und durch die Schweine die Wurzeln gleichsam ausrotten lässet.

Den Klee-Samen, wovon der Centner zwischen 10 und 12 Rthlr., und das Pfund 8 Groschen kosten wird, kauft der Landmann nur ein Mahl; hernach bauet er ihn selbst.

Um guten Klee-Samen zu erziehen, hat man verschiedene Verfahrungs-Arten, wovon ich einige beschreiben will. Die eine besteht in Folgendem. Man lässet nach dem ersten Schnitte so viel Klee unabgehauen stehen, als man Samen ziehen will, und hauet ihn nicht eher ab, als bis er recht reif ist, und man etliche Tage schönes Wetter vermuthet. Daß er recht reif sey, erkennt man daran, wenn die Kolben oder Samen-Häupter recht dunkelbraun, die Blätter aber meist schwarz und abgestorben sind. Er reift gemeiniglich sehr ungleich. Man hauet ihn früh im Thaue ab, har-

ket ihn nachmittags behutsam auf, und setzt ihn, wie das Heide-Korn, in mäßige Häufchen, worin er so lange steht, bis die Stängel völlig trocken sind, da sodann der noch unreife Same vollends reift, und zum Aufgehen gut wird, ob er gleich etwas flach ausfällt. Nachdem er recht ausgetrocknet ist, wird er eingebracht. Das Ausdreschen erfordert viele Mühe und Arbeit, weil er schwer aus der Spreu zu bringen ist. Erstlich drischt man ihn, gleich bey dem Einbringen in die Scheune, und sondert ihn von dem Strohe ab; doch kann es auch erst im Winter bey kaltem Wetter geschehen; allein bis dahin legt man den Samen-Klee an einen luftigen Ort, oder auf Stangen über der Scheun-Tenne. Nachdem er von dem Strohe abgesondert worden ist, wird er wieder 2 bis 3 Mahl durchgedroschen. Bey dem Herumdreschen wird er allemahl, wie gewöhnlich, umgeharket oder gewendet. Zuweilen geht auf diese Art nur wenig Same heraus, daher nur die Häupter von dem Strohe abgedroschen werden, und er durch ein Aehren-Sieb gesiebet wird. Alsdann wird er wieder durch ein weites Staub-Sieb gesiebet, damit der Same durchfalle. Was nun im Siebe zurück bleibt, wird in Säcke gethan, aber nicht allzu derb oder dicht eingedrückt, und in eine warme Stube, oben an der Decke etliche Wochen auf Stangen, aber nie in einen Back-Ofen, geleget und getrocknet. In der Stube hat er temperirte Wärme, und röstet; und geht, nachdem er wieder getrocknet ist, leicht aus der Spreu. Was nun durch das Staub-Sieb gefallen ist, wird gewurft und rein gemacht. Wenn nun der Klee also etliche Wochen in warmen Stuben geröstet und wieder getrocknet ist, wird er abermahl gedroschen, und durch das Staub-Sieb gesiebet. Was alsdann wieder im Siebe zurück bleibt, wird, bey warmen Sonnenschein, an der Sonne auf Tüchern recht getrocknet, und nochmahls gedroschen, und damit auf gleiche Art fortgefahren,

ren, bis man sieht, daß kein Same mehr in der Spreu befindlich ist. Zuletzt streuet man das wenige, was im Siebe zurück bleibt, mit auf den Acker, der mit Klee besäet werden soll. Die zu Staub gewordene Spreu brühet man dem Rindviehe mit ein unter anderes Futter.

Die Art den holländischen Kleesamen zu erbauen, st. im 60 St. der gel. Beytr. zu den braunschw. Anz. v. J. 1772, Col. 379, f.; desgl. in No. 31 des leipz. Int. Bl. v. J. 1772, S. 422, f.

Andere verfahren mit dem Klee-Samen folgender Maßen. Sie dreschen ihn, nach dem Einbringen, über die Tenne oder den Scheunen-Flur, oder an einem andern luftigen Orte, erst im Winter bey hartem Froste, schütten die abgedroschenen Samen-Häupter etliche Wochen auf einen Boden, wenden sie wöchentlich ein Par Mahl um, und wenn solche gut ausgetrocknet sind, dreschen sie dieselben wieder bey sehr kaltem oder wenigstens trocknem Wetter, da denn der beste Same meistens heraus geht. Dasjenige, was dieses Mahl nicht völlig ausgedroschen werden kann, wird in Säcke locker eingeschüttet, worauf man sie am folgenden Tage in einen meist verschlagenen Back-Ofen bringt, und wenn sie 24 Stunden darin gelegen haben, sofort völlig rein ausdrischt.

Nach des Hrn. Amtsrath Riem Anweisung (*), muß man zum Samen keinen sehr fetten Klee stehen lassen, weil man in diesem Falle wenigen Samen erhält. Mittelmäßiger Klee ist zum Samen am dienlichsten, daher auch meistens der erste Wuchs von dreyjährigem Klee erwählet wird. Zweyjähriger Klee ist aber eben so gut, wenn man ihn im Frühlinge vor der ersten Blüthe zeitig hauet und füttert. Auf diese Weise würde der zweyte Wuchs nicht so mast und zum Samen-

(*) In seinem Prodromus der monatbl. praktisch-ökon. Encyclopädie, oder vollständigen allgem. Futterkräuterbau, (Dessau, und L. 1783, 8.) S. 124, fgg.

Klee gerade reife werden. Nur muß man ihn das erſte Mahl nicht zur Blüthe gelangen laſſen; dieſe würde ihm zu viel Kräfte entziehen, und die beſte Zeit vergienge, die der Same eigentlich zu ſeiner Reife von nöthen hat. Dieſe Methode dient für warme und kältere Gegenden.

„Den Samen-Klee kann man", ſagt Hr. Riem: „hauen, ſo bald die meiſten Köpfe zeitigen Samen enthalten. Dieſen breitet man aus, wo die Schwaden zu dick liegen, und läſſet ihn ſo auf einer Seite einige Tage abtrocknen, ohne denſelben durch das Wenden ſeiner Blätter zu berauben; nur im Falle, daß er Regen bekäme, darf man ihn umwenden. Iſt er trocken, ſo ſetzt man ihn gegen Abend auf Haufen, und bringt ihn den andern Tag früh zur Scheune, wo die Köpfe abgedroſchen und aufbewahret werden, bis man ſie im Winter bey ſtarker Kälte vollends ausdreſchen und den Samen reinigen kann. In dieſer Zwiſchenzeit muß man aber bedacht ſeyn, dieſe Köpfe öfters

Gesinde-Stube, oder in der Flachs-Dörr-Stube in Säcken locker liegend besser austrocknen, und sodann vollends ausdreschen. Dieses Trocknen sowohl, als wenn man die gesammten Klee-Köpfe schon im Anfange abtrocknen wollte, muß man aber niemahls im Back-Ofen vornehmen lassen, weil es sonst gar leicht versehen wird, daß viele Körner zum Aufkeimen untüchtig werden (*). Das bey dem Abdreschen zurück gebliebene Klee-Stroh wird auf der Häcksel-Bank klein geschnitten, und gefüttert, wo es dann besonders den Pferden sehr zuträglich, dem Rindviehe aber nicht so dienlich seyn kann.

„Dieß wäre die gemeinste Art, den Samen zu gewinnen; da sie auch die wenigste Mühe macht, so ist sie sehr gebräuchlich. Allein man hat gefunden, daß während dem Trocknen und Zusammenrechen ihm zu viel Gewalt geschieht, so daß wohl ein Fünftel Same verloren geht. Man hat daher angefangen, die Samen-Köpfe mit der Sichel hoch oben abzuschneiden, und besonders zu trocknen, den untern Klee hingegen zu Pferde-Häcksel zu widmen. Ich habe es lange Zeit auch so besorgen lassen. Auch H. C. Chaves, von Cour bey Lausanne, lehrt es also, wenn er schreibt (**):

„Anfangs brach ich die Samen-Köpfe mit der Hand ab; ich fand aber drey Unbequemlichkeiten bey dieser Methode. 1. Erfordert sie zu viel Zeit, und ist deswegen zu kostbar. 2. Verliert man vielen Samen, wenn man die Köpfe so abbricht. 3. Wenn diese Köpfe in Haufen ge-

(*) In wie fern die unter dem Nahmen des Heinzen, von der Bündtner Gesellschaft landwirthschaftlicher Freunde, in ihrer Samml. 1 Th. S. 238, bekannt gemachte Heu-Darre zu diesem Abtrocknen dienlich sey, muß man erwarten, wenn solche durch Kupfer sollte erläutert und dadurch nachahmlicher werden.

(**) In seiner Abhandlung über die vortheilhafteste und wohlfeilste Manier den Kleesamen einzusammeln, einer gekrönten Preis-Schrift, in den durch die ökon. Gesellsch. zu Bern gesammelten Abhandlungen und Beobacht. v. J. 1773, 1 St. S. 2, fgg.

schüttet werden, um auszutrocknen, so sind sie leicht dem Erhitzen unterworfen.

„Hernach versuchte ich den Klee mit seinem Samen, so wie das andere Gras, abzumähen, hernach ihn auf der Wiese zu trocknen, und wie das Korn auszudreschen. Diese Methode ist aber gleichfalls zwey Unbequemlichkeiten unterworfen. 1. Ist man genöthigt, den Klee zu wiederhohlten Mahlen auf der Wiese umzuwenden, um ihn zu trocknen; dadurch geht viel Same verloren. 2. Bleiben allezeit viele Unreinigkeiten damit vermischt, so sehr man sich auch Mühe gibt, ihn mit der Wanne davon zu reinigen.

Diese verschiedene Versuche haben mich auf eine Methode gebracht, die von allen oben angeführten Unbequemlichkeiten frey ist; eine Methode, die so nützlich ist, daß ich auf einer einzigen Juchart 6 Cent. Samen eingesammelt habe. Dabey verfahre ich folgender Gestalt:

1. Ich sammle den Samen immer bey dem zweyten Abmähen. Der Klee hat bey dem ersten Schnitte noch keine Köpfe, überdieß würde man das Futter des ersten Schnittes verlieren, welches das ergiebigste ist, und der Same von dem dritten Wuchse würde nicht mehr reif werden, daher muß man denselben von dem zweyten nehmen.
2. Ehe man den Klee-Acker das erste Mahl abmähet, muß man zuvor wohl Acht geben, welche Plätze darauf zum Klee-Samen die tauglichsten sind; wobey man zu merken hat: a) daß er an denen Orten, wo er dick und schön steht, zu fallen und die Pflanze zu verfaulen pflegt, wenn sie allzu lange nicht abgemähet wird; eine solche gibt wenig Samen, und man würde viel Futter verlieren. b) Daß der schlechte und magere Klee fast nichts als Blätter und wenig Samen enthält.
3. Man muß daher die Plätze, die weder zu mager, noch zu fett sind, erwählen um auf denselben den Samen bey dem zweyten Schnitte zu erhalten.
4. Auch muß man zusehen, daß die Samen-Plätze von allen andern Kräutern frey seyn, insonderheit von dem Grinde, welches das schädlichste unter allen ist, indem ein einziges Korn davon oft etliche Ellen vom Erdreiche ansteckt.

5. Man muß im Frühjahre, bey dem ersten Schnitte diejenigen Plätze etwas früher abmähen, welche man zum Samen bestimmt hat, damit die Pflanze Zeit genug habe zu wachsen und wohl reif zu werden, zumahl wenn es ein kalter Boden ist. Die gewöhnliche Zeit des ersten Schnittes ist der Anfang oder die Mitte des Brach-Monathes.

6. Nun folgt der Haupt-Punct, wovon eigentlich die Frage ist, wann der Same reif ist, welches im Sept. geschieht. a) Ich schneide den Klee mit einer Sichel ab, wie man das Korn schneidet, und zwar so nahe an dem Kopfe, als nur immer möglich ist. b) Ist der Kopf wohl dürre, so ist es ein Zeichen, daß der Same recht reif ist; in welchem Falle man ihn des Morgens abschneiden muß, damit der Same nicht so leicht ausfalle. c) Sobald die Samen-Köpfe abgeschnitten sind, schneide ich auch die übrig gebliebenen Halme ab, die zum Füttern gut sind, besonders für die Pferde, die davon fett werden. Bey den Kühen hat es eine ganz entgegen gesetzte Wirkung. Auf diesem leeren Platze nun werden die abgeschnittenen Köpfe getrocknet. d) Um sie zu trocknen, legt man sie in Häuflein auf die Erde, und zwar so locker als möglich, damit die Luft desto leichter Zugang habe. Sie dürfen nicht größer seyn, als man mit zwey Händen fassen kann; je kleiner sie sind, je besser ist es. e) Man lässet sie auf diese Weise 10 bis 14 Tage, auch wohl 3 Wochen, liegen. Man kann sie ohne Gefahr länger oder kürzer liegen lassen; denn dieses Korn hat kein Thier zu fürchten, ausgenommen die Mäuse. f) Ich führe sie alsdann auf einem Wagen in die Scheuer, bey dem Aufladen aber muß man vorsichtig damit umgehen, weil sie sonst leicht ausfallen. Auch richte ich, so viel möglich, die Köpfe einwärts in den Wagen, damit sie nicht unterweges ausfallen. Noch besser wäre es, wenn man sie in großen Tüchern nach Hause führte. g) Zum Ausdreschen lege ich so viel auf die Tenne, als man Haber nimmt, und dresche dieses zwey Mahl; alsdann thue ich das Stroh oder die Halme hinweg, wenn es zuvor wohl ausgeschüttelt ist. h) Sodann thut man den ausgedroschenen Samen in die Mühle, wo man jedes Mahl einen guten Sack voll

auf

auf ein Mahl aufſchütten kann; er bleibt eine halbe Stunde unter dem Steine, wenn dieſer geſchwinde geht; wiedrigenfalls läſſet man ihn ungefähr 1 Stunde darunter, je nach dem man dem Steine viel oder wenig Waſſer geben kann. Wenn man ihn nicht gleich nach dem Dreſchen mahlen kann, ſo muß man ihn an einem trocknen Orte aufſchütten. i) Endlich wenn er auf bemeldete Art gemahlen iſt, muß man ihn mit der Wanne ſchwingen, und hernach in einem engen Siebe ſichten, durch welches nur der Klee-Same fallen kann. Man findet bey einem jeden Müller dergleichen Siebe.

Man iſt nachher auf eine noch leichtere Art der Einſammlung des Klee-Samens gefallen, vermittelſt einer Maſchine, Fig. 2095, welche Heinr. Erchaquet, Baumeiſter in Aubonne, im 2 B. der neuen Samml. phyſiſch-ökonomiſcher Schriften, herausgegeben von der ökon. Geſellſch. in Bern, (Zürich, 1782, 8.) S. LXXXVI, fgg. folgender Maßen beſchreibt: „In unſern Gegenden ſind die Landleute gewohnt, den Klee-Samen mit den Händen abzuleſen. Dieſes Abpflücken geht nur langſam von Statten, und macht die Arbeit ſehr koſtbar, indem ſolche insgemein 16 Perſonen erfordert, um in Einem Tage den Samen von einer Juchart einzuſammeln. Ein Landmann von St. Lisre, (Amts Auborne,) Nahmens Francois Peller, erfand eine Maſchine, mit welcher er, und mit Hülfe ſeines Eheweibes, leicht ſo viel Samen einſammelte, als 16 Perſonen mit der Hand thun können, ſo, daß er wenigſtens ſo viel Arbeit mit dieſer Erfindung verrichten kann, als 8 Perſonen mit den Händen. Dieſe Maſchine beſteht aus einer Art Rechen, mit einem gebogenen Stiele m, ungefähr 5 Schuh 6 Zoll (*) lang, mit

(*) 1 berniſcher Schuh verhält ſich gegen den pariſer, welcher 1440 Theile enthält, wie 1330 Theile gegen jenen. Da nun der rheinländiſche Schuh, welcher überall bekannt iſt, 1391 gegen den pariſer beträgt, ſo wird durch dieſe Erläuterung der Maß-Stab hierzu leicht zu finden ſeyn.

mit etwa 35 bis 40 Zähnen d von hartem Holze, die 8 Z. lang, oben flach, nebenzu geschärft wie ein Messer, vorn spitzig und etwas aufwärts gebogen sind; diese Zähne sind etwa 1½ Lin. von einander entfernt, und in einem eichenen, 3 F. langen Stücke Holz befestigt. In gleichem Stücke steckt der gebogene Stiel m, und wird durch 2 schiefe Quer-Hölzer g noch fester gemacht. Diese Maschine wird auf einer kleinen Achse e, mit 2 Rädern r von hartem Holze, geleget. Eine kleine Kiste f, von 4 Läden (Bretern) gemacht, wird auf den Stiel und obige Quer-Hölzer genagelt. Diese Kiste ist hier nur auf dem Profile 2095 b). und in dem Grund-Risse 2095 a) mit Fleiß ausgelassen worden, damit man die Einrichtung der Maschine besser sehen könne. Um solche zu gebrauchen, werden zwey Personen erfordert; inzwischen daß die eine den bey rr mit Stricken befestigten Riemen b um den Leib und über die eine Schulter wirft, und die Maschine fortzieht, fasset die andere den Stiel bey m, und hält ihn so, daß die Zähne just die Aehren des Klee-Samens ergreifen können; dadurch wird der Same abgestreift, und durch die Bewegung des Stieles zurück in die Kiste f geworfen. Man sieht wohl, daß, wenn man an einem Ende des Klee-Ackers anfängt, und furchenweise fortfährt, die Arbeit durch diese Erfindung um ein Beträchtliches verkürzet wird, und daß man mit dieser Maschine alle Aehren abrauft, die auf einer 2½ Sch. langen Linie stehen, da man in gleicher Zeit mit der Hand kaum einen einzigen Gras-Stängel abpflücken kann".

Sollte also einem Landwirthe das Dreschen zu langweilig seyn, so wähle er die Methode dieses bernischen Wirthes. Man mahle nähmlich die abgedroschenen Samen-Köpfe auf einer Mühle, wo man die Hirse schälet, oder allenfalls auch auf einer Oehl-Mühle, oder, in deren Ermangelung, auf einer ordinären Mahl-Mühle, welches Verfahren beynahe mit demjenigen über-

Klee gerade recht werden. Nur muß man ihn das erſte Mahl nicht zur Blüthe gelangen laſſen; dieſe würde ihm zu viel Kräfte entziehen, und die beſte Zeit vergienge, die der Same eigentlich zu ſeiner Reife von nöthen hat. Dieſe Methode dient für warme und kältere Gegenden.

„Den Samen-Klee kann man“, ſagt Hr. Riem:“ hauen, ſo bald die meiſten Köpfe zeitigen Samen enthalten. Dieſen breitet man aus, wo die Schwaden zu dick liegen, und läſſet ihn ſo auf einer Seite einige Tage abtrocknen, ohne denſelben durch das Wenden ſeiner Blätter zu berauben; nur im Falle, daß er Regen bekäme, darf man ihn umwenden. Iſt er trocken, ſo ſetzt man ihn gegen Abend auf Haufen, und bringt ihn den andern Tag früh zur Scheune, wo die Köpfe abgedroſchen und aufbewahret werden, bis man ſie im Winter bey ſtarker Kälte vollends ausdreſchen und den Samen reinigen kann. In dieſer Zwiſchenzeit muß man aber bedacht ſeyn, dieſe Köpfe öfters zu wenden. Iſt der Samen-Klee aber, wegen eingetretenen Regen, nicht ſehr trocken geworden, oder hat man nicht Zeit, ihn jetzt zu dreſchen: ſo läſſet man ihn über die Scheunen-Tenne auf Gerüſte von Stangen oder an ſonſt einen luftigen Ort legen, bis man ihn im Winter bey dem ſtärkſten Froſte ausdreſchen kann. Alsdann ſteht es frey, ob man den Ausdruſch in Hülſen bis zur Saat aufheben, oder ihn vollends rein machen will. Im letzten Falle zerdriſcht man die Hülſen ſehr gut, damit man den Samen davon entweder durch das Werfen, oder mit einer Wanne, oder auf einer Fegemühle, abſondern kann. Den davon gereinigten Samen verwahrt man jetzt nicht nur, ſondern man unterſucht auch die Hülſen, ob noch Same darin ſey. Sollten dieſe noch einigen Samen enthalten, und derſelbe wollte ſogleich nicht gern ausgehen, ſo läſſet man dieſen Ueberreſt nochmahls tüchtig ausfrieren, oder in der

Ge-

Gesinde-Stube, oder in der Flachs-Dörr-Stube in Säcken locker liegend besser austrocknen, und sodann vollends ausdreschen. Dieses Trocknen sowohl, als wenn man die gesammten Klee-Köpfe schon im Anfange abtrocknen wollte, muß man aber niemahls im Back-Ofen vornehmen lassen, weil es sonst gar leicht versehen wird, daß viele Körner zum Aufkeimen untüchtig werden (*). Das bey dem Abdreschen zurück gebliebene Klee-Stroh wird auf der Häcksel-Bank klein geschnitten, und gefüttert, wo es dann besonders den Pferden sehr zuträglich, dem Rindviehe aber nicht so dienlich seyn kann.

„Dieß wäre die gemeinste Art, den Samen zu gewinnen; da sie auch die wenigste Mühe macht, so ist sie sehr gebräuchlich. Allein man hat gefunden, daß während dem Trocknen und Zusammenrechen ihm zu viel Gewalt geschieht, so daß wohl ein Fünftel Same verloren geht. Man hat daher angefangen, die Samen-Köpfe mit der Sichel hoch oben abzuschneiden, und besonders zu trocknen, den untern Klee hingegen zu Pferde-Häcksel zu widmen. Ich habe es lange Zeit auch so besorgen lassen. Auch H. C. Chaves, von Cour bey Lausanne, lehrt es also, wenn er schreibt (**):

„Anfangs brach ich die Samen-Köpfe mit der Hand ab; ich fand aber drey Unbequemlichkeiten bey dieser Methode. 1. Erfordert sie zu viel Zeit, und ist deswegen zu kostbar. 2. Verliert man vielen Samen, wenn man die Köpfe so abbricht. 3. Wenn diese Köpfe in Haufen ge-

(*) In wie fern die unter dem Nahmen des Heinzen, von der Bündtner Gesellschaft landwirthschaftlicher Freunde, in ihrer Samml. 1 Th. S. 238, bekannt gemachte Heu-Darre zu diesem Abtrocknen dienlich sey, muß man erwarten, wenn solche durch Kupfer sollte erläutert und dadurch nachahmlicher werden.

(**) In seiner Abhandlung über die vortheilhafteste und wohlfeilste Manier den Kleesamen einzusammeln, einer gekrönten Preis-Schrift, in den durch die ökon. Gesellsch. zu Bern gesammelten Abhandlungen und Beobacht. v. J. 1773, 1 St. S. 2, fgg.

schüttet werden, um auszutrocknen, so sind sie leicht dem Erhitzen unterworfen.

„Hernach versuchte ich den Klee mit seinem Samen, so wie das andere Gras, abzumähen, hernach ihn auf der Wiese zu trocknen, und wie das Korn auszudreschen. Diese Methode ist aber gleichfalls zwey Unbequemlichkeiten unterworfen. 1. Ist man genöthigt, den Klee zu wiederhohlten Mahlen auf der Wiese umzuwenden, um ihn zu trocknen; dadurch geht viel Same verloren. 2. Bleiben allezeit viele Unreinigkeiten damit vermischt, so sehr man sich auch Mühe gibt, ihn mit der Wanne davon zu reinigen.

Diese verschiedene Versuche haben mich auf eine Methode gebracht, die von allen oben angeführten Unbequemlichkeiten frey ist; eine Methode, die so nützlich ist, daß ich auf einer einzigen Juchart 6 Cent. Samen eingesammelt habe. Dabey verfahre ich folgender Gestalt:

1. Ich sammle den Samen immer bey dem zweyten Abmähen. Der Klee hat bey dem ersten Schnitte noch keine Köpfe, überdieß würde man das Futter des ersten Schnittes verlieren, welches das ergiebigste ist, und der Same von dem dritten Wuchse würde nicht mehr reif werden, daher muß man denselben von dem zweyten nehmen.

2. Ehe man den Klee-Acker das erste Mahl abmähet, muß man zuvor wohl Acht geben, welche Plätze darauf zum Klee-Samen die tauglichsten sind; wobey man zu merken hat: a) daß er an denen Orten, wo er dick und schön steht, zu fallen und die Pflanze zu verfaulen pflegt, wenn sie allzu lange nicht abgemähet wird; eine solche gibt wenig Samen, und man würde viel Futter verlieren. b) Daß der schlechte und magere Klee fast nichts als Blätter und wenig Samen enthält.

3. Man muß daher die Plätze, die weder zu mager, noch zu fett sind, erwählen um auf denselben den Samen bey dem zweyten Schnitte zu erhalten.

4. Auch muß man zusehen, daß die Samen-Plätze von allen andern Kräutern frey seyn, insonderheit von dem Grinde, welches das schädlichste unter allen ist, indem ein einziges Korn davon oft etliche Ellen vom Erdreiche ansteckt.

5. Man muß im Frühjahre, bey dem ersten Schnitte diejenigen Plätze etwas früher abmähen, welche man zum Samen bestimmt hat, damit die Pflanze Zeit genug habe zu wachsen und wohl reif zu werden, zumahl wenn es ein kalter Boden ist. Die gewöhnliche Zeit des ersten Schnittes ist der Anfang oder die Mitte des Brach-Monathes.

6. Nun folgt der Haupt-Punct, wovon eigentlich die Frage ist, wenn der Same reif ist, welches im Sept. geschieht. a) Ich schneide den Klee mit einer Sichel ab, wie man das Korn schneidet, und zwar so nahe an dem Kopfe, als nur immer möglich ist. b) Ist der Kopf wohl dürre, so ist es ein Zeichen, daß der Same recht reif ist; in welchem Falle man ihn des Morgens abschneiden muß, damit der Same nicht so leicht ausfalle. c) Sobald die Samen-Köpfe abgeschnitten sind, schneide ich auch die übrig gebliebenen Halme ab, die zum Füttern gut sind, besonders für die Pferde, die davon fett werden. Bey den Kühen hat es eine ganz entgegen gesetzte Wirkung. Auf diesem leeren Platze nun werden die abgeschnittenen Köpfe getrocknet. d) Um sie zu trocknen, legt man sie in Häufelein auf die Erde, und zwar so locker als möglich, damit die Luft desto leichter Zugang habe. Sie dürfen nicht größer seyn, als man mit zwey Händen fassen kann; je kleiner sie sind, je besser ist es. e) Man läßet sie auf diese Weise 10 bis 14 Tage, auch wohl 3 Wochen, liegen. Man kann sie ohne Gefahr länger oder kürzer liegen lassen; denn dieses Korn hat kein Thier zu fürchten, ausgenommen die Mäuse. f) Ich führe sie alsdann auf einem Wagen in die Scheuer, bey dem Aufladen aber muß man vorsichtig damit umgehen, weil sie sonst leicht ausfallen. Auch richte ich, so viel möglich, die Köpfe einwärts in den Wagen, damit sie nicht unterweges ausfallen. Noch besser wäre es, wenn man sie in großen Tüchern nach Hause führte. g) Zum Ausdreschen lege ich so viel auf die Tenne, als man Haber nimmt, und dresche dieses zwey Mahl; alsdann thue ich das Stroh oder die Halme hinweg, wenn es zuvor wohl ausgeschüttelt ist. h) Sodann thut man den ausgedroschenen Samen in die Mühle, wo man jedes Mahl einen guten Sack voll

auf

auf ein Mahl aufſchütten kann; er bleibt eine halbe Stunde unter dem Steine, wenn dieſer geſchwinde geht; wiedrigenfalls läſſet man ihn ungefähr ½ Stunde darunter, je nach dem man dem Steine viel oder wenig Waſſer geben kann. Wenn man ihn nicht gleich nach dem Dreſchen mahlen kann, ſo muß man ihn an einem trocknen Orte aufſchütten. i) Endlich wenn er auf bemeldete Art gemahlen iſt, muß man ihn mit der Wanne ſchwingen, und hernach in einem engen Siebe ſichten, durch welches nur der Klee-Same fallen kann. Man findet bey einem jeden Müller dergleichen Siebe.

Man iſt nachher auf eine noch leichtere Art der Einſammlung des Klee-Samens gefallen, vermittelſt einer Maſchine, Fig. 2095, welche Heinr. Erchaquet, Baumeiſter in Aubonne, im 2 B. der neuen Samml. phyſiſch-ökonomiſcher Schriften, herausgegeben von der ökon. Geſellſch. in Bern, (Zürich, 1782, 8.) S. LXXXVI, fgg. folgender Maßen beſchreibt: „In unſern Gegenden ſind die Landleute gewohnt, den Klee-Samen mit den Händen abzuleſen. Dieſes Abpflücken geht nur langſam von Statten, und macht die Arbeit ſehr koſtbar, indem ſolche insgemein 16 Perſonen erfordert, um in Einem Tage den Samen von einer Juchart einzuſammeln. Ein Landmann von St. Lisre, (Amts Aubonne,) Nahmens Francois Peller, erfand eine Maſchine, mit welcher er, und mit Hülfe ſeines Eheweibes, leicht ſo viel Samen einſammelte, als 16 Perſonen mit der Hand thun können, ſo, daß er wenigſtens ſo viel Arbeit mit dieſer Erfindung verrichten kann, als 8 Perſonen mit den Händen. Dieſe Maſchine beſteht aus einer Art Rechen, mit einem gebogenen Stiele m, ungefähr 5 Schuh 6 Zoll (*) lang, mit

(*) 1 berniſcher Schuh verhält ſich gegen den pariſer, welcher 1440 Theile enthält, wie 1330 Theile gegen jenen. Da nun der rheinländiſche Schuh, welcher überall bekannt iſt, 1391 gegen den pariſer beträgt, ſo wird durch dieſe Erläuterung der Maßſtab hierzu leicht zu finden ſeyn.

ist aber wieder alle Erfahrung; und wenn eine Gegend keine andere Blumen, als rothen Klee, enthielte, so müßten die Bienen daselbst sofort verhungern und sterben. Man denkt vielleicht, wenn man die Blumen des rothen Klees in den Mund steckt, und daran sauget, so schmeckt man ganz eigentlich das Süße desselben, folglich müssen die Bienen ihr Honig daraus nehmen. Solche Schlüsse triegen aber am öftersten.

Endlich ist der Klee auch als ein Färbe-Kraut zu betrachten, indem man mit den in Wasser abgekochten Blumen, Wolle grün färben kann; da hingegen alle Pflanzen dieser Classe, deren Blumen bey dem Austrocknen grün werden, als z. B. einige Arten des Orobus, der Lotus corniculatus, und andere mehr, zum Blau-Färben dienlich sind; wie denn selbst die Pflanze, woraus der Indig bereitet wird, solches mit den übrigen dieser Classe gemein hat.

Just. Cph. Dithmars vollständige Nachricht von dem spanischen Klee, st. in Dessen oeconomischer Fama, 1 St. Frf. und L. 1730, 8. S. 38 — 64.

J. A. Herzogs Nachricht von dem nützlichen Anbau des englischen Grases und Landklees in Deutschland, zur Verbesserung des Schaf-Futters, st. im 16 St. der öcon. Nachr. Lpz. 1750, 8. S. 300, sqq.

Nachricht von dem spanischen Klee, st. im 23 St. derselben, L. 1751, 8. S. 832 — 840.

Beantwortung der Frage wegen der Kleewirthschaft und des Wickenfutters, st. im 10 St. der schles. öcon. Samml. Bresl. 1755, 8. S. 166 — 185.

S. v. G. Erfahrungsmäßige Nachricht vom Anbau und Nutzen des rothen spanischen Kleevers, st. in No. 14 der wöchentl. Königsberg. Frag- und Anzeig. Nachr. v. J. 1758; desgl. im 33 St. der Hamb. fr. Urth. u. Nachr. v. J. 1758, S. 257 — 259, und im 34 St. ders. S. 269 — 271.

Von dem rothen Kleegrase, und dessen besondern Nutzen in der Landwirthschaft, von Pelagus, aus dem 2 Th. des Dänisch-Norwegischen öcon. Magaz. st. im 3 Th. des 2 B der von C. G. Menael aus dem Dän. übersetzten oecon. Gedanken ꝛc. Kopenh. und L. 1760, gr. 8. S. 204 — 211; desgl. im 1 J. der Versuche zu nützen und zu gefallen, Stralf. 1763, 8. S. 26 — 32.

Jo. Jac. Reinhards Anmerkung von einer besondern Art, den holländischen Klee zu ziehen, st. in Dessen vermischten Schriften, 3 St. Frf. und L. 1761, 8. S. 337 — 350.

Vom Klee, dessen Anbau, Nutzen und Gattungen, s. Physikalisch-ökonomische Auszüge ꝛc. Stutg. 1762, 8. S. 532 — 626.

überein kommt, welches in den berliner Klee-Preisschriften (*) angegeben worden ist. Man stampft, nach dieser Anweisung, die Klee-Köpfe in einer Graupen- oder Hirsen-Stampfe, und reinigt den Samen in der Folge eben so, wie jenen gemahlnen. Da in manchen Gegenden fast ein jeder Bauer eine Graupen-Stampfe hat, so kann diese Methode für wenigen Klee-Samen, dem Landmanne erwünscht angezeigt seyn. Wirthschafter im Großen hingegen können mit ihren mehrern Klee-Hülsen eher zur Mühle fahren; und diesen ist des Chaves Art zuträglicher. Doch können Landwirthe im Großen noch eher die Mühle entbehren, wenn sie Butter-Maschinen, bey welchen zugleich Graupen-Stampfen mit angebracht sind, besitzen.

Ueber das Aussaugen eines Landes durch den Klee, hat Hr. P. Germershausen, in No. 38 des leipz. Int. Bl. v. J. 1784, S. 317, fgg. Folgendes geurtheilt:

Es hat ein Landwirth in No. 20, S. 173, f. der diesj. Int. Bl. den Satz geäussert: Wer da glaubt, daß der Klee das Land nicht aussauge, vielmehr zu Garten-Land machet, irret sehr. Hierauf wird nun fast allen Wirthschafts-Lehrern sowohl, als auch vielen Wirthen, welche Klee bauen, wiedersprochen. Wie aber bey der Bekanntmachung des obigen Satzes a ang. O. hinzu gefüget wird: Alles, besonders in der Land-Wirthschaft, hat zwey Seiten; aber meist nur eine ist anwendbar: so kann man in dieser Absicht wohl sagen, daß die Bejahung sowohl, als die Verneinung des in der Frage seyenden Satzes ihren Grund habe.

„Ehe ich ins Besondere gehe, muß ich noch die Anmerkung voran gehen lassen, daß ein und eben dasselbe Gewächs

(*) Practische Anleitung zum vortheilhaftesten Anbau der Futterkräuter, nach bewährten Erfahrungen deutscher Land-Wirthe. Eine Sammlung von Schriften, welche den von der kön. preuß. Acad. der Wiss. über diesen Gegenstand ausgesetzten Preis und das Accessit erhalten haben. (Berl. 1783, 8.) S. 42.

wächs an diesem Orte, und wovon der Grund in der besondern Lage und Beschaffenheit des Bodens vornehmlich liegen muß, ein Land aussauge, an einem andern aber nicht. So schreiben einige Wirthschafts-Lehrer z. B. daß die Hirse das Land aussauge. An ihrem Orte kann es so seyn, aber nicht an allen. Denn bey mir verbessert die Hirse das Land, sie sey im gegrabenen oder gepflügten Acker gesäet worden, so sehr, daß im Hirse-Lande allemahl der beste Rocken in Ansehung des Mandelns oder Schockens sowohl, als auch des Scheffelns oder Schüttens, wächst. Ja ein Par folgende Aernden zeichnen sich immer noch von der Hirse aus, wie sehr sie nähmlich ein Land hierselbst in Besserung bringen, und noch lange erhalten könne.

„Hr. v. Münchhausen sagt, daß der Flachs das Land auszehre. Wer wollte glauben, daß dieser berühmte Wirthschafts-Lehrer und zugleich genauester Beobachter sich versehen haben könne. An seinem Orte, oder auf seinen Gütern, konnte es nach Beschaffenheit des Grundes und Bodens wohl nicht anders seyn. Bey mir und in vielen andern Gegenden, ist wiederum das Gegentheil. Denn hierselbst erbauen wir den besten Weitzen und darauf die beste Gerste dergestalt in den Lein-Aeckern, daß sie sich davon an die 6 Jahr in der Besserung erhalten, als nach welcher Zeit zu gleichem Zweck eine neue Lein-Saat auf diesen Aeckern unternommen wird. In England sowohl, als in vielen Gegenden des nördlichen Deutschlandes, bereiten die Turnipse das Land zu einer guten Korn-Aernde vor. Diese sind in hiesiger Gegend seit 80 und mehrern Jahren zu bauen angefangen worden. Nicht immer bringen die Turnips-Aecker bey uns gute Korn-Aernden. Gegen zwey schlechte haben wir nur immer eine gute zu zählen gehabt.

„Noch muß ich mich erklären, was das sagen soll: ein Land wird ausgesogen. Es ist eben so viel, als: es wird entkräftet. Und woran wird dieß erkannt? Wenn der Acker eine geringere Aernde abwirft, die in Ansehung der Ergiebigkeit denjenigen nicht beykommt, die von Aeckern des nähmlichen Feldes und gleicher Cultur erlanget werden. Man kann sich aber auch des Aussaugens eines Feldes zum Vortheil bedienen, wie solches nach einigen berühmten Acker-Systemen geschehen muß. So wird z. B. nach dem Reichartischen System, mit ein Mahl so viel

Miſt aufgelegt, daß der Acker in vielen folgenden Jahren daran genug haben ſoll. Aus manchen Feld-Früchten würde nichts werden, wenn ſie in den ſo ſtark gemiſteten Acker eingeſäet werden ſollten; z. B. der Weitzen würde zu Lager gehen, oder mehr ins Stroh als ins Korn wachſen. Dieſerhalb muß in Anſehung ſolcher Getreide-Art ein Ausſaugen voran gehen. Reichart bringt daher den Weiß-Kohl oder Wurzel-Gewächſe zuerſt in den friſchen Dünger, weil ſolche den ſtärkſten Trieb vertragen. Nach ſolchen, wenn ſie das Land in etwas ausgeſogen haben, läßt er erſt Weitzen und ſodann andere Getreide-Arten folgen.

„Nun komme ich näher zur Sache. Der Urheber des in der Frage ſtehenden Satzes hat nicht geſagt, auf welche Klee-Art er ſelbige eingeſchränkt haben wolle. Ich nehme daher an, daß er den gemeinen rothen Klee, oder Klever, Trifolium pratenſe *Linn.* gemeinet, weil ſolcher am häufigſten überall unter uns gebauet wird, nachdem die meiſten Landwirthe von der Lucerne und Eſparſette, welche drey Klee-Arten bisher unter uns am meiſten Glück gemacht haben, abgegangen ſind. Eben dieſer Verf. ſagt uns zwar, daß er ſeit 23 Jahren ſeinen Klee in die Brache ſäen laſſen, und zwar in einem Lande, in welchem Kraut, Rübeſamen, oder Weitzen geſtanden. Allein, es iſt hieraus noch nicht klar genug, ob der Klee unmittelbar auf gedachte Früchte, und nicht vielmehr auf Sommer-Getreide, gefolget ſey. Denn nach der gemeinen Ordnung iſt letztgedachtes Getreide der Schluß in der Getreide-Folge, ſo daß nach Weitzen, als deſſen ausdrücklich gedacht wird, erſt Gerſte, und ſodann erſt die Brache komme. Es lieſſe ſich ſodann nach Beſchaffenheit des Bodens näher einſehen, ob nicht der Acker ſchon durch eine der vorangegangenen Feld-Früchte bereits ausgeſogen geweſen. So diente auch zu näherer Entſcheidung, wenn gemeldet wäre, ob der Acker krautartig, d. i. zur Hervorbringung allerley Unkräuter geneigt, ſey, als deren genug anzutreffen, auf welchen Kraut, oder Weiß-Kohl, nebſt Rübſen, doch recht gut gedeihen. Es iſt nur lokaliſch geſagt, wenn manche Wirthſchafts-Lehrer behaupten, daß ausgeſogene Aecker kein Unkraut hervor bringen können. In hieſiger Gegend, und mehrern andern, befindet ſich das Gegentheil. Wenn wir auſſer Beſſerung befindliche Aecker auf unſern Feldern haben, die eine geſäete Getreide-Art nicht lebhaft genug hervor bringen, oder erhalten,

halten, so werden sie dafür mancherley Unkraut desto stärker empor bringen. Dieß kommt nun daher, daß die perennirenden Wurzeln vieler Unkräuter gleichsam alle Winkel des Grundes schon besetzt haben, weshalb das eingesäete Getreide mit seinen zarten Wurzeln nicht recht aufkommen kann, auch zu wenig Nahrungstheile, die ihr von den so zu nennenden einheimischen Unkräutern weggeraubet werden, an sich ziehen kann, um im Wachsthum jene zu übertreffen, und hiermit solche zu unterdrücken und zu mindern. Ist es nun mit einem Klee-Acker, der sich, wie man sagt, fürs Korn schon ausgetragen hat, eben so, daß die Unkräuter vorhin in selbigem den Meister spielen können, so kanns nicht fehlen, daß solcher Klee-Acker nicht noch mehr sollte ausgesogen werden. In diesem Falle aber müßte man eigentlich sagen: Gras und Unkraut haben den Klee-Acker ausgesogen.

„Angenommen aber, es sey der Acker durch die vorhergehende Cultur vom Unkraute frey, auch von darauf erbaueten Feld-Früchten noch nicht ausgesogen, sondern noch in der Besserung gewesen, oder entweder zu Klee-Saat oder zur unmittelbar vorhergegangenen Bestellung mit einer Feld-Frucht gedünget gewesen: so wird noch die Frage seyn, wie die Klee-Saat verrichtet worden? Wäre der Klee zu dünn, oder theils zu früh, theils zu spät gesäet worden, daß er dieserwegen beym Aufgehen zu dünn gestanden, so wäre der Acker hiermit den Unkräutern Preis gegeben worden, welche sofort die leeren Plätze des Klee-Ackers einnehmen, und selbige auszehren. Auch müßte man wissen, ob der Klee vor sich allein gesäet worden, oder, wie es sehr häufig geschieht, im Gemenge mit Hafer und Gerste. Denn wenn letztere Korn-Arten nicht rein gewesen, weil man nähmlich dabey nur aufs grüne Futter, und nicht auf den Körner-Gewinnst, hinsieht, so können sie manche schädliche Unkraut-Samen in den Klee-Acker zum Nachtheile des Klees gebracht haben. Endlich würde auch noch die Frage auszumachen seyn, ob nicht der Klee immer zu spät, nähmlich nicht vor und bey, sondern nach der Blüthe, um oder nach der Samen-Reife, erst abgemähet worden. Denn ein samentragender Klee wird überall, wo nicht gänzlich, doch zum Theil, den Acker auszehren, wogegen er sich bey Kräften halten wird, wenn der Klee noch jung, oder um die Blüth-Zeit, abgeschnitten wird.

folium incarnatum, spicis villosis oblongis obtusis, aphyllis, foliolis subrotundis crenatis *Linn.* Engl. red-spiked Trefoil, wächst vorzüglich in Italien, kann aber auch leicht bey uns aus dem Samen erzogen werden, und hat auch im freyen Lande in der Wurzel sich mehrere Jahre erhalten. Die drey Blättchen sind rundlich, geadert, etwas haaricht und eingekerbet, und die Blatt-Ansätze lanzettförmig. Die Blumen-Aehre ist walzenförmig, lang, und wollicht anzufühlen, indem der Kelch überhaupt haaricht ist, und die Einschnitte desselben gleichsam in wollichte Grannen sich endigen; die zwey obern aufgerichtete Einschnitte stehen von den drey unterwärts gerichteten entfernt. Die Blumenblätter sind purpurfarbig; das Fähnchen ist gespalten und spitzig, wie auch das Schiffchen zugespitzt, und genau mit den Flügeln vereinigt. Die Hülse enthält 1 Samen.

24. Schmahlblätteriger Klee, Aehrentragender Berg-Klee mit den schmählsten Blättern, Trifolium angustifolium spicatum *J. B.* Trif. montanum angustissimum spicatum *C. B.* Trif. alopecurum angustifolium elatius *Barrel.* Trifolium angustifolium, spicis villosis conico-oblongis, dentibus calycinis setaceis subaequalibus, foliolis linearibus *Linn.* Engl. narrow-leaved Trefoil, kommt aus Languedoc und Italien, und dauert nicht über den Winter. Die Wurzel ist holzig; der Stängel einfach, etwa ½ F. hoch, steif und haaricht; die drey Blättchen sind schmahl und fast von gleicher Breite, und viel länger als der Stiel; die Scheide der Blatt-Ansätze ist gestreift; die längliche Blumen-Aehre steht auf der Spitze des Stängels; die Kelchzähne sind weich und haaricht.

25. Acker-Klee, niedriger wollichter Hasen-Klee, Katzen-Klee, Kätzel-Kraut, Hasen-Fuß, Hasen-Kraut, Hasen-Pförtchen, Mützchen, Dreiblatt,

gen; oder es würde, wenn es sonst der Grund vertragen will, die Wendfahre tiefer gepflüget, um nicht den vorhin untergepflügten Klee so zu Tage zu bringen, daß er, ohne etwas Erde über sich zu haben, unmittelbar von Luft und Sonne berühret, und hiermit entkräftet werden könnte. Damit aber theils das Gähren und Faulwerden des untergepflügten Klees befördert, theils aber auch der Acker, wenn er zumahl zähe oder unartig seyn sollte, desto geschwinder wieder artbar gemacht werde, könnte man etwa 8 Tage nach dem ersten Umreissen des Ackers, oder sobald man sieht, daß er anfangen will, grün zu werden, die Ege in trockner Zeit darüber gehen lassen, um sowohl alle Zwischenräume der Furche mit Erde zu zudecken, und hiermit das Faulen des Klees zu beschleunigen, als auch die aufgepflügte Erde desto milder, und für die folgende Pflüge-Arbeit desto mürber zu machen; vorausgesetzt, daß der Acker nicht unter die leichten gehöre. 4. Es könnte statt des gemeinen rothen Klees eine andere Klee-Art, als: Lucerne, oder Esparsette, oder, falls Grund und Boden hierzu nicht dienten, der weiße Klee, oder der gelbe Hopfen-Klee, oder, falls der Grund zu naß ist, der gestöckte doldenförmige Lotus-Klee mit gelben stark riechenden Blumen, Honig-Klee, goldener Klee, oder andere Klee-Arten, erwählet werden. 5. Endlich hätte man an Orten, wo der gemeine rothe Klee den Acker auszehrt, und man nicht mit Lucerne und Esparsette aufkommen, oder andere Klee-Arten nicht versuchen, auch zur grünen Fütterung nicht Wicken, oder die verschiedenen Arten derselben, anbauen könnte und wollte, noch die Gräser übrig, die zur grünen und trocknen Fütterung angebauet werden könnten. In Ansehung der Gräser, haben wir Landwirthe größtentheils uns noch nicht den Schlaf aus den Augen gewischet. Die Gräser sind doch zuverlässig gesünder als der Klee, bey welchem der wachsamste Wirth immer Gefahr läuft, daß das Gesinde nicht einst von der Fütterungs-Vorsicht abweiche, und dem Viehe schnelle oder schleichende Krankheiten zuziehe. Wir gehen immer sicherer, wenn wir wenigstens Gräser dem Klee beymischen, und wir sollten uns nur darauf legen, unsre besten Gräser nicht länger zu verkennen, und sie von den weniger guten unterscheiden zu lernen. Werden diese Gräser zu rechter Zeit, nähmlich kurz vor, oder im Anfange der Blüthe, abgemähet, so hat

man von ihnen einen eben so geschwinden und öftern Nachwuchs, als vom Klee, zu gewärtigen, wie solches unter andern am Honig-Grase erprobet worden. Und wenn Oerter sind, welche mit gutem Grunde über den Klee klagen müssen, daß ihre Aecker von selbigem, aber nicht vom Rocken, ausgesogen werden, so haben sie hiervon schon den Beweis zum voraus in Händen, daß die Gräser ihre Aecker eben so wenig aussaugen können, weil Rocken und Weitzen nebst andern gewöhnlichen Getreide-Arten im eigentlichen botanischen Verstande auch nur Gräser, und keine Kräuter, sind."

Ausser dem im Vorhergehenden beschriebenen Nutzen des Klees, in Ansehung der Fütterung, erhält man auch noch den Vortheil davon, daß er den Acker mürbe macht, und das beste Mittel abgibt, die Quecken aus dem Boden zu vertilgen.

In Hungers-Noth haben die Lappländer und Irländer aus den getrockneten Blumen des Klees ein so genenntes Stampf-Brod gebacken, welches von letztern Chambrok genannt wird; und die Kinder, welche das Honig daraus saugen, nennen solches Himmels-Brod. Wie man aus den getrockneten Blumen ein Mehl machen, und daraus Brod backen könne, lehrt Linné, in seiner Flora Lapon. S. 273.

Aufmerksame Bienen-Wirthe wollen beobachtet haben, daß die Bienen zwar den frischen Klee-Blumen häufig nachgehen, aber keinen Stoff zu Honig aus denselben erhalten, weil die Blümchen zu enge und zu lang sind, als daß die Biene mit ihrem Sauge-Rüssel den Boden derselben erreichen könne.

Nach dem 27 St. des Wittenb. Wochenbl. v. J. 1770, S. 221, ziehen die Bienen eigentlich nur aus dem grünen oder weißen Klee ungemeinen Nutzen; daher sollte man diesen lieber, als den rothen, ziehen. Der Klee mit rothen Blumen ist gar nicht für die Bienen. Man schreibt zwar in allen Bienen-Büchern getrost in die Welt hinein, daß die Bienen vom rothen Klee Honig eintragen. Es

ist

ist aber wieder alle Erfahrung; und wenn eine Gegend keine andere Blumen, als rothen Klee, enthielte, so müßten die Bienen daselbst sofort verhungern und sterben. Man denkt vielleicht, wenn man die Blumen des rothen Klees in den Mund steckt, und daran sauget, so schmeckt man ganz eigentlich das Süße desselben, folglich müssen die Bienen ihr Honig daraus nehmen. Solche Schlüsse triegen aber am öftersten.

Endlich ist der Klee auch als ein Färbe-Kraut zu betrachten, indem man mit den in Wasser abgekochten Blumen, Wolle grün färben kann; da hingegen alle Pflanzen dieser Classe, deren Blumen bey dem Austrocknen grün werden, als z. B. einige Arten des Orobus, der Lotus corniculatus, und andere mehr, zum Blau-Färben dienlich sind; wie denn selbst die Pflanze, woraus der Indig bereitet wird, solches mit den übrigen dieser Classe gemein hat.

Just. Cph. Dithmars vollständige Nachricht von dem spanischen Klee, st. in Dessen oeconomischer Fama, 1 St. Frf. und L. 1730, 8. S. 38 — 64.

J. A. Herzogs Nachricht von dem nützlichen Anbau des englischen Grases und Landklees in Deutschland, zur Verbesserung des Schaf-Futters, st. im 16 St. der öcon. Nachr. Lpz. 1750, 8. S. 300, fgg.

Nachricht von dem spanischen Klee, st. im 23 St. derselben, L. 1751, 8. S. 832 — 840.

Beantwortung der Frage wegen der Kleewirthschaft und des Wickenfutters, st. im 10 St. der schles. öcon. Samml. Bresl. 1755, 8. S. 166 — 185.

S. v. G. Erfahrungsmäßige Nachricht vom Anbau und Nutzen des rothen spanischen Kleevers, st. in No. 14 der wöchentl. Königsberg. Frag- und Anzeig. Nachr. v. J. 1758; desgl. im 33 St. der Hamb. fr. Urth. u. Nachr. v. J. 1758, S. 257 — 259, und im 34 St. ders. S. 269 — 271.

Von dem rothen Kleegrase, und dessen besondern Nutzen in der Landwirthschaft, von Pelagus, aus dem 2 Th. des Dänisch-Norwegischen öcon. Magaz. st. im 3 Th. des 2 B der von C. G. Menael aus dem Dän. übersetzten oecon. Gedanken ꝛc. Kopenh. und L. 1760, gr. 8. S. 204 — 211; desgl. im 1 J. der Versuche zu nützen und zu gefallen, Stralf. 1763, 8. S. 26 — 32.

Jo. Jac. Reinhards Anmerkung von einer besondern Art, den holländischen Klee zu ziehen, st. in Dessen vermischten Schriften, 3 St. Frf. und L. 1761, 8. S. 337 — 350.

Vom Klee, dessen Anbau, Nutzen und Gattungen, s. Physikalisch-ökonomische Auszüge ꝛc. Stutg. 1762, 8. S. 532 — 626.

guiſt, ſt. im 27 — 30 St. der gel. Beytr. zu den braunſchw. Anz. v. J. 1786.

Erfahrungen über das Dick- und Nichtdickſäen des rothen ſpaniſchen Klees auf einigen Rittergütern in Sachſen. 1. In Sand-Boden in der Gegend Eiſte wahr; 2. Im melirten auch leimichten Boden in der Waldheimiſchen und Gebirgs-Gegend, ſt. in Hrn. Amtm. Riem phyſ. ökon. Monaths- und Quartal-Schrift, Apr. 1787, S. 76 — 79.

20. Schmahlblätteriger ſpaniſcher Klee mit blaßrothen Blumen, Trifolium hispanicum anguſtifolium, ſpica dilute rubente *C. B.* Trifolium purpureum lagopoides hirſutum annuum rotundifolium, ſpica dilute rubente *Moriſon.* Trifolium ſquarroſum, ſpicis oblongis ſubpiloſis, calycum infimo dente longiſſimo reflexo, caule herbaceo *L.* iſt eine jährliche Pflanze, welche in dem ſüdlichen Theile von Frankreich und Italien wild wächſt. Sie macht einen ſtarken, grasartigen Stängel, welcher faſt 3 Sch. hoch wird, glatt, und mit dreyblätterigen Blättern beſetzt iſt, deren Lappen 2½ Z. lang, faſt ¼ Z. breit ſind, und auf langen Stielen ſtehen, welche, ſo lang ſie ſind, von den Blatt-Anhängen oder Scheiden umfaſſet werden. Die Blumen kommen an dem Gipfel der Stängel in ſehr langen Aehren zum Vorſchein. Sie haben eine ſchöne rothe Farbe, und machen alſo ein gutes Anſehen. Sie blüht im Jul., und der Same wird im Herbſte reif.

21. Rother ſpitzblätteriger Berg-Klee, Großer brauner Berg-Klee, Trifolium aliud montanum maius *Thal.* Trifolium maius alterum *Cluſ.* Trif. maius Cluſii ſecundum, non album ſed rubrum *J. B.* Trif. montanum purpureum maius *C. Bauh.* Trif. purpureum montanum maius, ſpica oblonga *Moriſ.* Trif. ſpica longiore, flore purpureo *Rivin.* Trif. ſpicis villoſis ſubovatis, caule erecto, foliis ovato-oblongis integerrimis *Royen.* Trif. foliis ovatis nervoſis, ſupremis coniugatis, vaginis lanceolatis *Hall.* Trifolium alpeſtre, ſpicis ſubgloboſis villoſis terminalibus,

libus, caule erecto, foliis lanceolatis serrulatis *L.* wächst auf trocknen Hügeln und erhabenen Plätzen, in ganz Europa; ist, der Blüthe nach, dem rothen Wiesen-Klee, den Blättern nach aber dem Erdbeer-Klee, (s. unten, No. 37), ähnlich; treibt aber, insonderheit wenn er gebauet wird, häufigere Zweige, und dauert in der Wurzel viele Jahre. Die Blatt-Ansätze sind grün, lanzettförmig, endigen sich aber nicht mit Grannen. Die Blätter sind länger, mehr aderig, als bey dem rothen Wiesen-Klee, auch selten gefleckt. Der Kelch ist gestreift, unterwärts mehr glatt und haaricht, die Zähne desselben aber rauch. Er unterscheidet sich auch von letzterm darin, daß derselbe zwey bey einander stehende Blumen-Köpfe, der rothe Wiesen-Klee aber nur Einen trägt. Die Blumen geben den Bienen Stoff zu Honig; und die ganze Pflanze kann auch, wie der Wiesen-Klee, zur Fütterung genutzet werden, nur wird sie bald in den Stängeln hart.

22. Klettenartiger Klee, mit weitschweifigem Stängel, eyrunden Blättern, und ziemlich eyrunden Blumen-Aehren, an deren Blumen-Kelchen die Zähne borstenartig und mit Börsten besetzt sind, Trifolium capitulo glomerato rigido *J. B.* Trif. globosum *f.* capitulo lagopi rotundiori *C. B* Trifolium lappaceum, spicis subovatis, calycinis dentibus seraceis hispidis, caule patulo, foliis ovatis *L.* Man findet ihn bey Montpellier wild. Seine Aeste stehen weit von dem Stängel ab; seine Blumenkelche sind glatt, ihre Zähne aber, wie Grannen, von gleicher Größe, und wann die Blüthe vorüber ist, steif. Seine Blumen-Kronen bestehen aus Einem Stücke, und sind blaß oder weiß.

23. Fleischrother nackender Wiesen-Klee, Trifolium album incarnatum spicatum, *s.* Lagopus maximus *J. B.* Trif. spica subrotunda rubra *C. B.* Trifol. alopecurum latifolium, spica longa *Barrel.* Tri-

33. Einblumiger ſtammloſer Klee, deſſen Blumenſtiele kürzer als der Blatt-Anſatz, und in 3 kleinere geſpalten ſind, und meiſtens 3 Blumen tragen, Trifolium unifiorum acaule, pedunculis trifidis ſubtriflorisque ſtipula brevioribus *Linn.* Er wächſt in Candien, Syrien, Arabien, in dem gelobten Lande und bey Conſtantinopel, wild. Seine Blätter ſind fein gezackt. Die Blumenſtielchen ſind lang, und die Blumen ſtehen in einiger Entfernung von einander; ihre Kelche formiren eine längere Röhre, und haben 10 Streifen, und gleich große Abſchnitte.

34. Schaumiger Klee mit eyrunden Blumen-Aehren, deren allgemeine Hüllen aus 5 Blättchen beſtehen, und deren Kelche aufgeblaſen und glatt ſind, und 5 Zähne haben; Trifolium capitulo ſpumoſo laeui *C. B.* Trif. caule nudo, glomeralis glabris *J. B.* Trifolium ſpumoſum, ſpicis ovatis, calycibus inflatis glabris quinquedentatis, involucris univerſalibus pentaphyllis *Linn.* Er wächſt in Frankreich und

aber derselbe mehr ein Sommer-Gewächs ist (*), möchte es bey uns die Mühe nicht belohnen, dieses nachzuahmen.

Am Fuße der pyrenäischen Alpen, französischen Antheiles, wo man den Acker, wie bey uns, in 3 Felder bauet, wird diese Klee-Art um Mich. in die ein Mahl gepflügete und geegete Brache des folgenden Jahres gesäet, vom Unkraute durch das Gäten gereiniget, zu Ende des Aprils schon zum ersten Mahl, und hierauf noch ein oder zwey Mahl gemähet, worauf der Acker wieder umgepflüget und mit Weitzen bestellet wird. Auf eine etwas sonderbare Weise wird der Same aufgenommen. Die Weibsleute beißen ihn ab, geben das Kraut dem Viehe, und nagen so mit ihren Kühen an Einer Pflanze. Eine flüchtige Vergleichung mit unsern bessern Klee-Sorten zeigt bald, warum die französischen Landwirthe nicht so glücklich, als ihre Moden-Händler, bey uns werden können.

27. Schildförmiger Klee, mit eyrunden Blättchen und Blumen-Aehren, an deren weit offen stehenden Blumenkelchen der unterste Zahn am größten und lanzenförmig ist; Trifolium clypeatum, spicis ovatis, calycibus patulis lacinia infima maxima lanceolata, foliolis ovatis *Linn.* Er ist in den Morgenländern zu Hause, und ebenfalls ein Sommer-Gewächs. Er glänzt wie Silber, und wird daher auch Trifolium clypeatum argenteum genannt.

28. Rauher Klee, mit eyrunden zur Seite des Stängels und der Aeste fest sitzenden Blumen-Köpfchen,

(*) Doch versichert Hr. Hofr. Beckmann, in den Grundsätzen der deutschen Landwirthschaft (Gött. 1773, 8) S. 171, daß diese Pflanze im ökonomischen Garten in Göttingen oft 2 Jahr gedauert habe. Er glaubt, daß sie eben diejenige sey, welche Krause, in seiner Gärtnerey, S. 652, pyrenäischen Berg-Klee nennt, und daß er diesen unrichtig für Trifol. rubens halte.

33. Einblumiger ſtammloſer Klee, deſſen Blumenſtiele kürzer als der Blatt-Anſatz, und in 3 kleinere geſpalten ſind, und meiſtens 3 Blumen tragen, Trifolium unifiorum acaule, pedunculis trifidis subtriflorisque ſtipula brevioribus *Linn.* Er wächſt in Candien, Syrien, Arabien, in dem gelobten Lande und bey Conſtantinopel, wild. Seine Blätter ſind fein gezackt. Die Blumenſtielchen ſind lang, und die Blumen ſtehen in einiger Entfernung von einander; ihre Kelche formiren eine längere Röhre, und haben 10 Streifen, und gleich große Abſchnitte.

34. Schaumiger Klee mit eyrunden Blumen-Aehren, deren allgemeine Hüllen aus 5 Blättchen beſtehen, und deren Kelche aufgeblaſen und glatt ſind, und 5 Zähne haben; Trifolium capitulo ſpumoſo laeui *C. B.* Trif. caule nudo, glomerulis glabris *J. B.* Trifolium ſpumoſum, ſpicis ovatis, calycibus inflatis glabris quinquedentatis, involucris univerſalibus pentaphyllis *Linn.* Er wächſt in Frankreich und Italien, vornehmlich in Apulien, wild. Seine Blumenkelche verlieren ſich in 5 Borſten. Die Blumen-Kronen ſind roth. Die Hülſen füllen den Kelch aus, und ſind länger als derſelbe; ſie haben eine pfriemförmige Spitze, und enthalten 4 Samen.

35. Rücklings liegender Klee, mit geſtreckten Stängeln und ziemlich eyrunden Blumen-Aehren, an welchen die Kelche aufgeblaſen und auf dem Rücken höckerig ſind, die Blumenkronen aber auf dem Rücken liegen; Trifolium folliculatum ſ. veſicarium minus purpureum *J. B.* Trif. pratenſe folliculatum *C. B.* Trif. pratenſe folliculatum, flore inverſo *Barrel.* Trif. ſalmanticum *Gerard.* Trifolium reſupinatum, ſpicis ſubovatis, corollis reſupinatis, calycibus inflatis dorſo gibbis caulibus proſtratis *Linn.* Er iſt in England und in den Niederlanden zu Hauſe. Seine Blumen-Kelche ſind eyrund länglich, und verlieren ſich

an

38. Weißer, wohlriechender Berg-Klee, Hopfen-Klee, aufrecht ſtehender Waſſerhopfen-Klee, weißer langſtieliger Spitz-Klee; Trifolium montanum albo flore, incanum Clulii *J. B.* Trif. montanum album *C. B.* Trif. pratenſe album *Fuchſ.* Trif. folio longiore, flore albo *Rivin.* Trif. caule erecto pauciflоro, foliis elliptico-lanceolatis, nervoſis ſubtus hirſutis *Hall.* Trifolium montanum, ſpicis ſubimbricatis ſubtribus, vexillis ſubulatis emarcescentibus, calycibus nudis, caule erecto *L.* Engl. white Meadow-Trefoil, wächſt in Europa auf trockuen Wieſen, Hügeln und erhabenen Weiden, hält mehrere Jahre aus, und blühet vom May bis in den Jul. Die Stängel wachſen gerade aufwärts, werden 1 F. hoch, ſind haaricht und gemeiniglich ohne Zweige. Die drey Blättchen ſind ſchmahl, ſpitzig, zart eingekerbet, grau oder bläulich, geadert und unterwärts haaricht; die Blatt-Anſätze lang zugeſpitzt; die Blumen-Köpfe weiß, eyförmig zugeſpitzt, und haben einen lieblichen Geruch. Der weiße, haarichte Kelch zeigt ganz dünne Zähnchen. Die Blumenblätter ſind weiß; das Fähnchen iſt zwey Mahl länger als die übrigen, geſtreift, gefalten, und zur Hälfte rückwärts gebogen; das Schiffchen unterwärts zweyſpaltig, nicht gekrümmt, und mit den Flügeln verwachſen. Dieſer Klee muß immer jung, zur grünen Fütterung ſowohl, als auch zum Heumachen, abgeſchnitten werden, weil Blätter und Stängel härter, als bey den übrigen Klee-Arten, ſind. Seine Blumen werden fleißig von den Bienen beſucht.

39. Gelber Wieſen-Klee, Hopfen-Klee, aufrecht ſtehender gelber Hopfen-Klee, gelber Katzen-Klee, Unſerer lieben Frauen Hopfen; Trifolium agrarium *Dod.* Trif. agrarium luteum capitulo lupuli, majus *Moriſ.* Trif. luteum alterum lupulinum, vulgo Lupulus ſylvaticus *Thal.* Trif. luteum minimum *Lob.* & *Dalech.* Trif. pratenſe luteum, capi-

niedrig liegen und feucht ſind. Er dauert mehrere Jahre. Seine kaum über 1 Schuh lange Stängel liegen auf der Erde, und treiben an ihrem Gelenke Wurzeln. Die drey Blättchen ſind glatt, nervicht, herzförmig, am Rande wie eine Säge gezahnt; und die Blatt-Anſätze groß, lanzettförmig, und verlängern ſich in eine Granne. Die Blumen-Köpfchen ſind beynahe kugelrund, doch dabey etwas platt gedrückt, ſie ſitzen in den Winkeln der Blätter auf langen dünnen Stielen. Der Kelch iſt anfangs wie mit Seide überzogen, und gleichſam in zwey Lippen abgetheilt; die 2 obern Zähne ſind kürzer, die untern aber länger und gerade. Wenn der Same zu reifen anfängt, verändert ſich der Kelch; der obere Theil nimmt die Geſtalt einer Kugel an, bekommt ein zartes netzförmiges, bald glattes, bald etwas haarichtes Gewebe, und hat 2 krumme Zähne, welche ſich gegen einander biegen. Wenn dieſe Kelche auf dem Boden liegen, ſehen ſie, indem ihre kugelrunde Häupter auf ihrer obern Seite, gegen die Sonne zu, einen rothen Schein haben, der andere Theil aber weiß iſt, den Erdbeeren ſehr ähnlich; und daher iſt auch die Benennung Erdbeer-Klee entſtanden. Das lange weiße Fähnchen iſt mit roſenfarbigen Linien durchzogen, und das ganze kurze Schiffchen mit den Flügeln verwachſen. Die Hülſe iſt rund, und enthält 2 Samen. Dem Nutzen nach kommt dieſer Klee dem Wieſen-Klee gleich. Er wird in Irland ausgeſäet, und treibt daſelbſt 7 Schuh lange Stängel (*). Er ſollte daher auch bey uns hervor geſuchet, und auf ſolchen Plätzen angebauet werden, wo die Näſſe andern Futter-Kräutern nachtheilig iſt. Er wird gemeiniglich mit dem aufrecht ſtehenden gelben Hopfen-Klee, (unten, No. 39) verwechſelt.

38. Weißer,

(*) Nach den von Baker damit angeſtellten Verſuchen. S. das aus dem Engl. überſ. Muſeum ruſticum & commerciale, 10 B. Lpz. 1769, 8.) S. 253, fgg.

Unter ſolchen befindet ſich auch Hr. Bergen, welcher in ſeiner Anleitung für die Landwirthe zur Verbeſſer. der Viehzucht, (Berl. und Stralſ. 1781, gr. 8.) S. 96, ſagt, daß er, wenn er angebauet wird, zu einer anſehnlichen Pflanze erwächſt, und in Anſehung ſeiner nahrhaften, geſunden, und dem Viehe äuſſerſt angenehmen Eigenſchaft, gleiches Lob mit dem holländiſchen weißen Wieſen-Klee (ſ. oben, No. 12) verdiene. Doch daure er ſelten über 2 Jahr, in naſſem Boden nur 1 Jahr. Man könne indeſſen dem Fehler durch Nachſäen abhelfen, indem man im Frühjahre den Samen nur auf die Wieſe ſtreuet, weil er ſchwer genug iſt, an die Erde zu kommen und Wurzel faſſen zu können, wozu auch die öftern Regen- und Schneeſchlacker des Aprils das ihrige beytragen.

40. Aufrecht ſtehender gelber Hopfen-Klee, mit dem haarichten Kelche; Trifolium montanum lupulinum *C. B.* Trif. pratenſe, flore rufescente *Vaill.* Trif. caule erecto, ſpicis ovatis ſtrepentibus, calycibus capillaribus piloſis *Hall.* Trifolium ſpadiceum, ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus piloſis, caule erecto *L.* Man findet ihn in ganz Europa auf trocknen Wieſen und in Wäldern, wo er im Jun. und Jul. blühet. Der aufrecht ſtehende Stängel wird 1 bis 2 F. hoch, und zeigt wenig Zweige. Die drey Blättchen ſind unten herzförmig, oben aber mehr eyförmig. Ehe die Blüthe ſich öffnet, iſt der Kelch merklich mit Haaren beſetzt; die zwey obern Zähne ſind kleiner, und der unterſte iſt der längſte und vorzüglich haaricht. Die getrockneten Blumenblätter bekommen eine bräunliche oder braunrothe Farbe. Scopoli zweifelt, daß dieſe Art von No. 39 wirklich unterſchieden ſey.

41. Geſtreckter gelber Hopfen-Klee, gelber Feld-Klee; Trifolium lupulinum alterum minus *Raj.* Trif. pratenſe luteo-croceum *Vaill.* Trif. ſpicis ſtrepentibus pauciſloris, caulibus erectis *Hall.* Trifolium procumbens, ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, caulibus procumbentibus *L.* wächſt

tulo lupuli, vel agrarium *C. B.* Trif. pratenſe luteum femina, flore pulchriori, ſ. lupulinum *J. B.* Trif. ſpicis ovatis denſiſſimis ſtrepentibus, caulibus diffuſis *Hall.* Trif. agrarium, ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus nudis, caule erecto *L.* Fr. Treſle houblonné, Engl. Hop-Trefoil, wächſt auf trocknen Wieſen, und leichten ſandigen Aeckern, häufig. Der Stängel iſt 1 Schuh lang, treibt viele Zweige, iſt aufgerichtet, oder zuweilen ausgebreitet, oder mehr ausgeſtreckt. Die drey Blättchen ſind ey- oder herzförmig, ausgezackt, glatt, bläulich grün, und die Blatt-Anſätze groß, eyförmig, zugeſpitzt. Die dichten Blumen-Köpfe ſitzen auf langen Stielen, und die Blumen ſelbſt hängen an beſondern Stielen. Die Blumenblätter ſind gelb; die Fahne iſt viel größer als die übrigen Blätter, herzförmig geſtreift und zurück gebogen; das Schiffchen zweyblätterig ohne Schenkel. Die Blumenblätter fallen nicht ab, ſie vertrocknen, werden braun, und geben bey dem Anfühlen ein Geräuſch von ſich. Die geſtielte Hülſe enthält nur 1 Samen. Dieſer Klee dauert gemeiniglich nur 1 Jahr, und iſt ſehr niedrig, erwächſt aber bey beſonderm Anbaue zu einer anſehnlichen Größe. Die Engländer pflegen denſelben auszuſäen, und mit vielen Lobſprüchen zu erheben. Sie wollen ihn, wegen des ſüßen Geſchmackes, dem rothen Klee vorziehen, und glauben, daß der Boden dadurch gedünget werde, folglich auch um deswillen einträglich ſey, wenn gleich weniger Heu davon gewonnen wird. Er wird in England ſehr häufig unter die Korn-Früchte ausgeſäet, nach der Abärndung derſelben abgemähet, und dem Viehe ſodann friſch vorgeleget, oder zu Heu gemacht. Es hat aber auch in Deutſchland nicht an Landwirthen gefehlt, welche das von den Engländern dieſem Klee beygelegte Lob nicht übertrieben finden, nachdem ſie ihn ſelbſt gebauet haben.

Unter

Winkeln der Blätter, und ſind von mehrern Blättern umzingelt, welche ſelbſt in 3 Abſchnitte geſpalten ſind. Die Blumen ſtehen wechſelweiſe, und haben eine gelbe Krone.

44. Ganz kleiner Klee, ohne Stängel und Blumen-Schaft, deſſen Blumen auf kaum merklichen Stielen unmittelbar aus der Wurzel kommen; Trif. pithymi capitulis inter genicula annuum *Capani*. Trif. minimum ſupinum, floſculorum & ſeminum glomerulis confertim ad radicem naſcentibus *Raj.* Trif. vernum repens *Buxb?* Trifolium ſuffocatum, acaule, exſcapum, floribus ſubſeſſilibus radicalibus *L.*

45. Pannoniſcher Klee, mit aufrechtem Stängel, der ſo wie die glattrandigen Blätter äuſſerſt rauch iſt, und langen rauchen Blumen-Aehren, in welchen die Blumen-Kronen aus Einem Stücke beſtehen, Trifolium pannonicum, ſpicis villoſis longis, corollis monopetalis, foliis integerrimis cauleque erecto villoſiſſimis *L.* iſt in Ungarn einheimiſch.

46. Großer haariger Wieſen-Klee, mit einer weißlich ſchwefelgelben oder kupferfarbigen Blume; Trif. pratenſe hirſutum maius, flore albo ſulphureo, ſ. ochroleucum *Raj. Cat.* Trif. ochroleucum, ſpicis ovatis, calycibus foliatis, caule erecto villoſo, foliolis lanceolatis *Mill.* Trifolium ochroleucum, ſpicis villoſis, caule erecto pubeſcente, foliolis infimis obcordatis *L.* wächſt für ſich auf kreidigem Boden in vielen Gegenden Englands; und in einigen Grafſchaften wird der Same auf eben die Art, wie der gemeine rothe Klee, beſonders auf kreidigen Boden geſäet. Die Stängel dieſer Sorte ſind haarig; ſie wachſen gerade, und werden 2 Sch. und darüber hoch. Sie ſind mit dreyblätterigen Blättern beſetzt, die auf langen Stielen ſtehen. Die Lappen derſelben ſind länger, als die am rothen Klee, und haben keine weiße Flecken. Ihre Farbe iſt gelblich grün. Sie ſind mit weichen Haaren bedeckt.

in leichten ſandigen Aeckern, beſonders in den Stoppeln und auf der Brache, und blüht vom May bis in den Jun. Die Stängel ſind ungefähr 1 F. hoch, gemeiniglich geſtreckt, zuweilen auch mehr aufgerichtet, in wenige Zweige verbreitet, und mit wenigern Blättern beſetzt; auch die drey Blättchen kleiner, und ſcharf ausgezackt. Das Blumen-Köpfchen iſt lockerer, und beſteht ungefähr aus 16 Blümchen, welche beym Vertrocknen eine grauliche Farbe annehmen. Er iſt ebenfalls ein ſehr gutes Futter für die Schafe, welches köſtliches Heu gibt, und deshalb in England beſonders gebauet wird.

42. Ganz kleiner oder dünnſtieliger gelber Hopfen-Klee, Faden-Klee; Trif. lupulinum minimum *Morif.* & *Raj.* Trifolium filiforme, ſpicis ſubimbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus pedicellatis, caulibus procumbentibus *L. Fr.* Non pareil, Engl. None ſuch, black Sead, ſmall Trefoil; ein Sommer-Gewächs, welches in England und in der Schweitz einheimiſch iſt, und eine bloße Varietät des vorhergehenden geſtreckten Klees zu ſeyn ſcheint. Stängel und Blumenſtiele ſind fadenförmig. Die letztern ſind länger als die Blätter, in deren Winkel ſie ſtehen, und tragen 3 bis 5, in gut gedüngtem Boden auch wohl 12 bis 15 unter ſich gebogene Blumen. Seine Blättchen ſind ausgeſchnitten und geſtreift. Er iſt ein gutes Futter-Kraut.

43. Zweyblumiger Klee, mit lanzenförmigen Blättern, und zweyblumigen Blumen-Aehren, welche aufſitzen, und borſtige trichterförmige Hüllen haben; Trifolrum biflorum ſpicis biforis ſeſſilibus, involucris hiſpidis infundibuliformibus, foliis lanceolatis *L.* Er kommt aus Canada und Virginien. Sein Stängel wächſt ziemlich aufrecht. Die Blätter ſitzen auf kurzen Stielen, und ihre Scheiden haben 2 ſcharf zugeſpitzte Zähne. Die Blumen-Köpfchen ſitzen in den

Win-

Linné hat dieſe Pflanzen-Gattung in die 3te Abtheilung ſeiner 17ten Claſſe geſetzt, welche er Diadelphia Decandria nennt, weil die Blumen 10 Staubfäden haben, die zwey Körper ausmachen.

Dieſe Gattung liefert, auſſer einigen, zur Verzierung der Blumen-Gärten ſchicklichen Pflanzen, beſonders auch einige herrliche, dauerhafte, theils im Winter unbelaubte, theils immergrüne Blumen-Sträuche für Luſt-Gärten, mit dreyfachen eyrunden Blättern, und mit langen Aehren von gelben, ſchmetterlingförmigen, reichlich blühenden Blumen, welche längliche Schoten hinterlaſſen, und im Herbſte eine Menge reifen Samen geben.

A. Für Luſt-Gebüſche. Engl. Trefoil-Tree.

1. Breitblätteriger Geiß-Klee, breitblätteriger Bohnen-Baum, falſcher Eben-Baum, Alpen-Cytiſus, Cytiſus Laburnum *Linn.* Siehe im X Th. S. 15, f.

2. Glatter kurzſtieliger Geiß-Klee, Kleiner italiäniſcher Bohnen-Baum, Cytiſus primus *Anguillarae?* Cytiſus alter minor *Penae, Lob. & Dalech.* Cytiſus quintus rotundifolius *Theod.* Cytiſus glaber ſiliqua lata *J. B.* Cytiſus glabris foliis ſubrotundis, pediculis breviſſimis *C. B.* Cytiſus foliis ſaepius ſeſſilibus, calycibus ſquamula triplici auctis *Sauvag.* Cytiſus ſeſſilifolius, racemis erectis, calycibus bracteis triplici, foliis floralibus ſeſſilibus *L. f.* Cytiſe des jardiniers, Engl. The ſmooth round-leaved Cytiſus; wird, nach Linné in Italien und in der Provence wild angetroffen, dauert aber in den Pflanzungen in Deutſchland, und leidet nur bey ſehr harten Wintern. Er bleibt allezeit ſtrauchartig, indem er nicht über 5 F. hoch wird. Die Blätter, welche aus 3 kleinen, rundlich ſpitzigen, glatten, hellgrünen Blättern zuſammen geſetzt ſind, ſtehen dicht um die Zweige. Die Blumen kommen im Anfange des Jun. an den Enden der Zweige, in kurzen

Die Blumen wachsen in eyrunden Aehren am Ende der Zweige; sie haben eine blasse Kupfer-Farbe; die Blumenblätter sind lang und röhrig, am Rande aber sind sie in 2 Lippen abgetheilt, wie die andern Sorten.

Den Nahmen Geiß-Klee, Gr. Κύτισος, L. Cytisus (*), Fr. Citile, oder Cytile, führt eine Pflanzen-Gattung mit schmetterlingförmigen Blumen. Der kurze glockenförmige Kelch besteht aus einem einzigen Blatte, welches in zwey Lippen abgetheilt ist; die obere ist zweyspaltig und spitzig, die untere aber in 3 Theile getheilt. Die Fahne der Blume steigt in die Höhe, ist eyrund, und an der Seite rückwärts gebogen. Die Flügel sind zugestumpft, stehen aufrecht, und haben die Länge der Fahne. Das Schiffchen oder Kiel-Blättchen ist bauchicht und zugespitzt. Von den 10 Staubfäden sind 9 in eine Scheide verwachsen, einer aber steht besonders; sie endigen sich mit Kölbchen, welche in die Höhe steigen. Sie hat einen länglichen Eyerstock, welcher einem einzelen, mit einer zugestumpften Narbe gekrönten Griffel zur Stütze dient. Aus dem Eyerstocke wird hernach eine längliche, zugestumpfte Schote, die an ihrer Basis schmahl, und mit einigen nierenförmigen platt gedrückten Samen angefüllt ist.

Linné

(*) *Servius* leitet diesen Nahmen von der Stadt Cithysa, *Philargyrius* von der Insel Cythisa, her, da doch die ältern Erd-Beschreiber weder eine Insel, noch eine Stadt dieses Nahmens kennen. Nach dem *Vossius* rührt die Benennung von der Insel Cythnus, bey Euböa und Attica her, aus welcher dieses Gewächs, wie *Plinius*, L. 13, c. 24, meldet, nach andern Inseln und Städten in Griechenland gebracht worden ist. Welches eigentlich der Cytisus der Alten, und von denselben zum Vieh-Futter angepriesen worden sey, ist nicht ausgemacht. Einige wollen den baumartigen Schnecken-Klee (Medicago arborea, welcher auch Cytisus genannt worden ist, dafür ausgeben; Andere glauben, es sey eine Art Meliloten; noch Andere geben die Colutea dafür aus. Ein Mehreres davon wird unten, wo ich von dem baumartigen Schnecken-Klee handle, vorkommen.

Inf. Cyt. quartus hiſpanicus Cluſii *Lob.* & *Dalech.* t. incanus, ſiliqua longiore *C. B.* Cytiſus hirſutus, dumculis ſimplicibus lateralibus, calycibus hirſutis dis obtuſis ventricoſo-oblongis *L. Fr.* Citiſe lanu- ux, Engl. Evergreen Cytiſus of Naples; iſt in rien, Oeſtreich, Schwaben, Italien und Spa- zu Hauſe. Der Stamm iſt aufrecht, ſtrauchig, mit vielen, aufrechten, eine vortreffliche dicht te Krone bildenden Zweigen, und wird 6 bis 8 h. Die Rinde der Zweige iſt grau, in einiger ung aber in das Grüne ſpielend; einige ſind hem Anſehen, als ob ſie geſtreift wären; die ungen im Boden ſchwärzlich grün, die Ränder ß; die jungen Schüſſe grün und geſtreift, und rfläche ſteifborſtig. Die Blätter, klein, ey- t einer ganz entlängs laufenden ſtarken Mittel- teifborſtig, je drey auf kurzen Stielen, vor- rün, bekleiden den Strauch mit großer Schön- ie Blumen, an den Seiten der Zweige, in ngenden Büſcheln, (auf einfachen Stielen, é), rein gelb, mit ſteifborſtigen, dreyſpaltigen, bauchig-länglichen Kelchen, blühen im Jun., abermahl im Oct., und in einem offenen und Winter bisweilen auch im Nov. und Dec. Jun. hervor gekommenen Blumen hinterlaſſen deren Same im Herbſte gut reif wird. Die- auch iſt im Jun. überall mit Blumen bedeckt, ie goldgelbe Krone macht dann ein ſchönes und ndes Anſehen. Er kann keinen ſtrengen Froſt n, und muß alſo in den Luſt-Gebüſchen einen n Boden, und eine gut geſchützte Lage haben.

. Oeſtreichiſcher, oder tatariſcher immergrüner Klee, Cytiſus incanus, folio oblongo auſtriacus . Cyt. incanus *Gerard.* Cytiſus floribus capita- oliolis ovato-oblongis, caule fruticoſo *Mill.* Cyti- auſtriacus, floribus vmbellatis terminalibus, caulibus

aufrechten Trauben hervor, ſind vortrefflich glänzend-gelb; die Kelche haben dreyfache Deckblätter. Die kleinen braunen Schoten enthalten 6 bis 7 braune Samen-Körner, welche im Aug. reif werden. Wenn dieſer Strauch in voller Blüthe ſteht, ſcheint er faſt ganz mit Blumen bedeckt zu ſeyn. Die äuſſere Rinde der Zweige iſt braunroth, und das Holz grüngelblich. Gleditſch hat bemerkt, daß die Blüthe nicht nur viel und gutes Honig gebe, ſondern auch die ſchwachen Bienen beſonders ſtärke.

3. Zwerg-Geißklee, ſchwarzes glattes Geißblatt, ſchwärzlicher Cytiſus, Cytiſus Geſneri *Dalech.* Cytiſus quartus *Cluſ.* Cytiſus primus *Cluſ.* & *Theod.* Cytiſus primus Tabernæmontani ſpicatus *Beſler.* Cytiſus minor *Geſn.* Cytiſus niger ſ. maior *J. Camer.* Cytiſus glaber nigricans *C. B.* Cytiſus Geſneri, cui flores ſpicati *J. B.* Cytiſus ſylveſtris *Cordi*, Cytiſus foliis ovatis nitidis, floribus ſpicatis cernuis, calycibus et ſiliquis ſericeis *Hall.* Cytiſus nigricans, racemis ſimplicibus erectis, foliolis ovato-oblongis *L.* Engl. black Cytiſus; wächſt in Oeſtreich, Pannonien, Böheim, und Italien wild. Der Stamm iſt kurz, ſtrauchig, theilt ſich niedrig in viele aufrechte, dünne, Zweige, welche eine buſchige Krone bilden; wird 4 bis 5 F. hoch. Die Rinde des Stammes iſt braun, die Rinde der jungen Schüſſe aber grünlich roth. Die Blätter ſind eyrund-länglich, dreyblätterig, den Blättern des gemeinen Klees ähnlich, glatt, die Oberfläche dunkelgrün, die Unterfläche bläſſer, die Haupt-Stiele bräunlich. Die Blumen zeigen ſich im Jun. und Jul. auf den Enden aller Zweige, in einfachen, langen, dichten, aufrechten Trauben, und ſind ſchön gelb. Die Samen werden im Herbſte reif. Dieſer Strauch hat, wenn er in voller Blüthe ſteht, ein vortreffliches Anſehen.

4. Haariger, ſtreifborſtiger oder immergrüner Geiß-Klee aus Neapel, Cytiſus quartus *Theod.* & *Cluſ.*

Clus. Cyt. quartus hiſpanicus Cluſii *Lob.* & *Dalech.* Cyt. incanus, ſiliqua longiore *C. B.* Cytiſus hirſutus, pedunculis ſimplicibus lateralibus, calycibus hirſutis trifidis obtuſis ventricoſo-oblongis *L.* Fr. Citiſe lanugineux, Engl. Evergreen Cytiſus of Naples; iſt in Sibirien, Oeſtreich, Schwaben, Italien und Spanien, zu Hauſe. Der Stamm iſt aufrecht, ſtrauchig, grau, mit vielen, aufrechten, eine vortreffliche dicht belaubte Krone bildenden Zweigen, und wird 6 bis 8 F. hoch. Die Rinde der Zweige iſt grau, in einiger Entfernung aber in das Grüne ſpielend; einige ſind von ſolchem Anſehen, als ob ſie geſtreift wären; die Aushöhlungen im Boden ſchwärzlich grün, die Ränder aber weiß; die jungen Schüſſe grün und geſtreift, und ihre Oberfläche ſteifborſtig. Die Blätter, klein, eyrund, mit einer ganz entlängs laufenden ſtarken Mittel-Rippe, ſteifborſtig, je drey auf kurzen Stielen, vortrefflich grün, bekleiden den Strauch mit großer Schönheit. Die Blumen, an den Seiten der Zweige, in kurzen hängenden Büſcheln, (auf einfachen Stielen, nach Linné), rein gelb, mit ſteifborſtigen, dreyſpaltigen, ſtumpfen, bauchig-länglichen Kelchen, blühen im Jun., und oft abermahl im Oct., und in einem offenen und gelinden Winter bisweilen auch im Nov. und Dec. Die im Jun. hervor gekommenen Blumen hinterlaſſen Hülſen, deren Same im Herbſte gut reif wird. Dieſer Strauch iſt im Jun. überall mit Blumen bedeckt, und ſeine goldgelbe Krone macht dann ein ſchönes und auffallendes Anſehen. Er kann keinen ſtrengen Froſt ertragen, und muß alſo in den Luſt-Gebüſchen einen trocknen Boden, und eine gut geſchützte Lage haben.

5. Oeſtreichiſcher, oder tatariſcher immergrüner Geiß-Klee, Cytiſus incanus, folio oblongo auſtriacus *C. B.* Cyt. incanus *Gerard.* Cytiſus floribus capitatis, foliolis ovato-oblongis, caule fruticoſo *Mill.* Cytiſus auſtriacus, floribus umbellatis terminalibus, caulibus

bus erectis, foliolis lanceolatis L. Engl. Tartarian Cytisus, ist in Italien, Oestreich und Sibirien zu Hause. Der Stamm ist strauchig, aufrecht, theilt sich niedrig in viele, grüne oder grünliche, eine dichtbelaubte, buschige Krone bildende Zweige, und wird 3 bis 4 F. hoch. Die Blätter sind eyrund-länglich, glatt, weißlichgrün. Die Blumen, an den Enden der Zweige, in dichten doldenförmigen Köpfchen, unter deren jedem sich ein Büschel von Blättern findet, glänzend- oder hellgelb, im May, hinterlassen bisweilen kurze wollige Hülsen.

Eine Abart davon, ist der sibirische Geiß-Klee, Cytisus austriacus foliis & floribus minoribus, Engl. Siberian Cytisus, mit kleinern Blättern, nackten Blumen-Stängeln, und kleinern, etwas früher blühenden Blumen. Nach Mawe ist Cytisus austriacus immergrün, Hanbury aber ordnet ihn zu den im Winter.

Diese fünf Arten sind zu Verzierungs-Pflanzungen höchst würdige Sträuche, und können zu Anlagen von Gruppen sowohl, als auch förmlichen Lust-Gebüschen, vortrefflich genutzet werden, indem sie nicht nur mit ihren zahlreichen dreyblätterigen Blättern zwischen andern Sträuchen eine vortreffliche Mannichfaltigkeit machen, sondern auch in dem Flore mit Blumen gleichsam ganz bedeckt zu seyn scheinen. Die Sorten vom Cytisus Laburnum müssen, weil sie einen hohen Wuchs haben, in den Gruppen und andern Lust-Gebüschen mehr rückwärts, die vier andern Arten aber mehr gegen die Fronte, und auf die am besten in das Auge fallenden Plätze gestellet werden. Sie müssen alle ihrem natürlichen Wuchse überlassen bleiben, ausser daß ihnen dieser oder jener sehr unregelmäßige Schuß oder Zweig genommen werden mag. Sie sind alle, ausser dem C. hirsutus, so dauerhaft, daß sie in jedem Boden und in jeder Lage fortkommen, und lassen sich alle in Menge

aus

aus Samen ziehen, und einige sich auch durch Zweige vermehren.

Aus Samen, welcher binnen 6 bis 7 Wochen aufzugehen pflegt: Man säe denselben im März in gemeine Garten-Erde, auf 4 F. breite Beete, entweder über das ganze Beet, und bedecke ihn ½ Z. tief mit Erde, oder in eben so tiefe Furchen, halte die jungen Pflanzen den ganzen Sommer über von Unkraute rein, begieße sie bey sehr trockner Witterung bisweilen ein wenig, schütze im folgenden Winter die von C. nigricans und hirsutus gegen sehr strengen Frost mit Matten, und pflanze, nach Mawe, schon im folgenden Frühjahre die Pflanzen von allen Arten, wenn sie etwa sehr gedrängt stehen, in 2 F. weit von einander entfernte Pflanzschulen-Reihen, und in den Reihen selbst 1 F. weit; und nach 2, 3 bis 4 Jahren, wenn sie die gehörige Größe erlangt haben, in die Lust-Gebüsche. Oder, nach Hanbury: man pflanze im ersten Frühjahre nur die Pflanzen von C. Laburnum und hirsutus in Pflanz-Schulen-Reihen, die der andern Arten aber lasse man auf dem Samen-Beete erst 2 Jahr alt werden, damit sie erst mehr Stärke gewinnen, pflanze aber die vom Laburnum, zumahl diejenigen derselben, die man hochstämmig ziehen will, etwas weiter von einander. Auch C. hirsutus kann mit einem 2, 3 bis 4 F. hohen geraden Schafte gezogen werden, und bildet dann auf dessen Gipfel von selbst eine vortreffliche Krone.

Durch abgeschnittene junge Schüsse, durch welche sich, weil sie binnen einem Jahre Wurzeln zu treiben pflegen, die mehresten der im Winter unbelaubten Arten auch mit gutem Erfolge vermehren lassen, und wozu der Oct. und Nov. die beste Zeit sind. Man stecke 8, 10 bis 12 Z. lange Schüsse, entweder in 1 F. weit von einander entfernte Reihen, und in den Reihen selbst 5 bis 6 Z. weit von einander, und pflanze dieselben im Winter des folgenden Jahres in die Pflanzschule; oder,

damit

damit man ſie nicht erſt noch in die Pflanzſchule bringen dürfe, ſtecke man ſie in 2 F. weit von einander entfernte Reihen, und in den Reihen ſelbſt 1 F. weit von einander, und pflanze ſie, ſo bald ſie nachher groß genug ſind, von da ſogleich in die Luſt-Gebüſche. In der Pflanz-Schule bedürfen die jungen Pflanzen keiner weitern Wartung, als daß ſie von Unkraute rein gehalten, und der Boden zwiſchen den Reihen jährlich aufgelockert werde.

B. Für die Blumen-Gärten. Engl. Baſe Tree-Trefoil.

6. Niedriger oder kriechender Geiß-Klee, Cytiſus ſupinus, foliis infra & ſiliquis molli hirſutie pubescentibus *C. B.* Cyt. ſupinus, floribus umbellatis terminalibus, ramis decumbentibus, foliolis ovatis *L.* Engl. Low downy Cytiſus. Man findet ihn in Sicilien, Italien, Provence, Spanien und Sibirien. Die Stämme ſind ſchwach, dünn, kaum 1 F. lang, ohne Unterſtützung am Boden liegend. Die Blätter, länglich, auf der Oberfläche glatt, auf der Unterfläche aber mit weichen Haaren beſetzt, je drey auf etwas langen Stielen. Die Blumen, auf den Enden der Zweige, in kleinen doldenförmigen Köpfchen, hochgelb, haben einen Büſchel von Blättern unter ſich, im Jun. Die Hülſen flach, weichhaarig.

7. Silberweißer Geiß-Klee, Cytiſus humilis argenteus anguſtifolius *Tourn.* Cyt. acaulis, floribus ſolitariis, foliolis ſericeis lanceolatis *Sauv.* Cyt. argenteus, floribus ſubſeſſilibus ſubbinatis, foliis tomentoſis, caulibus decumbentibus, ſtipulis minutis *L.* Engl. Silvery Cytiſus. Man findet ihn in Languedoc und Krain wild. Die Stämme ſind ſchwach, darnieder liegend, wenig über 6 Z. lang. Die Blätter ſind klein, lanzenförmig, filzig, ſilberweiß, je drey auf einem Stängel; die Blatt-Anſätze klein. Die Blumen, an den Enden der Zweige 2 bis 3 beyſammen,

in

in den Winkeln der Blätter aber einzeln, sehr kurz gestielt, blaßgelb, im Jul.

8. Griechischer oder leinkrautblätteriger Geiß-Klee, Barba Jovis linariae folio, flore luteo parvo *Tourn.* Cytisus graecus, foliis simplicibus lanceolato linearibus, ramis angulatis *L.* Engl. Linaria-leaved Cytisus, wächst auf den Inseln im Archipelagus wild. Er macht einen 6 bis 7 F. hohen, holzigen Stängel, welcher viele eckige Seiten-Zweige treibt, die mit einfachen, schmahlen, lanzenförmigen Blättern besetzt sind. Die Blumen kommen in kurzen Büscheln, neben an den Zweigen heraus. Sie sind klein, gelb, und erscheinen im Jul. und Aug. In England aber folgen keine Samen auf dieselben.

Wenn diese drey Pflanzen in einem trocknen und warmen Boden, und in einer südlichen, gut geschützten Lage stehen, so geben sie im Herbste größtentheils reifen Samen, ausser nur in einem sehr nassen Sommer nicht: weswegen man, um gleichwohl Samen zu gewinnen, über einigen Pflanzen gläserne Glocken befestigen muß, um den Regen abzuhalten, weil der Same dann, wofern nicht der Sommer äusserst kalt und ungünstig ist, zur Reife zu kommen pflegt. Sie lassen sich wegen ihrer zähen und tief eindringenden Wurzeln nicht gut verpflanzen. Der Same, aus welchem sie sich sehr leicht ziehen lassen, muß also im Frühlinge sogleich an Ort und Stelle gesäet, und die aufgegangenen Pflanzen gehörig verdünnet, und den Sommer über bey trockner Witterung begossen, im folgenden Sommer aber ihre Blumen-Stängel, sobald solche in die Höhe gehen, an kurze Stäbe aufgebunden werden, weil sonst die Blumen an der Erde liegen, und ein unsauberes Ansehen haben, und auch die Samen nicht zur Reife kommen würden.

Mit der Benennung **Harz-Klee** belegt Hr. Gmelin eine Gattung Hülsen-Gewächse mit 10, meistens in zwey Haufen verwachsenen Staub-Fäden, deren Blumenkelch mit verhärteten Tüpfelchen, Drüsen oder Wärzchen bestreuet, und gerade so lang, als die Hülse oder Schote ist, welche einen einigen nierenförmigen Samen enthält. Planer nennt diese Gattung Warzen-Kraut, und Linné Psoralea. In der Murrayischen Ausgabe findet man 18 Arten angeführt. Die bekanntesten und merkwürdigsten sind:

1. Gefiederter Harz-Klee mit einzelnen Blumen in dem Blätterwinkel, Spartium africanum *Riv.* Barba Jouis africana, foliis viridibus pinnatis, floribus axillaribus *L.* Dieser immergrünende Strauch wächst in Aethiopien, und erreicht bey uns einige Fuß Höhe. Die jüngern Stängel und Zweige sind eckig, gestreift, haarig, und mit glänzenden Puncten besetzt. Die gefiederten Blätter bestehen aus 2 oder 3 Paren, und einem einzelen, etwas haarigen, gerüpfelten, schmahlen und lanzenförmigen Blättchen. Bey dem Blatt-Stiele stehen 2 lanzettförmige Blatt-Ansätze; und an dem Winkel desselben stehen einzele Blüth-Stiele, welche nahe an dem Kelche mit 4 Deckblättern umgeben sind. Der Kelch ist haarig, mit glänzenden Puncten besetzt, und der untere Einschnitt nicht viel größer, als die 4 obern. Das Fähnchen ist bläulich, unterwärts weißlich, und kaum merklich eingekerbet; die Flügel sind weißlich, und mit Anhängen versehen; das Kiel-Blättchen ist mit diesen fast verwachsen, auch von gleicher Länge, weiß, und an der Spitze violet.

2. Gefiederter Harz-Klee mit Blumenähren in dem Blätterwinkel, neunblätteriger Harz-Klee, Psoralea Carthagenensis *Jacqu.* Psoralea enneaphylla, foliis pinnatis, spicis axillaribus *L.* Dieses immergrü-

glatt und getüpfelt; bey dem Blattstiele sitzen 2 lanzettförmige, am Rande haarige Blatt-Ansätze. Die Zweige endigen sich mit einer kurzen, dichten Blumen-Aehre. Eyförmige, in eine lange Spitze verlängerte, am Rande haarige, unterwärts drüsichte, weißliche Deckblätter stehen zwischen den Blumen. Der Kelch ist rauch, drüsicht, und der untere Einschnitt etwas länger. Die Blumenblätter sind violet, und geadert. Das Fähnchen und die Flügel haben fast einerley Länge, das Kielblättchen aber ist fast um die Hälfte kürzer.

Die dritte Art zieht man aus dem Samen in einem Mistbeete, und lässet die Pflanzen entweder daselbst wachsen, oder setzt sie in Töpfe, diese an einen sonnenreichen Ort, und bey kühlem Wetter hinter die Fenster des Glashauses, damit man wieder reifen Samen erhalte. Die übrigen Arten vermehrt man durch Samen und Zweige. Letztere schlagen von einigen, insonderheit der vierten Art, leicht Wurzeln. Diese ist zwar nicht so zärtlich als die übrigen, wird aber doch im freyen Lande nicht, wie in der Onomatologia botanica angegeben wird, ausdauern. Man muß sie im Winter in einem mäßig warmen Glashause unterhalten, öfters versetzen, und im Sommer fleißig begießen. Die 1ste, 2te und 5te Art können zwar auch, den Sommer über, der freyen Luft ausgesetzet, müssen aber im Winter wärmer gehalten werden.

* * *

Der **Lotus-Klee**, Lotus *Linn.* Fr. Lotier, Engl. Bird's-Foot-Trefoil, ist eine Gattung Hülsen-Gewächse mit 10 in zwey Haufen verwachsenen Staubfäden, daher sie Linné in die dritte Abtheilung seiner 17ten Classe, die er Diadelphia Decandria nennt, setzt. Wegen der Gestalt der Frucht-Hülse nennt Planer diese Gattung Walzen-Kraut; Andere nen-

iges Deckblatt. Der Kelch iſt haarig, und die kleinen Blumenblätter ſind dunkelblau.

4. Dreyblätteriger Harz-Klee mit lang geſtielten Blüthköpfchen aus dem Blattwinkel, Trifolium bituminoſum *Dod.* Trifolium bitumen redolens *C. B.* Pſoralea bituminoſa, foliis omnibus ternatis, foliolis lanceolatis, pedunculis capitatis *Linn.* wächſt in Sicilien, Italien und Languedoc, auf Hügeln an der Küſte, wild, und iſt ein immergrünender, bey uns 3 bis 4 F. hoher, und in viele geſtreifte und haarige Zweige verbreiteter Strauch. Die lang geſtielten Blätter beſtehen aus drey länglich zugeſpitzten, vertieften Blättchen, und am Stiele ſtehen 2 ſchmahle Blatt-Anſätze. Aus dem Winkel der obern Blatt-Stiele entſtehen einzele, lange, aufgerichtete, ſchwach geſtreifte Blüth-Stiele, welche ſich mit einem Blumen-Köpfchen endigen, und unter dieſem mit 2, auch 3 platt anſitzenden, breiten, zwey- oder dreyſpaltigen Deckblättern beſetzt ſind. Der Kelch iſt geſtreift, haarig, ſchwärzlich grün, und der unterſte Einſchnitt der längſte. Die Blumenblätter ſind blau, röthlich und weißlich vermiſcht. Ein Staubfaden ſteht einzeln. Der Kelch umgibt die Hülſe genau, und dieſe iſt an dem obern Theile mit Haaren und ſchwachen Stacheln beſetzt, und endigt ſich mit einem ſichelförmigen Griffel. Blüthe und Früchte zeigen ſich den ganzen Sommer über. Das Blüth-Köpfchen riecht ſtark nach Harze, wenn man es reibt.

5. Dreyblätteriger Harz-Klee mit kurz geſtielten Blüthähren an dem Ende der Zweige, Pſoralea bracteata *Linn.* Ehedem rechnete Linné dieſelbe zu dem Klee, und nannte ſie Trifolium fruticans. Ihr Vaterland iſt Aethiopien. Der Stängel iſt ſtrauchartig. Die rundlichen Zweige ſind haarig. Die kurz geſtielten Blätter ſtehen wechſelweiſe, und die 3 Blättchen ſind eyförmig, mit einer gekrümmten Spitze,

glatt

glatt und getüpfelt; bey dem Blattstiele sitzen 2 lanzettförmige, am Rande haarige Blatt-Ansätze. Die Zweige endigen sich mit einer kurzen, dichten Blumen-Aehre. Eyförmige, in eine lange Spitze verlängerte, am Rande haarige, unterwärts drüsichte, weißliche Deckblätter stehen zwischen den Blumen. Der Kelch ist rauch, drüsicht, und der untere Einschnitt etwas länger. Die Blumenblätter sind violet, und geadert. Das Fähnchen und die Flügel haben fast einerley Länge, das Kielblättchen aber ist fast um die Hälfte kürzer.

Die dritte Art zieht man aus dem Samen in einem Mistbeete, und lässet die Pflanzen entweder daselbst wachsen, oder setzt sie in Töpfe, diese an einen sonnenreichen Ort, und bey kühlem Wetter hinter die Fenster des Glashauses, damit man wieder reifen Samen erhalte. Die übrigen Arten vermehrt man durch Samen und Zweige. Letztere schlagen von einigen, insonderheit der vierten Art, leicht Wurzeln. Diese ist zwar nicht so zärtlich als die übrigen, wird aber doch im freyen Lande nicht, wie in der Onomatologia botanica angegeben wird, ausdauern. Man muß sie im Winter in einem mäßig warmen Glashause unterhalten, öfters versetzen, und im Sommer fleißig begießen. Die 1ste, 2te und 5te Art können zwar auch, den Sommer über, der freyen Luft ausgesetzet, müssen aber im Winter wärmer gehalten werden.

* * *

Der **Lotus-Klee**, Lotus *Linn.* Fr. Lotier, Engl. Bird's-Foot-Trefoil, ist eine Gattung Hülsen-Gewächse mit 10 in zwey Haufen verwachsenen Staubfäden, daher sie Linné in die dritte Abtheilung seiner 17ten Classe, die er Diadelphia Decandria nennt, setzt. Wegen der Gestalt der Frucht-Hülse nennt Planer diese Gattung Walzen-Kraut; Andere nen-

nen ſie Schoten-Klee, wodurch aber wieder Andere Meliloten verſtehen, und überhaupt tragen alle Klee-Pflanzen Schoten. Die Arten dieſer Gattung ſind theils krautartige, theils ſtaudige, entweder geſtreckte, oder aufrechte Pflanzen, von 1, 2 bis 3 Fuß Höhe, meiſtens mit dreyblätterigen, bey allen Arten an der Baſis der Stiele mit Blatt-Anſätzen verſehenen Blättern, und meiſtens in den Seiten der Zweige entſpringenden, im Jun. oder Jul. blühenden, und im Herbſte reife Samen gebenden, ſchmetterlingförmigen, verzierenden Blumen. Linné hat 19 Arten; bey den 10 erſten, bey der 12ten und 19ten, ſtehen die Hülſen dünn, bey den übrigen aber vereinigen ſie ſich in Köpfchen zuſammen.

1. Geflügelter gelber Lotus-Klee mit glatten Blättern, Meerſtrand-Schotenklee, Lotus maritima lutea ſiliquoſa, folio pingui glabro *Tourn.* Lotus ſiliquoſa lutea, ſiliquis pinnatis ſtrictioribus & longioribus *Raj.* Lotus tetragonolobus maritimus, flore luteo *Barthol.* Lotus maritimus, leguminibus ſolitariis membranaceo-quadrangulis, foliis glabris, bracteis lanceolatis *Linn.* Engl. Maritime Bird's-Foot-Trefoil. wächſt in ganz Europa an den Meer-Ufern (*). Seine Wurzel bleibt über den Winter, und treibt viele zarte, auf dem Erdboden kriechende Stängel, welche ungefähr 1½ Schuh lang werden, und mit dreylappigen Blättern an jedem Gelenke beſetzt ſind, die glatt ſind, und an der Baſis des Stängels 2 Anhänge haben. Die gelben Blumen ſtehen einzeln auf langen Stielen in den Winkeln der Blätter, und zeigen ſich im

*) Nach Schreber's Berichte, in ſeiner oecon. Beſchreibung der Wieſengewächſe bey Halle, (im 3 Theil ſeiner Sammlung verſchiedener Schriften ꝛc. Halle, 1758, gr. 8.) S. 52, wächſt dieſe Pflanze, welche ſonſt eigentlich nur am Ufer der See wohnt, auch bey Halle auf einer Wieſe vor dem Sebener Buſche in ziemlicher Menge.

im Jun. und Jul. Auf dieſelben folgen einzelne Schoten, die faſt 2 Z. lang ſind, und vierblätterige Häute haben, die an den 4 Ecken nach der Länge hin laufen. Der Same wird im Herbſte reif. Man kann ſie aus dem Samen ziehen, den man im Apr. dahin ſäet, wo die Pflanzen bleiben ſollen. Wenn dieſe aufgegangen ſind, muß man ſie verdünnen, daß ſie 2 Z. weit von einander ſtehen, und gehörig vom Unkraute reinigen. Er iſt, wegen ſeiner glatten und ziemlich fetten Blätter, ein vortreffliches Futter-Kraut. Haller nennt ihn die gelbe Lucerne.

2. Geflügelter gelber Lotus-Klee mit rauchen Blättern, Wieſen-Schotenklee, Lotus pratenſis ſiliquoſus, ſ. Lotus ſiliquoſus flore luteo *Cluſ.* Lotus pratenſis ſiliquoſus luteus *C. B.* Lotus pratenſis ſiliquoſus maior & durior *Tourn.* Lotus ſiliquoſa lutea monſpelienſis *J. B.* Lotus ſiliquoſa trifolia monſpeliana *Theod.* Lotus tetragonolobus *Riv.* Lotus trifolia corniculata *Gerard.* Lotus trifolia pratenſis ſiliquoſa Monſpelienſium *Penae & Lobel.* Lotus ολιγοκερατος τετραγωνολοβος perennis monſpelienſis luteo flore *Moriſ.* Lotus caule proſtrato, ſcapis unifloris, ſiliquis alatis, ſ. Lotus ſcapo unifloro procumbente, ſiliqua quadrangula *Hall.* Lotus pratenſis, leguminibus ſolitariis rectis teretibus terminalibus, caule erecto *Mill.* Lotus ſiliquoſus, leguminibus ſolitariis membranaceo-quadrangulis, caulibus procumbentibus, foliis ſubtus pubescentibus *Linn.* wächſt in dem ſüdlichen Theile von Europa, auch in Schwaben und in der Schweitz, auf etwas feuchten Wieſen. Er hat eine bleibende Wurzel. Der Stängel erreicht ungefähr 1 F. Länge, iſt größtentheils auf der Erde ausgeſtreckt, und mit wenigen Zweigen beſetzt. Am Blatt-Stiele ſtehen zwey eyförmig zugeſpitzte Blatt-Anſätze, welche mit den übrigen Blättern faſt gleiche Größe haben,



5. Geſtreckter L
leguminibus ſubſolitari
tis, ſtipulis minutis, ca
Vorgebirge der guten
Seine Wurzel bleibt üb
ſpannentange, geſtreck
Seine dreyfache Blätt
ſind lanzenförmig, glatt,
haarig, und haben an
und ſehr kleine ſcharf zu
menſtiele ſind lang und
Blume, und haben un
Der Blumenkelch iſt ſo g
Hülſe ſtehe horizontal, en
und iſt noch einmahl ſo lan
6. Fünf blätteriger L
Schoten, Lotus edulis cr
ραтος cretica lutea, ſiliqui
bus *Moriſ.* Lotus pentapl
Lotus edulis, leguminibus
Linn. Engl. Eſculent-poc
wächſt in Creta, Italien,
wild, wo die Schoten

ſich im Jun. und Jul. einzeln an der Seite des Stängels auf langen Stielen, welche 3 eyrunde Blattdecken haben, die ſo lang als die Blume ſind. Die Hülſen ſind eyrund-länglich und dick, und gleichen den Hülſen der Klapper-Schote, haben aber eine gerade Rücken-Naht.

7. Fremder Lotus-Klee mit zwey Schoten, Lotus ſiliquis geminis, peregrina *Boerh.* Lotus peregrinus, leguminibus ſubbinatis linearibus compreſſis nutantibus *L.* Engl. Twin-podded Bird's-Foot-Trefoil, wächſt in Spanien und Portugal wild. Die Wurzel iſt jährlich. Die Stängel treiben wenige Zweige. Die Blätter ſind rund und glatt. Die Blumenſtiele tragen ſelten mehr, als 2 gelbe Blumen. Auf dieſelben folgen 2 ſehr ſchmahle Schoten, welche ungefähr 2 Z. lang ſind, und unterwärts hängen. Er kann, wie die erſte Art, fortgepflanzet, und muß eben ſo behandelt werden.

8. Kleiner, fünfblätteriger, haariger Lotus-Klee, mit ſehr ſchmahlen Schoten, Lotus corniculata, ſiliquis ſingularibus ſ. binis, tenuis *J. B.* Lotus pentaphyllos, minor, hirſutus, ſiliqua anguſtiſſima *C. B.* Lotus leguminibus ſaepius ternatis linearibus ſtrictis erectis *Sauvag.* Lotus anguſtiſſimus, leguminibus ſubbinatis linearibus ſtrictis erectis, caule erecto, pedunculis alternis *L.* Engl. Narrow-podded Bird's Foot-Trefoil. Man findet ihn in Languedoc und England wild. Seine Wurzel bleibt über den Winter, und treibt viele kriechende Stängel, welche oft 1 F. hoch werden. Seine gelbe Blumen zeigen ſich im Jun. Die Hülſen ſind ſehr ſchmahl, und ſtehen meiſtens zu 2, manchmahl auch zu 3, oder einzeln. Er liebt einen feuchten Boden und eine ſchattige Lage, und kann ſehr leicht aus Samen gezogen werden. Miller will bemerkt haben, daß das Vieh dieſen Klee nicht frißt.

bus erectis, foliolis lanceolatis L. Engl. Tartarian Cytisus, ist in Italien, Oestreich und Sibirien zu Hause. Der Stamm ist strauchig, aufrecht, theilt sich niedrig in viele, grüne oder grünliche, eine dichtbelaubte, buschige Krone bildende Zweige, und wird 3 bis 4 F. hoch. Die Blätter sind evennd-länglich, glatt, weißlichgrün. Die Blumen, an den Enden der Zweige, in dichten doldenförmigen Köpfchen, unter deren jedem sich ein Büschel von Blättern findet, glänzend- oder hellgelb, im May, hinterlassen bisweilen kurze wollige Hülsen.

Eine Abart davon, ist der sibirische Geiß-Klee, Cytisus austriacus foliis & floribus minoribus, Engl. Siberian Cytisus, mit kleinern Blättern, nackten Blumen-Stängeln, und kleinern, etwas früher blühenden Blumen. Nach Mawe ist Cytisus austriacus immergrün, Hanbury aber ordnet ihn zu den im Winter.

Diese fünf Arten sind zu Verzierungs-Pflanzungen höchst würdige Sträuche, und können zu Anlagen von Gruppen sowohl, als auch förmlichen Lust-Gebüschen, vortrefflich genutzet werden, indem sie nicht nur mit ihren zahlreichen dreyblätterigen Blättern zwischen andern Sträuchen eine vortreffliche Mannichfaltigkeit machen, sondern auch in dem Flore mit Blumen gleichsam ganz bedeckt zu seyn scheinen. Die Sorten vom Cytisus Laburnum müssen, weil sie einen hohen Wuchs haben, in den Gruppen und andern Lust-Gebüschen mehr rückwärts, die vier andern Arten aber mehr gegen die Fronte, und auf die am besten in das Auge fallenden Plätze gestellet werden. Sie müssen alle ihrem natürlichen Wuchse überlassen bleiben, ausser daß ihnen dieser oder jener sehr unregelmäßige Schuß oder Zweig genommen werden mag. Sie sind alle, ausser dem C. hirsutus, so dauerhaft, daß sie in jedem Boden und in jeder Lage fortkommen, und lassen sich alle in Menge

aus

gelbgrünlichen Samen gehen auf dem Miſtbeete leicht auf. Den Sommer über wachſen die Stöcke im Töpfe recht gut, blühen ſchon im Jul. und Aug., laſſen aber keinen reifen Samen zurück.

11. Mauritaniſcher Lotus-Klee, Lotus mauritanicus, capitulis racemoſis, foliolis obovatis, caule fruticoſo erecto *L.* Dieſer Strauch kommt von dem Vorgebirge der guten Hoffnung. Sein Stängel treibt fadenförmige und ziemlich ſteife Aeſte. Seine Blätter ſtehen auf eigenen Stielen, endigen ſich mit ſteifen Spitzen, ſind auf beyden Flächen mit weißlichen Haaren beſetzt, und haben lanzenförmig-eyrunde Anſätze, welche ſo groß, als die Blätter, ſind. Die Blumen-Stiele ſind lang, und ſtehen in den Winkeln der Blätter. Die Hülſen ſind glatt, und anderthalb Mahl ſo lang, als die Blätter.

12. Glänzender, wollichter Lotus-Klee, ſilberfarbiger Schoten-Klee aus Creta, Lotus argentea cretica *Pluken.* Lotus polyceratos fruticoſa cretica argentea, ſiliquis longiſſimis propendentibus rectis *Moriſ.* Lotus creticus, leguminibus ſubternatis, caule fruticoſo, foliis ſericeis nitidis *L.* wächſt in Syrien, Creta und Spanien. Die dauernde Wurzel treibt holzige, ſchwache, an 4 F. hohe Stängel, welche, wie auch die Blätter, mit einem weißglänzenden, wollichten Ueberzuge bedeckt ſind. Gemeiniglich ſtehen 3 gelbe Blumen bey einander. Die Hülſen ſind walzenförmig, und hängen unterwärts. Man kann ihn entweder, wie den Jacobs-Schotenklee, aus abgeſchnittenen Aeſten, oder aus dem Samen, ziehen, den man im April auf ein Beet von leichter Erde ſäet. Vier Wochen, nachdem ſie aufgegangen, und gemeiniglich 8 Wochen, nachdem ſie geſäet ſind, ſetzt man die Pflanzen einzeln in beſondere kleine Töpfe, die mit friſcher Erde angefüllt ſind, und, bis ſie friſche Wurzeln haben, in Schatten geſtellet, hernach unter Obdach

und

damit man ſie nicht erſt noch in die Pflanzſchule bringen dürfe, ſtecke man ſie in 2 F. weit von einander entfernte Reihen, und in den Reihen ſelbſt 1 F. weit von einander, und pflanze ſie, ſo bald ſie nachher groß genug ſind, von da ſogleich in die Luſt-Gebüſche. In der Pflanz-Schule bedürfen die jungen Pflanzen keiner weitern Wartung, als daß ſie von Unkraute rein gehalten, und der Boden zwiſchen den Reihen jährlich aufgelockert werde.

B. Für die Blumen-Gärten. Engl. Baſe Tree-Trefoil.

6. Niedriger oder kriechender Geiß-Klee, Cytiſus ſupinus, foliis infra & ſiliquis molli hirſutie pubescentibus *C. B.* Cyt. ſupinus, floribus umbellatis terminalibus, ramis decumbentibus, foliolis ovatis *L.* Engl. Low downy Cytiſus. Man findet ihn in Sicilien, Italien, Provence, Spanien und Sibirien. Die Stämme ſind ſchwach, dünn, kaum 1 F. lang, ohne Unterſtützung am Boden liegend. Die Blätter, länglich, auf der Oberfläche glatt, auf der Unterfläche aber mit weichen Haaren beſetzt, je drey auf etwas langen Stielen. Die Blumen, auf den Enden der Zweige, in kleinen doldenförmigen Köpfchen, hochgelb, haben einen Büſchel von Blättern unter ſich, im Jun. Die Hülſen flach, weichhaarig.

7. Silberweißer Geiß-Klee, Cytiſus humilis argenteus anguſtifolius *Tourn.* Cyt. acaulis, floribus ſolitariis, foliolis ſericeis lanceolatis *Sauv.* Cyt. argenteus, floribus ſubſeſſilibus ſubbinatis, foliis tomentoſis, caulibus decumbentibus, ſtipulis minutis *L.* Engl. Silvery-Cytiſus. Man findet ihn in Languedoc und Krain wild. Die Stämme ſind ſchwach, darnieder liegend, wenig über 6 Z. lang. Die Blätter ſind klein, lanzenförmig, filzig, ſilberweiß, je drey auf einem Stängel; die Blatt-Anſätze klein. Die Blumen, an den Enden der Zweige 2 bis 3 beyſammen,

in

in den Winkeln der Blätter aber einzeln, sehr kurz gestielt, blaßgelb, im Jul.

8. Griechischer oder leinkrautblätteriger Geiß-Klee, Barba Jovis linariae folio, flore luteo parvo *Tourn.* Cytisus graecus, foliis simplicibus lanceolato linearibus, ramis angulatis *L.* Engl. Linaria-leaved Cytisus, wächst auf den Inseln im Archipelagus wild. Er macht einen 6 bis 7 F. hohen, holzigen Stängel, welcher viele eckige Seiten-Zweige treibt, die mit einfachen, schmahlen, lanzenförmigen Blättern besetzt sind. Die Blumen kommen in kurzen Büscheln, neben an den Zweigen heraus. Sie sind klein, gelb, und erscheinen im Jul. und Aug. In England aber folgen keine Samen auf dieselben.

Wenn diese drey Pflanzen in einem trocknen und warmen Boden, und in einer südlichen, gut geschützten Lage stehen, so geben sie im Herbste größtentheils reifen Samen, ausser nur in einem sehr nassen Sommer nicht; weswegen man, um gleichwohl Samen zu gewinnen, über einigen Pflanzen gläserne Glocken befestigen muß, um den Regen abzuhalten, weil der Same dann, wofern nicht der Sommer äusserst kalt und ungünstig ist, zur Reife zu kommen pflegt. Sie lassen sich wegen ihrer zähen und tief eindringenden Wurzeln nicht gut verpflanzen. Der Same, aus welchem sie sich sehr leicht ziehen lassen, muß also im Frühlinge sogleich an Ort und Stelle gesäet, und die aufgegangenen Pflanzen gehörig verdünnet, und den Sommer über bey trockner Witterung begossen, im folgenden Sommer aber ihre Blumen-Stängel, sobald solche in die Höhe gehen, an kurze Stäbe aufgebunden werden, weil sonst die Blumen an der Erde liegen, und ein unsauberes Ansehen haben, und auch die Samen nicht zur Reife kommen würden.

Mit der Benennung **Harz-Klee** belegt Hr. Gmelin eine Gattung Hülsen-Gewächse mit 10, meistens in zwey Haufen verwachsenen Staub-Fäden, deren Blumenkelch mit verhärteten Tüpfelchen, Drüsen oder Wärzchen bestreuet, und gerade so lang, als die Hülse oder Schote ist, welche einen einigen nierenförmigen Samen enthält. Planer nennt diese Gattung Warzen-Kraut, und Linné Psoralea. In der Murrayischen Ausgabe findet man 18 Arten angeführt. Die bekanntesten und merkwürdigsten sind:

1. **Gefiederter Harz-Klee mit einzelnen Blumen in dem Blätterwinkel,** Spartium africanum *Riv.* Barba Jouis africana, foliis viridibus pinnatis, floribus axillaribus *L.* Dieser immergrünende Strauch wächst in Aethiopien, und erreicht bey uns einige Fuß Höhe. Die jüngern Stängel und Zweige sind eckig, gestreift, haarig, und mit glänzenden Puncten besetzt. Die gefiederten Blätter bestehen aus 2 oder 3 Paren, und einem einzelen, etwas haarigen, gerüpfelten, schmahlen und lanzenförmigen Blättchen. Bey dem Blatt-Stiele stehen 2 lanzettförmige Blatt-Ansätze; und an dem Winkel desselben stehen einzele Blüth-Stiele, welche nahe an dem Kelche mit 4 Deckblättern umgeben sind. Der Kelch ist haarig, mit glänzenden Puncten besetzt, und der untere Einschnitt nicht viel größer, als die 4 obern. Das Fähnchen ist bläulich, unterwärts weißlich, und kaum merklich eingekerbet; die Flügel sind weißlich, und mit Anhängen versehen; das Kiel-Blättchen ist mit diesen fast verwachsen, auch von gleicher Länge, weiß, und an der Spitze violet.

2. **Gefiederter Harz-Klee mit Blumenähren in dem Blätterwinkel, neunblätteriger Harz-Klee,** Psoralea Carthagenensis *Jacqu.* Psoralea enneaphylla, foliis pinnatis, spicis axillaribus *L.* Dieses immergrü-

grünende, in hiesigen Gärten kaum 2 F. hohe, schwache Sträuchlein wächst in Carthagena, und soll daselbst, nach Jacquin's Beschreibung, 5 F. Höhe erreichen. Die wechselweise gestellten, gefiederten Blätter bestehen bey uns aus vielen, nach Jacquin aber nur aus 2 Paren, und einem einzelnen kleinen, eyförmigen, auf der untern Fläche getüpfelten Blättchen. Aus dem Blätter-Winkel treiben dichte Blüth-Aehren. Der Kelch ist nicht getüpfelt, in 2 Lippen getheilt, und die beyden obern Einschnitte sind etwas kürzer, als die 3 untern. Die Blumenblätter sind röthlich, geadert; das Fähnchen ist herzförmig, ausgehöhlt; die beyden Flügel stehen aufgerichtet, und sind etwas länger; das Kielblättchen ist 2 Mahl länger als das Fähnchen. Alle 10 Staubfäden sind verwachsen. Wenn man die frischen Blätter zwischen den Fingern reibt, werden diese dermaßen gelb gefärbet, daß man die Farbe kaum abwaschen kann; wirft man sie in kaltes Wasser, wird dieses gleichfalls anfangs schwach, hernach aber dunkelgelb gefärbet.

3. Gefiederter Harz-Klee mit Blüth-Aehren an dem Ende der Zweige. Linné hat dieses in Amerika, und besonders bey Veracrux, einheimische Sommer-Gewächs ehedem als eine besondere Gattung aufgeführt, und von dem Engländer Sam. Dale Dalea genannt; nachher aber mit dieser Gattung vereinigt, und ihm den Nahmen Psoralea Dalea, foliis pinnatis, spicis terminalibus, gegeben. Die zaserige Wurzel treibt einen, oberwärts mit einigen Zweigen versehenen, ungefähr 1 F. hohen, glatten, schwach gestreiften, aufrecht stehenden Stängel, welcher, wie auch die Zweige, sich mit einzelnen Blüth-Aehren endigen. Die Blätter stehen wechselweise, sind gefiedert, und bestehen aus 5 Paren, und einem einzelen länglichen, glatten, unterwärts getüpfelten Blättchen. Bey jeder Blüthe steht ein lanzettförmiges, am Rande haariges

kleiner und gelb sind, allemahl zwey aus einem Blatt-Winkel entstehen, welches bey der 3ten Art auch gar oft geschieht, und die Flügel der Hülse nicht kraus, sondern glatt sind. Man kann ihn, wie die erste Art, aus dem Samen ziehen, und muß ihn eben so behandeln.

5. Gestreckter Lotus-Klee, Lotus prostratus, leguminibus subsolitariis tomentosis, foliolis acuminatis, stipulis minutis, caulibus filiformibus *Linn.* Das Vorgebirge der guten Hoffnung ist sein Vaterland. Seine Wurzel bleibt über den Winter, und treibt viele, spannenlange, gestreckte und krautartige Stängel. Seine dreyfache Blätter stehen auf eigenen Stielen, sind lanzenförmig, glatt, auf der untern Fläche etwas haarig, und haben an beyden Enden steife Spitzen, und sehr kleine scharf zugespitzte Ansätze. Die Blumenstiele sind lang und fadenförmig, tragen nur Eine Blume, und haben unter ihrer Spitze ein Gelenk. Der Blumenkelch ist so groß, als die Blätter. Die Hülse steht horizontal, endigt sich in eine steife Spitze, und ist noch einmahl so lang, als der Blumenkelch.

6. Fünfblätteriger Lotus-Klee mit gehörnten Schoten, Lotus edulis cretica *Raj.* Lotus ὀλιγοσπερμος cretica lutea, siliquis binis curvis propendentibus *Morif.* Lotus pentaphyllos, siliqua cornuta *C. B.* Lotus edulis, leguminibus subsolitariis gibbis incurvis *Linn.* Engl. Esculent-podded Bird's-Foot-Trefoil, wächst in Creta, Italien, und besonders in Sicilien, wild, wo die Schoten, wenn sie noch jung sind, von den armen Einwohnern als Zugemüse gegessen werden. Seine jährliche Wurzel treibt viele kriechende und ziemlich rauche Stängel, welche ungefähr 1 F. lang werden. Seine dreyfache, glatte und rundliche Blätter stehen an den Gelenken des Stängels, und haben eyrunde Ansätze. Die kleinen gelben Blumen zeigen

sich

ſich im Jun. und Jul. einzeln an der Seite des Stängels auf langen Stielen, welche 3 eyrunde Blattdecken haben, die ſo lang als die Blume ſind. Die Hülſen ſind eyrund-länglich und dick, und gleichen den Hülſen der Klapper-Schote, haben aber eine gerade Rücken-Naht.

7. Fremder Lotus-Klee mit zwey Schoten, Lotus ſiliquis geminis, peregrina *Boerh.* Lotus peregrinus, leguminibus ſubbinatis linearibus compreſſis nutantibus *L.* Engl. Twin-podded Bird's-Foot-Trefoil, wächſt in Spanien und Portugal wild. Die Wurzel iſt jährlich. Die Stängel treiben wenige Zweige. Die Blätter ſind rund und glatt. Die Blumenſtiele tragen ſelten mehr, als 2 gelbe Blumen. Auf dieſelben folgen 2 ſehr ſchmahle Schoten, welche ungefähr 2 Z. lang ſind, und unterwärts hängen. Er kann, wie die erſte Art, fortgepflanzet, und muß eben ſo behandelt werden.

8. Kleiner, fünfblätteriger, haariger Lotus-Klee, mit ſehr ſchmahlen Schoten, Lotus corniculata, ſiliquis ſingularibus ſ. binis, tenuis *J. B.* Lotus pentaphyllos, minor, hirſutus, ſiliqua anguſtiſſima *C. B.* Lotus leguminibus ſaepius ternatis linearibus ſtrictis erectis *Sauvag.* Lotus anguſtiſſimus, leguminibus ſubbinatis linearibus ſtrictis erectis, caule erecto, pedunculis alternis *L.* Engl. Narrow-podded Bird's Foot-Trefoil. Man findet ihn in Languedoc und England wild. Seine Wurzel bleibt über den Winter, und treibt viele kriechende Stängel, welche oft 1 F. hoch werden. Seine gelbe Blumen zeigen ſich im Jun. Die Hülſen ſind ſehr ſchmahl, und ſtehen meiſtens zu 2, manchmahl auch zu 3, oder einzeln. Er liebt einen feuchten Boden und eine ſchattige Lage, und kann ſehr leicht aus Samen gezogen werden. Miller will bemerkt haben, daß das Vieh dieſen Klee nicht frißt.

9. Vogelfußartiger oder ſichelförmiger Lotus-Klee, ſicilianiſcher Schoten-Klee, Lotus peculiaris ſiliquola *J. Camer.* Lotus ſiliquis ornithopodii *C. & J. B.* Lotus ſylveſtris Dioſcoridis *Penae.* Lotus polyceratos annua procumbens, latifolia, ſiliquis ornithopodii *Moriſ.* Lotus ornithopodioides, leguminibus ſubternatis arcuatis compreſſis, caulibus diffuſis *L.* Engl. Ornithopodioide Bird's Foot-Trefoil. wächſt in Sicilien. Die faſerige, jährliche Wurzel treibt niedrige, haarige, in Zweige getheilte und über der Erde ausgebreitete Stängel. Die Blatt-Anſätze ſind ſehr klein und faſt dreyeckig; die Blättchen umgekehrt kegelförmig. An den Spitzen der Zweige ſtehen 3 oder 5 gelbliche Blümchen bey einander, welche auf einem Dreyblatte, ohne Blatt-Anſätze ruhen. Der Kelch iſt merklich in 2 Lippen getheilt; an der untern Lippe ſind die Seiten-Einſchnitte ganz klein, und der mittelſte iſt größer als alle übrige. Die Samen-Hülſen hängen unterwärts, ſind ſichelförmig, gekrümmt und breit gedrückt. Man erzieht dieſen jährlich aus Samen im freyen Lande.

10. Schmahlblätteriger Jacobs-Lotusklee, Jacobs-Schotenklee, Lotus anguſtifolia, flore luteo purpurascente, inſulae St. Jacobi *Commel.* Lotus Jacobaeus, leguminibus ſubternatis caule herbaceo erecto, foliolis linearibus *L.* wächſt auf der Inſel St. Jacob wild. Der Stängel iſt holzig, erreicht bey uns 2 F. Höhe, und blüht bey uns im erſten Sommer. Die Blättchen und Blatt-Anſätze ſind ganz ſchmahl und ſpitzig. Drey, auch fünf Blumen ſtehen auf einem gemeinſchaftlichen Stiele, und haben eine beſondere glänzende Farbe. Das Helmblättchen und die Flügel ſind dunkelviolet, und das Schiffchen, welches faſt länger als die Flügel, iſt gelblich. Die Hülſen ſind dünn und walzenförmig. Dieſer Klee iſt, nach unſern Erfahrungen, ſehr zärtlich. Die kleinen,

gelb-

gelbgrünlichen Samen gehen auf dem Miſtbeete leicht auf. Den Sommer über wachſen die Stöcke im Topfe recht gut, blühen ſchon im Jul. und Aug., laſſen aber keinen reifen Samen zurück.

11. **Mauritaniſcher Lotus-Klee**, Lotus mauritanicus, capitulis racematis, foliolis obovatis, caule fruticoſo erecto *L.* Dieſer Strauch kommt von dem Vorgebirge der guten Hoffnung. Sein Stängel treibt fadenförmige und ziemlich ſteife Aeſte. Seine Blätter ſtehen auf eigenen Stielen, endigen ſich mit ſteifen Spitzen, ſind auf beyden Flächen mit weißlichen Haaren beſetzt, und haben lanzenförmig-eyrunde Anſätze, welche ſo groß, als die Blätter, ſind. Die Blumen-Stiele ſind lang, und ſtehen in den Winkeln der Blätter. Die Hülſen ſind glatt, und anderthalb Mahl ſo lang, als die Blätter.

12. **Glänzender, wollichter Lotus-Klee, ſilberfarbiger Schoten-Klee aus Creta**, Lotus argentea cretica *Pluken.* Lotus polyceratos fruticoſa cretica argentea, ſiliquis longiſſimis propendentibus rectis *Moriſ.* Lotus creticus, leguminibus ſubternatis, caule fruticoſo, foliis ſericeis nitidis *L.* wächſt in Syrien, Creta und Spanien. Die dauernde Wurzel treibt holzige, ſchwache, an 4 F. hohe Stängel, welche, wie auch die Blätter, mit einem weißglänzenden, wollichten Ueberzuge bedeckt ſind. Gemeiniglich ſtehen 3 gelbe Blumen bey einander. Die Hülſen ſind walzenförmig, und hängen unterwärts. Man kann ihn entweder, wie den Jacobs-Schotenklee, aus abgeſchnittenen Aeſten, oder aus dem Samen, ziehen, den man im April auf ein Beet von leichter Erde ſäet. Vier Wochen, nachdem ſie aufgegangen, und gemeiniglich 8 Wochen, nachdem ſie geſäet ſind, ſetzt man die Pflanzen einzeln in beſondere kleine Töpfe, die mit friſcher Erde angefüllt ſind, und, bis ſie friſche Wurzeln haben, in Schatten geſtellet, hernach unter Obdach

und

und im Herbſte in ein Glashaus gebracht werden, wo man ſie, wie andere dauerhafte Gewächſe, behandelt, und nur vor dem Froſte verwahrt.

13. Rauchſtängeliger oder ſteifborſtiger Lotus-Klee mit gröſſern Blumenköpfen, Lotus pentaphyllos ſiliquoſus villoſus *C. B.* Lotus polyceratos frutescens, incana alba, ſiliquis erectis craſſioribus & brevioribus rectis *Moriſ.* Lotus capitulis hirſutis, caule erecto hirto, leguminibus ovatis *Sauv.* Lotus caule fruticoſo, florum capitulis depreſſis, calycibus lanigeris *Royen.* Lotus haemorrhoidalis *Tourn.* Lotus hirſutus, capitulis ſubrotundis, caule erecto hirto, leguminibus ovatis *L.* Engl. Hairy Italian Bird's-Foot-Trefoil, wächſt in Languedoc, in Italien, und im Orient. Die dauernde Wurzel treibt viele, in Zweige getheilte, etliche Fuß lange, rauche Stängel. Die Blätter ſitzen platt auf, und ſind den Blatt-Anſätzen ähnlich. Das Blumenköpfchen beſteht aus 7 oder 9 Blumen, und die dabey ſtehenden Blättchen ſind lanzettförmig, und faſt von gleicher Länge. Der Kelch iſt haarig, oberwärts röthlich, der unterſte Einſchnitt am längſten; das Fähnchen blaßröthlich, die Flügel weiß, und die Spitze des Schiffchens ſchwärzlich. Die walzenförmigen Samen-Hülſen erſcheinen aufgeblaſen. In einigen Ländern wird dieſe Art in den Apotheken aufbehalten, und inſonderheit bey der goldenen Ader äuſſerlich gebraucht. Er beſitzt eine lindernde und reinigende Kraft. Bey uns iſt er nicht im Gebrauche.

14. Glattſtängeliger Lotus-Klee mit kleinern Blumenköpfen, Lotus ſiliquoſus glaber, flore rotundo *C. B.* Lotus villoſus altiſſimus, flore glomerato *Tourn.* Lotus caule fruticoſo, florum capitulis globoſis *Royen.* Lotus lybica *Dalech.* & *Rivin.* Lotus polyceratos frutescens, hirſuta alba maior latifolia, ſiliquis tenuibus curtis rectis *Moriſ.* Lotus rectus, capitu-

pitulis ſubgloboſis, caule erecto laevi, leguminibus erectis glabris *L.* Engl. Straight-podded Bird's-Foot-Trefoil, wächſt in Languedoc und Sicilien. Die faſerige dauernde Wurzel treibt viele, einige Fuß hohe, glatte, gemeiniglich röthliche und oberwärts in Zweige verbreitete Stängel. Die Blatt-Anſätze ſind herzförmig, und die drey Blättchen auf der untern Fläche haarig. Ungefähr 20, dicht bey einander ſtehende Blumen ſtellen ein rundliches Köpfchen vor, welches kleiner als die Blätter iſt. Die Blumenblätter ſind fleiſchfarbig; die Hülſen dünner, glatt und aufwärts gerichtet. Nach Gouan's Anmerkung iſt die Höhe 6 Fuß; die herzförmigen Blätter-Anſätze ſind viel kleiner, als die Blättchen, und dieſe umgekehrt eyförmig, zugeſpitzt; die Deckblätter ganz klein, und von dem Blumenköpfchen entfernt. Wenn auch dieſe Art ein gutes Futter-Kraut abgeben möchte, ſo können wir doch keinen Gebrauch davon machen, indem wir die Stöcke in Töpfe, und den Winter über in ein Glashaus ſtellen müſſen. Sie ſind nicht zärtlich; und da wir jährlich reifen Samen erhalten, kann dadurch die Vermehrung auf dem Miſtbeete leicht geſchehen.

15. Geſtreckter doldenförmiger Lotus-Klee mit gelben ſtark riechenden Blumen, Gehörnter oder kleiner gelber Schoten-Klee, Horn-Klee, goldner Klee, wilder Stein-Klee, gelber Honig-Klee, Frauenfinger-Kraut, gelbe Vogel-Wicke, Lotus corniculata glabra minor *J. B.* & *Raj.* Lotus pentaphyllos *Geſn.* Lotus ſ. Melilotus pentaphyllos minor glabra *C. B.* Lotus ſylveſtris *Dod.* Lotus prima *Dalech.* Lotus caule herbaceo, florum capitulo depreſſo, leguminibus decumbentibus teretibus *Royen.* Lotus floribus vmbellatis, ſiliquis cylindricis rectiſſimis, ſ. Lotus floribus vmbellatis, ſiliquis pendulis,

Da die Blumen dieſes Klees, ehe ſie ſich öffnen, roth ſind, wenn ſie ſich geöffnet haben, und ſo lange ſie friſch ſind, gelb werden, und, wenn ſie aufgetrocknet werden, ſich in ein grünliches Blau verwandeln: ſo könnte die Pflanze, wofern von dieſer Veränderung der Farbe in den Blumen eine gegründete Vermuthung auf ihren Nutzen zu nehmen iſt, vielleicht in der Färbe-Kunſt nützlich werden. Da nähmlich die Blumen derjenigen Pflanzen, woraus der Indig bereitet wird, auch die grüne Farbe beym Trocknen annehmen, ſo würde vielleicht aus der Blüthe dieſer getrockneten Pflanze auch einige dem Indig ähnliche Farbe zu verfertigen möglich ſeyn.

16. Geißkleeartiger Lotus-Klee, Lotus ſiliquoſa maritima lutea, Cytiſi facie *Barrel.* Lotus cytiſoides, capitulis dimidiatis, caule diffuſo ramoſiſſimo, foliis tomentoſis *L.* Engl. Cytiloide Bird's-Foot-Trefoil. Man findet ihn in dem ſüdlichen Theile von Europa an dem Strande. Seine bleibende Wurzel treibt viele Stängel. Seine dreyfache runde Blätter haben zwey Anſätze. Die gelben Blumen zeigen ſich im Jul. auf kurzen Stielen, zu 4 bis 6, in Einem abgetheilten Haupte. Auf dieſelben folgen kegelförmige Schoten, die mit rundlichen Samen angefüllt ſind, welche im Herbſte reif werden. Man kann ihn aus dem Samen ziehen, den man im Frühlinge dahin ſäet, wo die Pflanzen bleiben ſollen. Man muß ſie alsdann eben ſo, wie die im Vorhergehenden angeführten dauerhaften Pflanzen, behandeln.

17. Fünfblätteriger Lotus-Klee, gefingerter Schoten-Klee, Dorycnium Monſpelienſium *Lob.* Lotus πολυκεφαλος frutescens incana, ſiliculis ſubrotundis erectis *Moriſ.* Lotus Dorycnium capitulis aphyllis, foliis ſeſſilibus quinatis *L.* Engl. white Auſtrian Bird's-Foot-Trefoil, wächſt in Spanien,

Lan-

Languedoc und Oestreich, wild. Seine Wurzel bleibt über den Winter, und treibt viele schwache, ständenartige Stängel, welche 3 bis 4 Sch. hoch werden, und viele zarte Aeste haben. Die Blätter sind klein und grau, und haben 5 Lappen, in Gestalt einer offenen Hand; sie sitzen dicht an den Zweigen. Die Blumen kommen am Ende der Zweige in kleinen Häuptern heraus, sie sind sehr klein und weiß, und machen also kein sonderliches Ansehen; sie erscheinen im Jun. Auf dieselben folgen kurze Schoten, welche 2 bis 3 runde Samen in sich schließen, die im Herbste reif werden. Diese Staude kommt in der freyen Luft fort, wenn sie auf trocknem Boden und in einer warmen Lage steht. Man kann sie aus dem Samen ziehen, der in jeder gemeinen Rabatte fortkommen wird.

18. Griechischer Lotus-Klee, mit einem aufrechten und offen stehenden Stängel, fünffachen Blättern, rundlichen Blumenköpfchen, und eyrunden Hülsen; Lotus graeca maritima, folio glauco & veluti argenteo *Tourn.* Lotus graecus, capitulis subrotundis, caule erecto patulo, foliis quinatis, leguminibus ovatis *L.* Er ist in den Morgenländern, insonderheit aber in Griechenland und Arabien zu Hause, und zwischen dem Lotus hirsutus und rectus das Mittel. Seine Wurzel bleibt über den Winter. Der Stängel ist aufrecht, und verdirbt im Herbste. Die Blätter sind insgesamt fünffach, und haben überdieß noch zwey längliche Ansätze. Die Blumen sind weiß, kleiner als bey dem L. hirsutus, und größer, als bey dem rectus.

19. Arabischer Lotus-Klee, mit gestreckten Stängeln, dreyblumigen Blumenstielen, einzelnen Blattdecken und walzenförmigen Hülsen, welche Grannen haben; Lotus arabicus, leguminibus cylindricis aristatis, caulibus prostratis, pedunculis trifloris, bracteis monophyllis *L.* Sein Vaterland ist Arabien. Die ausdauernde Wurzel treibt viele, etwas haarige

Stängel, welche ungefähr 1½ Sch. hoch werden. Seine Blätter ſind dreyfach, und ſitzen auf eigenen Stielen; ihre Blättchen haben wieder ganz kurze Stielchen, und ſind umgekehrt eyrund, ziemlich ſtumpf, etwas grau, und beynahe glatt; ihre Anſätze haben faſt die Größe und Geſtalt der Blättchen. Die Blumen-Stiele ſtehen wieder auf eigenen Stielchen, welche eine aufrechte, den Blättchen ähnliche Blattdecke haben, und hängen über; die Zähne des Kelches ſind pfriemenförmig, und in einiger Entfernung von einander; die Kronen ſind bloß rothgelb, das Fähnchen hat rothe Adern, und die Seiten-Blättchen ſchließen das Schiffchen ein. Bey Nacht legen ſich die Blumen feſt an den gemeinſchaftlichen Stiel an, und über ihnen liegt die Blattdecke; auch die Blättchen und Blatt-Anſätze fallen zuſammen.

* * *

Den Nahmen Schnecken-Klee, Sichel-Klee, oder Mond-Klee, führen diejenigen Arten des Klees, deſſen zuſammen gedrückte Schote (Hülſe) eine ſchneckenförmige Geſtalt hat, oder wie eine Schraube gedrehet iſt, oder wie eine Sichel oder wie ein halber Mond gekrümmt iſt. Weil nicht bey allen Arten dieſer Gattung, L. Medicago, Engl. Medick, die Frucht ſchneckenförmig gewunden, aber auch nicht bey allen ſichel- oder mondförmig iſt, hat Rivinus zwey Claſſen daraus gemacht, und die erſten Arten cochleatas, die andern falcatas, genannt. Da nun aber dieſer Unterſchied nicht weiter Statt findet, und alle in Einer Gattung vereiniget werden, wird es gleichgültig ſeyn, ob man Mond- Sichel- oder Schnecken-Klee zum Gattungs-Nahmen wähle. Der Kelch iſt glocken- oder walzenförmig, und beſteht aus einem einzigen, in 5 gleich ſcharfe Spitzen getheilten Blatte. Die 4 Blumenblätter ſind ſchmetterlingförmig geſtellet; das Fähnchen

chen ist eyrund, völlig ganz, und an den Rändern sowohl, als auch im übrigen Umfange, rückwärts gebogen; die beyden Flügelblätter sind länglich, eyrund, und mit einem Wiederhaken an das Kielblättchen (Schiffchen) befestigt, und unter demselben an ihren Seiten mit einander vereinigt. Das Kielblättchen ist länglich, zweyspaltig, wird von dem Fruchtkeime unterwärts gedrückt, und steht von dem Fähnchen entfernt. Von den 10 Staubfäden sind 9 fast bis oben hinauf vereinigt; der 10te steht einzeln; sie endigen sich mit Kölbchen. Der Fruchtkeim ruhet auf einem kurzen Stielchen, ist krumm gebogen, platt gedrückt, von der Staubfäden-Scheide bedeckt, geht aber aus dem Kiel-Blättchen hervor, und drückt das Fähnchen rückwärts; es verlängert sich derselbe in einen kurzen und geraden Griffel, dessen Staubweg kaum merklich ist. Die Hülse ist platt gedrückt, lang, verschiedentlich gewunden, und enthält viele nierenförmige Samen. Bey den meisten Arten stehen drey Blättchen auf einem gemeinschaftlichen Stiele, und die Blumen ährenweise an dem Blätterwinkel. Linné hat nur 9 Arten bestimmt, indem derselbe viele für Spiel-Arten angenommen hat.

1. **Baumartiger immergrünender Schnecken-Klee, grauer staudiger dreyblätteriger Mond-Klee, Klee-Staude, Klee-Strauch,** Cytisus der Alten, Cytisus incanus siliquis falcatis *C. B.* Medicago trifolia frutescens incana *Tourn.* Medicago arborea, leguminibus lunatis margine integerrimis, caule arboreo *L.* Engl. Moon-Trefoil, oder Shrubby hoary Medicago. Er wächst auf den Inseln des Archipelagus, in Sicilien, und in den meisten Theilen von Italien, wild. Er macht einen staudenartigen Stängel, welcher 8 bis 10 Sch. hoch wird, mit einer grauen Rinde bedeckt ist, und sich in viele Zweige abtheilt, die, weil sie noch jung sind, mit einer grauen Wolle bedeckt sind. Diese sind an jedem Gelenke mit dreyspaltigen Blättern

beſetzt, die auf 1 Z. langen Stielen ſtehen. An jedem Gelenke ſtehen 2 bis 3 derſelben, ſo, daß alſo die Zweige dicht damit bedeckt ſind. Die Lappen ſind klein, lanzenförmig, und auf der untern Seite grau. Sie bleiben das ganze Jahr über. Die Blumen haben eine glänzende gelbe Farbe, und ſtehen auf Stielen, welche neben an den Zweigen heraus kommen. Auf jedem Stiele ſtehen 4 bis 5 Blumen. Auf dieſelben folgen zuſammen gepreßte mondförmige Schoten, deren jede 3 bis 4 nierenförmige Samen in ſich ſchließt. Sie blühet den größten Theil des Jahres, und, wenn der Winter gelinde iſt, das ganze Jahr hindurch. Wenn die Pflanzen im Winter bedeckt werden, ſind ſie ſelten ohne Blumen. Diejenigen Pflanzen, welche in der freyen Luft ſtehen, fangen im April an zu blühen, und fahren damit bis in den Dec. fort. Diejenigen Blumen, welche zeitig im Sommer zum Vorſchein kommen, haben im Auguſt, oder zu Anfange des Sept., reifen Samen, und der andere wird nach und nach reif, bis die Kälte es verhindert.

Dieſe Pflanze wird von Vielen für den Cytiſus der Alten, als: des Theokrit's, Theophraſt's, Dioſcorides, Virgil's, Columella, Plinius, und anderer alten Schriftſteller vom Ackerbau, gehalten, von welcher dieſelben, als von einer beſondern Pflanze reden, die zur Fütterung gebauet zu werden verdiene.

Virgil zeigt, daß er ein vortreffliches Futter ſey, welches einen Ueberfluß an Milch verſchaffe, und den Bienen dienlich ſey. Er ſagt in der 1ſten Ecloge:

— — — Non, me paſcente, capellae
Florentem cytiſum & ſalices carpetis amaras.

In der 9ten Ecloge ſchreibt er:

Sic cytiſo paſtae diſtendent vbera vaccae.

Und in der 10ten:

Nec lacrymis crudelis amor, nec gramina rivis,
Nec cytiſo ſaturantur apes, nec fronde capellae.

Theo-

Theokrit ſagt in der erſten Idylle, daß die Ziegen den Cytiſus gern freſſen:

Ἁ̓ξ τὸν κύτισον, ὁ λύκος τὰν αἶγα διώκει.

Capra cytiſum, Lupus capellam ſequitur.

Dioſcorides ſagt, er ſey eine weiße Staude, dem Rhamnus gleich, habe Zweige 1 Elle lang, und darüber, und ſey mit Blättern, wie die Blätter des Foenum graecum bekleidet, nur wären ſie kleiner, und hätten ſtärkere Adern. Wenn man ſie zwiſchen den Fingern riebe, ſo röche ſie wie weißer Senf und ſchmeckte wie Kichern; und dieſes trifft mit der Medicago arborea überein, denn die Blätter haben 3 Lappen, riechen (vornehmlich um Neapel) wie Senf, und die Pflanze iſt in ihrem natürlichen Boden ſehr rauh.

Dieſer Klee wird in Italien und Spanien häufig und mit großem Vortheile gebauet, weil er nicht nur in dieſen warmen Ländern auf dem unfruchtbarſten Boden fort kommt, ungemein lange dauert, gegen 8 Monathe grün bleibt, und je älter je beſſer wird, ſondern auch, ſowohl grün, als getrocknet, ein ſehr angenehmes, nahrhaftes und geſundes Futter für alles Vieh, beſonders aber für die Ziegen und Schafe, gibt, überdieß auch bey der Bienenzucht ſehr nützlich iſt. In dem Königreiche Neapolis freſſen die Ziegen denſelben, aus deren Milch die Einwohner ſehr viel Käſe machen. Auf den Inſeln des Archipelagus gebrauchen die Türken ſein zähes und hartes Holz, um die Griffe ihrer Säbel davon zu ſchnitzen; und die Mönche in Pathmos machen aus dieſem Holze ihre Roſen-Kränze.

Unter den neuern Schriftſtellern, hat Stephan Switzer (*) den Cytiſus als ein Gewächs angeprieſen,

(*) Diſſertation on the Cytiſus of the antients, by *Steph. Switzer.* Lond. 1711. 8.

D. überſ. u. d. T. Nachricht vom Cytiſus der Alten, aus dem Engl. des Steph. Switzer, ſt. im 45 St. der Stuttg. phyſ. ökon. Realzeit. oder gemeinnützl. Wochenſchr. v. J. 1756.

Eb. deſſ. compendious method for the raiſing of the italian Broccoli, Spaniſh Cardon, Celerio, Finocchi and other foreign kitchen vegetables. Lond. 1735. 8.

D. überſ.

welches zur Verbeſſerung des dürreſten und unfruchtbarſten Landes diene. Hier iſt ein Auszug aus ſeinem Werke.

S. 121 und 122, gibt er nachſtehende Abſtammung des Cytiſus der Alten an. Der Cytiſus war urſprünglich ein einländiſches Gewächs auf einer von den alten cycladiſchen Inſeln, um und auf dem Archipelagus, woher er durch ganz Griechenland ausgebreitet, und von da nach dem römiſchen Reiche gebracht wurde, wo er eine Zeitlang blieb, wie wir aus ihren Dichtern, und denen, die von Pflanzen geſchrieben haben, erſehen, und wurde für das beſte Futter, welches ſie pflanzten oder ſäeten, für ihr Vieh gehalten; und als er nach Spanien gebracht war, wurde er, während der grauſamen Ueberſchwemmung der Barbarey, womit die Gothen Italien verheerten, daſelbſt auf eine glückliche Weiſe erhalten, und vermuthlich zuletzt, nebſt der Medica (der Lucerne), zur Verſchönerung und Wiederverbeſſerung dieſer verwüſteten und verödeten Reiche, wieder dahin zurück gebracht.

S. 122 und 123, enthalten davon dieſe Beſchreibung: In meinen Anmerkungen über dieſe Pflanze fortzufahren, ſo ſind die grünen Pflänzlinge derſelben (denn ſie wächſt der Zwerg-Weide einiger Maßen gleich, ob ſie ſchon in einer nördlichen Lage, und wo keine Sonne dazu kommen kann, gepflanzt ſind,) zur Zeit, da ich dieſes ſchreibe, einen völligen Fuß hoch, und höher. Die Stängel ſind ſehr zart und voll Blätter, und nun zum grünen Futter ſo geſchickt, als Klee, oder ein anderes von unſern Gras-Samen mit ten im Sommer iſt; und die Pflanzen ſind ſo ſtark (die ſo blühen, ausgenommen) anzuſehen, daß ich keinesweges zweifle

D. überſ. u. d. T. Kurze und bequeme Methode, die italiäniſchen Brocoli, ſpaniſche Cardoon, Celeriac, Finochi, und andre fremde Küchen-Kräuter hervorzubringen, nebſt einer Nachricht von der Lucerne, St. Foin, Klee, und andern Gras-Samen, wie auch der Methode, Lehmen zur Verbeſſerung des Landes zu brennen; welcher beygefüget iſt eine Beſchreibung des Cytiſus der Alten, einer Pflanze, die mit glücklichem Erfolg zur Verbeſſerung des dürreſten und unfruchtbarſten Landes gebraucht werden kann, imgleichen auch eine Nachricht von dem großen Profit, der von Säung der Lucerne, und von Lehmenbrennen entſteht: von Steph. Switzer, aus dem Engl. überſetzt. Lpz. 1755, gr. 8.

zweifle, ſie werden die Strenge des Winters ausſtehen, und in jedem Stücke mit dem Lobe überein treffen, welches von vorgedachten Schriftſtellern dem Cytiſus gegeben wird.

S. 146 bis 151, werden einige griechiſche und römiſche Schriftſteller erwähnet, die von dem Nutzen des Cytiſus gehandelt haben.

S. 251, f. geſchieht von ſolchem Nutzen folgende Meldung: Columella L. 5. c. 11, ſagt davon: Omni generi pecudum vtiſiſſimus eſt, quod ex eo cito pinguescit, & lactis plurimum praebet ovibus, tum etiam quod coëlo mentibus viridi eo pabulo vti, & poſtea arido poſſit; praeterea in quolibet agro, quamvis macerrimo, celeriter comprehendit, omnem iniuriam ſine noxa patitur. Plinius, L. 13 Hiſt. nat. c. 23, ſchreibt: Non ex alio pabulo lactis maior copia aut melior, ſuper omnia pecorum medicina, a morbis omni vſu praeſtante. Nebſt demjenigen, was Columella und Virgil von dem Nutzen deſſelben bey den Bienen geſchrieben haben, erwähnt Plinius aus dem Ariſtomachus und Andern: Apes quoque nunquam defore, Cytiſo pabulo contingente.

Die Fortpflanzung und Nutzung iſt, S. 152–155, folgender Maßen angegeben: „Dieſe Pflanze kann entweder durch den Samen, oder durch Schnittlinge fortgepflanzet werden; auch kann ſie wie Kohl-Samen, oder eine andere Pflanze von ſolcher Gattung, 1½ F. von einander hinaus geſetzet werden, wie Varro meldet, oder 4. F., wie Columella ſagt, auf die Weiſe, wie die Weiden gepflanzet werden. Was die Fortpflanzung derſelben durch Samen betrifft, hat man ſo wenig davon gehört, daß ſolcher in England jemahls erhalten worden ſey, weil er mitten im Winter blühet, daß ich daran zweifle, ſolches jemahls zu ſehen, ob er ſchon grün und friſch bleibt, und ſolche ganze Zeit über eine überaus ſchöne Pflanze iſt, die ſich in Zweige ausbreitet und viele Schüſſe gewinnt. Seine Fortpflanzung kann in wenigen Jahren auf eine leichte Weiſe und im Ueberfluß geſchehen. Ich habe ſelbſt an einer Pflanze Schnittlinge genug geſehen, um wenigſtens den vierten Theil eines Ackergrundes zu verſehen, maßen jedes Stückchen 2 oder 3 Z. lang wachſen wird. Und wenn er im Frühlinge, oder in einem von den Sommer-Monathen gepflanzet und mäßig begoſſen wird, ſo wird er nach Luſt wurzeln; und wenn er im Frühlinge, oder in einem von den Sommer-Monathen

gepflanzet und mäßig begossen wird, so wird er nach Lust wurzeln; und wenn er 3 F. weit von einander gesetzt wird, so werden ungefähr 4800 Pflänzlinge auf einen Acker hinlänglich seyn, welcher im ersten oder andern Jahre kann abgeweidet werden, wenn es mit Sorgfalt geschehen ist, weil nichts vermögend ist, solchen zu verletzen, wie Plinius von ihm sagt: Non aestuum, non frigorum, non grandinum aut nivis iniuriam expauescit. Und ob schon Letzterer überhaupt, solches räth, so bald er verblühet hat, welches um die Zeit ist, wenn im Frühlinge Tag und Nacht einander gleich sind, welches bey ihnen bisweilen schon im Febr. geschieht, so scheint doch aus der Nachricht, die er von dessen Dauerhaftigkeit gibt, und nach des Hyginus Bericht, daß ihn kein Hacken, Beschneiden, Behauen, oder anderes übles Begegnen, wegen seines Holzes, gänzlich verderben könnte, nicht unbillig zu schließen, daß er zu einer jeden Jahrszeit, auch in der größten Sommerhitze sowohl, als Kälte des Winters, kann abgeschnitten werden. Und ich werde in dieser Meinung bestärkt, weil er nicht nur von einer trocknen Eigenschaft, und nicht geneigt ist zu bluten, wie die meisten andern Gräser zu thun pflegen, sondern er verträgt auch drinnen und draussen, ja zu allen Jahrszeiten, wohl behauen und beschnitten zu werden; und ob auch schon die Aeste ein wenig hart seyn mögen, wenn man sie zu lange wachsen lässet, so sind doch in offener und freyer Luft eine solche Menge kleiner Blätter, die den Stock umgeben, daß das Vieh genug daran abzunagen hat. Ich werde durch die Nachricht, die ich neulich von einem aus Frankreich kommenden Herrn erhalten habe, der ihn auf offenen Rändern in den Gärten zu Chantilly wachsen und blühen gesehen hat, wo er den ganzen Winter auf eine sehr angenehme Weise blühet, noch mehr in meiner Meinung von dessen Dauerhaftigkeit bestärket".

S. 155, werden folgende Anmerkungen über dessen Säung und Pflanzung mitgetheilet: Plinius gibt die Anweisung, den Samen im Frühlinge zu säen, wie man den Lauch säet, oder durch die Stängel im Herbste, ehe die kurzen Tage heran kommen. Allein, nach der Erfahrung, die ich davon gemacht habe, halte ich für das Beste, wenn man die Schnittlinge oder zarten Stängel um das Ende des Märzes oder zu Anfange des Aprils steckt; und wenn sie bey ihrer Pflanzung 15 oder 16 Tage wohl begossen werden,

werden, wofern kein Regen fällt, so werden sie zu solcher Zeit genug gewurzelt seyn, bey dem ersten Regen im Sept. in das offene Feld hinaus gepflanzet zu werden".

S. 157, wird eine Methode, den Cytisus in Britannien wachsend zu machen, eröffnet. „Das erste, was man zu verrichten hat, ist, daß man die Ober-Rinde der Heide aufschärfe oder abschäle, sie in Haufen werfe, und sie auf eben solche Weise verbrenne, wie bey dem gemeinen Rasen-Brennen; zu jedem Haufen aber muß man 1 Metze oder ½ Scheffel Kalk hinzu thun. Hernach läßet man den Grund pflügen, wie gewöhnlich ist, so wird man einen Vorrath Erde haben, die geschickt ist, die Stöcke im Herbste darein zu pflanzen".

S. 159, wird von der Zeit, und der Methode, solchen zu säen und zu pflanzen, gehandelt. „Nach dem Berichte der Alten, ist die Zeit, den Cytisus zu säen, entweder um die Mitte des Oct., oder im Anfange des Frühlinges, wenn die Erde wohl zugerichtet ist, und die Reihen fein nach Art eines Garten-Beetes gemacht sind, da er wie Basilien oder anderer Same gesäet wird. Ich wollte aber in diesem Erdreiche vielmehr rathen, den Samen lieber im Frühlinge zu säen, als zu einer andern Zeit, damit die Pflanzen aufwachsen und stark genug seyn mögen, den Frösten des folgenden Winters zu wiederstehen, da sie noch gar zart seyn mögen. Und dann im folgenden Herbste oder Frühlinge können sie in andere Gehäuse, in den offenen Feldern oder auf Hügeln, die durch Brennen oder auf andere Art zugerichtet worden sind, hinaus gesetzet werden.

„Plinius schreibt, daß er mit wenig Kosten könnte hervor gebracht werden, wenn man ihn unter Gerste oder ein anderes Frühlings-Getreide von Samen säet, oder durch die Setzlinge der Stängel im Herbste, ehe es regnet, fortpflanzt. Wofern aber kein Same zu bekommen ist, so kann er, wie Columella, L. 5. c. 3. vorschlägt, im Anfange des Sept. durch Schnittlinge in dazu vorbereitete Beete hinaus gepflanzet werden. Allein, hier halte ich wieder für rathsamer, diese Beete zu den Schnittlingen gegen das Ende des Märzes, oder im Anfange des Apr., anzufangen, ungefähr 5 bis 6 Z. weit von einander, wie unsere Gärtner die Ulmen aus den Wäldern in ihre Baumschulen pflanzen. Denn hierdurch wird die Pflanze so stark gewurzelt seyn, wenn der grüne Giptel bey dem Hinauspflanzen

abgeschnitten worden ist, daß sie das nächste Jahr auf dem freyesten Felde oder Hügel, ohne Wässerung wächst; und diese Fortsetzung der Pflanze aus dem Beete in die offene Luft, ist gewiß gegen das Ende des Aug. oder zu Anfange des Sept., wegen vorher angezeigter Ursachen, am bequemsten".

S. 164, spricht Switzer von der Dauerhaftigkeit des Cytisus in der englischen freyen Luft: „Es ist fast so gewiß, als etwas in der Natur seyn kann, daß er wegen seines reichlichen Wachsthumes in einer offenen freyen Luft im Sommer wenigstens bis 4 Mahl abgeschnitten werden kann. Ich bin versichert, je öfter es geschieht, je zärter wird er seyn. Der Klee, wenn er reif ist, bringt Stängel hervor, die so hart, als diese, sind; er ist aber keinesweges so dick mit Laube bedeckt".

So nützlich aber diese Pflanze in Creta, Sicilien und Neapolis, oder auch in warmern Ländern seyn mag, und so sehr auch Switzer ihren Anbau in England empfohlen hat, so möchte doch wohl schwerlich in Deutschland, wenigstens in den meisten Gegenden desselben, ein großer Gebrauch davon zu machen seyn; wie denn auch Miller behauptet, man könne es in England damit so weit nicht bringen, daß sie zu solcher Absicht wirklich nutzbar sey; denn sie könne die dortigen harten Fröste nicht vertragen, oder, wenn sie diese auch so weit ausstände, daß sie nicht ganz und gar zu Grunde ginge, so würde sie doch dadurch dermaßen mitgenommen, daß sie nicht im Stande wäre, vor der Mitte oder dem Ende des Mayes sich wieder zu erhohlen. Auch alsdann wäre der neue Wuchs nicht so stark, daß man diese Gewächse in einem Sommer mehr als Ein Mahl hauen könne. Hernach würden sie auch, wenn man sie lang wachsen liesse, so holzig, daß sie sehr mühsam zu hauen, und zu Futter nicht füglich zu gebrauchen wären. Ueberhaupt also lohnen sie, seinen Gedanken nach, die Mühe und Kosten bey der Bestellung in England gar nicht, wo es an andern vorzüglichen Gewächsen nicht fehlt; hingegen, wo heiße, trockne, felsige Gegenden sind,

der-

dergleichen sich in etlichen englischen Colonien finden, in welchen wenig andere Pflanzen fortkommen, da kann man es mit diesen Gewächsen zu großem Vortheil versuchen, denn daselbst dauern sie viele Jahre lang, und halten sich sehr gut.

Mills scheint Switzer'n in Schutz nehmen zu wollen. Er setzt, in seinen Lehrbegriff von der prakt. Feldwirthsch. 3 Th. (Lpz. 1765, gr. 8.) S. 320, f. nachdem er Millers Zweifel gegen den nützlichen Anbau dieses Gewächses im Freyen angeführt hat, hinzu: „Indessen waren Columella und Plinius in Ansehung der Härte dieser Pflanze ganz anderer Meinung, als Hr. Miller. Ihren Worten nach kommt sie nicht nur in dem allerdürftigsten Erdboden fort, sondern steht auch fast alle schlimme Witterung aus. Vermuthlich meinen sie darunter den Frost; denn es ist ja bekannt, daß in den meisten Gegenden von Italien, so wie in vielen andern Ländern, die jenen in diesem Stücke gleich sind, zwar mitten am Tage eine unerträgliche Hitze ist, aber doch auch zuweilen sehr heftige Fröste einfallen, die noch dazu sehr plötzlich kommen; eben deswegen sind sie für alle Gattungen von Gewächsen desto gefährlicher, als andere, die wohl freylich viel strenger sind, und weit länger dauern, doch dabey nur nach und nach kommen. Daher ich beynahe auf die Gedanken gerathe, als habe sich Hr. Miller hier geirret".

Man hat auch hin und wieder in Deutschland Versuche mit dem Anbaue dieser Pflanze, aber vergeblich, angestellt. Nach dem Berichte eines Ungenannten, im 26 St. des Hannov. Magaz. v. J. 1763, sind die Versuche, die Heide-Gegenden, nach Switzer's Vorschlage, mit dem Klee-Strauche zu verbessern, bereits in einer Gegend von Deutschland, die unter einem gelindern Himmels-Striche, als die hannoverischen Lande, liegt, 5 Jahr nach einander mit aller möglichen Sorgfalt angestellet worden. Man ließ den Samen aus England kommen; man säete ihn in Gärten, wo die Pflanzen Schutz vor den strengsten Winden hatten; man ließ etliche da gehen, etliche brachte man auch in

das

Freye; sie hielten aber alle zusammen auch den gelindesten Winter von diesen fünfen nicht aus, sondern erfroren sowohl im Garten, als im Freyen.

Schon im 6 Th. der ersten zu Halle herausgekommenen Schreberischen Sammlung, steht unter den Aufgaben, S. 451: „Wie ist der Cytisus veterum (Medicago arborea *L*), dieses von den alten römischen Landwirthschafts-Scribenten für das beste Vieh-Futter gepriesene Gewächs bey uns im freyen Felde durch den Winter zu bringen, daß es nicht erfriere? Muß es etwa vor dem Winter abgeschnitten werden? Die von mir im Freyen angebaueten Stöcke sind nicht abgeschnitten worden, und im Winter insgesammt darauf gegangen".

Im 2ten Th. der zu Bützow heraus gekommenen Schreberischen Sammlung, ertheilt Rammelt folgende Nachricht von seinem angestellten Versuche: "Der Cytisus dauert bey uns über Winter, ausser dem Gewächs-Hause, nicht in freyer Erde. Wenn sich, nach Switzer's Berichte, in England wirkliche Plantagen davon anlegen lassen, so muß der engländische Winter von ganz anderer Beschaffenheit seyn, als der unsrige. Ich habe nun 3 Winter Versuche damit gemacht; es ist aber die Mühe allemahl vergebens gewesen. Ich brauchte noch die Vorsicht, daß ich etliche Stauden zu verschiedenen Zeiten abschnitt, die auch wieder frisch ausschlugen. Andere schnitt ich im späten Herbste ab, und meinte, es würde sich die Wurzel desto eher erhalten; etliche ließ ich stehen, wie sie im Sommer in die Höhe gewachsen waren; allein sie verdarben alle. So gern das Vieh diese Pflanze frißt, und so vielen Nutzen man davon in Italien ehedem gehabt, und wohl noch hat; so müssen wir uns doch dieses Vortheiles, bewandten Umständen nach, verzeihen".

Im 45 St. des Hannov. [illegible]-gaz. v. J. 1763, theilt ein Ungenannter, welcher sich [illegible] mit P. bezeichnet hat, fol-

folgende Gedanken über vorstehende Bemerkungen mit: „In Ansehung der Schreberschen und Rammeltschen Versuche fällt es zwar deutlich ins Auge, daß ihnen ein und anders an der Vollständigkeit abgeht, um darüber eine gewisse Regel zu fassen, weil daraus das eigentliche Verfahren bey den Versuchen nicht erhellet, ins besondre wegen der Jahrszeit des vorgenommenen Anbaues, auch ob solche mit Samen, Ablegern, oder Schnittlingen ins Werk gerichtet worden. Die fünfjährigen Versuche des Hrn. Verf. scheinen aber zu entscheiden, daß der Cytisus der Alten in dem nördlichen Theile Deutschlandes vermittelst des Samens im Freyen nicht durch den Winter zu bringen sey.

„Voraus gesetzt, daß der erhaltene Same der rechte gewesen, wird des Hrn. Verf. Ermäßigung anheim gegeben, ob dieses Gewächs nicht auf andere Art dahin gewöhnet werden könne, daß es vermöchte, unsere Winter in freyer Luft auszustehen. Einmahl fragt es sich, ob nicht der Cytisus eine dauerhaftere Pflanze abgeben würde, wenn er unter gutem Obdache zeitig in Kasten gesäet, nachher mit Behutsamkeit an die freye Luft gebracht, und sodann bey gehöriger Erstärkung zu rechter Zeit ins Land gesetzet würde, wie bey vielen Gewächsen gebräuchlich ist.

„Hiernächst dürften dazu zwey Wege vorhanden seyn. Der erste, daß die auf einem Saat-Bette angezogenen Pflanzen durch eine dienliche Verwahrung auf der Stelle durchgewintert; der andere, daß von solchen Pflanzen, die unter Dach gebracht worden, die Schnittlinge oder Ableger das folgende Jahr hinaus gepflanzt würden".

So untauglich aber diese Pflanze in Deutschland in dieser Absicht seyn mag, so verdient sie doch, wegen der Schönheit ihrer grauen Blätter, die das ganze Jahr dauern, und wegen ihrer lange währenden Blüthe, in jedem guten Garten einen Platz, und wird, wenn sie mit andern Stauden von gleichem Wachsthume untermischt ist, eine recht anmuthige Varietät machen.

Diese Pflanze kann sehr leicht aus dem Samen gezogen werden. Man säe denselben im März oder Apr. auf eine warme Rabatte in feine leichte Garten-Erde, in flache Furchen, ½ Z. tief, oder, um das Wachsthum der Pflanzen mehr zu befördern, in Töpfe, und

und senke diese in ein Mistbeet ein, gewöhne aber die jungen Pflanzen, sobald sie 1 bis 2 Z. groß sind, sogleich allmählich an die freye Luft, und begieße und beschatte die Pflanzen allenfalls auch bey heißer Witterung. Die in den Töpfen stelle man gegen den Winter in ein Gewächs-Haus, die im freyen Lande aber überspreite man mit Tonnen-Reifen, bedecke sie bey Eintritt des Frostes mit Matten, und verstärke diese Bedeckung bey zunehmendem Froste, weil sie sonst alle erfrieren. Im folgenden Frühlinge pflanze man eine Anzahl der stärksten Pflanzen einzeln in Töpfe, um sie in denselben, damit sie zuvor mehr Stärke gewinnen, noch 1 oder 2 Jahr durch den Winter zu bringen; die übrigen aber, wenn man einer großen Anzahl bedarf, pflanze man entweder schon jetzt, oder auch erst, um sie im folgenden Winter mit Matten bedecken zu können, im zweyten Frühlinge, auf Gewinn und Verlust, in eine gut geschützte, trockne, warme Pflanz-Schule, in 2 F. weit von einander entfernte Reihen, und in den Reihen selbst 1 F. weit von einander.

Sie kann aber auch durch abgeschnittene Zweige fortgepflanzet werden. Im März oder Apr. schneide man starke junge Schüsse ab, theile solche in 6, 8 bis 10 Z. lange Stücke, stecke solche entweder auf ein Beet, von der zuvor beschriebenen Beschaffenheit, in leichte fette Erde, oder, um sie im folgenden Winter beysetzen zu können, in Töpfe, die man entweder auf einer schattigen Stelle, oder, um die Bewurzelung geschwinder zu befördern, in ein Mist-Beet einsenken kann; beschatte sie auch in allen diesen Fällen gegen die Mittags-Sonne, und begieße sie gehörig. Am Ende des Sommers werden sie sich alle gut bewurzelt haben. Die im freyen Lande können daselbst so lange bleiben, bis sie zur förmlichen Verpflanzung stark genug sind; die aber in Töpfen müssen im folgenden Frühlinge theils einzeln in Töpfe, theils in die Pflanzschule, gepflanzet werden.

Nach

Nach Bechſtedts Verſicherung, in ſeinem niederſ. Land- und Garten-Buche, 3 Th. (Flensb. und L. 1773, 8.) S. 586, erträgt der baumartige Schnecken-Klee die gewöhnliche Winter-Kälte ſehr gut, und nur die ſtrengſte Kälte iſt ihm empfindlich. Er kann hier alſo, eben ſo wie in England, behandelt werden. Im freyen Lande wächſt und blüht er weit ſtärker, als in Töpfen.

2. Virginiſcher Schnecken Klee, mit aufrechtem und ſehr äſtigen Stängel, und Blumenbüſcheln an dem Gipfel des Stängels und der Aeſte; Medicago virginica, caule erecto ramoſiſſimo, floribus fasciculatis terminalibus *L.* Sein Vaterland iſt Virginien. Er iſt glatt, ſein Stängel ſtaudenartig, und ſeine Blätter ſind dreyfach.

3. Jähriger dreyblätteriger Schnecken-Klee mit nierenförmiger Hülſe, geſtrahlter Schnecken-Klee, Medica lunata *C. Durant.* Trifolium ſiliqua falcata *C. B.* Medicago annua trifolii facie *Tourn.* Medicago radiata, leguminibus reniformibus, margine dentatis, foliis ternatis *L.* Engl. radiated Trefoil, wächſt in Italien wild. Es iſt dieſes eine jährige Pflanze. Sie hat verſchiedene dünne äſtige Stängel, welche 1½ Sch. hoch ſind, ſich auf der Erde ausbreiten, und mit dreytheiligen Blättern beſetzt ſind, deren Lappen lanzenförmig und ganz ſind. Die Blumen kommen einzeln auf dünnen Stielen zum Vorſchein, welche neben an den Zweigen ſtehen. Sie ſind klein und gelb. Auf dieſelben folgen breite, flache, mondförmige Schoten, die am Rande gezähnet ſind; und dieſe Zahnungen haben an der Spitze zarte Haare. In einer jeden Schote ſind 4 bis 5 nierenförmige Samen enthalten. Sie blühet im Jun. und Jul., und der Same wird im Herbſte reif. Man kann ihn aus dem Samen ziehen, den man zu Anfange des Aprils in ein Beet von guter Erde, in welchem die Pflanzen bleiben ſollen, ſäet. Wenn dieſe aufgegangen ſind, muß man ſie vom

kraute rein halten, und nach und nach ſo verdünnen, daß ſie 1 F. weit aus einander ſtehen.

4. Jähriger gefiederter oder gekräuſelter Schnecken-Klee mit nierenförmiger Hülſe, ſpaniſcher Schnecken-Klee, Falcata foliis Anthyllidis *Riv.* Medicago vulnerariae facie, hiſpanica *Tourn.* Medicago circinnata, leguminibus reniformibus margine dentatis, foliis pinnatis *L.* Engl. round-podded Medick. Er kommt aus Spanien und Italien. Seine Wurzel iſt jährig, und ſeine Hülſen ſind zottig. Man kann ihn, wie den vorhergehenden, aus Samen ziehen, und muß ihn eben ſo behandeln.

5. Aufrecht ſtehender Schnecken-Klee mit vielfach gewundener Hülſe, blauer Klee, ewiger Klee (wiewohl ſeine Ewigkeit nur 10 oder 12 Jahr dauert), Lucerne, Luſerne, Luzerne, Lucern-Klee, mediſcher Klee, vorzüglich ſo genannter Schnecken-Klee, Spargel-Klee, um Erfurt Stotternheimer Klee, Medica legitima *Clus.* Medica flore purpureo *Anguillar.* Medica cretica coloris violacei, medica vera *Geſn.* Medica herba *Lonic.* Medica maior, erectior, floribus purpurascentibus *J. B.* Medica caule erecto floribus ſpicatis, ſiliquis repetito-intortis glabris *Hall.* Medica ſativa *Dalech.* Medicago ſativa, pedunculis racemoſis, leguminibus contortis, caule erecto glabro *L.* Fr. Luzerne, grand Trefle, (auch Sain-Foin, Saint Foin oder Foin de Bourgogne, geſundes Heu, heiliges Heu, burgunder Heu, Foenum burgundicum, aber unrecht; denn das iſt die Eſparſette) in der Provence Lauſerdo, bey den Spaniern Alfalfa; Engl. Lucern Medick Fodder; eine Pflanze, ohne deren Anbau die beſte Landwirthſchaft mangelhaft iſt, wo nicht überflüſſiger Wieſewachs vorhanden iſt; eine Pflanze, welche allen Arten von grünem, oder zu Heu getrocknetem Vieh-Futter, deſſen man ſich bisher bedient, vorzuziehen iſt, indem ſie nicht nur das frühe-

ſte, ſondern auch das ſpäteſte Futter iſt. Sie iſt bereits ſeit der Zeit, da Darius während ſeinem perſiſchen Heerzuge, dieſelbe in Meden (*) zuerſt entdeckt hat, ein edler Gegenſtand des Landbaues. Durch eben dieſen Darius kam ſie hernach nach Griechenland (**), und von da nach Italien, noch vor den Zeiten

(*) In Meden wird ſie noch heutiges Tages, beſonders zum Futter für die Pferde gebauet, und daher Pferde-Klee genannt. Olearius Reiſe, 567.

(**) Plinius ſagt, Lib. 18, c. 5: *Medica externa etiam Graeciae eſt, vt a Medis advecta per bella Perſarum, quae Darius intulit*, d. i. Die Lucerne iſt auch in Griechenland fremd, indem ſie in den Kriegen der Perſer, aus Meden dahin gebracht worden iſt, als Darius daſſelbe überfiel. Eben das ſagt Columella, L. 2, c. 12; auch Throphraſt, L. 1, c. 8. Dieſer Umſtand aber iſt von den neuern Schriftſtellern ganz unrichtig vorgeſtellt worden. Der Verf. des neuen und vollſtändigen Syſtems des praktiſchen Feldbaues, ſchreibt, im 3 B. ſeines Werkes, S. 339, alſo: „Dieſe Pflanze, (die „Lucerne) ſoll, wie man glaubt, ihren Nahmen Medica von „Meden erhalten haben, wohin Darius Hyſtaſpes eine „große Menge derſelben geſchafft haben ſoll, als er Griechen„land überfallen hatte, und dadurch wäre der Same der„ſelben daſelbſt verbreitet worden.“ Dieſe Vorſtellung nun iſt von derjenigen, welche ich von der Meinung des Plinius gegeben habe, ſehr verſchieden. Wenn dieſer größte der alten Naturkundiger geſagt hätte: Medis advecta, an ſtatt a Medis advecta, ſo könnte Plinius gemeint haben, daß die Lucerne durch den Darius zu den Medern ſey gebracht worden, und nicht von den Medern nach Griechenland; und alsdann würde die Nachricht wirklich unvollkommen und wiederſinnig geweſen ſeyn, indem nähmlich der Naturforſcher, um den Nahmen einer Pflanze zu erklären, mehr ſagte, wohin, als woher ſie gebracht worden ſey. Allein, die beſtätigte Leſe-Art des Plinius leitet uns natürlicher Weiſe auf den Schluß, daß Darius, da er dieſes vortreffliche Futter-Kraut in Meden gefunden, daſſelbe von daher nach Griechenland, welches er eingenommen hatte, gebracht habe; und daß die Pflanzen, welche von dem vertheilten Samen deſſelben gezogen wurden, unter den Griechen den Nahmen Medica erhalten haben, als welche wohl wußten, wo die Samen hergekommen waren. Unterdeſſen ſind die zweyten Gedanken oft die beſten, und ſo ſcheint der Verf. des neuen und vollſt. Syſtems ꝛc. zu denken; denn im 4 Bande, S. 297, drückt er ſich alſo aus: „Nach dem Plinius und Columella iſt die Lucerne, „welche jetzt ſolche reiche Aernden in dieſem Königreiche gibt,

ten des Cato und Virgil's. Nach diesem letztern Zeitpuncte, haben kluge Oekonomen in verschiedenen Gegenden der Welt, fast von einem Pole zum andern, dieselbe mehr oder weniger fortgepflanzt.

Was die Geschichte dieser nützlichen Pflanze, seit den Zeiten des Virgil's betrifft: so ist kein Zweifel, daß ihre Fortpflanzung in Italien auf einem blühenden Fuße gestanden hat, bis auf die Zeit des Einfalles der Gothen und Vandalen; alsdann aber ging sie zu Grunde, oder eigentlich, sie erlosch durch die Nachlässigkeit und Unwissenheit dieser wilden Eroberer (1). In Spanien aber, welches bey der Ueberschwemmung dieser Barbaren weniger, als Italien, litte, und bey dem Einbruche der Mauren, die nicht nur Liebhaber der Erd-Gewächse, sondern auch gewisser Maßen Kräuter-Kenner waren, wurde der Bau der Lucerne sorgfältig erhalten, wie ein vestalisches Feuer; und wahrscheinlicher Weise kommt diejenige Art, welche wir nun haben, von der Lucerne des Columella her, der sie aus Italien brachte, und nach Andalusien verpflanzte, wo dieser vortreffliche Landwirth die Ursache war,

„anfänglich durch den Xerxes nach Europa gebracht wor„den, als er von seinem Feldzuge gegen Griechenland zurück „kam." Der Verf. widerruft seine erste Nachricht nicht, und daher kann dasjenige, was er hier sagt, nicht als eine Verbesserung, sondern als ein Widerspruch, angesehen werden, wofern er nicht erst zeigen wird, daß Griechenland nicht in Europa sey, oder daß Darius und Xerxes einerley Person sey. Auch wäre es schicklich, in einer folgenden Ausgabe, wenigstens durch eine Anmerkung, zu zeigen, was für ein Land in Europa es gewesen sey, in welchem Xerxes seine Lucerne gelassen habe, als er von der Bekriegung Griechenlandes zurück gekehrt war, indem man es für natürlicher halten dürfte, daß er dieselbe da gelassen habe, als er angelanget war, besonders da fliehende Heere selten Fourage zurück führen; und wo ich nicht irre, so hatte Xerxes das Unglück, in einem See-Treffen nicht weit von Asia geschlagen zu werden.

(1) Le vinte giornate dell' agricoltura, di M. *Agostino Gallo* (in Venez. 1569, 4.) p. 36.

war, daß dieses Kraut lange Zeit mehr oder weniger ächt erhalten wurde, eben so, wie die Reinigkeit der griechischen Sprache einige hundert Jahr in der Pflanz-Stadt Marseille mehr oder weniger fort dauerte. Aus Spanien kam dieses Kraut, unter dem Nahmen Medica, nach Neapel, und verbreitete sich durch Volterra und Scandiano, wurde auch überall hoch gehalten, besonders aber bey den Städten, wo das Land rar und theuer ist.

Ein gewisser Edelmann, **Hercules Cuccho**, der die Landwirthschaft liebte, führte sie bey seiner zweyten Ankunft im Venetianischen mit gutem Erfolge um das Jahr 1550 ein (2). Nicht lange hernach brachte Montigli, Bischof zu Viterbo, etwas Samen nach Rom; und der Lucernen-Bau verbreitete sich sehr schnell durch einen ziemlichen Strich Landes im Kirchen-State, und durch die ganze Lombardey (3). Einige Jahre hernach lehrte ein gewisser Graf **Fabio** die Franzosen um Paris die Lucerne bauen, daher sie zu König Heinrich IV. Zeiten, wenigstens in den südlichen Theilen von Frankreich so gemein war, als jetzt der gemeine Klee auf unsern Feldern ist (4).

Um das J. 1578, fand diese Pflanze ihren Weg nach Deutschland, und wurde in einer der anmuthigsten Provinzen des ganzen Reiches, ich meine in der untern Pfalz, gebauet (5). Um dieselbe Zeit erreichte der Ruhm davon England (6), wo sie jedermann bewun-

(2) Eb. das. giornate III.

(3) Herbario di *Castore Durante.* (in Roma, 1585. f.) p. 279.

(4) *De Serres* Theatre d'Agriculture, dedié au Roi Henri IV. 1660. f.

(5) *Conr. Heresbach* de re rustica, Colon. 1573. 8. Damahls nannte man in Deutschland die Lucerne wälsche Kolken.

(6) *Barnaby Googe's* whole art of husbandry. Lond. 1578. 4.

wunderte, aber nur wenige den Muth hatten, Verſuche, dieſelbe zu bauen, anzuſtellen. Allein, dieſe Verſuche waren ſchwach, und vermuthlich von ſchlechtem Erfolge, ungeachtet man die Art, damit umzugehen, gar leicht aus den römiſchen Schriftſtellern de rebus ruſticis hätte lernen können. Endlich fing Heartlib im J. 1650 an, die öffentliche Aufmerkſamkeit auf dieſen Punct von neuem zu erregen. Wenn man die Umſtände betrachtet, ſo that er alles, was ein Mann von ſeinem großen Genie thun konnte. Allein, da kein Mittel vorhanden war, es allgemein bekannt zu machen, ſondern man ſich mit der alten Weiſe behalf, Klee zu ſäen, ſo mißrieth endlich die Lucerne in unſerer Himmels-Gegend.

In Ireland hat der Ritter **Bellingham Boyle** die Lucerne zuerſt zur Blüthe gebracht.

Dühamel ſchreibt, daß die Lucerne in **England** ſehr ſchlecht gerathe, da er doch dasjenige, was **Tull** darüber geſchrieben hat, geleſen haben müßte. Allein, er irret, es ſey denn, daß er auf diejenige Art des Lucerne-Baues, da dieſes Gewächs, wie der **Klee**, mit Sommer-Frucht geſäet wird, ziele.

Woher dieſe Pflanze den Nahmen **Lucerne** hat, iſt ſchwer zu beſtimmen, weil von dem Canton Lucern, in der Schweitz, welcher auch dieſen Nahmen führt, aber niemahls wegen dieſes Gewächſes beſonders berühmt geweſen, noch jetzt iſt, die weſtlichen und nördlichen Völker den Nahmen nicht haben entlehnen können, wie auch aus vorſtehender Geſchichte dieſes Krautes erhellet. Gleichwohl verſichert Dühamel, daß dieſe Pflanze überall in der Schweitz nicht fort komme, ob es gleich gewiß iſt, daß ſie an verſchiedenen Orten in den 13 Cantons überaus wohl gerathe, wie denn Hr. v. Chateauvieux alle ſeine Erfahrungen davon, deren ich unten Erwähnung thun werde, in dem Gebiethe von Geneve glücklich angeſtellt hat, welches man

im

im ökonomischen Verstande, in Ansehung der Luft und des Klima, und wegen der Nachbarschaft, gar wohl als einen Theil Helvetiens ansehen kann, ohne sich auf besondere geographische Distinctionen einzulassen.

Die ausdauernde Wurzel der Lucerne geht tief in die Erde, der Stängel aber wächst alle Jahre von neuem. Er steht aufgerichtet, wird in gutem Boden an 3 F. hoch, und ist an jedem Knoten mit dreyblätterigem Laube versehen, woran jeder Theil spießförmig, ungefähr 1½ Z. lang, und ½ Z. breit ist, und, gegen den Stängel zu, Zähne wie eine Säge hat. Die Blüthen wachsen in Aehren, welche eine Länge von 2 bis 3 Z. haben, und auf nackenden Stielen gerade in die Höhe stehen, die 2 Z. weit aus den Seiten der Stängel hervor kommen. Sie sind von der Gattung der Erbsen-Blüthe, und haben eine schöne purpurrothe Farbe (*); das Fähnchen ist lang, schmahl, gefalten und eingekerbt; die Flügel sind heller und mit Wiederhaken versehen. Auf die Blüthen folgen glatte, zusammen gedrückte, mondförmige und 2 bis 3 Mahl gewundene Hülsen (Schoten), in welchen etliche Samen-Körner in Gestalt der wälschen Bohnen stecken. Die Blüthe erscheint im Jun., und der Same wird im Sept. reif.

Die Beschreibung der Lucerne bey dem Plinius, ist etwas dunkel. Er schreibt: Similis est trifolio, caule foli-

(*) Gemeiniglich spielt die Blumenkrone in das Purpurrothe; doch findet man sie auch violet, himmelblau, violet und gelb, grün, braun, und auch ganz gelb, welche verschiedene Sorten Pflanzen-Liebhaber in Gärten, unter den Benennungen: Medica maior erectior flore violaceo, fl. caeruleo, fl. ex violaceo & luteo mixto, fl. viridi &c. zu unterhalten pflegen. Hammerl's gelbe Lucerne, die er um Beichlitz im Merseburgischen gefunden haben will, ist nicht die mit blaßgelber Blume, von welcher Haller redet, sondern der Lotus maritimus. Für den Oekonom ist die purpurfarbige die nutzbarste.

abgeſchnitten worden iſt, daß ſie das nächſte Jahr auf dem freyeſten Felde oder Hügel, ohne Wäſſerung wächſt; und dieſe Fortſetzung der Pflanze aus dem Beete in die offene Luft, iſt gewiß gegen das Ende des Aug. oder zu Anfange des Sept., wegen vorher angezeigter Urſachen, am bequemſten".

S. 164, ſpricht Switzer von der Dauerhaftigkeit des Cytiſus in der engliſchen freyen Luft: „Es iſt faſt ſo gewiß, als etwas in der Natur ſeyn kann, daß er wegen ſeines reichlichen Wachsthumes in einer offenen freyen Luft im Sommer wenigſtens bis 4 Mahl abgeſchnitten werden kann. Ich bin verſichert, je öfter es geſchieht, je zärter wird er ſeyn. Der Klee, wenn er reif iſt, bringt Stängel hervor, die ſo hart, als dieſe, ſind; er iſt aber keinesweges ſo dick mit Laube bedeckt".

So nützlich aber dieſe Pflanze in Creta, Sicilien und Neapolis, oder auch in wärmern Ländern ſeyn mag, und ſo ſehr auch Switzer ihren Anbau in England empfohlen hat, ſo möchte doch wohl ſchwerlich in Deutſchland, wenigſtens in den meiſten Gegenden deſſelben, ein großer Gebrauch davon zu machen ſeyn; wie denn auch Miller behauptet, man könne es in England damit ſo weit nicht bringen, daß ſie zu ſolcher Abſicht wirklich nutzbar ſey; denn ſie könne die dortigen harten Fröſte nicht vertragen, oder, wenn ſie dieſe auch ſo weit ausſtände, daß ſie nicht ganz und gar zu Grunde ginge, ſo würde ſie doch dadurch dermaßen mitgenommen, daß ſie nicht im Stande wäre, vor der Mitte oder dem Ende des Mayes ſich wieder zu erhohlen. Auch alsdann wäre der neue Wuchs nicht ſo ſtark, daß man dieſe Gewächſe in einem Sommer mehr als Ein Mahl hauen könne. Hernach würden ſie auch, wenn man ſie lang wachſen lieſſe, ſo holzig, daß ſie ſehr mühſam zu hauen, und zu Futter nicht füglich zu gebrauchen wären. Ueberhaupt alſo lohnen ſie, ſeinen Gedanken nach, die Mühe und Koſten bey der Beſtellung in England gar nicht, wo es an andern vorzüglichen Gewächſen nicht fehlt; hingegen, wo heiße, trockne, felſige Gegenden ſind,

dergleichen sich in etlichen englischen Colonien finden, in welchen wenig andere Pflanzen fortkommen, da kann man es mit diesen Gewächsen zu grossem Vortheil versuchen, denn daselbst dauern sie viele Jahre lang, und halten sich sehr gut.

Mills scheint Switzer'n in Schutz nehmen zu wollen. Er setzt, in seinen Lehrbegriff von der prakt. Feldwirthsch. 3 Th. (Lpz. 1765, gr. 8.) S. 320, f. nachdem er Millers Zweifel gegen den nützlichen Anbau dieses Gewächses im Freyen angeführt hat, hinzu: „Indessen waren Columella und Plinius in Ansehung der Härte dieser Pflanze ganz anderer Meinung, als Hr. Miller. Ihren Worten nach kommt sie nicht nur in dem allerdürftigsten Erdboden fort, sondern steht auch fast alle schlimme Witterung aus. Vermuthlich meinen sie darunter den Frost; denn es ist ja bekannt, daß in den meisten Gegenden von Italien, so wie in vielen andern Ländern, die jenen in diesem Stücke gleich sind, zwar mitten am Tage eine unerträgliche Hitze ist, aber doch auch zuweilen sehr heftige Fröste einfallen, die noch dazu sehr plötzlich kommen; eben deswegen sind sie für alle Gattungen von Gewächsen desto gefährlicher, als andere, die wohl freylich viel strenger sind, und weit länger dauern, doch dabey nur nach und nach kommen. Daher ich beynahe auf die Gedanken gerathe, als habe sich Hr. Miller hier geirret".

Man hat auch hin und wieder in Deutschland Versuche mit dem Anbaue dieser Pflanze, aber vergeblich, angestellt. Nach dem Berichte eines Ungenannten, im 26 St. des Hannov. Magaz. v. J. 1763, sind die Versuche, die Heide-Gegenden, nach Switzer's Vorschlage, mit dem Klee-Strauche zu verbessern, bereits in einer Gegend von Deutschland, die unter einem gelindern Himmels-Striche, als die hannoverischen Lande, liegt, 5 Jahr nach einander mit aller möglichen Sorgfalt angestellet worden. Man ließ den Samen aus England kommen; man säete ihn in Gärten, wo die Pflanzen Schutz vor den strengsten Winden hatten; man ließ etliche da[illegible]hen, etliche brachte man auch in

das

Freye; sie hielten aber alle zusammen auch den gelindesten Winter von diesen fünfen nicht aus, sondern erfroren sowohl im Garten, als im Freyen.

Schon im 6 Th. der ersten zu Halle herausgekommenen Schreberischen Sammlung, steht unter den Aufgaben, S. 451: „Wie ist der Cythisus veterum (Medicago arborea *L*), dieses von den alten römischen Landwirthschafts-Scribenten für das beste Vieh-Futter gepriesene Gewächs bey uns im freyen Felde durch den Winter zu bringen, daß es nicht erfriere? Muß es etwa vor dem Winter abgeschnitten werden? Die von mir im Freyen angebaueten Stöcke sind nicht abgeschnitten worden, und im Winter insgesammt darauf gegangen".

Im 2ten Th. der zu Bützow heraus gekommenen Schreberischen Sammlung, ertheilt Rammelt folgende Nachricht von seinem angestellten Versuche: "Der Cythisus dauert bey uns über Winter, ausser dem Gewächs-Hause, nicht in freyer Erde. Wenn sich, nach Switzer's Berichte, in England wirkliche Plantagen davon anlegen lassen, so muß der engländische Winter von ganz anderer Beschaffenheit seyn, als der unsrige. Ich habe nun 3 Winter Versuche damit gemacht; es ist aber die Mühe allemahl vergebens gewesen. Ich brauchte noch die Vorsicht, daß ich etliche Stauden zu verschiedenen Zeiten abschnitt, die auch wieder frisch ausschlugen. Andere schnitt ich im späten Herbste ab, und meinte, es würde sich die Wurzel desto eher erhalten; etliche ließ ich stehen, wie sie im Sommer in die Höhe gewachsen waren; allein sie verdarben alle. So gern das Vieh diese Pflanze frißt, und so vielen Nutzen man davon in Italien ehedem gehabt, und wohl noch hat; so müssen wir uns doch dieses Vortheiles, bewandten Umständen nach, verzeihen".

Im 45 St. des Hannov. [illegible]-gaz. v. J. 1763, theilt ein Ungenannter, welcher sich [illegible] mit P. bezeichnet hat, fol-

folgende Gedanken über vorstehende Bemerkungen mit: „In Ansehung der Schreberschen und Rammeltschen Versuche fällt es zwar deutlich ins Auge, daß ihnen ein und anders an der Vollständigkeit abgeht, um darüber eine gewisse Regel zu fassen, weil daraus das eigentliche Verfahren bey den Versuchen nicht erhellet, ins besondre wegen der Jahrszeit des vorgenommenen Anbaues, auch ob solche mit Samen, Ablegern, oder Schnittlingen ins Werk gerichtet worden. Die fünfjährigen Versuche des Hrn. Verf. scheinen aber zu entscheiden, daß der Cytisus der Alten in dem nördlichen Theile Deutschlandes vermittelst des Samens im Freyen nicht durch den Winter zu bringen sey.

„Voraus gesetzt, daß der erhaltene Same der rechte gewesen, wird des Hrn. Verf. Ermäßigung anheim gegeben, ob dieses Gewächs nicht auf andere Art dahin gewöhnet werden könne, daß es vermöchte, unsere Winter in freyer Luft auszustehen. Einmahl fragt es sich, ob nicht der Cytisus eine dauerhaftere Pflanze abgeben würde, wenn er unter gutem Obdache zeitig in Kasten gesäet, nachher mit Behutsamkeit an die freye Luft gebracht, und sodann bey gehöriger Erstärkung zu rechter Zeit ins Land gesetzet würde, wie bey vielen Gewächsen gebräuchlich ist.

„Hiernächst dürften dazu zwey Wege vorhanden seyn. Der erste, daß die auf einem Saat-Bette angezogenen Pflanzen durch eine dienliche Verwahrung auf der Stelle durchgewintert; der andere, daß von solchen Pflanzen, die unter Dach gebracht worden, die Schnittlinge oder Ableger das folgende Jahr hinaus gepflanzt würden".

So untauglich aber diese Pflanze in Deutschland in dieser Absicht seyn mag, so verdient sie doch, wegen der Schönheit ihrer grauen Blätter, die das ganze Jahr dauern, und wegen ihrer lange währenden Blüthe, in jedem guten Garten einen Platz, und wird, wenn sie mit andern Stauden von gleichem Wachsthume untermischt ist, eine recht anmuthige Varietät machen.

Diese Pflanze kann sehr leicht aus dem Samen gezogen werden. Man säe denselben im März oder Apr. auf eine warme Rabatte in seine leichte Garten-Erde, in flache Furchen, ½ Z. tief, oder, um das Wachsthum der Pflanzen mehr zu befördern, in Töpfe, und

und ſenke dieſe in ein Miſtbeet ein, gewöhne aber die jungen Pflanzen, ſobald ſie 1 bis 2 Z. groß ſind, ſogleich allmählich an die freye Luft, und begieße und beſchatte die Pflanzen allenfalls auch bey heißer Witterung. Die in den Töpfen ſtelle man gegen den Winter in ein Gewächs-Haus, die im freyen Lande aber überſpreite man mit Tonnen-Reifen, bedecke ſie bey Eintritt des Froſtes mit Matten, und verſtärke dieſe Bedeckung bey zunehmendem Froſte, weil ſie ſonſt alle erfrieren. Im folgenden Frühlinge pflanze man eine Anzahl der ſtärkſten Pflanzen einzeln in Töpfe, um ſie in denſelben, damit ſie zuvor mehr Stärke gewinnen, noch 1 oder 2 Jahr durch den Winter zu bringen; die übrigen aber, wenn man einer großen Anzahl bedarf, pflanze man entweder ſchon jetzt, oder auch erſt, um ſie im folgenden Winter mit Matten bedecken zu können, im zweyten Frühlinge, auf Gewinn und Verluſt, in eine gut geſchützte, trockne, warme Pflanz-Schule, in 2 F. weit von einander entfernte Reihen, und in den Reihen ſelbſt 1 F. weit von einander.

Sie kann aber auch durch abgeſchnittene Zweige fortgepflanzet werden. Im März oder Apr. ſchneide man ſtarke junge Schüſſe ab, theile ſolche in 6, 8 bis 10 Z. lange Stücke, ſtecke ſolche entweder auf ein Beet, von der zuvor beſchriebenen Beſchaffenheit, in leichte fette Erde, oder, um ſie im folgenden Winter beyſetzen zu können, in Töpfe, die man entweder auf einer ſchattigen Stelle, oder, um die Bewurzelung geſchwinder zu befördern, in ein Miſt-Beet einſenken kann; beſchatte ſie auch in allen dieſen Fällen gegen die Mittags-Sonne, und begieße ſie gehörig. Am Ende des Sommers werden ſie ſich alle gut bewurzelt haben. Die im freyen Lande können daſelbſt ſo lange bleiben, bis ſie zur förmlichen Verpflanzung ſtark genug ſind; die aber in Töpfen müſſen im folgenden Frühlinge theils einzeln in Töpfe, theils in die Pflanzſchule, gepflanzet werden.

Nach

ne Schaden thut, zumahl, wenn jenes ſtark, und die Witterung feucht iſt.

„In Languedoc ſäen ſie kein Getreide darunter, und wenn die Lucerne 6 bis 7 Z. hoch ſteht, wird ſie gehauen. Hierdurch verliert alles Sommer-Unkraut die Samen-Knoſpen, und kann ſich nicht ausſäen.

„In der Normandie, wo das Klima faſt eben ſo, wie in Engkand iſt, ſäet man Getreide unter die Lucerne.

„In der Picardie und um Paris, wird dieſes Gewächs theils mit, theils ohne Getreide geſäet.

„Wenn um Avignon die Lucerne ſchlecht zu ſtehen anfängt, wird das Feld aufs neue gepflüget, gedünget, und mit Getreide und Lucerne beſäet. Dann ſchlagen die alten Wurzeln noch einmahl mit dem Samen aus, und geben noch eine ſchöne Heu-Aernde; denn dieſes ſchadet ihnen nichts, daß das Feld gepflüget wird.

„Wenn Gerſte in der gewöhnlichen Quantität mit der Lucerne geſäet wird, und dieſelbe ſehr ſtark wächſt, ſo iſt der beſte Rath, ſie zu der Zeit, da ſie in der Aehre ſteht, abzuhauen.

„Friſch aufgeriſſenes Feld muß 1 oder 2 Jahr vorher, ehe Lucerne darauf kommt, gut durchgearbeitet werden. Zu dieſer Vorbereitung hilft es auch etwas, wenn man, ein Jahr über, Bohnen und Erbſen darauf ſäet. Vor allen andern Gewächſen bringen Kartoffeln den Erdboden in eine milde und lockere Verfaſſung. Im folgenden Jahre wird es nicht unrecht ſeyn, Rüben darauf zu erbauen. Läſſet man dieſe von den Schafen wegfreſſen, ſo bringt dieſes ſehr viele Nahrung in den Erdboden.

„Werden auf neu umgeriſſenes Feld, um es zu Lucerne vorzubereiten, frühzeitige Erbſen geſäet, ſo können hinter her, ſo bald die Erbſen weg ſind, weiße Rüben darauf kommen, und um Weihnachten ſind ſie ſchon ſo beſchaffen, daß ſie abgehütet werden können. Sobald dieſe vom Felde weg ſind, wird das Feld umgeackert, und bleibt ſo lange liegen, bis es Zeit iſt, es noch einmahl umzurühren. Oder, man ackert es furchenweiſe, und dieſes kann auch gleich das erſte Mahl ſehr dienlich ſeyn.

„Lucerne wird ungefähr vom Anfange des Märzes bis zum Ende des Mayes geſäet; im Apr. aber iſt es am beſten, wofern die Witterung trocken iſt. Wer es erſt nach dem May thut, wagt zu viel, weil man alsdann wegen der

kräute rein halten, und nach und nach ſo verdünnen, daß ſie 1 F. weit aus einander ſtehen.

4. Jähriger geſiederter oder gekräuſelter Schnecken-Klee mit nierenförmiger Hülſe, ſpaniſcher Schnecken-Klee, Falcata foliis Anthyllidis *Riv.* Medicago vulnerariae facie, hiſpanica *Tourn.* Medicago circinnata, leguminibus reniformibus margine dentatis, foliis pinnatis *L.* Engl. round-podded Medick. Er kommt aus Spanien und Italien. Seine Wurzel iſt jährig, und ſeine Hülſen ſind zottig. Man kann ihn, wie den vorhergehenden, aus Samen ziehen, und muß ihn eben ſo behandeln.

5. Aufrecht ſtehender Schnecken-Klee mit vielfach gewundener Hülſe, blauer Klee, ewiger Klee (wiewohl ſeine Ewigkeit nur 10 oder 12 Jahr dauert), Lucerne, Luſerne, Luzerne, Lucern-Klee, mediſcher Klee, vorzüglich ſo genannter Schnecken-Klee, Spargel-Klee, um Erfurt Stotternheimer Klee, Medica legitima *Cluſ.* Medica flore purpureo *Anguillar.* Medica cretica coloris violacei, medica vera *Geſn.* Medica herba *Lonic.* Medica maior, erectior, floribus purpurascentibus *J. B.* Medica caule erecto floribus ſpicatis, ſiliquis repetito-intortis glabris *Hall.* Medica ſativa *Dalech.* Medicago ſativa, pedunculis racemoſis, leguminibus contortis, caule erecto glabro *L.* Fr. Luzerne, grand Treffle, (auch Sain-Foin, Saint Foin oder Foin de Bourgogne, geſundes Heu, heiliges Heu, bürgunder Heu, Foenum burgundicum, aber unrecht; denn das iſt die Eſparſette) in der Provence Lauſerdo, bey den Spaniern Alfalfa; Engl. Lucern Medick Fodder; eine Pflanze, ohne deren Anbau die beſte Landwirthſchaft mangelhaft iſt, wo nicht überflüſſiger Wieſewachs vorhanden iſt; eine Pflanze, welche allen Arten von grünem, oder zu Heu getrocknetem Vieh-Futter, deſſen man ſich bisher bedient, vorzuziehen iſt, indem ſie nicht nur das frühe-

ſte,

ſte, ſondern auch das ſpäteſte Futter iſt. Sie iſt bereits ſeit der Zeit, da Darius während ſeinem perſiſchen Heerzuge, dieſelbe in Meden (*) zuerſt entdeckt hat, ein edler Gegenſtand des Landbaues. Durch eben dieſen Darius kam ſie hernach nach Griechenland (**), und von da nach Italien, noch vor den Zeiten

(*) In Meden wird ſie noch heutiges Tages, beſonders zum Futter für die Pferde gebauet, und daher Pferde-Klee genannt. Olearius Reiſe, 567.

(**) Plinius ſagt, Lib. 18, c. 5: *Medica* externa etiam *Graeciae* eſt, vt a *Medis* advecta per bella *Perſarum*, quae *Darius* intulit, d. i. Die Lucerne iſt auch in Griechenland fremd, indem ſie in den Kriegen der Perſer, aus Meden dahin gebracht worden iſt, als Darius daſſelbe überfiel. Eben das ſagt Columella, L. 2, c. 12; auch Throphraſt, L. 1, c. 8. Dieſer Umſtand aber iſt von den neuern Schriftſtellern ganz unrichtig vorgeſtellt worden. Der Verf. des neuen und vollſtändigen Syſtems des praktiſchen Feldbaues, ſchreibt, im 3 B. ſeines Werkes, S. 339, alſo: „Dieſe Pflanze, (die „Lucerne) ſoll, wie man glaubt, ihren Nahmen Medica von „Meden erhalten haben, wohin Darius Hyſtaſpes eine „große Menge derſelben geſchafft haben ſoll, als er Griechen„land überfallen hatte, und dadurch wäre der Same der„ſelben daſelbſt verbreitet worden.“ Dieſe Vorſtellung nun iſt von derjenigen, welche ich von der Meinung des Plinius gegeben habe, ſehr verſchieden. Wenn dieſer größte der alten Naturkundiger geſagt hätte: Medis advecta, an ſtatt a Medis advecta, ſo könnte Plinius gemeint haben, daß die Lucerne durch den Darius zu den Medern ſey gebracht worden, und nicht von den Medern nach Griechenland; und alsdann würde die Nachricht wirklich unvollkommen und wiederſinnig geweſen ſeyn, indem nähmlich der Naturforſcher, um den Nahmen einer Pflanze zu erklären, mehr ſagte, wohin, als woher ſie gebracht worden ſey. Allein, die beſtätigte Leſe-Art des Plinius leitet uns natürlicher Weiſe auf den Schluß, daß Darius, da er dieſes vortreffliche Futter-Kraut in Meden gefunden, daſſelbe von daher nach Griechenland, welches er eingenommen hatte, gebracht habe; und daß die Pflanzen, welche von dem vertheilten Samen deſſelben gezogen wurden, unter den Griechen den Nahmen Medica erhalten haben, als welche wohl wußten, wo die Samen hergekommen waren. Unterdeſſen ſind die zweyten Gedanken oft die beſten, und ſo ſcheint der Verf. des neuen und vollſt. Syſtems ꝛc. zu denken; denn im 4 Bande, S. 297, drückt er ſich alſo aus: „Nach dem Plinius und Columella iſt die Lucerne, „welche jetzt ſolche reiche Aernden in dieſem Königreiche gibt,

cerne konnten mehr als 6 Pferde den Sommer und Herbſt hindurch unterhalten.

Miller's Anweiſungen ſind dem Verfahren dieſes Herrn völlig gemäß. Er ſchlägt zu Beſtellung der Luzerne folgende Anſtalt vor.

„Das Feld wird zuvörderſt gut geackert, und ſehr klar geeget, hernach quer darüber eine Furche gezogen, die aufs höchſte ½ Z. tief iſt; in dieſelbe kommt der Same ganz dünn, und wird ungefähr ¼ Z. oder etwas dicker mit Erde bedeckt. Alsdann macht man wieder eine ſolche Furche 1½ F. weit von der vorigen, ſtreuet den Samen nach der zuvor angegebenen Weiſe hinein, und ſo verfährt man über das ganze Feld, indem man eine Reihe ſo weit als die andere macht, und den Samen ſehr dünn ſtreuet. Auf ſolche Weiſe werden 6 Pfund Samen auf 1 Morgen Landes zureichen. Wird dicker geſäet, und der Same geht gut auf, ſo ſtehen die Gewächſe in 1 oder 2 Jahren ſo dick, daß ſie einander Schaden thun, indem das Kraut ſowohl, als die Wurzeln, wenn ſie Platz haben, ſehr groß wachſen. Wenn alſo dieſes Gewächs gut in Acht genommen wird, hält es ſich viele Jahre lang, und bleibt eben ſo gut, als es im erſten Jahre war. Denn die Wurzeln dringen ſehr tief in das Erdreich, wofern der Boden trocken iſt. Geſetzt, ſie kommen 1 F. tief auf harten Kies, ſo fahren ſie dennoch durch, und immer weiter hinunter.

„Die Urſache, warum der Same in Reihen geſäet werden muß, iſt dieſe, damit die Pflanzen Platz zu wachſen haben, und der Erdboden dazwiſchen zu Ausrottung des Unkrautes und Beförderung des Wachsthumes der Pflanzen deſto beſſer aufgelockert werden könne. Dieſes läſſet ſich am leichteſten gleich nachher, wenn ſie einmahl gehauen iſt, mit einer holländiſchen Hacke thun. Davon werden die Pflanzen in kurzer Zeit aufs neue ausſchlagen, und viel munterer ſtehen,

als wo das Erdreich nicht aufgehacket werden kann. Im Anfange aber, wenn die Gewächse aufgehen, muß die Erde dazwischen mit einer gewöhnlichen Hacke locker gemacht werden. Dabey kann man die Pflanzen, wo sie zu dick stehen, wegnehmen, damit die übrigen desto besser wachsen. Diese Hack-Arbeit muß man, so lange die Gewächse jung sind, nach dem Wachsthume des Unkrautes, 2 bis 3 Mahl wiederhohlen, aber allemahl in trocknem Wetter, damit das Unkraut desto besser wegkomme, weil es in feuchtem Wetter wieder einwurzelt, und von neuem wächst.

„Bey solcher Wartung stehen die Gewächse im Anfange des Aug., da die Blüthen sich allmählich zeigen, 2 F. hoch, und wohl noch höher. Um solche Zeit ist es nöthig, die Lucerne zu hauen, welches aber, wenn Heu daraus werden soll, in trocknem Wetter geschehen muß. Ferner wird erfordert, daß man sie oft wende, damit sie bald trocken werde, und vom Felde gebracht werden könne. Liegt sie zu lange auf den Wurzeln, so können diese nicht gleich wieder ausschlagen. Wenn das Heu weggebracht ist, muß das Feld zwischen den Reihen, um das Unkraut zu tilgen und die Erde locker zu machen, mit einer Hacke aufgerühret werden. Davon kommen die Gewächse in einer kurzen Zeit wieder in die Höhe, so, daß sie im Anfange des Sept. schon 4 bis 5 Z. hoch stehen. Zu solcher Zeit läßet man die Schafe darauf gehen, die sie abfressen. Denn auf den Pflanzen dürfen keine Schößlinge stehen bleiben, weil sie, wenn Frost einfällt, verwelken, und oben auf die Wurzeln fallen möchten, wodurch diese gehindert werden, daß sie nicht zeitig genug im folgenden Frühlinge ausschlagen. Es ist also der beste Rath, bis zum Oct. das Vieh darauf zu treiben, zu welcher Zeit sie in demselben Jahre nicht wieder ausschlagen. Allein im ersten Jahre darf es kein großes Vieh seyn, weil die noch jungen Wurzeln in Gefahr stehen, entwe-

der

der zertreten, oder aus der Erde gerissen zu werden. Schafe hingegen schaffen den Wurzeln durch ihre Düngung Nutzen, wofern sie nicht so tief fressen, daß sie den Wurzeln Schaden zufügen.

„Im Anfange des Febr. muß die Erde zwischen den Reihen wieder mit der Hacke aufgelockert werden, damit sie neue Kräfte zu wachsen bekommen. Dabey muß man sich aber sehr in Acht nehmen, daß man den Wurzeln nicht oben zu nahe komme, wo die Keime zu solcher Zeit sehr geschwollen, und hervor zu kommen im Begriff sind. Durch solche Wartung werden die aufgegangenen Pflanzen, wenn der Erdboden warm ist, mitten im März 5 bis 6 Z. hoch stehen; wenn es alsdann an Futter fehlt, kann man sie bis in die erste Woche des Apr. abhüten lassen. Hierauf lässet man sie in die Höhe wachsen, und im Anfange des Jun. sind sie schon so weit, daß man sie hauen kann. Dann müssen sie aber auch, so bald als möglich, vom Felde weggeschaffet, und der Erdboden wieder mit der Hacke locker gemacht werden. Dieses befördert das Wachsthum der Gewächse dermaßen, daß sie um die Mitte oder gegen das Ende des Jul. schon wieder zu hauen sind, und dabey muß man so, wie das vorige Mahl, verfahren; hernach müssen sie im Herbste wieder abgehütet werden. Zu solcher Zeit stecken die Wurzeln schon so tief und fest in der Erde, daß auch großes Vieh ohne Gefahr darauf getrieben werden kann. Doch darf es nicht mehr darauf gelassen werden, wenn die Wurzeln nicht mehr frisch ausschlagen, damit es nicht an die Wurzel selbst anbeiße, und dadurch die Gewächse, wo nicht ganz zernichte, doch wenigstens sehr verletze.

„Auf solche Weise lässet sich dieses Gewächs immerfort zwey Mahl hauen, und zwey Mahl abhüten. In guter Witterung kann es drey Mahl gehauen, und zwey Mahl abgehütet werden. Dieses ist ein wichtiger

Vor-

Vortheil, besonders, da diese Pflanze auf dürrem unfruchtbaren Boden, wo sehr wenig Gras wächst, immer forkommt, und in trocknen Sommern, wo das Gras oft verbrennt, großen Nutzen schaffet. Ferner zeigt sich dieses Gewächs schon zeitig im Frühlinge, und thut also, wenn es zu solcher Zeit an Fütterung zu mangeln anfängt, sehr gute Dienste, indem es wenigstens einen Monath eher, als Gras oder Klee, dem Viehe zur Weide dient.

„Die Kälte thut diesem Gewächse keinen Schaden (*). In dem sehr kalten Winter $17\frac{39}{40}$ waren bey mir einige Wurzeln dieses Gewächses im Oct. ausgegraben, und bis zu Anfange des Märzes auf den Erdboden in freyer Luft hingeleget worden. Diese ließ ich wieder in die Erde setzen, wo sie sehr bald frisch und munter ausschlugen. So gar da sie noch auf der Erde lagen, trugen sie Fasern unten an den Seiten der Wurzeln aus, und oben an den Wurzeln fingen sie schon an grün zu werden. Daß aber die Wurzeln in der Nässe verderben, weiß ich ganz sicher. Denn ich säete zur Probe etwas Samen auf einen feuchten Fleck, der sehr gut aufging, und sich den Sommer über vortrefflich hielt; da es aber Winter wurde, und stark regnete, fingen die Wurzeln an unten abzufaulen, und vor dem Frühlinge waren sie größtentheils verdorben.

„Die besten Oerter, wo der Same herkommt, sind die Schweitz und die nördlichen Gegenden von Frankreich. Dieser Same komme in kalten Ländern besser fort, als anderer aus Gegenden, die mehr gegen Mittag liegen. Allein es lässet sich dieser Same auch in England in Menge erbauen. Hierzu darf nur eine gewisse

(*) Eben dieses wird auch von Dühamel versichert; welcher sagt, der harte Winter im J. 1709 habe fast alle Oehl-Bäume in Frankreich umgebracht, an der Lucerne aber sehr wenig Schaden gethan.

gewisse Anzahl Pflanzen ungehauen stehen bleiben, und wachsen, bis der Same reif wird. Alsdann schneidet man ihn ab, und legt ihn in eine offene Scheune, wo die Luft frey durchstreicht, damit er dürre werde. Nur darf keine Nässe unter diesen Samen kommen, sonst wächst er schon in der Hülse aus, und ist zu nichts nütze. Sobald er ganz trocken ist, wird er ausgedroschen, und von der Hülse gereiniget, und hernach an einen trocknen Ort gebracht, bis es Zeit zu säen ist. Same, der in England erbauet wird, taugt daselbst auch viel mehr, als der fremde. Die daraus gewachsenen Pflanzen standen weit schöner, als andere von französischem, schweitzerischen und türkischen Samen, der zu gleicher Zeit, in einerley Gegend, und auf einerley Boden gesäet war. Wer die Lucerne nach vorstehender Anweisung säet und wartet, wird finden, daß sie so gut, als anderes bisher in England erbauetes Futter, fortkommt und viel länger aushält. Denn wenn der Boden, so oft ein Mahl gehauen ist, gehörig aufgerührt, und das Gewächs das erste Mahl, wie oben angewiesen worden ist, abgehütet wird, bleibt es 20 Jahr, und noch länger, in gutem Stande, ohne daß noch ein Mahl gesäet werden darf. Nur muß man es nicht zu Samen kommen lassen; den dadurch verlieren die Wurzeln mehr Kräfte, als wenn sie vier Mahl gehauen werden.

„Das Lucern-Heu muß man in wohlverwahrten Scheunen aufheben; denn daß es frey in der Luft auf einem Haufen wie anderes Heu liegen sollte, dazu ist es zu zart. Wird es aber recht trocken unter Dach gebracht, so hält es sich 3 Jahr lang gut. In andern Ländern glaubt man, es lassen sich 3 Pferde von 1 Morgen Landes solches Futters ein ganzes Jahr hindurch erhalten. Und mir haben glaubwürdige Personen die gewisse Versicherung gegeben, daß in England 10 Karren-Pferde von Ende des Apr. an, bis zum Anfange des Oct., von 3 Morgen Landes, ohne das geringste

ringſte andere Futter ernährt worden ſind, ungeachtet ſie dieſe ganze Zeit über gearbeitet haben. Uebrigens läſſet ſich dieſes Gras nicht beſſer nutzen, als wenn man es abhauet, und dem Viehe grün vorlegt. Wo dieſes täglich geſchehen war, iſt, wie ich ſelbſt geſehen habe, unter der Zeit, da das Feld nach und nach gehauen wurde, das zuerſt gehauene Stück ſchon wieder ſo gut bewachſen geweſen, daß es von neuem gehauen werden konnte. Alſo gab das Feld nach einander beſtändig Futter von der Mitte des Apr. bis zu Ende des Oct., indem die Witterung lange Zeit gelinde blieb. Wenn es den Sommer hindurch abwechſelnd geregnet hat, ſo weiß ich, daß in Einem Jahre ſechs Mahl gehauen worden iſt. In trockner Witterung geht es aber doch gewiß allezeit drey Mahl an. Wenn die Pflanze zu blühen anfängt, alsdann iſt es Zeit zu hauen. Steht ſie länger, ſo wird der Stängel hart, das untere Laub verwelkt, und das Vieh frißt hernach nicht gern davon. Wer ſolche Gewächſe in großer Menge auf ſeinem Felde hat, muß zum Theil ſchon hauen laſſen, ehe ſich die Blüthen zeigen; denn wenn er bis zur rechten Zeit warten will, kommt hernach gar zu viel zuſammen.

„Wer Heu daraus machen will, hat viel Arbeit damit. Weil die Stängel ſehr ſaftig ſind, muß es fleißig gewendet werden, und 14 Tage lang liegen, ehe es eingefahren werden kann, denn es gehört zu dieſem mehr Zeit, als zur Esparſette, wenn Heu daraus werden ſoll. Iſt es alſo gehauen, ſo muß man es auf irgend einen Gras-Fleck führen und abtrocknen. Denn die Erde in den Lücken zwiſchen den Reihen wird durch einen jeden Regenguß in das Heu geſpühlt und darunter gemiſcht; hiernächſt, wenn man es gleich weggeſchafft hat, ſo bald es los gemacht iſt, ſchlagen die Pflanzen auf das neue wieder aus. Doch wer Heu daraus macht, der kann es nicht ſo nutzen, als wenn es grün verfüttert wird. Da läſſet es ſich für alle Gattungen von Vieh

gebrauchen, und insonderheit finden die Pferde ihr Vergnügen daran".

Dühamel (*) hält es für recht, die Lucerne im dritten Jahre, nachdem sie gepflanzt ist, zu düngen. Man dürfe sie an Orten, wo es sich thun lässet, niemahls unter Wasser setzen, als bis ausserordentlich dürres Wetter ist, auch alsdann müsse das Wasser ganz sparsam, und nur sehr kurze Zeit darauf stehen bleiben; Vieh dürfe gar nicht auf der Weide gehen, wo diese Gewächse stehen, wofern sie lange Zeit dauern sollen. Er merkt ferner an, wenn das Feld, nachdem es gehauen worden, sehr naß ist, so werden die Blätter in wenig Tagen so weiß, als Papier, seyn. Ist es aber nur ein überhin gehender Regen, der das Erdreich nur obenhin naß gemacht hat, so muß man die abgehauenen Schwaden nicht eher anrühren, als bis der Wind sie abgetrocknet hat. In sehr heißem Wetter muß man dieses Heu noch vorher einführen, ehe es ganz dürre

daß die Pferde es recht gern fressen, wenn man es ihnen im Winter unter der Lucerne vorlegt.

In manchen Jahren pflegen ganze Schwärme von schwarzen Schmetterlingen in der Lucerne zu hecken, und allen jungen Wuchs davon abzufressen. Diesem zuvor zu kommen, gibt Dühamel den heilsamen Rath, man solle es umhauen, sobald diese Feinde sich sehen zu lassen anfangen; dadurch müssen sie verderben, und die Gewächse werden bey Zeiten wieder ausschlagen, ohne daß es dem künftigen Heue einigen Abbruch thut.

Hr. v. Chateauvieux in Geneve, ist darin mit Dühamel und den übrigen Vertheidigern der neuen Wirthschaft einig, daß Lucerne am besten fort kommt, wenn sie auf Beeten erbauet wird; seine Einrichtung aber ist von der ihrigen in vielen Stücken unterschieden. Dieser Unterschied besteht:

1. In dem Grundsatze, dem Hr. v. Ch. sonderlich bey der Bestellung der Lucerne gemäß handelt. Lucerne hat von Natur eine einzige, große, gerade und tief in die Erde hinunter dringende Haupt-Wurzel, und wenn auch einige Seiten-Wurzeln daran wachsen, so sind deren doch sehr wenige. Aehnliche Versuche mit andern Pflanzen von langen Wurzeln brachten ihn auf die Gedanken: wenn man diese Pflanze versetzt, und von ihrer langen Haupt-Wurzel etwas abschneidet, so gebe man Gelegenheit, daß verschiedene Seiten-Wurzeln horizontal ausfahren, die in der lockern Erde der Gänge herum laufen, und daselbst für die Gewächse noch mehr Nahrung aufsuchen, wodurch sie also in den Stand gesetzt werden, reichlicher zu tragen. Der Ausgang hat bewiesen, daß er nach gesunden Grundsätzen gehandelt habe. Seine verpflanzte Lucerne trieb unzählig große Seiten-Wurzeln aus, und diese theilten sich wieder in andere, welche durch fleißige Bestellung der Gänge sich unendlich vermehren. Denn die Pferde-

Hacke thut bey diesen Seiten-Wurzeln eben das, was es bey der Haupt-Wurzel thut, wenn sie abgeschnitten wird.

2. In der Art, die Lucerne auszupflanzen. Er machte verschiedene Beete. Einige waren, die Gänge mitgerechnet, 3 F. breit, auf welche er eine einzelne Reihe Lucerne pflanzte; andere waren ungefähr 3 F. 9. Z., auf welche 2 Reihen kamen; noch andere 4 F. 3 Z. breit, und auf diese setzte er 3 Reihen. Mit dieser Verschiedenheit hatte er die Absicht, zu erfahren, nach welcher von diesen drey Einrichtungen auf Flecken von einerley Größe die meiste Lucerne wachsen würde. Die Pflanzen auf den einzelnen Reihen standen 6 Z. von einander; auf den doppelten und dreyfachen Reihen betrug der Zwischenraum 8 bis 9 Z. Er säete auch Lucerne mit dem Säe-Zeuge auf Beeten, die ohne weitere Auspflanzung so stehen blieb. Diese war sehr schön, doch bey weitem nicht so munter, und frisch, als die verpflanzte. Wenn Lucerne in der Absicht gesäet wird, daß sie stehen bleiben soll, so muß es sehr dünn geschehen, und diese Arbeit nimmt mehr Zeit weg, als wenn man sie auspflanzt.

Bey Auspflanzung der Lucerne auf Beeten, ist Folgendes zu beobachten. 1. Die Mitte der Beete muß, so viel möglich ist, in einen Bogen erhöhet werden; und da die Lucerne auf einerley Felde viele Jahre stehen bleibt, muß man den Erdboden so gut, als es sich thun lässet, vorbereiten. 2. Die Lucerne muß im Frühlinge, und auf einen guten Boden gesäet werden, damit die Pflanzen zum Versetzen im Sept. stark genug seyn. 3. Pflanzen von 2 bis 3 Jahren lassen sich so gut, als die jungen, versetzen. 4. Das Versetzen muß im Sept. geschehen, damit die Pflanzen, ehe der Winter heran kommt, frisch einwurzeln können. 5. Geht es nicht wohl an, sie im Sept. zu versetzen, so kann es auch im Oct. geschehen, nur muß kein Frost zu befürch-

ten

ten seyn. 6. Das Erdreich, worein sie gesetzt werden, muß feucht seyn; und wenn das Wetter ein wenig regenhaft ist, so thut es desto besser. Alsdann ist es nicht nöthig, die Pflanzen zu begießen. 7. Wird Lucerne im Nov. oder Dec. versetzt, so ist zu befürchten, daß der Frost viele Pflanzen aus der Erde heraus ziehen möchte. 8. Kann man wegen der warmen und trocknen Witterung nicht im Sept. oder Oct. die Versetzung bewerkstelligen, so ist es besser, den Winter vorbey zu lassen. Alsdann kann man sich gewiß darauf verlassen, daß die Pflanzen Wurzeln schlagen, und wenige davon eingehen. 9. Ist es möglich, sie im Herbste zu versetzen, so werden sie im künftigen Jahre ganz vortrefflich wachsen; werden sie aber erst im Frühlinge versetzt, so ist die folgende Aernde ganz mäßig. 10. Die Pflanzen müssen aus dem Mist-Beete sehr sorgfältig und behutsam heraus genommen werden, damit die Wurzeln keinen Schaden leiden. 11. Die Wurzeln müssen ungefähr 6 bis 7 Z. lang bleiben, und die grünen Keime oben auf der Wurzel bis auf 2 Z. abgeschnitten werden. 12. Die Pflanzen werden desto eher einwurzeln, wenn sie, so bald als sie aus dem Mist-Beete kommen, in Wasser geleget werden, und darin liegen bleiben, bis man sie verpflanzt. 13. Bey der Verpflanzung werden mit einem Pflanz-Stocke für die Gewächse Löcher gemacht, wie zu den Kohl- und Salat-Pflanzen in Gärten. 14 Die beste Art Lucerne zu pflanzen, ist, wenn man eine gerade Furche 2 bis 3 Z. tief macht, die Pflanzen hinein setzt, und bis oben an das Kraut mit Erde bedeckt. 15. Es ist genau darauf Achtung zu geben, daß wenigstens die ersten 2 bis 3 Jahr nicht das geringste Unkraut unter der Lucerne wachse; daher müssen die Reihen nebst dem Rande der Gänge neben den Pflanzen, wo mit der Pferde-Hacke nicht hin zu kommen ist, mit der Hand gegätet werden. 16. Zu Auflockerung der Gänge lässet sich entweder der einfache

breit, im 2ten fast durchgängig über 6 Z., und im gegenwärtigen 3ten hatte mehr als die Hälfte der Pflanzen eine Krone von 10 bis 12 Z. im Durchschnitt. Viele darunter sind so groß geworden, daß sie einander berühren, daher sind die Kronen länglich rund, und nach der Seite zu gewachsen, wo ihnen nichts im Wege gewesen ist.

„Gewonnenes Gras. Ich habe ein Feld von Lucerne in Beeten, welches in 2 Theile abgetheilt ist. Jetzt ist es das dritte Mahl, daß von dem einen gehauen ist. Die Beete sind 250 F. lang. Im J. 1753 ließ ich diese Lucerne 6 Mahl, nähmlich: im May, Jun., Jul., Aug., Sept., und Nov. hauen. Das letzte Mahl geschahe es gleich im Anfange des Monathes, und war nicht so reichlich, als die vorigen Mahle; zudem mußte ich ihn zu Hause trocknen. Dieses von Einem Beete gehauene Heu, worauf nur eine einzige Reihe Lucerne stand, betrug 140 ℔ schönes trocknes Futter.

„Im J. 1754 währte es lange, ehe die Lucerne auszuschlagen anfing, und der Erdboden war trockner, als im vorigen Jahre. Ich konnte nur 5 Mahl hauen lassen, nähmlich: d. 27 May, 1 Jul., 27 Jul., 26 Aug., und 23 Nov. Auf diese 5 Mahl hatte ich von jedem Beete überhaupt 225 ℔ wohl getrocknetes Heu.

„Ein Feld 250 F. lang, welches die Länge meiner Beete war, und 210 F. breit, enthält nach Genfer Maße, 1 Arpent oder Morgen Landes. Dieses Feld in 68 Beete abgetheilt, deren jedes 3 F. breit ist, trägt, jedes Beet zu 225 ℔ Heu gerechnet, überhaupt 15300 ℔ (*). Dieses ist weit mehr, als jemahls bey der gewöhnlichen Einrichtung gewonnen wird.

„Auf den Beeten mit drey Reihen wuchs weit weniger. Im 3ten Jahre betrug das davon gewonnene Heu nicht mehr, als 169 ℔ auf jedem Beete, und also ein Viertel weniger, als auf jenen. Nun sind diese Beete breiter; und also sind auf 1 Morgen Landes, statt 68 nach der vorigen Abtheilung, hier nur 47, jedes 4 F. 3 Z. breit; mithin beträgt das Heu davon überhaupt 7943 ℔. Folglich trägt dieser Morgen Landes nicht viel mehr, als die Hälfte dessen, was

(*) Mehr als 7½ Fuder Heu, jedes zu 1800 Pfund gerechnet; welches über 6 Fuder auf 1 engl. Morgen Landes beträgt.

Von der Lucerne darf man aus dem, was im 1sten und 2ten Jahre wächst, nicht urtheilen. Sie ist alsdann zu jung, als daß sie im Stande seyn sollte, viel zu geben. H. v. Châteauvieux ertheilt folgende Nachricht, wie die nach seiner Vorschrift behandelte Lucerne gewachsen, und wie viel Heu daraus geworden ist, richtet aber seine Berechnung nach dem dritten Jahre ein. Er erinnert dabey, daß die Jahre 1753 und 1754 ausserordentlich, und so sehr trocken waren, daß zwischen denen Zeiten, da gehauen wurde, nicht ein Tropfen Regen, und fast nicht einmahl Thau, fiel. Die Witterung war zum Gras-Wuchse so schlecht, daß das Heu überaus theuer bezahlt wurde.

„Beschaffenheit der Gewächse in ihrem dritten Jahre. Da der Theil an der Pflanze, den ich jetzt zu betrachten habe, derjenige ist, der in der Erde steckt, so grub ich viele davon aus, um von ihrer allgemeinen Beschaffenheit urtheilen zu können. Die Wirkung der Versetzung an diesen Pflanzen fiel mir sehr stark in die Augen. Statt einer senkrechten Wurzel, wie diese Gewächse ordentlicher Weise haben, fand ich an denselben 3, 4, 5, und zuweilen noch mehr Wurzeln, die fast von gleicher Stärke waren. Sie hatten durchgängig ¾ Z. im Durchschnitt, und waren aus der Haupt-Wurzel gewachsen, deren Stärke nunmehr im Durchschnitt wenigstens 1, und an vielen 1½ Z. betrug. Ich gab mir alle Mühe, unter der, nach gemeiner Art gesäeten, Lucerne, welche 12, 20 und noch mehr Jahre gestanden hatte, eine Pflanze zu finden, die nur eine Stärke von 1 Z. an der Haupt-Wurzel hatte. Wenige darunter waren etwa ½ oder ¾ Z. dick.

„Auch fand ich an den Wurzeln der verpflanzten Lucerne noch eine andere Gattung von Wurzeln, wovon ich an der alten Lucerne nicht eine einzige wahrnahm. Es waren dieses eine große Anzahl faserige Wurzeln, die zum Theil schon ½ Z. im Durchschnitt hatten, und so aussahen, als würden es ebenfalls Haupt-Wurzeln werden. Die Stängel schienen aus der Erde herauf zu gehen. Von der Zeit an, da sie das erste Mahl gehauen sind, entsteht eine Art von Kopf gerade über der Erde, die sich alle Jahre ausbreitet. Im ersten Jahre war dieser Kopf 2 bis 3 Z.



„Gewonnenes G
in Beeten, welches in
das dritte Mahl, daß
Beete ſind 250 F. lang
6 Mahl, nähmlich: in
und Nov. hauen. Da
Anfange des Monathes
vorigen Mahle; zudem
Dieſes von Einem Bee
einzige Reihe Lucerne
nes Futter.

„Im J. 1754 währt
ſchlagen anfing, und de
vorigen Jahre. Ich
nähmlich: d. 27 May,
Nov. Auf dieſe 5 Mah
haupt 225 ℔ wohl getro

„Ein Feld 250 F. l
Beete war, und 210 F.
1 Arpent oder Morgen La
abgetheilt, deren jedes 2
225 ℔ Heu gerechnet, üb
iſt weit mehr, als jemahl
ung gewonnen wird.

„Auf den Beeten mit d
Im 3ten Jahre betrug da
mehr, als 169 ℔ auf jed
weniger, als auf jenen.

blieb auch nicht eine einzige zurück. Sie liessen sich im ersten Jahre 3 Mahl hauen, ungeachtet der Boden sich gar nicht für sie schickte. Da noch etliche Reihen übrig blieben, die im Herbste nicht gepflanzt werden konnten, so verschob er es mit diesen bis zum nächsten Frühlinge. Von diesen Pflanzen gingen viele ein, und die noch Wurzel geschlagen hatten, trugen weit kürzere Stängel, als jene, welche man im Herbste verpflanzt hatte. Die leeren Flecke auszufüllen, nahm er einige Zweige, die er von den nahe stehenden Pflanzen absenkte. Hierdurch hoffte er, diese Lücken würden im folgenden Jahre wieder voll werden.

Der Verfasser des 1764 heraus gekommenen Essay of husbandry, gedenkt des Verfahrens des Hrn. v. Chateauvieux, Lucerne zu verpflanzen, mit vielem Lobe, und führt von den guten Wirkungen dieser Einrichtung aus seiner eigenen Erfahrung Beyspiele an. Hernach tadelt er mit allem Rechte die Einwohner von Jamaica, Barbados, und andern warmen Provinzen der Engländer in Amerika, wo so gar wenig Feld ist, und wo es sehr an Fütterung für das Vieh fehlt, daß sie an die Bestellung dieses Gewächses nicht die gehörige Mühe gewendet haben; da es doch in Peru, Mexiko, und andern nahe gelegenen Ländern, sehr gut fort kommt, und es, allem Vermuthen nach, in den meisten Gattungen von Erdboden, und in den meisten Gegenden vom Aequator bis ziemlich an die Pole, ganz wohl gerathen würde. Er macht die richtige Anmerkung, daß Lucerne in jedem volkreichen, mit Manufacturen und Fabriken versehenen Lande, Ochsen, Kühe, Kälber, und vielleicht auch Schafe und Wildbret zu mästen, ganz besondere Dienste thue.

„Wenn Rindvieh mit diesem Grase gemästet werde, so könne man es viel eher und auch viel zeitiger im Jahre, zum Verkauf tüchtig machen, als es der Landwirth nach der alten Wirthschaft zu Markte bringen kann; denn es sey etwas leichtes, den Anfang der Fütterung mit Lucerne am

Ende

geht vielleicht auf die Sorgfalt des Wirthes, welcher dem Dünger ꝛc. dem Boden hinlängliche Feuchtigkeit zur Nahrung der Pflanze geben muß, so, daß also die ganze Stelle folgender Maßen übersetzet werden könnte: „Der Boden „muß, nachdem die Steine und anderer Unrath heraus geschaffet worden, im Herbste gegraben oder gepflüget wer„den, so, daß er im März zum dritten Mahl kann gepflü„get werden, die Klöße zerstoßen seyn, er drey Mahl gegra„ben sey, jedes Mahl über den fünften Tag, und seinen Dün„ger erhalten habe. Diese Pflanze erfordert einen Boden, „der von Natur trocken ist, doch hinlängliche Feuchtigkeit „zum Wachsthume durch Düngen oder auch durch Wässe„rung desselben erhalten hat".

Columella sagt: Das Pflügen des Bodens soll mit dem Oct. seinen Anfang nehmen.

In Ansehung der Zeit des Düngens drückt sich Plinius nicht genau aus. Es scheint, als verlange er es im Frühlinge, nachdem zum dritten Mahl gepflüget worden ist; und doch scheint es besser zu seyn, wenn man den Dünger viel zeitiger mit dem Boden vermischt, da zu dessen Milderung dieses hernach überaus viel beytragen wird.

Die Saat-Zeit dazu, ist von Georgen (d. 23 Apr.) an, bis zu Johannis (24 Jun.). Man kann zwar die Lucerne auch im Sept. säen, allein die Frühlings-Saat ist allemahl sicherer. Sehr zuträglich ist es für diese Saat, wenn gleich nach derselben ein sanfter Regen erfolgt; denn alsdann geht sie schon am vierten Tage recht schön auf.

Von der Saat-Zeit bemerkt Plinius: Ita præparato (solo Medica) seritur *mense Maio*, alias proinis obnoxia; d. i. „Wenn der Boden auf diese Weise zubereitet worden ist, „wird die Lucerne im May gesäet; denn wenn es zeitiger „geschähe, so würde sie den Reifen ausgesetzt seyn. Co„lumella sagt: daß man zu Ende des Aprils säen solle.

Auf einen Acker Landes von 300 leipz. Ruthen, (die Ruthe zu 15 Sch. 2 Z. gerechnet,) braucht man ordentlicher Weise 24 Pfund Samen. Dieses ist das richtigste Verhältniß; von diesem Gewichte darf also nichts

blieb auch nicht eine einzige zurück. Sie liessen sich im ersten Jahre 3 Mahl hauen, ungeachtet der Boden sich gar nicht für sie schickte. Da noch etliche Reihen übrig blieben, die im Herbste nicht gepflanzt werden konnten, so verschob er es mit diesen bis zum nächsten Frühlinge. Von diesen Pflanzen gingen viele ein, und die noch Wurzel geschlagen hatten, trugen weit kürzere Stängel, als jene, welche man im Herbste verpflanzt hatte. Die leeren Flecke auszufüllen, nahm er einige Zweige, die er von den nahe stehenden Pflanzen absenkte. Hierdurch hoffte er, diese Lücken würden im folgenden Jahre wieder voll werden.

Der Verfasser des 1764 heraus gekommenen Essay of husbandry, gedenkt des Verfahrens des Hrn. v. Chateauvieux, Lucerne zu verpflanzen, mit vielem Lobe, und führt von den guten Wirkungen dieser Einrichtung aus seiner eigenen Erfahrung Beyspiele an. Hernach tadelt er mit allem Rechte die Einwohner von Jamaica, Barbados, und andern warmen Provinzen der Engländer in Amerika, wo so gar wenig Feld ist, und wo es sehr an Fütterung für das Vieh fehlt, daß sie an die Bestellung dieses Gewächses nicht die gehörige Mühe gewendet haben; da es doch in Peru, Mexiko, und andern nahe gelegenen Ländern, sehr gut fort kommt, und es, allem Vermuthen nach, in den meisten Gattungen von Erdboden, und in den meisten Gegenden vom Aequator bis ziemlich an die Pole, ganz wohl gerathen würde. Er macht die richtige Anmerkung, daß Lucerne in jedem volkreichen, mit Manufacturen und Fabriken versehenen Lande, Ochsen, Kühe, Kälber, und vielleicht auch Schafe und Wildbret zu mästen, ganz besondere Dienste thue.

„Wenn Rindvieh mit diesem Grase gemästet werde, so könne man es viel eher und auch viel zeitiger im Jahre, zum Verkauf tüchtig machen, als es der Landwirth nach der alten Wirthschaft zu Markte bringen kann; denn es sey etwas leichtes, den Anfang der Fütterung mit Lucerne am

Ende



„ger werden, die Klöße
„ſey, jedes Mahl über
„ger erhalten habe. D
„der von Natur trocken
„zum Wachsthume dure
„ung deſſelben erhalten

Columella ſagt:
mit dem Oct. ſeinen Anfa

In Anſehung der Zeit
nicht genau aus. Es ſche
linge, nachdem zu n dritten
doch ſcheint es beſſer zu ſe
zeitiger mit dem Boden ver
dieſes hernach überaus viel

Die Saat-Zeit dazu,
an, bis zu Johannis (24
die Lucerne auch im Sept.
Saat iſt allemahl ſicherer.
dieſe Saat, wenn gleich n
gen erfolgt; denn alsdann
Tage recht ſchön auf.

Von der Saat-Zeit beme
(ſolo Medica) ſeritur *menſe Mai*
„Wenn der Boden auf dieſe
„wird die

verrichtet; und die erwähnte Quantität des Samens auf einen Acker lehrt auch den Säemann schon, wie dick er denselben auszustreuen habe. Nach geschehener Saat wird der Same nicht mit der ordentlichen Ege, sondern am besten mit einem Rechen, untergeharket. Wenn die Lucerne aufgegangen, und 1½ oder höchstens 2 Z. hoch ist, muß sie auf das sorgfältigste gegätet, und dieses 14 Tage darauf noch einmahl mit gleicher Sorgfalt wiederhohlet werden, weil sonst das Unkraut unfehlbar den Klee erstickt. Diejenigen, die das Gäten verrichten, müssen barfuß gehen, damit sie nicht mit den Schuhen das Land derb, und den Klee gar vertreten.

Von der fernern Behandlung der Lucerne, sagt Plinius, was das Unkraut betrifft: Ad trimatum maris ad solum radi (debet): ita reliquae herbae interent sine ipsius damno, propter altitudinem radicum. Si evicerint herbae; remedium vnicum est aratio saepius vertendo, donec omnes aliae radices intereant; d. i. „Die Lucerne muß, wenn „sie 3 Jahr alt ist, durch Hacken bis auf den Boden nie„dergerissen werden; denn auf solche Weise wird das Un„kraut vertilget, ohne daß die Lucerne dabey Schaden lei„det, wegen der Tiefe ihrer Wurzeln. Wenn aber das „Unkraut die Lucerne immer noch überwächst, so ist das ein„zige Mittel, so oft zu pflügen, bis alle Wurzeln, die von „der Lucerne ausgenommen, vertilget sind.“

So bald der Klee 1 Fuß hoch ist, kann man ihn zum ersten Mahl abmähen; er wird dann bald wieder in die Höhe wachsen, und noch viel größer werden; so oft er aber groß genug ist, so oft wird er auch gemähet. Im ersten Jahre kann dieses drey, auch bey gutem fruchtbaren, d. i. feuchten und warmen Wetter, wohl vier Mahl, geschehen. In den folgenden Jahren aber gibt die Lucerne wenigstens 4, mehrentheils 5, und oft auch 6 volle Aernden. In dem zweyten und den folgenden Jahren kann man sie schon zu Ende des

Aprils mähen. Fängt ſie hin und wieder an zu blühen, ſo iſt es mit der Senſe die höchſte Zeit.

Was das Schneiden betrifft, ſo ſagt Plinius: Secari incipiens florere & quoties refloruit. Id ſexies eodem anno, cum minimum quater; d. i. „Die Lucerne muß „geſchnitten werden, wenn ſie zu blühen anfängt, und ſo „oft als ſie wieder blühet, welches ſechs, wenigſtens vier „Mahl, in Einem Jahre geſchehen kann.“

Iſt die Lucerne im erſten Jahre mit dem Ausgehen gehörig gewartet worden, ſo bedarf es in den folgenden Jahren weiter nichts, als daß man ſie vor den Winter mit Dünger überſprenge, den man, woferne es nicht noch ſtark friert, zu Ende des Märzes, oder zu Anfange des Aprils, wieder wegnimmt. Bey anhaltendem Regen-Wetter im Herbſte, Winter und Frühlinge, bekommt ihr die Aſche und das Begießen mit Miſt-Gauche ſehr wohl; dieſes muß aber, wenn die Jahrszeit friſch, und das Wetter trocken iſt, ſo wie an heißen Tagen, völlig unterbleiben.

Grün verfüttert, iſt die Lucerne ein ſehr milchreiches Futter für Kühe, und ein Maſt-Futter für Ochſen und Gelt-Vieh. Sie kann aber auch, wie der rothe Klee und die Esparſette, zu Heu gemacht werden, ſo oft ſie groß genug erwachſen iſt, daß man ſie auf der Häckſel-Bank ſchneiden kann. Nur muß man ſie nicht in Samen ſchießen laſſen, weil ſonſt die Stöcke geſchwächt werden. Auch darf man ſie in Schwaden nicht zu dürre werden laſſen, weil ſie ſonſt von den Blättern zu viel verliert. Hieraus erſieht man auch, wie man mit ihr auf dem Heu-Boden umzugehen habe.

Was das Schießen in Samen betrifft, ſo ſagt Plinius: In ſemen maturescere prohibenda eſt, quia pabulum vtilius eſt vsque ad trimatum; d. i. „Man muß die „Lucerne nicht in Samen ſchießen laſſen, weil es nützlicher „iſt, ſie zur Fütterung zu gebrauchen, bis ſie 3 Jahr alt „geworden iſt.“

Von

verrichtet; und die erwähnte Quantität des Samens auf einen Acker lehrt auch den Säemann schon, wie dick er denselben auszustreuen habe. Nach geschehener Saat wird der Same nicht mit der ordentlichen Ege, sondern am besten mit einem Rechen, untergeharket. Wenn die Lucerne aufgegangen, und 1½ oder höchstens 2 Z. hoch ist, muß sie auf das sorgfältigste gegätet, und dieses 14 Tage darauf noch einmahl mit gleicher Sorgfalt wiederhohlet werden, weil sonst das Unkraut unfehlbar den Klee erstickt. Diejenigen, die das Gäten verrichten, müssen barfuß gehen, damit sie nicht mit den Schuhen das Land derb, und den Klee gar vertreten.

Von der fernern Behandlung der Lucerne, sagt Plinius, was das Unkraut betrifft: Ad trimatum maris ad solum radi (debet): ita reliquae herbae interent sine ipsius damno, propter altitudinem radicum. Si evicerint herbae; remedium vnicum est aratio saepius vertendo, donec omnes aliae radices intereant; d. i. „Die Lucerne muß, wenn „sie 3 Jahr alt ist, durch Hacken bis auf den Boden nie„dergerissen werden; denn auf solche Weise wird das Un„kraut vertilget, ohne daß die Lucerne dabey Schaden lei„det, wegen der Tiefe ihrer Wurzeln. Wenn aber das „Unkraut die Lucerne immer noch überwächst, so ist das ein„zige Mittel, so oft zu pflügen, bis alle Wurzeln, die von „der Lucerne ausgenommen, vertilget sind.“

So bald der Klee 1 Fuß hoch ist, kann man ihn zum ersten Mahl abmähen; er wird dann bald wieder in die Höhe wachsen, und noch viel größer werden: so oft er aber groß genug ist, so oft wird er auch gemähet. Im ersten Jahre kann dieses drey, auch bey gutem fruchtbaren, d. i. feuchten und warmen Wetter, wohl vier Mahl, geschehen. In den folgenden Jahren aber gibt die Lucerne wenigstens 4, mehrentheils 5, und oft auch 6 volle Aernden. In dem zweyten und den folgenden Jahren kann man sie schon zu Ende des

dem Vortheile gedeihen; so bald er auf die Nässe kommt, sterben seine Wurzeln ab; und eben das veranlasset eine in der Unterfläche befindliche, der Oberfläche entgegen gesetzte Erd-Art. Aus diesem Grunde fordert er, daß die Gattung Erde, die sich auf der Oberfläche befindet, wenigstens 3 bis 4 rheinische Fuß tief eben dieselbe verbleibe, weil er eben so tief, oft noch tiefer, wurzelt. Gesetzt nun, die Oberfläche besteht aus Sand, und in der Tiefe von 2 bis 3 F. folgt Leimen oder Thon; so wird man bald gewahr werden, wenn der Luzern-Klee mit seinen Wurzeln dahin eintreten will. So schön er auch vorher wuchs, wird er jetzt zurück bleiben, gelb werden, oder ganz absterben, wenigstens von geringem Vortheile seyn. Eben so verhält es sich, wenn die Oberfläche aus Leimen oder mit Leimen melirten Boden besteht, und die untere Erd-Lage kreidig oder sandig ist. In beyden Fällen kann er nur 2 bis 3, höchstens 4 Jahre dauern, bey seiner einerley Erd-Art aber 10, 12 bis 15 Jahre stehen; wiewohl es allezeit besser ist, ihn nach dem 7ten, höchstens 9ten Jahre wieder unterzuackern, so bald man einen andern Acker wieder in seine Stelle damit besäet hat. Oder, daß ich mich ganz deutlich ausdrücke: man ackere ihn um, wenn man gewahr wird, daß viele kahle Plätze erscheinen. Denn, wenn auch gleich hin und wieder schöner Klee steht, so würden die kahlen Plätze das Unkraut zu sehr überhand nehmen lassen, dagegen der Acker einem verwilderten, zu lange gelegenen Brach-Acker ähnlich und zu fest werden.

Nach diesem Vortrage ist noch zu erörtern, ob dieser Klee auch im Neubruch-Lande zu erbauen sey? Er gedeihet wohl auch darin, wenn man das Land so bereitet, wie ich weiter unten lehren werde; doch ist es allemahl vortheilhafter, wenn man für diese Klee-Gattung in dergleichen Land zuerst ein Jahr vorher Wurzel-Gewächse oder Kartoffeln pflanzet. Durch

das

das etlichmahlige Behacken, so diese Gewächse erfordern, wird das Unkraut desto mehr vertilget, und das Erdreich dazu vorbereitet werden, daß man in dem folgenden Jahre ihn mit weniger Mühe und Arbeit erbauen kann.

„Ueberdas darf man unter diesen Klee keine Frucht säen, ob es gleich einige Schriftsteller lehren, und selbst die **Beschreibung einiger Futterkräuter**, welche zu Berlin, ohne Jahrzahl, in Fol. heraus gekommen ist, gelehrt und angerathen hat, ihn mit Gerste, Haber, Lein ꝛc. auszusäen. Ich werde unten zeigen, daß bloß die Pimpernelle die einzige Untersaat sey, die ich unter ihm gut gefunden habe; ja daß die Pimpernelle in ihrem sonst unmerklichen Nutzen zwischen der Lucerne gewinne; und dieß wird ihre Zumischung noch mehr anrathen. Ray-Gras hingegen würde bewirken, daß sie schon im 3ten Jahre merklich abnähme.

„In den Gärten sollte man mit ihr alle Rabatten einfassen und besetzen. Man glaubt kaum, wie oft sie da, und gegen dem Buxe ohne Mühe abgeschnitten werden kann. Manche Kuh kann auch davon gesättiget werden, da der Bux hingegen zu nichts taugt.

„Unter allen Futter-Kräutern, verdient die Erziehung des Lucern-Klees den Vorzug, wofern man denjenigen Boden besitzt, der, wie ich erwähnt habe, einerley Erd-Art in der Ober- und Unter-Fläche von 3 bis 4 F. tief darbiethet, oder der im Ermangelungs-Falle dazu bereitet werden kann. Ist das nicht, so muß man von ihm abstehen, weil er, bey einem, auch selbst 2 F. tiefen Boden von einerley Grund kaum 3 Jahre dauern, und dabey doch nicht so viel grünes oder getrocknetes Futter abwerfen würde, als der rothe Klee, den er ausserdem übertrifft. Man kann mir ganz sicher glauben, daß dieses sich auf Erfahrungs-Sätze gründe, die untrüglich sind. Einige in nicht

kleinen Bezirken, von mehr als 100 Meilen hin und wieder gehabte Versuche können zu mehrerer Erläuterung dienen. Ich will daher einige hier anfügen. Als Beyspiele können sie Beweise und Warnungen abgeben, wo und unter was für Bedingnissen er anzupflanzen rathsam sey. Ich habe denselben in etlichen Gegenden im Brandenburgischen, sowohl im Kleinen, als im Großen, und mit Vortheile in der für ihn erforderlichen Erd-Art angesäet; ich habe ihn auch in Schlesien, und zwar in der Mitte desselben, mit eben dem guten Erfolge, sowohl durch das Säen, als auch durch das Verpflanzen in Reihen, beprobet; und lange vorher habe ich ihn im Reiche mit Nutzen angeleget, und anlegen sehen; zur Stall-Fütterung sowohl selbst genutzet, als auch von meinen ökonomischen Freunden dazu nutzen gesehen, und doch wollte er mir an einem andern Orte nicht so gelingen. Ich werde es getreulich anzeigen, daß und wie er mir gerathen oder mißrathen ist. In einem andern Theile Schlesiens, etliche 30 Meilen von jenem entfernt, sollte und wollte ich ihn in einem der fürstl. Anhaltischen Aemter auch anbauen. Der Same war verschrieben, bevor ich auf Ort und Stelle gekommen, und die Erd-Arten untersuchen konnte. Ich fand Erdreich, das in der Ober-Fläche auf 1 bis 2, auch wohl 2½ F. tief, den besten Boden darboth. Ich ließ dieses zu rechter Zeit, wie gewöhnlich, tief und mit zwey in einer Furche hinter einander gehenden Pflügen doppelt ackern, und gehörig düngen, damit nichts versäumet werde, was ihm hinderlich seyn können. In solches Land ward er hierauf gesäet; dem ohngeachtet fing er mir im 3ten Jahre schon an auszugehen. Ich verschrieb neuen Samen, und wiederhohlte den Versuch in verschiedenen Districten von 2 Meilen, er wollte aber nirgends fortkommen, und ich mußte von ihm abstehen, mich aber mit dem Beweise begnügen, daß er mehr, wie 3 Fuß, ei-

nerley Erd-Art verlange. In Gärten hatte ich ihm durch Rajolen dieselbe Tiefe verschafft, und da kam er fort. Das war mir aber kein Geschäft ins Große zu treiben, so sehr ich ihn auch zum Zwischen-Futter in heißen Sommern gewünscht hatte. Beygesäetes Gemenge von Spargel-Grase, Heide-Korne und Haber, mußten beym rothen Klee mir einzig und allein zur Stall-Fütterung Gefährten seyn. Ich erzähle dieses um desto freyer, da mißlungene Versuche die lehrreichsten sind, und für Andere, die dergleichen unternehmen wollen, sichere Regeln abgeben können. Hieraus dürfte zur Genüge erhellen, ob und wo dieser Klee leicht und bald sich mit Nutzen erziehen lasse.

„Neubruch-Land, altes Klee-Land, oder Feld, das 4 und mehr Jahre brach liegen müssen, entsprechen ihm nicht gern; man muß sie daher erst ein Jahr vorher cultiviren, und mit Kartoffeln oder Möhren bepflanzen. Kann das Land vorher 2 Jahre Grapp tragen, so ist es noch besser. Hat man kein anderes Land, als einjährige Brache (*), oder einen guten Neu-Bruch, so muß man solches Land schon im Jun. tief umstürzen, sodann nach 4 Wochen mit einer langzinkigen eisernen Ege gut durchegen. So wie das Egen in die Länge sowohl, als die Quere, überhaupt (wozu aber gute Pferde erforderlich sind,) das beste ist, eben so ist es auch hier sehr gut. Nach weitern 4 Wochen überfährt man dieses Feld reichlich mit Dünger; strohiger trockner Schaf-Dünger ist ihm nicht so zuträglich, wie Rindvieh-Mist; eine Vermengung von beyden, wenn sie unter einander gemenget etliche Wochen zerrotten können, und wenn es auch ein Gemenge von Pferde-Mist wäre, ist ihm gedeihlicher. Ist der Dün-

(*) Vier- oder sechsjährige Brache verwerfe ich schlechterdings für den Kleebau, so wie solche eben auch für den Fruchtbau nicht zu loben ist.

Dünger verbreitet, so ackere man ihn tief unter, und lasse in derselben Furche sogleich einen zweyten Pflug (allenfalls kann es ein tüchtiger Haken-Pflug seyn) folgen, und die Erde wenigstens an 12 bis 15 Z. tief herauf bringen, damit sie über Winter Frost und Regen durchdringe. Oder man lasse in der umgeackerten ersten Furche einige Männer mit starken Spaten folgen, die solche aufgeackerte Furche 10 Z. tiefer aufstechen, und die Erde über das geackerte Land überbreiten. Jene Arbeit mit zwey Pflügen ist minder kostbar; unter beyden hat man nun die Wahl. Dieses Neubruch-Land bleibt so über Winter liegen, und wird im Frühjahre zur weitern Saat so bearbeitet, wie ich vom andern gemeinen und schon vorher cultivirt gewesenen Lande anzeigen werde.

„Besser ist es freylich, man nutzet dieses Neu-Bruch-Land zuerst ein Jahr, wie schon gesagt, zu Kartoffeln ꝛc. und zwar kann es diese ohne Dünger reichlich tragen. Hat man durch den Kartoffelbau ein Feld dazu vorbereitet, so dünget man es im Herbste, so bald als die Kartoffeln ausgehacket worden; ackert, wie oben gesagt, ihn tief und doppeltfurchig unter, und wiederhohlt solches vor dem Froste noch ein Mahl. Im folgenden Frühlinge eget man sowohl dieses benarbte, als auch jenes unbenarbte, aber bereits zum Klee gestürzte Land wieder tüchtig, und beackert es nach 14 Tagen oder 3 Wochen nochmahls. So bleibt nun alles liegen, bis 14 Tage vor der Zeit, da der Same gesäet werden soll; und diese Zeit ist in wärmen Gegenden die Hälfte des Aprils bis zur Hälfte des May-Monathes; in kältern hingegen von Anfange bis zu Ende des Mayen. Ich rathe jedoch an, was ich jederzeit selbst gern befolge: ihn lieber 14 Tage später zu säen, und eher das Land noch ein Mahl mehr zu ackern, damit das Unkraut, des Lucerns Todfeind, gänzlich zerstöret werde. Man habe nun ein oder das

andere gethan, so eget man das Land 14 Tage vor der Saat des Klees noch ein Mahl recht gut durch, und das in die Kreutz und Quere. Den Tag vor der Saat ackere man dasselbe in 18 bis 24furchige Beete, aber die Furchen schmahl, und 6 Z. tief. Da das Land zum Lucern absolut keiner Nässe ausgesetzt seyn darf, folglich hierzu trocken liegende Aecker erwählet werden, so würden schmählere, besonders sechsfurchige Beete hier ganz unnütz angebracht seyn; aber gute, und in gehöriger Menge nach der Länge des Landes angebrachte Wasser-Furchen sind weit dem Zwecke entsprechender, als die zu vielen und Land raubenden Beet-Furchen.

„Nun wird bey windstillem Wetter zum Säen geschritten; denn regnichtes und stürmisches Wetter macht eine üble Saat. Vor dem Ausstreuen des Samens eget man den Acker zuerst rauh weg; nachher säet man den Samen mit drey Fingern aus, und zwar also: der Daumen muß über den Samen auf den zwey andern Fingern hinweg gedrückt, und gleichsam gewirbelt werden, indem die zwey Finger ihn auswerfen. Damit der Same nicht ungleich und zu dünn, ohne daß die Gänge jedes Saat-Wurfes zusammen reichen können, so muß alle 3 Schritte eine neue Satel, oder ein neuer Gang (niemahls breiter,) vorgenommen werden. Nach vollbrachter Saat eget man den Samen mit einer leichten Ege, und etwas schnell, ein. Am besten ist es, so wie für alle Samen, daß die Pferde es im Trabe verrichten. Ist das Land schollig, so ebnet man es mit einer Stachyl-Walze ein; ist es leichter Erd-Art, so ist jede andre leichte Walze dazu gut. Fehlt alles dieses, so drehet man die Ege um, beschwert sie mit Steinen, und überfährt den Acker damit. Da aber dieses den Samen ungleich schleppet, so ist eine Walze vorzuziehen. Alsdann zieht man die Wasser-Furchen, und deren lieber eine

zu

zu viel, als eine zu wenig, jedoch am rechten Platze. Vom Samen ſelbſt ſetze ich zum voraus, daß er neu und friſch ſey; und dann brauchet man auf einem Morgen von 180 Quadrat-Ruthen 8 bis 10 Pfund berlin. Gewichts, oder 9¼ bis 11½ Pfund ſchleſ. Gewichts. Ich habe dieſes aus Erfahrung im Brandenburgiſchen und Schleſiſchen als das zuträglichſte Maß befunden. Zu viel deſſen zu nehmen, wäre nicht ökonomiſch, und zu wenig würde ſchädlich ſeyn. Zuträglicher iſt es zu doch, ihn eher zu dick, als zu dünn, zu ſäen; weil es beſſer, der dicke Klee vertilgt das Unkraut, als daß das Unkraut den Klee erſticke.

Die weitere Beſtellungs-Arten beſtehen in folgenden. So bald der Luzern-Same aufgegangen, und Spannen lang gewachſen iſt, auch das Unkraut überhand nehmen will, ſo pflegen ihn Einige zu gäten; das iſt aber eine gar zu koſtſpielige Arbeit bey der Wirthſchaft im Großen; ich habe daher lange dieſem verdrießlichen Geſchäfte auszuweichen nachgedacht, und ein Mittel gefunden, welches mir das Gäten unnöthig gemacht hat. Es beſteht ſolches darin: Wenn der Klee geſchoſſet, und das Unkraut ihn überwachſen will, ſo hauet man ihn das erſte Mahl zeitig, bloß des Unkrautes wegen, welches meiſtens in wilder Melde beſteht; ab, und wiederhohlt denſelbe, ſo bald dieſes zum zweyten Mahl nachfolget, wenn auch der Klee nur noch klein wäre. Jetzt wird nach dieſem Abhauen das Unkraut langſamer wachſen, der Klee aber deſto ſchneller, und es bemeiſtern. Da nun das Unkraut durch dieſes öftere Umhauen zeitig, bevor es zum Samen gelangen können, hinweg genommen, ſo wird ſeine Wurzel abſterben, und kein Nachwuchs vom Samen Statt finden. Der im Unkraute befindliche zarte Klee wird mit Häckſel vermenget und gefüttert. Den folgenden Klee, wie er dann im erſten Jahre ſchon zum dritten Mahl gehauen werden kann, läßt man etwas ſtärker wer-

werden, so kann man ihn ohne Häckſel verfüttern. Durch dieſe Methode, welches gewiß die ungekünſtelte iſt, hat man ſchon genug gewonnen, beſonders da man ſich bisher an Orten, wo Menſchen-Hände zum Gäten fehlen, geſcheuet, ihn wegen dieſer überhäuften Arbeit anzupflanzen.

„Viele, die Sand-Aecker mit ihm binden wollen, ſäen dieſen Samen nicht in den Sand, weil gar viele Pflanzen von der Sonne im Anfange verbrennen und verderben, wenn nicht bald Regen erfolgt. Sie haben daher ein Ländchen bloß angeſäet, und nach häufigem Regen ſolche in den Sand-Acker verpflanzt, und zwar in Reihen, dem Pfluge nach, ſo wie man das Kraut ſetzt, damit er behackt werden konnte. Noch Andere ackerten je zwey Furchen zuſammen, ſäeten den Samen ſo in Reihen darauf, und behackten ihn in der Folge. Ich habe es auch verſucht, und thunlich befunden. Ein Jeder wähle nun das aus, was ihm beliebt, und für ſeine Gegend am dienlichſten ſcheint.

„Ich habe oben erwähnt, daß man dieſen Samen nicht unter andere Früchte, ob es gleich manche angerathen hätten, ausſäen dürfe und ſolle, das einzige für ihn zuträgliche wäre die Pimpernelle. Will man nun ſolche mit unterſäen, ſo mißt man mit einem Maße ein Sechstel des Klee-Samens von den auf 1 Morgen geforderten 7 bis 8 Pfunden weg, und ſäet dagegen dieſes Maß doppelt, mit Pimpernell-Samen angefüllt, unter den Klee aus. Hier darf ich nicht nach dem Gewichte ab- und zunehmen; denn ſtatt 1 Pfund hinweg genommenen Klee-Samens 1 Pf. Pimpernell-Samen hin zu legen, würde höchſte Ungleichheit veranlaſſen, weil der Pimpernell-Same ſehr leicht, obwohl größer, wie jener, im Samen iſt. Die Pimpernelle wird niemahls dieſem Klee ſchaden; ſie ſchießt zwiſchen ihm in die Höhe, und liefert ein gutes Menge-

Fut-

Futter. Hier ist selbst der Nutzen von der Pimpernelle zu beziehen, den sie ausserdem nicht liefern würde.

„Von Bereitung dieses Klees zu Heu noch etwas zu sagen, wird wohl das einzige übrig seyn. Hat man von diesem Klee zu viel, so daß er hart werden mögte, dann hauet man ihn, wenn er zu blühen beginnt, in Schwaden; diese verbreitet man, wo er zu dick liegt, alsobald, und rührt den Klee nicht weiter mehr an, als bis er trocken ist, da man ihn denn gegen Abend, wenn es anfängt zu thauen, auf Haufen zusammen bringt, und des Morgens früh einführt. Seine Blätter fallen zwar nicht so leicht ab, als wie die des rothen Klees; allein, diese Vorsicht nützet dennoch. Nur im Falle als es regnen sollte, während daß er auf der ersten Seite nicht vollends abtrockyen können, wendet man ihn früh morgens um, so fallen auch dann wenig Blätter ab."

Es wird hoffentlich nicht überflüssig seyn, auch noch dasjenige, was der würdige **Germershausen** (*) von der Lucerne sagt, anzuführen.

„Ueber keinem Futter-Kraute sind die Schriftsteller und Landwirthe mehr getheilt, als über diesem und der Esparsette. Die Einwendungen aber wieder dieses Futter-Kraut sind kürzlich diese: Es erfordere einen guten Boden, und im sandigen Grunde gehen die Stöcke aus, wenn man ihnen nicht durch öfteres Wässern zu Hülfe komme. Durch die verflochtenen Wurzeln werde das Erdreich dergestalt gebunden, daß es sich beynahe weder durch den Pflug, noch durch die Hacke, umwenden lasse. Es liefere die Pflanze zwar ein häufiges, aber blähendes Futter, wodurch sonderlich das Rindvieh Schaden leide. Es könne auch nicht anders, denn schwer, zu Heu getrocknet werden. Aus diesen und andern Ursachen nun hat es besonders Hr.

(*) Im 3 B. des Hausvaters, S. 271, fgg.

Hr. v. Haller nebst mehrern Schriftstellern wiederrathen, so wie mir auch bekannt ist, daß viele Landwirthe davon wieder abgegangen sind, und sich für den rothen Klee einzig und allein erklärt haben.

„Dagegen hat dieses Futter-Kraut neuerlich an an dem mehrmahls gelobten Hrn. Schubart einen starken Vertheidiger und zugleich Anbauer gefunden. Denn er schreibt von selbigem also: Die Lucerne wächst schon zu Ende des Märzes und Anfange des Aprils, also zu einer Zeit, weny sonst noch nicht das geringste grüne Futter vorhanden ist, und dauert so lange im Felde, als nicht starke Fröste kommen, bis dahin man sie folglich auch grün verfüttern kann. Man kann sie alle 3 bis 4 Wochen ein Mahl, und folglich, wenn es nur einiger Maßen gut wittert, jährlich 5 bis 6 Mahl abmähen lassen. Die Ergiebigkeit der Lucerne ist also, wo nicht 3, doch zuverlässig 2 Mahl so groß, als die Ergiebigkeit des gemeinen rothen Klees. Sie verdient in allem Betracht, grün zu verfüttern, den Vorzug, indem sie weit süßer und nahrhafter, als der vorgedachte Klee, ist; und die Milch, welche die Kühe darnach geben, ist weit fetter. Es ist auch, wenn sie noch jung ist, nicht so viel Gefahr beym Verfüttern; und endlich ist sie für jeden Landwirth ein wahres Kleinod. Auf einem meiner Güter, wo ich bauete, hatte ich den Pferdestand um die Hälfte verstärket; im April war Haber und Heu alle. Da die Wege im April äusserst schlecht waren, konnte ich kaum so viel Futter als nöthig war, von einem andern entlegenen Gute zuschleppen, ohne die von vielen Bau-Fuhren schon abgematteten Pferde noch mehr und bis aufs äusserste abzumatten. Zum Glück hatte ich daselbst 4 Jahre vorher gegen 5 Morgen schlechtes steiniges Land zur Probe mit Lucerne besäen lassen, welche vortrefflich heran wuchs. Ich ließ sie ganz jung abmähen, auf einer Futter-Bank Zoll lang schneiden, und mit viel Häcksel vermischt den abgetriebenen Pferden, ohne ihnen weiter etwas reichen zu lassen, so lange füttern, bis dieselbe so groß war, daß sie ihnen in die Raufe konnte gesteckt werden. Zusehends kamen die Pferde wieder zu Kräften, und wurden dick, ob sie schon dabey Mist- und Bau-Fuhren verrichten mußten. Ich entschloß mich, ihnen dieses Futter-Kraut ohne ein

Aprils mähen. Fängt ſie hin und wieder an zu blühen, ſo iſt es mit der Senſe die höchſte Zeit.

Was das Schneiden betrifft, ſo ſagt Plinius: Secatur incipiens florere & quoties refloruit. Id ſexies evenit per annos, cum minimum quater; d. i. „Die Lucerne muß „geſchnitten werden, wenn ſie zu blühen anfängt, und ſo „oft als ſie wieder blühet, welches ſechs, wenigſtens vier „Mahl, in Einem Jahre geſchehen kann.“

Iſt die Lucerne im erſten Jahre mit dem Ausgäten gehörig gewartet worden, ſo bedarf es in den folgenden Jahren weiter nichts, als daß man ſie vor den Winter mit Dünger überſprenge, den man, woferne es nicht noch ſtark friert, zu Ende des Märzes, oder zu Anfange des Aprils, wieder wegnimmt. Bey anhaltendem Regen-Wetter im Herbſte, Winter und Frühlinge, bekommt ihr die Aſche und das Begießen mit Miſt-Gauche ſehr wohl; dieſes muß aber, wenn die Jahrszeit friſch, und das Wetter trocken iſt, ſo wie an heißen Tagen, völlig unterbleiben.

Grün verfüttert, iſt die Lucerne ein ſehr milchreiches Futter für Kühe, und ein Maſt-Futter für Ochſen und Gelt-Vieh. Sie kann aber auch, wie der rothe Klee und die Esparſette, zu Heu gemacht werden, ſo oft ſie groß genug erwachſen iſt, daß man ſie auf der Häckſel-Bank ſchneiden kann. Nur muß man ſie nicht in Samen ſchießen laſſen, weil ſonſt die Stöcke geſchwächt werden. Auch darf man ſie in Schwaden nicht zu dürre werden laſſen, weil ſie ſonſt von den Blättern zu viel verliert. Hieraus erſieht man auch, wie man mit ihr auf dem Heu-Boden umzugehen habe.

Was das Schießen in Samen betrifft, ſo ſagt Plinius: In semen maturescere prohibenda est, quia pabulum vtilius est vsque ad trimatum; d. i. „Man muß die „Lucerne nicht in Samen ſchießen laſſen, weil es nützlicher „iſt, ſie zur Fütterung zu gebrauchen, bis ſie 3 Jahr alt „geworden iſt.“

Von

Von der bequemsten Zeit, die Lucerne zu gebrauchen, sagt Plinius: Ex viridis vtilior est: arescit furculose, ac postremo in pulverem inutilem extenuatur; d. i. „Die „Lucerne ist am nützlichsten, wenn sie grün ist; denn sie „verwelkt von Knoten zu Knoten, und vertrocknet zu einem „unnützen Staube.“

Bey guter Witterung thut die Lucerne 6 und mehr Jahre auf einerley Felde vollkommen gut; im 7ten Jahre aber, wenn sie dünner steht, muß man sie an einen andern Ort säen, und das Feld allmählich eingehen lassen. Man wird auch alsdann noch ein Par ziemlich gute Aerndten von dem alten Stücke bey dem neuen haben, und solchemnach in diesem Jahre wenigstens eben so viel Lucerne erbauen, als man vorher von dem Stücke hatte, da es noch in seiner besten Kraft war. Das ausgehende Lucerne-Land hat alsdann, wie jedes umgestürzte Klee-Land, die Kraft eines Neu-Bruches zum Getreide-Bau: doch ist nöthig, allen Klee daraus zu vertilgen, ehe man es mit Getreide wieder besäet. Wer es 1 oder 1½ F. tief umgraben, die Erde recht umwenden, und alle Klee-Wurzeln heraus bringen, hernach aber den Acker düngen und mit Winter-Getreide besäen kann, wird eine bewundernswürdige Fruchtbarkeit verspüren. Wem dieses aber zu mühsam ist, der ackere das Klee-Stück, nachdem er es im 7ten Jahre, oder, wenn es auszugehen anfängt, noch etwann zwey, oder höchstens drey Mahl genutzt hat, ungesäumt mit dem Pfluge so tief, als möglich, um, pflüge es 4 Wochen darauf noch ein Mahl, und zwar, wofern es seyn kann, überzwerch, und dann das dritte Mahl zur Saat. Am sichersten geht man, wenn man das Klee-Stück zu Ende des sechsten Jahres bricht, es bald im Frühlinge des siebenten noch ein Mahl umackert, und mit Sommerung, als: Weiß-Kohle, Kartoffeln, und andern Früchten, die mit der Hacke bearbeitet werden, be-

dem Vortheile gedeihen; ſo bald er auf die Näſſe kommt, ſterben ſeine Wurzeln ab; und eben das veranlaſſet eine in der Unterfläche befindliche, der Oberfläche entgegen geſetzte Erd-Art. Aus dieſem Grunde fordert er, daß die Gattung Erde, die ſich auf der Oberfläche befindet, wenigſtens 3 bis 4 rheiniſche Fuß tief eben dieſelbe verbleibe, weil er eben ſo tief, oft noch tiefer, wurzelt. Geſetzt nun, die Oberfläche beſteht aus Sand, und in der Tiefe von 2 bis 3 F. folgt Leimen oder Thon: ſo wird man bald gewahr werden, wenn der Luzern-Klee mit ſeinen Wurzeln dahin eintreten will. So ſchön er auch vorher wuchs, wird er jetzt zurück bleiben, gelb werden, oder ganz abſterben, wenigſtens von geringem Vortheile ſeyn. Eben ſo verhält es ſich, wenn die Oberfläche aus Leimen oder mit Leimen melirten Boden beſteht, und die untere Erd-Lage kreidig oder ſandig iſt. In beyden Fällen kann er nur 2 bis 3, höchſtens 4 Jahre dauern, bey ſeiner einerley Erd-Art aber 10, 12 bis 15 Jahre ſtehen; wiewohl es allezeit beſſer iſt, ihn nach dem 7ten, höchſtens 9ten Jahre wieder unterzuackern, ſo bald man einen andern Acker wieder in ſeine Stelle damit beſäet hat. Oder, daß ich mich ganz deutlich ausdrücke: man ackere ihn um, wenn man gewahr wird, daß viele kahle Plätze erſcheinen. Denn, wenn auch gleich hin und wieder ſchöner Klee ſteht, ſo würden die kahlen Plätze das Unkraut zu ſehr überhand nehmen laſſen, dagegen der Acker einem verwilderten, zu lange gelegenen Brach-Acker ähnlich und zu feſt werden.

Nach dieſem Vortrage iſt noch zu erörtern, ob dieſer Klee auch im Neubruch-Lande zu erbauen ſey? Er gedeihet wohl auch darin, wenn man das Land ſo bereitet, wie ich weiter unten lehren werde; doch iſt es allemahl vortheilhafter, wenn man für dieſe Klee-Gattung in dergleichen Land zuerſt ein Jahr vorher Wurzel-Gewächſe oder Kartoffeln pflanzet. Durch

das

das etlichmahlige Behacken, so diese Gewächse erfordern, wird das Unkraut desto mehr vertilget, und das Erdreich dazu vorbereitet werden, daß man in dem folgenden Jahre ihn mit weniger Mühe und Arbeit erbauen kann.

„Ueberdas darf man unter diesen Klee keine Frucht säen, ob es gleich einige Schriftsteller lehren, und selbst die **Beschreibung einiger Futterkräuter**, welche zu Berlin, ohne Jahrzahl, in Fol. heraus gekommen ist, gelehrt und angerathen hat, ihn mit Gerste, Haber, Lein ꝛc. auszusäen. Ich werde unten zeigen, daß bloß die Pimpernelle die einzige Untersaat sey, die ich unter ihm gut gefunden habe; ja daß die Pimpernelle in ihrem sonst unmerklichen Nutzen zwischen der Lucerne gewinne; und dieß wird ihre Zumischung noch mehr anrathen. Ray-Gras hingegen würde bewirken, daß sie schon im 3ten Jahre merklich abnähme.

„In den Gärten sollte man mit ihr alle Rabatten einfassen und besetzen. Man glaubt kaum, wie oft sie da, und gegen dem Bure ohne Mühe abgeschnitten werden kann. Manche Kuh kann auch davon gesättiget werden, da der Bur hingegen zu nichts taugt.

„Unter allen Futter-Kräutern, verdient die Erziehung des Lucern-Klees den Vorzug, wofern man denjenigen Boden besitzt, der, wie ich erwähnt habe, einerley Erd-Art in der Ober- und Unter-Fläche von 3 bis 4 F. tief darbiethet, oder der im Ermangelungs-Falle dazu bereitet werden kann. Ist das nicht, so muß man von ihm abstehen, weil er, bey einem, auch selbst 2 F. tiefen Boden von einerley Grund kaum 3 Jahre dauern, und dabey doch nicht so viel grünes oder getrocknetes Futter abwerfen würde, als der rothe Klee, den er ausserdem übertrifft. Man kann mir ganz sicher glauben, daß dieses sich auf Erfahrungs-Sätze gründe, die untrüglich sind. Einige in nicht

kleinen Bezirken, von mehr als 100 Meilen hin und wieder gehabte Versuche können zu mehrerer Erläuterung dienen. Ich will daher einige hier anfügen. Beyspiele können sie Beweise und Warnungen geben, wo und unter was für Bedingnissen er anzusäen rathsam sey. Ich habe denselben in etlichen Gegenden im Brandenburgischen, sowohl im Kleinen als im Großen, und mit Vortheile in der für ihn erforderlichen Erd-Art angesäet; ich habe ihn auch in Schlesien, und zwar in der Mitte desselben, mit eben dem guten Erfolge, sowohl durch das Säen, als auch durch das Verpflanzen in Reihen, beprobet; und lange vorher habe ich ihn im Reiche mit Nutzen angebauet, und anlegen sehen; zur Stall-Fütterung sowohl selbst genutzet, als auch von meinen ökonomische Freunden dazu nutzen gesehen, und doch wollte er mir an einem andern Orte nicht so gelingen. Ich werde getreulich anzeigen, daß und wie er mir gerathen oder mißrathen ist. In einem andern Theile Schlesiens, etliche 30 Meilen von jenem entfernt, sollte und wollte ich ihn in einem der fürstl. Anhaltischen Aemter auch anbauen. Der Same war verschrieben, bevor ich auf Ort und Stelle gekommen, und die Erd-Arten untersuchen konnte. Ich fand Erdreich, das in der Ober-Fläche auf 1 bis 2, auch wohl 2½ F. tief, den besten Boden darboth. Ich ließ dieses zu rechter Zeit, wie gewöhnlich, tief und mit zwey in einer Furche hinter einander gehenden Pflügen doppelt ackern, und gehörig düngen, damit nichts versäumet werde, was ihm hinderlich seyn können. In solches Land ward er hierauf gesäet; dem ohngeachtet fing er mir im 3ten Jahre schon an auszugehen. Ich verschrieb neuen Samen, und wiederhohlte den Versuch in verschiedenen Districten von 2 Meilen, er wollte aber nirgends fortkommen, und ich mußte von ihm abstehen, mich aber mit dem Beweise begnügen, daß er mehr, wie 3 Fuß, ei-

nerley Erd-Art verlange. In Gärten hatte ich ihm durch Rajolen dieselbe Tiefe verschafft, und da kam er fort. Das war mir aber kein Geschäft ins Große zu treiben, so sehr ich ihn auch zum Zwischen-Futter in heißen Sommern gewünscht hatte. Beygesäetes Gemenge von Spargel-Grase, Heide-Korne und Haber, mußten beym rothen Klee mir einzig und allein zur Stall-Fütterung Gefährten seyn. Ich erzähle dieses um desto freyer, da mißlungene Versuche die lehrreichsten sind, und für Andere, die dergleichen unternehmen wollen, sichere Regeln abgeben können. Hieraus dürfte zur Genüge erhellen, ob und wo dieser Klee leicht und bald sich mit Nutzen erziehen lasse.

„Neubruch-Land, altes Klee-Land, oder Feld, das 4 und mehr Jahre brach liegen müssen, entsprechen ihm nicht gern; man muß sie daher erst ein Jahr vorher cultiviren, und mit Kartoffeln oder Möhren bepflanzen. Kann das Land vorher 2 Jahre Gravp tragen, so ist es noch besser. Hat man kein anderes Land, als einjährige Brache (*), oder einen guten Neu-Bruch, so muß man solches Land schon im Jun. tief umstürzen, sodann nach 4 Wochen mit einer langzinkigen eisernen Ege gut durchegen. So wie das Egen in die Länge sowohl, als die Quere, überhaupt (wozu aber gute Pferde erforderlich sind,) das beste ist, eben so ist es auch hier sehr gut. Nach weitern 4 Wochen überfährt man dieses Feld reichlich mit Dünger; strohiger trockner Schaf-Dünger ist ihm nicht so zuträglich, wie Rindvieh-Mist; eine Vermengung von beyden, wenn sie unter einander gemenget etliche Wochen zerrotten können, und wenn es auch ein Gemenge von Pferde-Mist wäre, ist ihm gedeihlicher. Ist der Dün-

(*) Vier- oder sechsjährige Brache verwerfe ich schlechterdings für den Kleebau, so wie solche eben auch für den Fruchtbau nicht zu loben ist.

)ere gethan, so eget man das Land 14 Tage vor der
iat des Klees noch ein Mahl recht gut durch, und
in die Kreutz und Quere. Den Tag vor der Saat
ere man dasselbe in 18 bis 24furchige Beete, aber
Furchen schmahl, und 6 Z. tief. Da das Land
n Lucern absolut keiner Nässe ausgesetzt seyn darf,
ılich hierzu trocken liegende Aecker erwählet werden,
würden schmählere, besonders sechsfurchige Beete
r ganz unnütz angebracht seyn; aber gute, und in
öriger Menge nach der Länge des Landes angebrach-
Wasser-Furchen sind weit dem Zwecke entsprechen-
, als die zu vielen und Land raubenden Beet-
chen.

„Nun wird bey windstillem Wetter zum Säen ge-
itten; denn regnichtes und stürmisches Wetter
ht eine üble Saat. Vor dem Ausstreuen des Sa-
ns eget man den Acker zuerst rauh weg; nachher
t man den Samen mit drey Fingern aus, und zwar
: der Daumen muß über den Samen auf den
y andern Fingern hinweg gedrückt, und gleichsam
irbelt werden, indem die zwey Finger ihn auswer-
. Damit der Same nicht ungleich und zu dünn,
e daß die Gänge jedes Saat-Wurfes zusammen
hen können, so muß alle 3 Schritte eine neue Sa-
oder ein neuer Gang (niemahls breiter,) vorge-
nmen werden. Nach vollbrachter Saat eget man
Samen mit einer leichten Ege, und etwas schnell,
. Am besten ist es, so wie für alle Samen, daß
Pferde es im Trabe verrichten. Ist das Land
llig, so ebnet man es mit einer Stachel-Walze ein;
s leichter Erd-Art, so ist jede andre leichte Walze
u gut. Fehlt alles dieses, so drehet man die Ege
, beschwert sie mit Steinen, und überfähret den
er damit. Da aber dieses den Samen ungleich
eppet, so ist eine Walze vorzuziehen. Alsdann
t man die Wasser-Furchen, und deren lieber eine

zu viel, als eine zu wenig, jedoch am rechten Platz. Vom Samen selbst setze ich zum voraus, daß er rein und frisch sey; und dann braucht man auf einen Morgen von 180 Quadrat-Ruthen 8 bis 10 Pfund berlin. Gewichts, oder $9\frac{1}{4}$ bis $11\frac{1}{2}$ Pfund schles. Gewichts. Ich habe dieses aus Erfahrung im Brandenburgischen und Schlesischen als das zuträglichste Maß befunden. Zu viel dessen zu nehmen, wäre nicht ökonomisch, und zu wenig würde schädlich seyn. Zuträglicher ist es noch doch, ihn eher zu dick, als zu dünn, zu säen; weil es besser, der dicke Klee vertilgt das Unkraut, als daß das Unkraut den Klee ersticke.

„Die weitere Bestellungs-Arten bestehen in folgenden. So bald der Lucern-Same aufgegangen, und Spannen lang gewachsen ist, auch das Unkraut überhand nehmen will, so pflegen ihn Einige zu gäten; das ist aber eine gar zu kostspielige Arbeit bey der Wirthschaft im Großen; ich habe daher lange diesen verdrießlichen Geschäfte auszuweichen nachgedacht, und ein Mittel gefunden, welches mir das Gäten ganz unöthig gemacht hat. Es besteht solches darin: Wenn der Klee geschosset, und das Unkraut ihn überwachsen will, so hauet man ihn das erste Mahl zeitig, bloß des Unkrautes wegen, welches meistens in wilder Melden besteht, ab, und wiederhohlt dasselbe, so bald dieses zum zweyten Mahl nachfolgt, wenn auch der Klee noch klein wäre. Jetzt wird nach diesem Abhauen das Unkraut langsamer wachsen, der Klee aber desto schneller, und es bemeistern. Da nun das Unkraut durch dieses öftere Umhauen zeitig, bevor es zum Samen gelangen können, hinweg gekommen, so wird seine Wurzel absterben, und kein Nachwuchs vom Samen Statt finden. Der im Unkraute befindliche zarte Klee wird mit Häcksel vermenget und gefüttert. Den folgenden Klee, wie er dann im ersten Jahre schon zum dritten Mahl gehauen werden kann, lässet man etwas stärker wer-

werden, so kann man ihn ohne Häcksel verfüttern. Durch diese Methode, welches gewiß die ungekünstelte ist, hat man schon genug gewonnen, besonders da man sich bisher an Orten, wo Menschen-Hände zum Gäten fehlen, gescheuet, ihn wegen dieser überhäuften Arbeit anzupflanzen.

„Viele, die Sand-Aecker mit ihm binden wollen, säen diesen Samen nicht in den Sand, weil gar viele Pflanzen von der Sonne im Anfange verbrennen und verderben, wenn nicht bald Regen erfolgt. Sie haben daher ein Ländchen bloß angesäet, und nach häufigem Regen solche in den Sand-Acker verpflanzt, und zwar in Reihen, dem Pfluge nach, so wie man das Kraut setzt, damit er behackt werden konnte. Noch Andere ackerten je zwey Furchen zusammen, säeten den Samen so in Reihen darauf, und behackten ihn in der Folge. Ich habe es auch versucht, und thunlich befunden. Ein Jeder wähle nun daraus, was ihm beliebt, und für seine Gegend am dienlichsten scheint.

„Ich habe oben erwähnt, daß man diesen Samen nicht unter andere Früchte, ob es gleich manche angerathen hätten, aussäen dürfe und solle, das einzige für ihn zuträgliche wäre die Pimpernelle. Will man nun solche mit untersäen, so mißt man mit einem Maße ein Sechstel des Klee-Samens von den auf 1 Morgen geforderten 7 bis 8 Pfunden weg, und säet dagegen dieses Maß doppelt, mit Pimpernell-Samen angefüllt, unter den Klee aus. Hier darf ich nicht nach dem Gewichte ab- und zunehmen; denn statt 1 Pfund hinweg genommenen Klee-Samens 1 Pf. Pimpernell-Samen hin zu legen, würde höchste Ungleichheit veranlassen, weil der Pimpernell-Same sehr leicht, obwohl größer, wie jener, im Samen ist. Die Pimpernelle wird niemahls diesem Klee schaden; sie schießt zwischen ihm in die Höhe, und liefert ein gutes Menge-

Fut-

Futter. Hier ist selbst der Nutzen von der Pimpernelle zu beziehen, den sie ausserdem nicht liefern würde.

„Von Bereitung dieses Klees zu Heu noch etwas zu sagen, wird wohl das einzige übrig seyn. Hat man von diesem Klee zu viel, so daß er hart werden mögte, dann hauet man ihn, wenn er zu blühen beginnt, in Schwaden; diese verbreitet man, wo er zu dick liegt, alsobald, und rührt den Klee nicht weiter mehr an, als bis er trocken ist, da man ihn denn gegen Abend, wenn es anfängt zu thauen, auf Haufen zusammen bringt, und des Morgens früh einführt. Seine Blätter fallen zwar nicht so leicht ab, als wie die des rothen Klees; allein, diese Vorsicht nützet dennoch. Nur im Falle als es regnen sollte, während daß er auf der ersten Seite nicht vollends abtrockyen können, wendet man ihn früh morgens um, so fallen auch dann wenig Blätter ab."

Es wird hoffentlich nicht überflüssig seyn, auch noch dasjenige, was der würdige Germershausen (*) von der Lucerne sagt, anzuführen.

„Ueber keinem Futter-Kraute sind die Schriftsteller und Landwirthe mehr getheilt, als über diesem und der Esparsette. Die Einwendungen aber wieder dieses Futter-Kraut sind kürzlich diese: Es erfordere einen guten Boden, und im sandigen Grunde gehen die Stöcke aus, wenn man ihnen nicht durch öfteres Wässern zu Hülfe komme. Durch die verflochtenen Wurzeln werde das Erdreich dergestalt gebunden, daß es sich beynahe weder durch den Pflug, noch durch die Hacke, umwenden lasse. Es liefere die Pflanze zwar ein häufiges, aber blähendes Futter, wodurch sonderlich das Rindvieh Schaden leide. Es könne auch nicht anders, denn schwer, zu Heu getrocknet werden. Aus diesen und andern Ursachen nun hat es besonders Hr.

(*) Im 3 B. des Hausvaters, S. 271, sqq.

Hr. v. Haller nebst mehrern Schriftstellern wiederrathen, so wie mir auch bekannt ist, daß viele Landwirthe davon wieder abgegangen sind, und sich für den rothen Klee einzig und allein erklärt haben.

„Dagegen hat dieses Futter-Kraut neuerlich an an dem mehrmahls gelobten Hrn. Schubart einen starken Vertheidiger und zugleich Anbauer gefunden. Denn er schreibt von selbigem also: „Die Lucerne wächst schon zu Ende des Märzes und Anfange des Aprils, also zu einer Zeit, wenn sonst noch nicht das geringste grüne Futter vorhanden ist, und dauert so lange im Felde, als nicht starke Fröste kommen, bis dahin man sie folglich auch grün verfüttern kann. Man kann sie alle 3 bis 4 Wochen ein Mahl, und folglich, wenn es nur einiger Maßen gut wittert, jährlich 5 bis 6 Mahl abmähen lassen. Die Ergiebigkeit der Lucerne ist also, wo nicht 3, doch zuverlässig 2 Mahl so groß, als die Ergiebigkeit des gemeinen rothen Klees. Sie verdient in allem Betracht, grün zu verfüttern, den Vorzug, indem sie weit süßer und nahrhafter, als der vorgedachte Klee, ist; und die Milch, welche die Kühe darnach geben, ist weit fetter. Es ist auch, wenn sie noch jung ist, nicht so viel Gefahr beym Verfüttern; und endlich ist sie für jeden Landwirth ein wahres Kleinod. Auf einem meiner Güter, wo ich bauete, hatte ich den Pferdestand um die Hälfte verstärket; im April war Haber und Heu alle. Da die Wege im April äusserst schlecht waren, konnte ich kaum so viel Futter als nöthig war, von einem andern entlegenen Gute zuschleppen, ohne die von vielen Bau-Fuhren schon abgematteten Pferde noch mehr und bis aufs äusserste abzumatten. Zum Glück hatte ich daselbst 4 Jahre vorher gegen 5 Morgen schlechtes steiniges Land zur Probe mit Lucerne besäen lassen, welche vortrefflich heran wuchs. Ich ließ sie ganz jung abmähen, auf einer Futter-Bank Zoll lang schneiden, und mit viel Häckfel vermischt den abgetriebenen Pferden, ohne ihnen weiter etwas reichen zu lassen, so lange füttern, bis dieselbe so groß war, daß sie ihnen in die Raufe konnte gesteckt werden. Zusehends kamen die Pferde wieder zu Kräften, und wurden dick, ob sie schon dabey Mist- und Bau-Fuhren verrichten mußten. Ich entschloß mich, ihnen dieses Futter-Kraut ohne ein

Korn Haber fortfüttern zu laſſen; und vom Apr. bis zu Ende Aug. fütterte ich 11 Stück Pferde von dem Ertrage eines Lucern-Feldes, das noch nicht 5 Morgen hielt, vollkommen aus. Wie viel Morgen Feld gehörten dazu, um den Haber für 11 Pferde auf 5 Monathe zu erbauen! — Im Frühjahre 1783 hatte ich gegen 5 Morgen Lucerne-Feld, worunter ungefähr ⅓ mit Eſparſette, etliche 30 Stück Rind-Vieh, ohne Stroh, und 10 Acker-Pferde, ohne ein Korn Haber oder Gerſte, oder dergl., auch Schweine, Gänſe und 100 Stück Schafe, vom 17 Apr. bis zum 11 Jun. füttern laſſen, ohne daß er noch zum zweyten Mahl abgeſchnitten werden dürfen". Dieſen Verſuch hatte er ausdrücklich unternommen, um zu ſehen, wie lange Zeit er für dieſe Anzahl vom Vieh reichen würde. Er wurde an 3 F. lang, fing endlich an zu blühen, und würde, wenn er länger geſtanden hätte, zu holzig und die Blätter gelb geworden ſeyn, zumahl weil er ſich vor Fettigkeit und Schwere gelegt hatte, und kaum mit der Senſe durchzuhauen war. Auf dem zuerſt gemäheten Stücke, war er d. 11 Jun., wo er zum zweyten Mahl zu mähen angefangen wurde, wieder 2 F. hoch, wie ſolches die Herren Profeſſoren Leske und Hindenburg, nebſt dem Hrn. v. Bugenhagen aus Pommern, die ihn beſuchten, mit Augen geſehen. Der Unterſchied der Fütterung alles Viehes mit grüner Lucerne in Horden, im Hofe und im Stalle, ſchreibt er ferner, iſt gegen deſſen Austreibung und Hütung wie 1 zu 6, und welche Menge Dünger erhält man nicht dadurch mehr!

„So viel ich bey gemeinen Landwirthen, welche vom Anbaue dieſes Futterkrautes wieder abgegangen ſind, und ſtatt deſſen den rothen Klee erziehen, habe bemerken können, haben ſie es an zwey Stücken bey der Cultur der Lucerne ermangeln laſſen. Erſtlich haben ſie nicht den rechten Boden dazu gewählt, auch im erſten und zweyten Jahre das Gäten unterlaſſen, weshalb Gras und Unkraut die Oberhand bekommen, daß nichts aus

der

der Lucerne hat werden wollen. Hernach haben sie auch unterlassen, ihre Lucern-Felder von Zeit zu Zeit zu düngen, und ihnen mit neuen Kräften aufzuhelfen. Sie sagen, die Cultur nebst der voran gehenden Zubereitung des Bodens sey zu mühsam und zu kostbar, in Vergleichung des rothen Klees, welcher im ersten und zweyten Jahre weit ergiebiger sey, als Lucerne. Sie haben auch in gewisser Weise nicht Unrecht; aber sie müssen nur erwegen, daß dieses auf den rechten Boden gebrachte und hernach wohl gepflegte Futter-Kraut, wie oben gesagt worden, erst vom dritten Jahre an, den rothen Klee im Ertrage nicht nur weit hinter sich zurück lasse, sondern auch dieses voraus habe, daß er an 10 bis 20 Jahr auf seiner Stelle fort dauern könne. So genannte Zeit-Pächter werden sich nicht mit diesem Futter-Kraute abgeben, und ihren Nachfolgern, da es ungewiß ist, ob sie nach verflossenen Pacht-Jahren bleiben können oder nicht, freylich nicht gern was vorarbeiten wollen, wovon die Nachfolger erst noch beständigen und meisten Nutzen haben können. Diesen wird man also gar selten Lucerne und Esparsette bauen sehen. Es wäre aber höchst billig, daß Guts-Herren für dergleichen 10 bis 20 Jahr Nutzen bringende Anlagen den abziehenden Pächtern eine Vergütigung angedeihen liessen, und solche ihnen in dem Pacht-Contracte versicherten.

„Um nun im Anbaue und in der Pflege dieses Futter-Krautes nicht unrichtig zu verfahren, muß man folgenden Unterricht wohl bemerken:

„1. Es muß die Lucerne nicht auf einen so tiefen Boden gebracht werden, daß ihre, an die 2 Fuß in den Grund hinein gehende, Wurzel vom Wasser unter der Erde berühret werde. So bald dieses geschieht, geht sie aus. Man lieset zwar in öffentlichen Schriften, daß besonders die schlesischen Landwirthe versichern, sie sey bey ihnen in einem festen, thonigen und feuchten

Boden beſſer, als in einem ſandigen und trocknen, ausgefallen, und daß ſo gar das Waſſer, womit das Feld, nach dem Aufthauen im Frühjahre überſchwemmet worden, den Wurzeln keinen Schaden zugefüget habe. Ob nun ſchon die erſte Beſchaffenheit des Bodens dieſer Pflanze ſehr angemeſſen ſeyn kann, ſo iſt doch, in Anſehung des zweyten Punctes, die Folgerung nicht zu weit auszudehnen. Ein anders iſt, eine kurze Zeit unter dem Thau-Waſſer aushalten; ein anders aber, im Sommer mit den Wurzeln die meiſte Zeit an das Waſſer hinein reichen. Der rothe Klee hält auch eine Ueberſchwemmung von einigen Tagen aus; man findet ihn aber auf naſſen ſumpfigen Wieſen nicht wild wachſend.

„2. Man muß nicht denken, daß der ſchlechteſte Boden, wo ſonſt nichts wachſen will, für die Lucerne gut genug ſey. Man kann zwar einen ſteinigen, zum Kornbau eben nicht allzu guten, Acker mit Vortheil dazu auswählen, aber ein magerer loſer Sand-Boden wird ungleich wenigern Ertrag geben. Ein ſteiniger Boden iſt unter ſich feſt, und hält ſich länger friſch und feucht, als jener. Hat er hiernächſt unter der Ober-Fläche einen fetten Lehm oder Letten, ſo kann der Lucerne kein beſſerer Platz angedeihen, wenn ſchon oberwärts der magere Sand einen Fuß tief liegt. Das Korn wird hierſelbſt einen geringen Wuchs zeigen, weil es mit ſeinen Wurzeln nicht tief genug hinein geht, um aus der beſſern Erde Nahrung an ſich zu ziehen. Allein, die Lucerne geht nach und nach bis 2 Fuß tief in den Grund hinein, und wird aus dem hierſelbſt angetroffenen Lehm ſich aufs freudigſte ernähren, ja ſo gar in der Dürre, wenn andre Feld-Feuchte leiden, ſehr gut beſtehen, weil der Lehm in der Tiefe ſeine Feuchtigkeit behält. Iſt nun in der Tiefe dagegen loſer, geringer und nicht feucht haltender Sand, wie auf der Ober-Fläche, ſo muß ſchon mehr gekünſtelt werden, wenn hier-

hierselbst die Lucerne einen nur mittelmäßigen Bestand haben soll. Ein Glück ist es, wenn auf einem Boden solcher Art die beyden ersten Jahre seiner Begattung mit Lucerne nasse Jahre sind, damit sie in solchen erst rechten Fuß fassen, und hiermit ihre Erde unter und um sich her vermittelst ihrer Wurzeln befestigen, diese aber sodann ihre Feuchtigkeit länger behalten könne. Hat man aber einen magern Boden, den man mit Lucerne besäen will, so muß man ihn mit schicklichem Dünger zuvor bessern, damit die jungen Pflanzen recht stark anwachsen mögen. Unterlässet man solches, so wird ein ausser Besserung befindlicher Acker auf immer so genannte verbuttete Stöcke zeigen. Es sind Aecker, die man krautartig nennt, weil sie mehr als alle andre zur Hervorbringung des Unkrautes allerley Art geneigt sind, und hierzu die perennirenden Wurzeln sowohl, als den Samen, enthalten. Sind sie hiervon sehr erfüllt, so nennt man sie auch verwildert. Sind sie aber voller Gras- und Quecken-Wurzeln, so nennt man sie verqueckt. Der Lucern-Same wird aber in verqueckten Aeckern sehr verwahrloset. Dieserhalb müssen sie durch vorgängige schickliche Cultur, so viel möglich, so gereinigt seyn, daß der aufgehende Lucern-Same die Nahrungs-Theile seines Landes nicht mit fremden Kräutern und Gräsern theilen dürfe. Es werden ohnehin bey aller voran gegangenen Reinigung noch genug Unkräuter mit der Zeit erscheinen, welche durch das Gäten in der Folge fortzuschaffen sind.

3. Die Säe-Zeit der Lucerne ist zu Ende des Aprils, oder Anfange May, wenn keine starke Nacht-Fröste mehr zu besorgen, und noch Winter-Feuchtigkeit im Boden ist. Der Same wird mit den drey vordersten Fingern, weil er sehr klein ist, ausgesäet, und mit Dornen-Bündeln, wie bey dem rothen Klee, eingeeget. Auf einen Acker, der 2 berl. Scheffel, oder 1 dresdn. Scheffel Aussaat erfordert, braucht man 9

bis 10 Pfund Samen. Einige pflegen wohl Ray-Gras, zum dritten Theil im Gewichte genommen, zugleich darunter zu ſäen. Man kann auch eine andere Gras-Art erwählen. Denn wenn dieſe nur einige Zoll tief, die Lucerne aber ſo viel Fuß tief wurzelt, ſo hindert die Gras-Art derſelben eben nicht. Es iſt aber doch beſſer, das Gras im Anfange wegzulaſſen, weil es zehrt. Wenn die Lucerne erſt ein Par Jahre geſtanden, und ſich in der Tiefe recht eingewurzelt hat, kann es rathſamer ſeyn, Gras-Samen auf den Lucern-Acker, (und wozu ich den Honiggras-Samen empfehlen wollte,) ohne ihn einzuegen, auszuſtreuen, damit ihn der Regen zum Aufgehen bringe. Hieraus entſteht mit der Zeit, wenn man nähmlich einen leichten Boden vor ſich hat, eine Verraſung deſſelben, welche in der Folge der Dürre Trotz biethen kann. Des Hrn. Hofr. Schubart's Verſuch, erſt Erbſen zu ſäen und unterzuackern, dann aber die Lucerne oder Esparſette darauf zu ſäen, hat meinen völligen Beyfall. Er hat die bis

krautes nicht unterlassen, und, so oft es nöthig ist, wiederhohlet werde. Im zweyten Jahre wird es kaum mehr nöthig seyn, weil das Unkraut von den Stöcken selbst schon unterdrückt werden wird. Hätte man aber einen Acker, der den Hederich sehr dick, wie es in vielen Gegenden sehr häufig geschieht, hervorgehen lässet, so darf man ihn, falls er über die Lucerne herüber wächst, nur fort wachsen, und eben wenn er blühen will, abmähen und grün verfüttern lassen. Er wird bey seinem dicken Stande wenig oder gar keine andre Unkräuter neben oder unter sich hervor lassen, und da er keine perennirende Wurzel hat, auch nach dem Abhauen keinen Samen trägt, so wird im folgenden Jahre von ihm nichts mehr zu sehen seyn. Das Rindvieh frißt den Hederich, wenn er zu Häcksel geschnitten, oder klein gestampft ist, unter dem Stroh-Häcksel sehr gern; weniger gern aber, wenn er blühet, und noch ungerner, nach dem Verblühen. Für die Schweine aber kann kein besseres Futter seyn, als wenn er ihnen eingesauert gegeben wird. Denn wenn er ihnen so roh hingeworfen wird, fressen sie so nothdürftig davon, und vertreten das meiste davon in den Mist.

„5. Viele Landwirthe lassen die junge Lucerne bis in den Aug. unberührt stehen, da sie denn gegen 2 Sch. Höhe erreicht, auch Blüthen ausgetrieben haben kann. Ist das erste Abmähen sodann geschehen, so wird es von ihnen zu Ende des Sept. wiederhohlt, oder auch von Schafen abgehütet. Es ist aber das Verfahren des Hrn. Schubart vorzuziehen, welcher die Lucerne gar nicht bis zur Blüth-Knospe kommen, sondern sie im ersten Jahre der Aussaat oft, jedoch nicht zu tief, und dergestalt abmähen läßt, daß die Stutzeln ein Par Zoll über der Erde stehen bleiben, und neue Keime ansetzen können. Auch ist es nach seiner Vorschrift ebenfalls wohl zu bemerken, daß man vor 3 Jahren von der Lucerne keinen Samen ziehe, sonst geht sie

bald ein, weil die Stöcke dadurch zu früh geschwächet werden.

„6. In den folgenden Jahren muß man die Lucerne auch nie zur Blüthe kommen lassen, sondern sie abschneiden, so bald sich die Blüth-Knospen nur zeigen. Wenn sie in der Blüthe sich befindet, ist sie schon zu hart, holzig und weniger nahrhaft geworden. Eine Ausnahme kann nur da Statt finden, wo die Pflanze (entweder weil sie zu dick steht, oder nicht Trieb genug auf einem nicht kräftigen Boden hat,) nicht sonderlich dicke Halme und Stängel gewinnt, da sie denn erst in der Blüthe, die sonst das Vieh sehr gern frißt, abgeschnitten wird.

„7. Wenn man die Lucerne zu Heu machen will, so verfährt man eben so damit, als mit dem rothen Klee. Sie trocknet etwas geschwinder, als dieser. In unbeständiger und regnichter Witterung geht man am sichersten, wenn man die Gelegenheit dazu hat, selbige gleich nach dem Abmähen in Bündlein binden, und auf einen nahen andern Platz hintragen oder fahren zu lassen. Denn da der Nachwuchs der jungen Blätter in und durch die Schwaden gehen würde, so müßte bey anhaltendem Regen-Wetter das Trocknen der abgemäht liegenden Lucerne sehr langsam von Statten gehen.

„8. Das Düngen des Lucernen-Ackers muß nicht aus der Acht gelassen werden. Hr. Schubart hat uns seine Erfahrungen hierüber so mitgetheilt: „Im 2ten und 3ten Jahre lässet man Esparsette und Lucerne mit Gyps düngen, oder in dessen Ermangelung mit Asche, Märgel, oder dem Ueberbleibsel in Salz-Siedereyen. Doch ist Gyps nicht nur das wohlfeilste, sondern thut auch ganz unglaubliche Wirkung. Alle Frühjahre kann man diese Felder mit einer eisernen Ege, den gemeinen Klee aber mit einer scharfen hölzernen Ege wohl aufkratzen, und im 4ten Jahre kann im Winter kurzer fetter Mist oben darauf gefahren, und sogleich zerstreuet werden, welcher, wenn er aus-

ausgelanget, im Frühjahre, ehe das Futter zu wachsen anfängt, mit einer Ege nächtig zerrissen, das grobe strohige aber zusammen geharket, und wieder weggefahren werden kann. Es schadet auch nicht, wenn man, so oft sie abgehauen worden sind, dieselben wieder mit Asche, oder besser mit Gyps, bestreuen lässet. Auf diese Weise, und bey dieser abgewechselten Düngung, nähmlich im 3, 4 und 5ten Jahre mit Gyps, und dann einmahl mit Mist, welcher eben durch diesen Futterbau sich häufig vermehrt, wird man über die Menge des Futters erstaunen '. Ich muß hierbey noch hinzu fügen, daß man da, wo es an Gyps und Asche mangelt, sich an andere Düngungs-Mittel halten könne.

9. Es ist oben gesagt worden, daß man vor dem dritten oder vierten Jahre nicht von der Lucerne Samen ziehen solle. Nach solcher Zeit kann man nun, zu dessen Gewinnung, einige Stöcke da, wo kahle Flecke sind, unberührt stehen lassen, indem zugleich der etwa ausfallende Same das leere Land wieder begatten wird, wenn man nicht etwa hierselbst nun, wie gleichfalls oben gelehret worden, lieber einen Gras-Samen auf den entstandenen Leeren ausstreuen wollte. Es kann aber auch gerathener seyn, wenn man nach des Hrn. Pr. Lüders Anweisung, in Ansehung des gemeinen Klees, auch eigene Beete für Lucern-Samenstöcke anlegt, und sie reihenweise bepflanzt, um den möglich besten Samen auf solche Art zu erziehen.

10. Da die Lucerne 10, 15, 20 Jahre stehen bleiben, und also bey angezeigter Pflege den Acker zum folgenden Getreidebau eher verbessern als verderben wird, indem der jährliche Abfall der Blätter beym öftern Abschneiden sehr zur Düngung des Landes dient: so muß man mit einem recht scharf gemachten und zugleich starken, gut bespannten Pfluge den Acker im späten Herbste umreissen, das Umpflügen im nächsten Frühjahre wiederhohlen, hiermit alle 4 bis 6 Wochen fortfahren, und im Herbste das gewöhnliche Korn einsäen.

Der Haken-Pflug, wo selbiger im Gebrauch ist, schickt sich zum Umreissen des Lucern-Ackers noch besser, als der Pflug. Ist dieser nicht stark genug zu den Wurzeln, so muß man sie mit der Hacke aushauen. Befindet man sich in einer holzarmen Gegend, so darf man nur solchen Acker an Häusler oder Bäuner, Gärtner, oder wie sonst dergleichen kleine Leute auf den Dörfern heißen, gegen die Wurzeln austhun, daß sie solche zu ihrer Feuerung behalten sollen, als wozu sie nach dem Trocknen sehr brauchbar sind. Es ist aber gar nicht nöthig, daß diese Wurzeln bis auf den Grund mit der Hacke heraus geschaffet werden. Wenn sie nur so tief abgehauen werden, als der Pflug zu gehen pflegt, so ist es schon genug, indem sie sodann um desto weniger wieder ausschlagen, als das Pflügen, wie vorher gesagt worden, zum öftern wiederhohlet wird".

Zu mehrerer Erläuterung des jetzt beschriebenen Lucern-Baues, werde ich nun die deshalb in verschiedenen Gegenden angestellten Versuche selbst, theils wohlgerathene, theils auch mißlungene, erzählen.

In Hedemünden, im Fürstenthume Calenberg, hat Hr. Schwachheim zwey Versuche mit diesem Futter-Kraute angestellt. Den ersten, beschreibt er in einem Sendschreiben, v. 7 Sept. 1750, im 23 Stück der hannov. gel. Anz. v. J. 1750, in folgender Nachricht.

„Ich bekam diesen Samen d. 14 May dieses Jahres, da ich eben am Podagra in großen Schmerzen lag. Ich wurde dadurch so sehr erfreuet, daß mir die Schmerzen darüber vergingen. Ich ließ sogleich des folgenden Tages das dazu bestimmte Stück Land umpflügen. Ich ließ mich selbst auf dieses Land hinführen, um zu besorgen, daß bey der Bestellung von den Knechten nichts möchte versehen werden. Aber, ich beging selbst dabey einen großen Fehler; denn dieses Land war nicht gedünget, es war nur 2 Mahl gepflüget, und hatte 3 Jahr hinter einander Frucht getragen, wobey es ohnedem nur von mittelmäßiger Güte ist;

ist; ich erwählte es aber darum, weil es in einem Gehäge, wo kein Vieh hinkommt, gelegen ist. Mein zuvor begangenes Versehen machte ich damit wieder gut, daß ich das Unkraut zwey Mahl ausgäten, und das Land mit einer Kraut-Hacke, welche an dem einen Ende 3 Zacken hat, an dem andern aber breit und scharf ist, los und locker machen ließ. Dieses ging gut von Statten, weil ich keinen Haber, wie in den Beschreibungen angerathen wird, darunter gemenget hatte. Will man des mühsamen Gätens und Hackens überhoben seyn, so muß man ein Stück Land dazu liegen lassen, welches man im Herbste mit Rocken oder Weitzen zu bestellen gewillet ist; dieses belege man im künftigen Jahre noch mit den Schafen, und lasse es dann so zurechte machen, als wenn man Lein darauf säen wollte; man säe den Samen aus, wenn man Gerste zu säen anfängt oder auf hört: so wird man im nächstfolgenden Jahre den Nutzen davon finden.

„Ich ließ mein Stück Land erst etliche Mahl scharf egen, und darauf nahm ich so viel Lucerne-Samen, als ordinären Klee; ich vermengte den Samen mit guter Erde, und wie er ausgesäet war, ließ ich das Land mit verkehrter Ege zwey Mahl überziehen. Ich wollte wohl rathen, daß man sich eine eigene Ege dazu machen liesse, darin die Zacken von Holz, und nicht länger als 2½ Z. lang wären; denn der Same darf nicht tief untergebracht werden, weil er sonst in dem Lande fauler und erstirbt.

„Im Anfange ging er sehr dünn und kümmerlich auf, daher es mir gereuete, daß ich nicht die Proportion von 10 ℔ auf einen Morgen, sondern nur die Proportion von 6 ℔ genommen hatte, welches erstere ich aus unten angeführten Ursachen zuträglicher zu seyn erachte. Mitten im Jun. hatte ich noch wenig Hoffnung, daß er aufkommen würde, weil es das Ansehen hatte, als ob ihn das Ungeziefer gänzlich vertilgen wollte. Als ich ihn aber erst einmahl gäten und behacken lassen, und er einen warmen Regen nach dem andern bekam, da fing er an gewaltig zu treiben, und sich zu bestauden. Die Fruchtbarkeit des Wetters machte aber auch, daß das Unkraut von neuem wieder aufschlug. Denn, weil er etwas dünn stand, so konnte er das Land nicht gleich bedecken; deswegen ich es für rathsam halte, daß man 10 ℔ Samen auf 1 Morgen nehme, wenn er etwas über 120 Ruthen hält, wie hier. Sollte er auf diese Weise im andern

dern Jahre zu dicht an einander zu stehen kommen, daß er sich nicht genugsam verbreiten und bestauden könnte: so ist es leichter, eine Pflanze, wo sie überflüssig ist, auszuziehen, als etliche zu zupflanzen, welches aber doch auch geschehen kann, wenn man mit der Kraut-Hacke die leeren Plätze unhacket, und frischen Samen hinein streuet. Es ist ohnedem unmöglich, daß ein Ackermann den Samen so accurat sollte aussäen können, daß die Stauden in gleicher Weite von einander, und nicht dichter noch dünner sollten zu stehen kommen, als es geschehen müßte. Daher ich es für rathsam halte, daß man ein wenig Samen in Vorrath behalte, um bey dem Gäten an leeren Plätzen denselben noch anzubringen. Alsdann kann man auch Pflanzen ausziehen, wo sie zu dicht an einander stehen. Auf diese Weise kann man es zwingen, daß die Lucerne ordentlich zu stehen kommt, und das Land bedeckt, damit kein Unkraut zwischen derselben aufkomme. Ich habe es nicht nöthig gehabt, Pflanzen auszuziehen, weil sie nirgend zu dicht stehen. Vor zwey Tagen aber versuchte ich eine Staude auszureissen, um zu sehen, wie stark die Wurzel wäre; allein, es war mir unmöglich, selbige mit den Händen auszuziehen, daher ich einen Spaten dabey gebrauchen mußte. Ich befand, daß die Wurzel so dick, wie mein Daumen, und anderthalb Viertel von einer Elle lang war. Die Stauden sind nicht alle von gleicher Höhe und Dicke; die längsten sind 1¼, die niedrigsten ¾ E. hoch, letztere aber sind auch viel dicker, und haben weit mehrere Zweige, als jene, an der Wurzel heraus getrieben. Der junge Ausschlag an der Wurzel ist demjenigen, welcher aus dem Samen hervor gekommen, ganz ungleich an Farbe und Blättern. Der erste Ausschlag aus dem Samen sieht den auf den trocknen Wiesen stehenden Hauhecheln nicht ungleich, und ist hart und grob. Der junge Ausschlag aber hat viel breitere und kleemäßige Blätter, ist bleicher von Farbe, und zärter, wie jener. Hätte ich den ersten Ausschlag, wie er anfing in die Blüthe zu treten, abschneiden lassen, so hätte ich nicht nur erfahren, wie er an dem Viehe fütterte, sondern ich würde auch befunden haben, daß er sich weit stärker bestaudet hätte; und ich zweifle nicht daran, daß ich ihn jetzo schon zum andern Mahle schneiden könnte, denn man darf ihn mit der Sense nicht mähen, weil man die Wurzeln und den ganz jungen Ausschlag dadurch beschädigen würde. Ich habe mich daher

her gewundert, daß in den Beschreibungen, welche ich in den ökonomischen Sammlungen und Nachrichten davon gelesen, steht, daß man im dritten Jahre erst Nutzen davon hätte. Ich habe ihn gleichwohl nicht schneiden noch abfüttern lassen, theils um zu erfahren, wie er sich bis ans Ende arte, theils auch aus der Ursache, daß ich den Samen gewinnen möchte, welcher bereits stark ansetzt, und, meiner Hoffnung nach, zur völligen Reife kommen wird. Erhalte ich diesen Zweck, so wird mir meine auf dieses Stück angewendete Mühe schon reichlich bezahlet, denn der Same ist kostbar. Das ℔ kostet in England 1 Schill. 2 pence, welches nach unserm Gelde beynahe 12 Mgr. beträgt. Ich hoffe zum wenigsten aus 2 ℔ Einsaat 20 ℔ wieder zu ärnden; ich hoffe auch, daß er von eben der Güte seyn werde, wie der englische.

Den zweyten Versuch mit der Lucerne, hat Hr. Schwachheim an einem Berge auf dem allerschlechtesten Stücke Landes gemacht. Er meldet davon, in einem Schreiben, v. 21 Sept. 1750, im 29 St. der hannov. gel. Anz. a. d. J. 1750, Folgendes.

„Ich habe meinen zweyten Versuch mit dem edeln Futter-Kraute, Lucerne genannt, auf einem Stücke Landes gemacht, welches wohl das allerschlechteste vor ganz Hedemünden ist; es ist daher auch gar selten gebauet worden. Vor 5 Jahren ließ ich es umreissen, und mit Weitzen besäen. Ich bekam aber kaum die Einsaat wieder, und also hat es bis daher brach gelegen. Das Erdreich besteht aus Hasel-Erde und Kalksteinen, welche man mit dem Pfluge nur abschälen kann, weil gleich die so genannten Hecht-Steine, oder vielmehr der harte Felsen, darunter befindlich ist.

„Ich erwählte aber dieses Stück Land aus der Ursache dazu, um zu erfahren, ob die Lucerne auch in solchem Lande fortkommen könnte, und ob es wahr sey, daß die Wurzel so lange gerade unter sich schlage, als sie Erdreich finde, sich aber hernach, wenn sie auf Steine und Felsen komme, krümme, und darauf fortschlinge, bis sie eine Oeffnung zwischen den Steinen und Felsen finde, in welche sie sich denn hinein dringe, ihre Nahrung aus dem tiefsten Boden herauf hohle, und ihrem Kraute dadurch den Wachsthum mittheile. Ich kann versichern, daß sich dieses alles also ver-

verhalte. Ich habe mehr als Eine Probe mit Ausziehung einiger Pflanzen gemacht.

„Ich ließ dieſes Stück Landes im Frühjahre, wie ich mit der Beſtellung des Habers fertig war, erſt umreiſſen, und war entſchloſſen, daſſelbe mit Eſparcet-Samen zu beſäen, welchen man vom März an, bis in den Auguſt anbringen kann. Ich ließ auf mein Stück Landes, welches ein wenig mehr als 1 Vorling hält, 2 Fuder Miſt fahren, und es hernach noch mit den Schafen belegen, jedoch ſo ſparſam, daß die Morgen-Ställe fortgeſchlagen wurden, denn es war nur eine kleine Heerde Schafe.

„Wie das Land 3 Mahl gepflüget war, ließ ich es erſt ſcharf egen. Ich konnte nach aller angewendeten Mühe nicht mehr Eſparcet-Samen, als 1 Metze, erhalten, welchen ich oben an das eine Ende des Stückes anbrachte. Das übrige wollte ich nicht gern unbeſamt liegen laſſen; und da ich noch einen Vorrath von Lucerne-Samen übrig hatte, ſo wagte ichs, und beſäete es damit, worauf es mit verkehrter Ege 2 Mahl überzogen wurde. Ich nahm, nach dem Verhältniſſe des Landes, ſo viel Samen, als 10 ℔ auf 1 Morgen gerechnet. Die Beſtellung geſchahe im Ausgange des Jun., und alſo ſehr ſpät. Dem ohngeachtet ſteht er doch in recht gutem Wachsthume. Das längſte Kraut iſt ½ Elle, das niedrigſte aber 1½ Viertel von einer Elle hoch, und tritt jetzt zum Theil in die Blüthe. Es ſteht nicht zu dick und auch nicht zu dünn, und fängt an ſich zu beſtauden und ſich zu verbreiten. Doch finde ich noch keinen jungen Ausſchlag an der Wurzel, ſondern der Stamm, welcher aus dem Samen ausgeſchlagen, und anfänglich nur einfach iſt, treibt jetzo erſt mehrere Zweige, welches mich aber nicht befremdet, weil es noch keine 7 Wochen ſind, da meine erſte Lucerne neuen Ausſchlag aus der Wurzel getrieben, dieſe aber über 7 Wochen ſpäter geſäet worden; jene einen ziemlich guten Boden hat, dieſe aber auf einem Steinfelſen ſteht. Inzwiſchen habe ich doch geſtern noch geſehen, daß der neue Ausſchlag an einigen Wurzeln ſchon anfängt in der Erde zu keimen. Ich habe alſo die Hoffnung, daß er noch vor Martini, wenn wir anders eine ſo gute Witterung behalten, ſich noch eben ſo ſtark beſtauden werde, wie meine erſtere, abſonderlich, wenn ich ihn nun abſchneiden laſſe, ſo bald er zuſammen in die Blüthe getreten iſt; denn ich

darf

darf mir keine Hoffnung machen, auf diesem Stücke reifen Samen zu gewinnen, weil es schon zu spät im Jahre ist. — —

„Ich habe vor einigen Tagen einen kleinen Platz, worauf ich meinen dritten Versuch gemacht habe, abschneiden, und das Kraut dem Viehe vorwerfen lassen. Die Pferde sowohl als das Rindvieh, haben dieses Kraut mit dem größesten Appetit verzehrt. An den Wurzeln schlägt auch das Kraut häufig wieder aus"

Schulz in Medingen, ertheilt im 91 St. der hannov. gel. Anz. v. J. 1751, und im 93 St. der leipz. Sammlungen ꝛc. folgende Nachricht von dem Verhalten des im Frühlinge 1751 gesäeten Lucerne-Samens.

„Ich nahm zu dieser Besamung eine solche Anhöhe auf einer Wiese, die, des guten Ueberdüngens ohngeachtet, kein Gras tragen wollte. Diese Anhöhe, weil ich sie zu Wiesenwachse untüchtig hielt, und das wenige darauf hervor schießende Gras von der Sonne bald verzehret wurde, zumahl sie gegen Süden und Westen, theils auch gegen Osten, freye Lage hat, ließ ich im Herbste 1749 umgraben, fand aber überall ein schlechtes, leicht- und sohres, mit grobem Sande vermischtes Erdreich. Die unterwärts gekehrte Narbe war zum Anfange des Frühjahrs 1750 ziemlich gerottet. Ich war gewillet, diesen Platz rajolen zu lassen, es fand sich aber mehr und mehr taube Erde. Da ich also dafür hielt, daß aus demselben keine tüchtige Wiese wieder werden könnte, es wäre denn, daß man die Anhöhe ganz abtragen, und neue Erde darüber herführen liesse, dieses aber der Kosten halber mir bedenklich wurde, anerwogen auch der vorhin darauf ausgeschüttete Aescher nichts verfangen wollte, so beschloß ich, Futter- oder Mang-Korn, nähmlich eine Vermischung von Gerste, Haber und schwarzen Wicken, darauf zu säen, und wann solches abgeärndet, mit Winter-Rübesamen dieses Land noch zu bestellen. In solcher Absicht ließ ich die hin und wieder noch liegenden Erd-Schollen klein schlagen, und die noch nicht völlig verweseten Gras- und Unkraut-Wurzeln, auch Fäserchen, mit eisernen Harken tüchtig heraus bringen, den Platz, so weit die Erde noch irgend einen guten Anschein hatte, umgraben, und mit gutem Stall-Miste, auch Holz-Spänen und Aale unterdüngen. Das Futter-Korn wuchs sehr gut, und die nachher, wiewohl ohne weitere Düngung darauf ge-

geſäeten Rüben geriethen ebenfalls ſo, daß mich die angewandte Mühe und Koſten nicht gereueten.

„Ich würde im folgenden, nähmlich dem jetzigen Jahre, dieſen Platz zu gleichem Behufe genutzet haben, wenn nicht die Neubegierde, den Lucerne-Samen, als womit ich im vorigen Jahre, da ich eine kleine Quantität immediate aus England kommen laſſen, ſchon eine Probe in mittelmäßigem Garten-Lande gemacht hatte, weiter zu verſuchen, bey mir empfunden. Ich ließ demnach dieſe Wieſen-Anhöhe in letztvorigem Frühjahre von allem Kraute und wilden Wurzeln möglich reinigen, tüchtig umgraben, mit gutem Stall-Miſte und Schaf-Modde ſtark düngen, und mit Lucerne-Samen ganz milde beſäen, auch die Samen fleißig einegen. Dieſes geſchahe etwa 8 Tage, wo nicht etwas ſpäter, nach May-Tage. Der Same lief nach einigem Regen bald auf, und zeigte ſich faſt ſo häufig in der Blade, als er eingeſtreuet war; die darauf folgende und faſt bis zu Ende des Jun. anhaltende Dürre aber hinderte nicht nur den Wachsthum, ſondern es entſtanden auch verſchiedene bloße Stellen, wo der junge Auflauf gelb wurde, und caducirte. Bey hiernächſt eintretendem Regenwetter ließ ich die bloß gewordenen Stellen ein wenig aufharken, und von neuem beſäen. Dieſe Nachſaat wuchs bey fruchtbarer Witterung aufs beſte, und die ganze Beſamung ſtand bald darauf ſo dicht wie ein Halm. Dieſem ungeachtet ſchlug doch das Unkraut, inſonderheit der Hederich, herdurch, welches mir an ſich ſelbſt ſeltſam vorkam, zumahl die Lucerne ſchon etwa ½ E. lang war. Ich bemerkte, daß bey dieſem Unkraute die nächſten Lucerne-Halme gelb und welk wurden, ließ alſo aufs eilfertigſte alles Unkraut, und inſonderheit den Hederich, ausgäten. Hierzu mußte aber viele Behutſamkeit angewandt werden, um nicht der Wurzel der Lucerne, um welche ſich die Kraut-Wurzeln geſchlungen hatten, zu nahe zu kommen, indem der von Erde etwas entblößte Lucern-Halm ſich zur Verwelkung neigete, welches mir denn ebenmäßig ſeltſam ſchien, da die Lucerne ſehr tiefe und zähe Wurzeln ſchlägt. In der Mitte des Jul. war die Lucerne etwa 1 E. hoch, theils etwas niedriger, hatte jedoch zur Blüthe ſich noch nicht angeſetzt. Ich ließ dieſelbe zum erſten Mahl mähen, und zwar nach und nach für die milchenden Kühe; ſie wurden aber mit ungefähr ⅔ andern Graſes vermenget, theils um dieſes gute Futter auf längere Zeit zu

behalten, theils auch deswegen, weil mein Vieh, nach vorher gemachten Versuche, wenn es die Lucerne unvermengt gefressen, zwar merklich in der Milch zunahm, dabey aber nicht wieder an die Weide wollte. Ich halte dafür, daß sie eher zu obiger Höhe würde gelanget seyn, wenn die Trockniß den Wachsthum nicht zurück gehalten hätte, massen denn die Lucerne bey der ziemlich nassen Sommer-Witterung 4 bis 5 Wochen nach dem ersten Schnitte schon wieder zu ihrer vorigen Länge gediehen, mithin zum zweyten Mahl zu mähen war. Von dieser Zeit an, nähmlich von der Mitte des Augustes, wuchs sie langsamer, und wurde erst gegen die Mitte des Oct. wieder mähbar; und da es unterdessen an Regen nicht fehlte, so ist die Ursache des langsamern Fortkommens dem Abgange der Sonnen-Wärme, insonderheit der ungewöhnlich frühzeitigen kalten Witterung wohl beyzumessen, zumahl sie dann nach diesem dritten Abmähen allen Wachsthum versaget, und die darauf noch gebliebenen Blätter anfängt abzuwerfen, und sich zur Stoppel setzt. Indessen sind, des Gätens ungeachtet, andere wilde Kräuter, auch ordinäres Gras, zwischen der Lucerne häufig durchgewachsen; und da sie, der Erfahrung nach, von selbigen vertrieben wird, so fürchte ich, daß dieses Gewächs in dem hiesigen magern Boden sich nicht so viele Jahre, als man insgemein dafür hält, conserviren werde, zumahl da mit dem Ausgäten fremder Kräuter viele Lucerne-Halme verloren gehen, die durch die Ausstaudung der Wurzeln wohl nicht ersetzet werden können. Uebrigens habe ich, der unbeständigen Witterung halber, nicht wagen mögen, die Lucerne auftrocknen und heuen zu lassen, nachdem ich bey einem angestellten kleinen Versuche befunden, daß sie nach der Abmähung keine Nässe vertragen kann, sondern schnell will gedörret seyn.

„Endlich merke noch dieses an, daß die Milch und Butter von den Kühen, welchen die Lucerne in obgedachter Vermengung mit anderm Grase zur Futterung gereichet, zwar etwas stärker an Geschmack, doch gar nicht unangenehm gewesen.

„Meiner geringen Ueberlegung nach, halte ich also von diesem Gewächse, 1. daß dasselbe in schlechtem sowohl, als gutem Lande fortkomme; 2. mittelmäßige Wärme sowohl, als Befeuchtung, nöthig habe, starke Hitze oder Trockniß aber demselben schädlich sey; 3. zwar ein gar heilsames

Futter, dem Viehe aber mäßig zu geben sey, damit dasselbe insonderheit in dürren Gegenden, wie hier, bey der Weide bleibe; und 4. daß die Lucerne besser gedeihen und länger fortdauern würde, wenn die Reinigung des Landes von andern Kräutern füglicher zu bewerkstelligen wäre; endlich 5. der Anbau derselben die Mühe und Kosten gar wohl belohne, und wenigstens einen guten Anger veranlasse."

Wie die Lucerne in Schlesien gesäet, und aufgebracht worden, meldet ein Ungenannter in einem Schreiben, v. 28 Apr. 1754, im 1 B. der schles. ökonom. Sammlungen, Bresl. 1755, 8. S. 89, fgg.

„Ich habe vor 3 Jahren den ersten Lucerne-Samen in die Hände bekommen, und habe solchen an drey Orten gegen Ende des Apr. damahls zu gleicher Zeit gesäet. Erstlich erwählte ich einen sandigen, doch mit tragbarem Erdreich melirten grauen Boden, welcher über Winter mit Kuh- und Schweine-Mist gedünget, gestürzet, und im Frühjahr nochmahls gehörig gegraben und gleich geretchet worden. Ich ließ den Lucerne, nach der von den Samen-Händlern in Hamburg, Johann und Matthias Klefecker herausgegebenen Vorschrift, dergestalt säen, daß auf 10 Ruthen Ackers, jede Ruthe a 7½ E. bresl. Maßes im Quadrat, etwa 1 ℔. verstreuet worden; dann ließ ich Wicken-Gemenge von Wicken, Gerste und Hafer drauf säen, und es nochmahls sauber und gleich einrechen. Ich muß aber gestehen, daß ich das erste Jahr von dieser Saat nicht das gehoffte Vergnügen erhalten, indem entweder der Same nicht völlig aufgegangen ist, oder die Hühner zu viel ausgescharret haben, oder solcher vielleicht zu dünn gesäet worden. Ich habe solchen das erste Jahr nur 2 Mahl abhauen können; und da dieses Land nach seiner Art nicht viel Unkraut und Gras trägt, so ist der Klee dadurch auch nicht verdämpfet worden, sondern dessen starke Stöcke haben sich das zweyte Jahr besser gebreitet, auch dreymahlige, und an einigen Orten, wo das Erdreich etwas stärker und besser war, viermahlige Aernde gegeben, und dieses dritte Jahr hoffe ich noch mehr Vortheil davon zu ziehen, da noch kein Stock verloren gegangen, sondern solche nunmehr

mehr die größte Hoffnung zu völliger Bedeckung des Gartens zeigen.

„Die andere Probe machte ich in meinem Küchen-Garten, und zwar mitten in den breiten Gängen, welche unten einen blau und gelb lettigen Grund hatten, und ehehin mit Sande (wie man dergleichen Gänge in Gärten zu bestreuen pflegt) überschüttet waren. Ich machte mir um so weniger gute Hoffnung von diesem Unternehmen, weil der Garten überhaupt sehr näß, und der um solchen Garten geführte Canal so hoch mit Wasser angefüllet war, daß es dem Erdreiche, in welches die Lucerne gesäet wurde, gleich stand, und man, besonders im Frühjahr 4 bis 5 Z. tief das volle Wasser erlangte, wie denn auch die Lucerne nicht über 3 Ellen von und neben diesem Canal gesäet worden ist.

„Ich ließ das über Winter mit etwas wenigem und schlechten Dünger gestürzte Erdreich im Apr. nochmahls graben; weil es aber allzu schwer und naß war, ließ ich es 8 und mehr Tage, ohne es gleich zu rechen, liegen, wodurch aber die erfolgte Hitze das lettige und thonige Erdreich dergestalt fest gemacht und ausgetrocknet hatte, daß es nicht möglich war, die harten Erd-Klöße mit der schwersten Hacke oder Eisen zu zerschlagen. Ungeachtet nun der Acker gar mit nichts zu zwingen war, so ließ ich doch den Lucerne-Samen darauf streuen; und weil ich glaubte, daß unfehlbar das meiste des Samens in dem harten Erdreiche verloren gehen, oder künftig bey erfolgender Näße verderben müßte, so ließ ich den Samen wohl zwey Mahl dicker, als in jenem Sand-Lande, einstreuen; und weil kein Rechen oder Ege die festen Klöße zu zwingen vermochte, ließ ich solche Saat, und die das ganze Beet bedeckende Klöße nur etwas hin und her stoßen, und dann mit den Füßen, jedoch nicht allzu fest, ein und gleich treten, worauf nach 3 oder 4 Tagen ein starker Regen einfiel, durch dessen Hülfe ich alsdenn die großen Klöße und feste Letten noch etwas zerschlagen lassen konnte.

„Ich kann die Freude nicht beschreiben, die ich empfand, als ich nach 5 oder 6 Tagen den Lucerne-Klee dergestalt dick und gleich aufgehen sahe, daß, allem Vermuthen nach, wenig Körner verloren gegangen sind, und noch mehr, da solcher dergestalt heran wuchs, daß ich medio Junii solchen, da er bis 10 Z. hoch war, das erste Mahl

abgraſen laſſen konnte. Die Begierde aber, von dieſem unvergleichlichen Kraute bald das erſte Jahr Samen zu erhalten, verleitete mich, einen Theil deſſelben ſtehen und fortwachſen zu laſſen, aus welchem ich aber das untergeſäete Wicken-Gemenge ſorgfältig auspflücken ließ, um reinen Lucerne-Samen zu erhalten, und dieſes edle Kraut von jenem Unkraute nicht verdämpfen zu laſſen.

„Meine Sorge war aber auf eine zwiefache Art vergebens, denn dieſer Klee verdämpfte zwar das Wicken-Gemenge und anderes dazwiſchen gewachſenes Gras und Unkraut, weil kein Gras oder Getreide ſo ſtark und geſchwinde, wie die Lucerne, wächſt; aber ich wartete auch den ganzen Sommer, bis in den Sept., ganz vergeblich auf die Blüthen und Samen, maßen auch die wenige Blüthen, die ſich hier und da zeigten, zu ganz keiner Reife gelangten, und da inzwiſchen dieſer Klee über 2, und faſt 3 F. lang gewachſen war, und faſt das ganze Beet bedeckt und ſich gelagert hatte, auch zum Theil zu faulen anfing, ſo mußte ich mir allen Appetit zu dem gehofften Samen vor dieſes Jahr vergehen laſſen, weshalb ich das Kraut abhauen, abtrocknen und zum Winter-Futter verwahren ließ, dabey

und folglich die Nachricht, daß diese Art Klee so viele Jahre zwar dauern, aber nur im trocknen Erdreich conserviret werden könne, gegründet sey? Die aus dem schwersten lettigen Erdreiche ausgegrabenen Stöcke dieser Lucerne aber hatten Wurzeln, die eines Fingers dick und über ½ E. lang waren, und ehe noch einiges Gras oder Blumen im Garten sich zeigten, wuchs diese Lucerne noch schöner und stärker, als im vorigen Jahre, dergestalt, daß ich die Hälfte desselben, den Sommer hindurch, 5 Mahl abhauen lassen, nachdem es jedes Mahl über ¼ E. hoch gewachsen war, und derjenige Theil, den ich zu Samen aufbehalten wollte, davon ließ ich die Hälfte ein Mahl, ungefähr d. 12 May, abgrasen, und dann zu Samen wachsen, die andere Hälfte aber mähete ich vorher und bis d. 12 Jul. noch das zweyte Mahl, alsdenn es auch zur Blüthe und Samen wachsen sollte. Ich kann aber versichern, daß ich von diesem letztern, welcher zwey Mahl abgemähet war, mehr und frischern Samen, als von dem ersten, den ich nur 1 Mahl abgrasen lassen, gehabt habe, weil dieser zu fett gewachsen war, und sich geleget auch etwas gefaulet hatte.

„Weil der Same nicht zu gleicher Zeit reif worden, ließ ich den reifsten von Zeit zu Zeit abpflücken, und im Sept. den Rest abhauen, abtrocknen, und in Gebünden noch etliche Wochen an einem bedeckten Ort gegen die Mittags-Sonne stellen, alsdann solchen, da er genugsam trocken geworden, verwahren und im Winter ausdreschen.

„Ich kann nicht vergessen, noch anzufügen, daß ich nach abgenommenem Samen und abgemähetem starken Klee, noch gegen Ende des Oct. eine mäßige Frucht davon genommen und abgehauen habe, daß ich also auch bey erhaltenem Samen solchen resp. 3 und 4 Mahl genutzt habe.

„Die dritte Probe war ganz von ungefähr und ohne sonderbare Mühe; denn als der Gärtner von dem Lucerne-Samen etwas übrig hatte, welchen er nach vorstehender zweyten Probe in den Garten-Gang in den lettigen Boden gesäet hatte, so nahm ich solchen und streute ihn auf ein, viele Jahre verwildertes und vor etlichen Tagen vom alten Grase und Quecken etwas gereinigtes Blumen-Beet, ohne daß es der Gärtner gemerket, und also auch, ohne daß derselbe den gesäeten Klee einrechen und mit Erde bedecken können, so daß nur der, etliche Tage darauf erfolgte Re-

gen, dieſen Samen in den Erdboden eingeſpühlet und eingedrückt haben mag. Dieſe Lucerne iſt nun ſo gut, wie die in der zweyten Probe beſchriebene, aufgegangen, hat 3 und 4 Mahl im erſten Jahre, und bis 5 Mahl in vorigem Jahre abgemähet werden können, und dennoch die darey geſtandenen Tulipanen und andere Blumen-Zwiebeln nicht ganz verdämpfet, aber auch wenig ander Gras neben und zwiſchen ihren Stücken aufwachſen laſſen; und da der Boden auf dieſer Blumen-Rabatte beſſer, und wenigſtens nicht ſo gar ſchwer, naß und lettig iſt, als daſelbſt, wo ich die erſte und zweyte Probe gemacht habe, überdem die auf die Blumen-Rabatte geſtreute Lucerne niemahls einige Mittags-Hitze von der Sonne empfunden, und eher an einem dumpfigen Orte geſtanden, weil das gegen Mittag vorſtehende Wohnhaus faſt alle Sonnen-Strahlen abgewendet, anbey aber auch die auf dieſer Rabatte befindlichen Franz-Bäume der Lucerne etwas mehr Schatten gegen die Morgen- und Abend-Sonne gehalten, daß es derſelben niemahls an Feuchtigkeit gemangelt, ſo iſt dieſe, ohne alle Mühe und Fleiß, nur obenhin geſtreuete Lucerne faſt ſtärker, als die in der zweyten Probe, gewachſen, und iſt wenigſtens um 1 bis 2 Z. jedesmahl bey der Abmähung länger geweſen; die Wurzeln davon ſind auch bis 1½ F. tief gegangen, und ſind viele davon ſchon im erſten Jahre eines ſtarken Fingers und Daumens ſtark geworden, beſonders diejenigen, die ich nahe an den Franz-Bäumen, um dieſen nicht die Kräfte des Wachsthums zu entziehen, im 2ten Jahre und auch dieſes Frühjahr habe müſſen laſſen heraus nehmen, auſſer welchen, allem Vermuthen und dem Augenſchein nach, auch in dieſem 3ten Jahre noch kein Stock verloren gegangen iſt.

„Ich muß noch anfügen, daß ich dieſe ausgegrabene und ausgezogene Lucerne-Stöcke, nachdem ich ziemlich ein Drittheil der langen Wurzeln abgeſchnitten, wieder verpflanzt habe, welche zu meinem Vergnügen wieder ausgewachſen und keine davon verdorben ſind.

Es folgt hieraus, daß die Lucerne 1. zwar auf einem mit Sande und andern Erdreiche melirten Boden ziemlich und beſſer, als andere Klee-Arten, wächſt, auf einem gar ſchlechten und leichten Sande aber ſeinem Herrn ſehr ſchlechtes Vergnügen und Nutzen geben werde. 2. Daß ſolche in einem feuchten und ſchweren Boden ganz wohl

und

und weit besser, als in einem sandigen oder melirten Mittel-Erdreiche fortwächst, und daß derselben Wurzeln keinesweges durch die Nässe verzehret oder verdorben werden. 3. Daß die etwas dicke Saat desselben besser einschlägt, als die in erwähnter Nachricht angerathene allzu dünne Aussaat, wodurch die zu weit aus einander kommenden Stöcke, dem dazwischen wachsenden Quecken-Grase nicht genugsam wiederstehen können, daher ich solche noch einmahl so dick zu säen anrathe. 4. Daß derselben auch, wie die dritte Probe zeigt, der schattige Boden, noch die ermangelnde Mittags-Sonne, nichts schadet, sondern derselben vielmehr desto stärkern Trieb verstattet; und daß 5. es also gar nicht schädlich, unter die Lucerne etwas Wicken-Gemenge, auch Erbsen oder Gerste ꝛc. zu säen, welche aber nach 4 bis 5 Wochen zum Futter abgehauen werden müßte, weil solches der zarten Lucerne-Pflanze die allzu starke Sonnen-Hitze abwendet, und ihr den anfänglich sehr nöthigen Schatten ertheilt.

„Indessen hat der Verfasser dieser Nachricht von der Lucerne zu wenig gesagt, daß solche im ersten Jahre nur 1 Mahl abgemähet und 1 Mahl abgefüttert werden könne, auch daß solche im 2ten Jahre nur zwey Mahl abgemähet und abgehütet würde ꝛc. Ich habe solche, gedachter Maßen, im ersten Jahre 3 bis 4, und im zweyten Jahre 5 Mahl in voller Größe abhauen lassen, und ihr Wachsthum hat bis in den spätesten Herbst, und bis der volle Frost eingetreten ist, nicht nachgelassen, so daß ich solche noch ganz spät im Jahre hätte können abhüten lassen, wenn es nicht in meinem Küchen-Garten gewesen wäre. Wie denn auch die in der ersten Probe beschriebene Lucerne wirklich im spätesten Herbst ohne Schaden von Pferden, Rind- und Schweinevieh abgefressen worden, welche die Unachtsamkeit des Gesindes in den Gras-Garten eingelassen hatte."

In der Schweitz, hat Tschiffeli Lucerne in die Stoppeln zu säen, auch zu versetzen, und in magerm Lande ohne Mist zu ziehen, versucht. Er erzählt seine Versuche im 1 St. des 4 Jahrg. 1763, der durch die ökon. Gesellsch. zu Bern gesammelten Abhandl. und Beobacht. S. 174, ſgg.

„Lucerne in die Stoppeln geſäet. Es glaubt faſt jedermann, und ich habe es bisher ſelbſt geglaubt, es erfordere die Lucerne einen von langer Zeit her, und mit größtem Fleiß zugerüſteten ſcharf und friſch gedüngten Boden. Da ich aber je länger je mehr mich angewöhne, in Landbau-Sachen wenig für richtig anzunehmen, als was ich ſelbſt erfahren, oder von andern glaubwürdigen Perſonen mit erforderlicher Achtſamkeit verſucht worden iſt, ſo habe ich dieſen Sommer folgende Proben gemacht.

„Ein Acker von ungefähr anderthalb Jucharten, von welchem ich wußte, daß er an ſich ſelbſt gut, weder zu zähe, noch zu leicht, auch ferndrigen Jahrs wohl bearbeitet, und nach Landesart reichlich gedünget worden war, trug dies Jahr unvergleichlich ſchönen, und von allem Unkraut faſt völlig befreyten Weitzen. Alle dieſe Umſtände brachten mich auf den Gedanken, zu verſuchen, ob nicht in die Stoppeln dieſes Weitzen-Ackers Lucerne mit Vortheil geſäet werden könnte. Und was mich noch mehr dazu anfriſchte, war dieſes, daß, wie ich wußte, der Boden dieſes Ackers wenigſtens auf 5 Schuh tief aus gleicher Mittel-Erde beſtunde.

„Sobald demnach die Garben ab dem Acker gebracht worden waren, ließ ich denſelben mit möglichſt ſchmahlen Furchen, ſo tief die Pflugſchar nur reichen mochte, umackern, das wenige Unkraut ſammt den Stoppeln ſorgfältig aufleſen und abtragen, alle gröbern Erd-Klöße in Stücke zerſchlagen, und ſodann mit einer ſchweren eiſernen Ege dieſen Boden ausebnen, und in Ordnung bringen. Hierauf wurden, d. 11 Aug., 14 ℔. Lucerne-Samen bey ſtiller Witterung von Hand ausgeſäet, und mit einer ſehr zarten Ege hinlänglich in die Erde gebracht; eine Arbeit, deren glücklicher Erfolg durch einen, 2 Tage hernach eingefallenen fruchtbaren Regen ungemein begünſtiget worden.

„Nun gegenwärtig, da ſeit der Ausſaat kaum etwas mehr als 9 Wochen verfloſſen, ſteht die junge Lucerne beynahe aller Orten faſt 1 Schuh hoch in gleicher erforderlicher Dichtigkeit, und, nach der Ausſage aller Kenner dieſer Gras-Art, die ſie geſehen haben, ſo ſchön, als man ſie immer wünſchen könnte. Dennoch getraue ich mir nicht, ſie dieſen Herbſt abzumähen. Zu ihrer Stärkung halte ich für beſſer, ſie durch den Winter zuſammen faulen zu laſſen,

inzwischen aber bis auf das Frühjahr, entweder mit altem Dach-Stroh, oder langem Mist, hinlänglich zu bedecken; da denn das künftige Jahr das weitere zeigen wird.

„Ob sich Lucerne und holländischer Klee versetzen lasse. Ich habe im verwichenen May einen Versuch gemacht, ob dieses sich thun lasse. Von jeder Art habe ich ungefähr 500 Pflanzen, die im ferndrigen Frühjahre gesäet worden, ausgraben, die Wurzeln sogleich reinigen, und sowohl als das Kraut verstutzen, nachwärts die Pflanzen ins frische Wasser werfen, und alsobald in gleich guten, doch nur schlecht umgegrabenen Grund versetzen, auch dieselben, zu Abhaltung der Hitze, auf etwa 14 Tage mit Stroh leicht bedecken lassen. Von diesen 1000 Pflanzen sind kaumerlich 4 zurück geblieben. Fast alle, sonderlich die Lucerne, sind diesen Sommer über in ansehnliche Stöcke erwachsen, und werden allem Anscheine nach noch weiter zunehmen. Sollte es möglich seyn, die Kosten dieses Verpflanzens, das im Anfang etwas langsam hergeht, zu verringern, und es z. E. nur dahin zu bringen, daß ein Weibsbild des Tages 2000 Stöcke versetzen könnte, so glaube ich, aus meiner kleinen Erfahrung, dieses Verfahren sehr vortheilhaft. Meine Meinung wäre, sie solchenfalls in Reihen von der Entfernung einer Schuh-Breite zwischen den Reihen, und 6 Z. zwischen den Pflanzen, zu setzen. Ich vermuthe, daß auf diese Weise eine Juchart fast 2 Mahl so viel, als nach der gemeinen Art, abtragen würde; ohne zu rechnen, daß also ein Lucerne-Acker schon im 2ten Jahre zu völligem Abtrage gelangen, und zugleich alle gegründete Hoffnung einer weit längern Dauer geben würde.

„Versuch, die Lucerne in magerm Lande ohne Mist zu ziehen. Zur Probe habe ich ungefähr den dritten Theil einer Juchart in einer abgenutzten magern Wiese mit dem Schäl-Pfluge schälen, die halb dürren Rasen gleich kleinen Oefen von etwa 2 Sch. im Durchschnitte auf einander setzen, und vermittelst etwas wenigen Holzes, und ein Par Stücken Torfs, in jedem Haufen Feuer anstecken, hierauf solches zudecken, und auf diese Weise den Rasen gleichsam braten oder rösten lassen. Ich sage: braten; denn nach meinen Begriffen ist unserer fast durchgängig eisenhaltigen Erde nichts schädlicher, als wenn solche bey den so genannten Mutfeuern roth gebrannt wird. Den gerösteten Rasen

ließ ich hierauf möglichſt gleich auf dem Lande vertheilen, und ſolches mit der Schaufel eines guten Stiches tief umgraben, hierauf verebnen, den Lucerne-Samen darüber ausſäen und unteregen.

„Obgleich nun dieſer Boden bey weitem nicht von der beſten Art iſt, und einen gewiſſen Letten-Sand zum Grund hat, ſo iſt dennoch meine Lucerne dieſen Sommer recht gut fortgekommen. Das durch das Feuer mit ſeinem Samen vertilgte Unkraut hat ihr faſt gar kein Leid zugefügt, und ich habe ſie wirklich 2 Mahl eingraſen laſſen. Dieſes Verfahren kann alſo an Orten, wo man kein beſſeres Land hat, freylich ſeinen Nutzen haben. Da aber die Arbeit langſam von ſtatten geht, und daher koſtbarer iſt, als da, wo man des Brennens nicht nöthig hat, ſo wollte ich ſolche noch zur Zeit um ſo weniger anrathen, als ich noch nicht weiß, ob dieſe anſcheinende glückliche Probe im Verfolge ſich gleich gut erzeigen werde.“

Zu Winſen an der Luhe, hat ein gewiſſer T. im J. 1764, Verſuche mit dem Ray-Graſe und Lucerner-Klee angeſtellt, welche ich aus der 1 Samml. der brſch. lüneb. Landwirthſchaftsgeſellſch. Nachrichten ꝛc. Zelle, 1769, 8. S. 39, fgg. hier anführe.

„Ich habe, ziemlich im Großen, Beſamungen von Ray-Gras und Lucerner-Klee vorgerichtet, und zwar nach ſolchen Vorſchriften, welche mir die leichteſten und natürlichſten geſchienen; indem meine Abſicht mit dem Anbau dieſer Futter-Kräuter aber allein auf die Heide-Gegenden ſeine Beziehungen hat, für nothwendig gehalten, dazu den ſchlechteſten Boden zu wählen, den in dieſer Gegend finden können.

„Ich habe nähmlich dazu nie angebautes Land genommen, und bloß durch ſorgfältige Bearbeitung und guten Dünger ſolches zu meinem Endzweck zubereiten laſſen, in der feſten Ueberzeugung, daß, wenn mein Verſuch hier gelinget, man wegen des Erfolgs in allen möglichen Heide-Gegenden des lüneburgiſchen Landes ohnbeſorgt bleiben könne, im Fall nur einiger Fleiß bey der Beſtellung, und die nöthige Schonung angewendet und beobachtet wird.

„Der Erfolg iſt nicht unter meiner Erwartung geweſen; denn vernünftiger Weiſe konnte und durfte ich es mir nicht vorſtellen, daß auf rohem Lande, welches nur etwa 4

Z. schwarzer Erde, hernach aber groben gelben Sand, auch zum Theil Lagen von Ort-Erde hatte, und mit welchem sich der Dünger im ersten Jahre nicht gehörig vermischen konnte, der Wuchs beträchtlich seyn würde. Indessen habe ich die Zufriedenheit, daß der Boden, so schlecht er auch ist, größten Theils vom Ray-Grase dicht beangert, und der Lucerner-Klee frische und tiefe Wurzeln geschlagen hat, folglich ich mir die gegründete Hoffnung machen darf, es werde sich der Trieb in künftigem Sommer finden, zumahl einige Winter-Pflege noch daran wenden will, und alsdann werde ich im Stande seyn, von meinem Verfahren bey diesem Anbau Bericht zu geben.

„Ausser diesem Versuch habe ich gleichwohl auch mit Ray-Grase und Lucerner-Klee Besamungen auf guten Geest-Lande machen lassen, die recht nach Wunsche gelungen sind. Um die Mitte des May-Monathes ließ ich ein Stück von etwa 1 Himbtsaat Rocken-Einfall mit Lucerner Samen besäen, der mir 3 gute Aernden gegeben, wovon man im ersten Jahre sehr zufrieden seyn kann. Der Versuch mit dem Ray-Grase ist aber durch den Amts-Vogt, Hrn. le Marchand zu Amelinghausen, durch ihm zugesandte 10 ℔. Samen geschehen. Er hat davon 4 Aernden gehabt. Der Boden bey Amelinghausen besteht aus vermischter Leim- und Sand-Erde, dergleichen sich in den Heide-Gegenden vieler Orten findet. Das Hornvieh hat das Ray-Gras sowohl grün, als auch das zum Versuch von 31 Ruthen gemachte Heu, begierig gefressen. Dieser gute Erfolg, welche der Amts-Vogt den Bauern gezeiget und angepriesen, hat bey diesen die Begierde erweckt, gleiche Versuche zu machen. Einige unter ihnen, welche den guten Wuchs des Lucerner-Klees bey mir gesehen, haben auch Samen gefordert, und ich verschaffe ihnen solchen aufs Frühjahr.

„Ich habe im abgewichenen Sommer den Versuch in der Stall-Fütterung mit 6 Kühen mittlerer Größe gemacht, solche mit Lucerner- auch spanischem Klee mit untermischtem Grase füttern lassen, und dadurch die Nutzung in der Milch beynahe dreyfach gegen dasjenige erhöhet, was ich davon gehabt habe, als die nähmliche Anzahl Kühe Tag und Nacht in guter Weide gingen.“

Aus Zelle machte Hr. v. B. unter d. 4 Dec. 1767, folgende Nachricht von dem Anbaue der Lucerne, in der 6ten Samml. gedachten Werkes, (Zelle, 1768.) S. 693, fgg. bekannt.

„Unter andern Versuchen bey meiner kleinen Landwirthschaft habe ich auch mein Augenmerk auf den Anbau der bisher dem Landmanne angepriesenen Futter-Kräuter, und unter diesen der vorzüglich gerühmten Lucerne, gerichtet gehabt, und ich mache mir ein desto größeres Vergnügen, solchen bekannt zu machen, je glücklicher bis jetzt der Erfolg davon gewesen.

„Ich wählte dazu ein umzäuntes Stück Garten-Land, welches aus Leim und etwas schwarzer Erde bestand, nicht, weil ich dieses dazu besonders nützlich hielt, sondern weil ich leider dergleichen Versuche auf meine hin und wieder zerstreuete Feldstücke durch die gemeine Hut und Weide allemahl vereitelt sehen müssen. Ich ließ dasselbe, da es viele Jahre durch zum Wiesenplatz gebrauchet, jedoch nur wenig und schlechtes Gras hervor gebracht hatte, im Frühjahre 1765, 3 Fuß tief umrejolen, wodurch auch der Endzweck, den Anger völlig zu ersticken, und das Unkraut zu vertilgen, erreichet wurde. In der einen Hälfte ließ ich ohne weitere Düngung Kartoffeln setzen, und die andere mit etwas Pferde-Dünger umgraben, und mit Weiß-Kohl bepflanzen, von welchen beyden ich nachgehends nützliche Aernden erhielt.

„Im Herbst, nachdem der Boden leer war, ließ ich denselben tief umpflügen, sowohl um die Erde locker zu erhalten, als dieselbe ferner von allem Unkraute zu reinigen. Im folgenden Frühjahre 1766, zu Anfange des Aprils, ließ ich diesen ganzen Platz, welcher dem Augenschein nach ungefähr ½ Morgen ausmachen dürfte, mit gutem Dünger belegen, und nachdem derselbe 1 F. tief untergepflüget, solche mit der Ege fleißig beziehen. Einige Tage nachher, und zwar d. 7 Apr., ließ ich abermahls den Pflug, jedoch nur ganz seicht, darüber gehen, und sofort in die frischen Furchen 5 ℔. Lucerne-Samen dünn einstreuen, und das Land nachher so zart, wie möglich, egen. Die trockne Witterung, welche beynahe diesen ganzen Monath mit Kälte und rauhen Winden anhielt, ließ den Samen über 14 Tage in der Erde stille liegen, bis ein darauf folgender

der warmer und sanfter Regen denselben mit solcher Munterkeit hervor trieb, daß mein ganzer Acker schon im Anfange des May-Monathes mit unzähligen Pflanzen bezogen war. In der Mitte dieses Monaths, da dieselbe einen Finger lang aufgewachsen, ließ ich das zugleich aufgekeimte Unkraut sorgfältig ausgäten, und in der Mitte des Jun., da meine Pflanzen sich über 1 Schuh hoch zeigten, ließ ich solche, jedoch nach und nach, abmähen, und dem Viehe grün vorwerfen. Die mit warmen Regen und Sonnenschein abwechselnde Witterung trieb dieselben in kurzer Zeit wieder fort, so daß sie in der Mitte des Aug. beynahe 2 Sch. hohe Stängel hatte, und sich so gar ihre Blumen zu zeigen anfingen, da ich dann selbige zum zweyten Mahl, wie vorhin, abhauen und grün verfüttern ließ. Wie solches geschehen, ließ ich das sich ziemlich häufig angefundene Unkraut abermahl ausziehen, und am Ende des Sept. fing ich meine dritte Aernde an, die beynahe eben so nützlich, wie die zweyte, war. Die darauf einfallende Trockniß aber benahm den Pflanzen den fernern Wachsthum, und ließ auch dem Unkraute nicht zu, weiter hervor zu keimen. In der Mitte des Nov. ließ ich den Acker mit langem Dünger belegen, und solchergestalt den Winter durch ruhen. Im folgenden Frühjahre aber, ungefähr in der Mitte des Märzes ließ ich solchen wieder herunter bringen, und das Land mit der Ege überziehen, da sich die Pflanzen bereits unter der warmen Decke hervor gethan hatten. Die rauhe und dürre Witterung, welche in diesem Früh-Jahre ausserordentlich fortdauerte, hielt gleichwohl den fernern Wachsthum der Lucerne lange Zeit zurück. Indessen war ich doch so glücklich, zu Anfange des Mayes meine erste Aernde anzufangen, welche weit ergiebiger war, wie die vorhergehenden, da die Pflanzen theils mehrere, theils stärkere, auch theils höhere Schossen getrieben hatten. Ich fuhr damit von 6 Wochen zu 6 Wochen fort, so daß ich in der Mitte des Sept. 5 gute Aernden gewonnen hatte, und vielleicht noch die 6te erhalten haben würde, wenn nicht die abermahl eingefallene Trockniß meine Hoffnung betrogen hätte.

„Bey allem diesen von dem Anbaue der Lucerne gehabten Nutzen, und meiner darauf gewandten Sorgfalt, darf ich gleichwohl ein Versehen nicht verschweigen, welches ich darunter begangen, daß ich in diesem zweyten Jahre auf

die

die Ausrottung des Unkrauts nicht Bedacht genommen, und dadurch veranlasset habe, daß hin und wieder, wo daſſelbe am häufigſten hervor gekommen, meine Pflanzen zum Theil erſticket, wenigſtens ſich nicht ſo reichlich ausbreiten können, wie ſie ſonſt in einem freyen und reinen Erdreiche gewohnt ſind. Vielleicht aber kann ich dieſem Fehler noch im künftigen Frühlinge abhelfen, wenn ich, wie ich willens bin, das Land mit einem ſeichten Pfluge beziehen, und ſcharf beegen, auch demnächſt das übrig gebliebene Unkraut mit gehörigem Fleiße ausgäten, und die etwa ausgegangenen oder zurück bleibenden Pflanzen mit andern ergänzen laſſe.

„Gegenwärtig ruhet meine Lucerne unter einer warmen Decke von Pferde-Dünger, welche ich vor ungefähr 14 Tagen darüber legen laſſen.

„Noch muß ich zur Ehre und Empfehlung der Lucerne anzeigen, wie ich dieſelbe den ganzen Sommer durch zwey milchenden Kühen morgens und abends vortragen laſſen; und obſchon meine übrige Kühe eben ſo reichlich mit andern Gräſereyen verſorget worden, jene zwey ſich dennoch vorzüglich ſowohl in Anſehung der Menge, als der Güte und Fettigkeit der Milch, hervor gethan haben. Ueberdem habe eine Säug-Stute, welche des Nachts mit ihrem Füllen auf die Weide gegangen, bey Tage die ganze Aerndezeit durch bloß damit füttern laſſen, und dieſelbe hat mit meinen übrigen auf den Stall mit Hafer gefütterten Pferden gleich ſtarke Arbeit täglich verrichtet, iſt dabey gleich munter und bey gleichen Kräften geblieben, hat auch dem Füllen die Milch weit reichlicher, als vorhin, fließen laſſen.“

Sehr inſtructiv ſind auch folgende mit der Lucerne gemachte, und in der 3ten Samml. der brſchw. lüneb. Landwirthſchaftsgeſellſch. Nachrichten, Zelle, 1769, 8. S. 294, fgg. im 8 St. der nützl. Nachr. und Abh. das Oekonomie- und Commerzweſen betreffend, v. J. 1767, Wien, gr. 8. S. 504, fgg. und in Hrn. Pratje allgem. öcon. Magaz. 1 B. 2 St. v. Mon. Sept. 1782, S. 99, fgg. beſchriebene Verſuche.

„Alle

„Alle Arten der Futter-Kräuter wurden von mir mit Sorgfalt in verschiedene Arten von Boden gesäet; ich fand mich aber bey den mehresten, ins besondre aber bey der Esparcette, in meiner Hoffnung betrogen. Bloß die Versuche mit rothem Klee, Ray-Gras und Lucerne, gaben mir Muth, solche ins Größere zu machen. Diese drey schlugen im Größern nach Wunsch ein, vornehmlich aber die Lucerne, daher ich auf die Anbauung dieses Futter-Krautes alle Mühe und Sorgfalt wendete, und der Erfolg hat solche so reichlich belohnt, daß ich den Anbau desselben zu empfehlen mich verbunden achte, um so mehr, da derselbe den Boden über die Maßen verbessert, indem er durch Hülfe seiner senkrecht in die Erde bis 3 F. und drüber eindringenden Wurzel die Säfte zu seinem Wachsthume aus der Tiefe hervor hohlet, die Oberfläche aber durch den Abfall der Blätter jährlich verbessert, und wenn nach drey Jahren das Feld aufgerissen wird, durch die starken vielsprossigen Köpfe oder Kronen über die Maßen dünget, auch durch die in Fäulung übergehende starke Wurzeln den Grund in einer Tiefe von 2 bis 3, und zuweilen mehr Fuß auflockert, und dadurch die zur Vegetation der Pflanzen nöthige Gährung gibt.

„a) Auf starken Kley- Letten- und Leim-Boden treibt diese Pflanze das erste Jahr vortrefflich, nimmt aber in folgenden ab, und wird dünn, weil viele Pflanzen ausgehen, vornehmlich wenn nasse Witterung den Winter durch einfällt. b) Alle gemischte Boden, worin obige drey Arten entweder zum Theil, oder zusammen den größten Theil ausmachen, sind zwar etwas besser, haben inzwischen nach dem ersten Jahre keine bessere Aernden gegeben. Die Pflanze hat nie recht gesprosset, die Schüsse sind stärker, aber nicht lang geworden. c) Ein mittlerer Erdboden, 1 F. tief, unter welchen sich Letten befindet, gab das zweyte Jahr wenig, das dritte fast gar nichts. d) Ein tiefer Erdgrund trieb das erste Jahr mäßig muntere Pflanzen, und 1 bis 1½ F. lange Wurzeln, oben 5, 6 bis 7 Sprossen nach dem ersten Abmähen. Im zweyten Jahre vervielfältigten sich solche zu 20 bis 20 Schößlingen, konnten 3 Mahl gemähet werden, und die Krone war jedes Mahl dicker. Das 2te Jahr gab dieser Grund eine viermahlige Abnutzung, und die mehresten Kronen hatten 50, viele aber mehrere Halme. e) Eben ein solcher, aber zu gleichem

chem Theile mit Sand gemischter tiefer Boden, that fast eben dasselbe. f) Ein Boden, der größten Theils aus Sand, und ungefähr ¼ Erd- und andern Bestand-Theilen zusammen gesetzt war, ließ wenig Unterschied von dem unter e. bezeichneten merken. g) Der fast aus lauter Sand und weniger Erde bestehende Grund, brachte ungefähr die Hälfte des unter b. angeführten Bodens. h) Ein aus Grand und Sand bestehender Acker aber gab eine die Mühe nicht belohnende Ausbeute.

„Das zu Lucerne bestimmte Stück Landes wird, falls es mit Rasen bewachsen ist, um Johannis, falls es aber bereits trägt, gleich nach der Aernde, mit dem gewöhnlichen Pflüge flach umgepflüget, und Furche an Furche gestürzet; vor dem Winter wenigstens 10 Z. tief wieder aufgerissen und umgewandt, und zwar Furche an Furche (*); und so bleibt der Acker den Winter über liegen. So bald die Witterung es erlaubt, wird der Acker mit einer großen Ege, die fußlange Zinken hat, 1 Mahl in der Länge und zwey Mahl in der Quere zerrissen, und darauf mit der gewöhnlichen Ege in der Runde geeget; ferner mit gutem, wohl verfaulten Miste gedünget, welcher gleich darauf tief untergepflüget wird. Nach dieser Arbeit lässet man den Acker also 14 Tage liegen, ehe man denselben besäet. Alsdann überzieht man solchen, vorerwähnter Maßen, mit der großen und kleinen Ege; pflüget den Acker des Tages vorher, ehe man ihn besäen will, kurz und gut ab, eget ihn eben, und streuet alsdann den Lucerne-Samen ordentlich aus, überfährt den besäeten Acker der Länge nach im Trabe, mit umgewandten und mit Dornen durchflochtenen Egen.

„Was den Samen betrifft, so muß derselbe reif und schön, und nicht älter als 1 Jahr, seyn. Derjenige, welcher zu der Zeit gesäet worden, wenn die Eichen Knospen gewinnen, hat den Vorzug vor dem, der früher und später gesäet worden, erhalten. Eine zwölfstündige Einweichung in weichem Wasser hat jederzeit Nutzen geschaffet, die künstlichen Brühen aber haben mehrentheils geschadet. Bey gar trockner Saatzeit hat das Ueberwalzen mit

(*) In manchen Ländern bedient man sich dazu eines andern Pfluges, den man den Haken-Pflug nennet.

mit einer, nicht zu schweren, hölzernen Walze, nach dem Ueberfahren mit der Ege, merklich genutzet.

„Im überjährigen Felde treibt die Lucerne sehr früh, und die im überzweyjährigen noch früher; man verfüttert also die, so am längsten gestanden, zuerst. Die junge ist besser zu Heu, weil sie nicht so harte Stängel und mehrere Blätter treibt. Man muß niemahls mehr mähen, als man den Tag über verfüttert. Sie ist nicht so hitzig, als der spanische Klee; doch ist es gut, daß sie den Pferden, mit etwas Stroh vermengt, in die Raufen gegeben werde. Noch besser aber ist es, wenn sie stark gewachsen ist, daß sie zum Theil mit einem Drittel Stroh zu Häcksel geschnitten werde. Dem Hornviehe ist sie auf gleiche Art, allemahl wenig, aber wenigstens 7 Mahl im Tage, abwechselnd kurz und lang zu reichen. Die Lucerne, so ich zu Heu habe machen lassen wollen, habe ich so, wie solche abgehauen worden, in Grashaufen bringen, und 24 Stunden in sich selbst erhitzen lassen (*), alsdann ausgestreuet, und gleich andern zum Heu bestimmten Gras-Arten, bearbeiten lassen. Alle Lucerne muß, so bald dieselbe anfangen will zu blühen, gemähet werden. Habe ich länger gewartet, so hat die Pflanze nach der Zeit nicht so gut getrieben, und das Heu ist um ein merkliches schlechter gewesen; ja, den schon ganz aufgebläheten und getrockneten hat das Vieh gutem Strohe kaum vorgezogen.

„Meine gemachte Versuche hatten mich von dem Nutzen und der Art des Lucernenbaues versichert. Es kam also nunmehr darauf an, einen noch etwas größern Gebrauch davon zu machen. Ich bestimmte im Frühjahr 1757 ein Stück Ackers von 3600 Quadrat-Ruthen eines aus Erde mit einem Drittel Sandes bestehenden Bodens dazu, ließ dieses begraben, mit lebendigen Hecken einfassen, und theilte es in 6 Theile, um in einer gewissen Ordnung Lucerne und Getreide auf solchem zu erzielen; zugleich aber auch von der, durch die Lucerne zuwege gebrachten Verbesserung des Ackers Vortheil zu ziehen, und auf diese Art dop-

(*) Das ist aber mit Gefahr verbunden; denn sollte eine regnichte Witterung einfallen, so würde es übel aussehen, und eine schlechte Heu-Aernde geben. Die Lucerne würde verbrennen, und Geschmack und Kraft verlieren.

doppelten Nutzen von dem Lande zu haben. Es lag in 6 Feldern abgetheilt. Von diesen bestimmte ich jährlich eines zur Brache, eines zu Winter-Korn, eines zu Sommer-Getreide, und drey zu Lucerne. Um diese entworfene Einrichtung bald in Ordnung zu bringen, ließ ich um Joh. das erste stürzen, und das vierte um Mich., das erste aber nach geschehener Winter-Saat, so tief, als immer möglich, Furche an Furche pflügen.

„Das folgende Frühjahr 1758, so bald es die Witterung erlaubte, ließ ich selbiges mit der großen eisernen und kleinen Ege zerreissen, und eben egen, mit gutem kurzen Miste düngen, und den Dünger wieder sogleich tief unterbringen; darauf am Ende des Apr. wieder, wie oben gesagt worden, 13 Tage darauf zur Saat pflügen und besamen. Das vierte ließ ich bearbeiten, wie die gewöhnliche Brache, mit viermahligem Pflügen, und besäete solches im Herbste mit Rocken.

„Mit dem zweyten verfuhr ich, wie mit dem ersten; mit dem fünften aber wie mit dem vierten im abgewichenen Jahre. In dem darauf folgenden 1759sten J. ließ ich das dritte bearbeiten gleichwie das erste und zweyte; das sechste aber wie das vierte und fünfte in den vorhergehenden Jahren.

„Nach abgeärndetem Rocken von dem vierten Stücke, ließ ich den Acker stürzen, und das Frühjahr darauf kehren, zur Gerste zubereiten, und mit Gerste wirklich besäen, ob man sonst diesen Boden nicht für Gerste, sondern nur für guten Haber recht tauglich hielt. Im J. 1760 waren also meine entworfene Einrichtungen fertig und in Ordnung. Ich hatte 3 Felder mit Lucerne, 1 mit Winter- und 1 mit Sommer-Korn, nebst der Brache, wozu im Herbste das Feld, welches 3 Jahr Lucerne getragen, genommen wird; das aber, so Gerste getragen, wird wie oben das erste bearbeitet und gedünget, und wieder mit Lucerne angesäet. Um dieses deutlich zu machen, habe ich am Ende eine Tabelle darüber beygefüget.

Im J. 1760 und 1761, hatte ich von den drey Lucern-Feldern so, wie in den folgenden Jahren, hinlängliches grünes Futter für 12 Pferde, und so viele starke, große Pflug-Ochsen. Das Getreide aber war wie gewöhnlich. Die Rocken-Aernde von dem ersten Felde, so durch die Lucerne war verbessert worden, war 1762 über mein Verhoffen schön,

und

und bis jetzt ist das Getreide von den Lucern-Feldern vorzüglich gut, und körniger, als alles übrige Getreide in dieser Gegend; ja selbst dieses Jahr, da das Winter-Getreide schlecht gerathen, bringt der Rocken von obgedachtem Felde etwas weniges mehr, als das ächte Korn. Nicht nur aber dieser Versuch, welchen ich nur zum Beyspiel, als meinen ersten anführe, sondern alle übrige bestätigen dieses im Großen.

		Lucerne a.	Lucerne b.	Lucerne c.	Vor-Brache.	Winter-Getreide.	Somer Getreid
e.	Winter-Getreide	Soмer-Getreide.	Lucerne a.	Lucerne b.	Lucerne c.	Vor-Brache.	Winter Getreid
).	Vor-Brache.	Winter-Getreide.	Soмer-Getreide.	Lucerne a.	Lucerne b.	Lucerne c.	Vor-Brache.
).	Dresch.	Vor-Brache	Winter-Getreide.	Soмer-Getreide.	Lucerne a.	Lucerne b.	Lucerne c.

lateiniſchen Buchſtaben bedeuten die Jahre der Gräſerey.

„Kurzer An- und Ueberschlag.

Nach dem in hiesiger Gegend gewöhnlichen höchsten Anschlage würden 100 Quadrat-Ruthen solchen Bodens zu 1 Rthlr. gerechnet werden können, und also der jährliche Nutzen von 3600 Quadrat-Ruthen seyn 36 Rthlr.

Das Nocken-Feld ist besäet mit 9 Scheffel, hat getragen 72 Scheffel. Hiervon die Saat abgezogen, bleiben 63 Scheffel, à 16 Ggr. machen . . . 42 Rthlr. — Ggr.

Im Gersten-Felde sind eingefallen 11 Scheffel, und sind gedroschen 86 Scheffel; hiervon die Aussaat abgezogen, bleiben 75 Scheffel, à 14 Ggr. beträgt . . . . . 43 Rthlr. 18 Ggr.

Die ersparte Weide für 12 Pferde und 12 Zug-Ochsen, zu 3 Rthlr. das Stück, macht . . . . . 72 Rthlr. — Ggr.

Summa 157 Rthlr. 18 Ggr.

Die Arbeit nach hiesiger Land-Art aufs höchste zu Gelde gerechnet, beträgt . . . . . 30 Rthlr. — Ggr.

bleiben 127 Rthlr. 18 Ggr.

Von diesen abgezogen, was die 3600 □ Ruthen nach dem höchsten Anschlage bringen sollten . . 36 Rthlr. — Ggr.

bleibt also der reine Gewinn . . 91 Rthlr. 18 Ggr.

Auch in Astracan, in dem asiatischen Theile des russischen Reiches, wird die Lucerne gebauet, wie aus nachstehendem Auszuge eines Schreibens des Hrn. Translateur Carl Häblitl, an Hrn. C. R. Pallas, von Jun. 1781, im 3 B. der neuen nordischen Beyträge ꝛc. (St. Petersb. und Lpz. 1782, gr. 8.) S. 396, f. zu ersehen ist.

„Theils durch die hier handelnden Bucharen, theils aber durch einen 18 Jahr in der Bucharey als Sclave verbliebenen orenburgischen n, der sich gegenwärtig allhier (in Astr be ich endlich in Erfahrung gebr r-Kraut sey, welches die Buch elches bey ihnen in einem trock-

doppelten Nutzen von dem Lande zu haben. Es lag in 6 Feldern abgetheilt. Von diesen bestimmte ich jährlich eines zur Brache, eines zu Winter-Korn, eines zu Sommer-Getreide, und drey zu Lucerne. Um diese entworfene Einrichtung bald in Ordnung zu bringen, ließ ich um Joh. das erste stürzen, und das vierte um Mich., das erste aber nach geschehener Winter-Saat, so tief, als immer möglich, Furche an Furche pflügen.

„Das folgende Frühjahr 1758, so bald es die Witterung erlaubte, ließ ich selbiges mit der großen eisernen und kleinen Ege zerreissen, und eben egen, mit gutem kurzen Miste düngen, und den Dünger wieder sogleich tief unterbringen; darauf am Ende des Apr. wieder, wie oben gesagt worden, 13 Tage darauf zur Saat pflügen und besamen. Das vierte ließ ich bearbeiten, wie die gewöhnliche Brache, mit viermahligem Pflügen, und besäete solches im Herbst mit Rocken.

„Mit dem zweyten verfuhr ich, wie mit dem ersten; mit dem fünften aber wie mit dem vierten im abgewichenen Jahre. In dem darauf folgenden 1759sten J. ließ ich das dritte bearbeiten gleichwie das erste und zweyte; das sechste aber wie das vierte und fünfte in den vorhergehenden Jahren.

„Nach abgeärndetem Rocken von dem vierten Stücke, ließ ich den Acker stürzen, und das Frühjahr darauf kehren, zur Gerste zubereiten, und mit Gerste wirklich besäen, ob man sonst diesen Boden nicht für Gerste, sondern nur für guten Haber recht tauglich hielt. Im J. 1760 waren also meine entworfene Einrichtungen fertig und in Ordnung. Ich hatte 3 Felder mit Lucerne, 1 mit Winter- und 1 mit Sommer-Korn, nebst der Brache, wozu im Herbste das Feld, welches 3 Jahr Lucerne getragen, genommen wird; das aber, so Gerste getragen, wird wie oben das erste bearbeitet und gedünget, und wieder mit Lucerne angesäet. Um dieses deutlich zu machen, habe ich am Ende eine Tabelle darüber beygefüget.

Im J. 1760 und 1761, hatte ich von den drey Lucern-Feldern so, wie in den folgenden Jahren, hinlängliches grünes Futter für 12 Pferde, und so viele starke, große Pflug-Ochsen. Das Getreide aber war wie gewöhnlich. Die Rocken-Aernde von dem ersten Felde, so durch die Lucerne war verbessert worden, war 1762 über mein Verhoffen schön, und

bige mehrentheils mit den Stängeln auf der Erde kriechend wahrgenommen habe; dahingegen der gebaute Lucern oder Bedde, nach allen Beschreibungen aufrecht wächst. Allein die Bucharen behaupten, daß dieser Unterschied bloß von der Cultur herrühre, und daß der wildwachsende Lucern auch bey ihnen mit kriechenden Stängeln angetroffen werde. — Ist dem also, und die hier wachsende Pflanze ist der wirkliche Lucern, so wäre es leicht, dieses nützliche Gewächs auch bey uns um Astrachan zu bauen, da es hier auf allerley Boden, ja so gar auf den trockensten und salzigsten Stellen, von der Natur erzeugt wird. Eine solche Cultur würde auch hier von großem Nutzen seyn, da man in der Nähe den größten Mangel an guten Weiden hat, sonderlich alsdann, wenn die Wolga alle Niedrigungen überschwemmt, auf den Anhöhen aber alle Kräuter von der Sonnenhitze verdorren".

In der Anzeige von der leipz. ökon. Societät, in der Mich. Messe 1782, S. 11, f. finde ich folgende Nachricht des Amtmannes Wehner in Plauen, vom Anbau der Lucerne und Esparcette in der dasigen Gegend.

„Es sind 8 Jahr, daß ich die höchste Concession erhielt, die hinter dem Schlosse befindlichen Wälle in die vorgelegenen Gräben zu stürzen. Als solches geschehen, ließ ich den denen Feldern gleich niedrig gemachten Wall, welcher 80 Ellen lang, und theils 6, theils 12 E. breit gewesen, und aus lehmigen und leberfelsigen Boden besteht, so tief als möglich war, aufhacken, ihn, wie Garten-Land, mit eisernen Rechen, ohne Dünger, zurecht machen, setzte 10 E. weit aus einander, fruchttragende Bäume in die dazu gemachten großen Gruben; diese wurden mit guter Erde wieder ausgefüllet, und die Bäume darein gesetzt; sodann wurde der ganze Platz mit Lucerne und etwas darunter gemengter Esparcette besäet, jedoch die Baum-Gruben damit verschonet. Die Saat geschahe gegen Bartholomäi. Um Martini ließ ich den ganzen Platz mit klarem Miste überstreuen. Im Frühjahre, medio Martii, wurde der Mist wieder abgerechet; und ich hatte das Vergnügen, dieses neue Kleestück schon im ersten Jahre drey Mahl zu nutzen. Gegen Martini wurde wiederum klarer Mist darauf gestreuet, und solcher im Frühjahre abgeharket. Den 25

Mart.

wie die ſechs zum Lucern- und Kornbau beſtimmten Felder am leichteſten mit Ordnung im Gange gebracht worden, und wie ſie auf einander folgen, und die Producte abwechſeln.

Felder	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765
1.	Lucerne a.	Lucerne b.	Lucerne c.	Vor-Brache.	Winter-Getreide.	Soñer-Getreide.	Lucerne b.	Lucerne a.
2.	Dreſch.	Lucerne a.	Lucerne b.	Lucerne c.	Vor-Brache.	Winter-Getreide.	Soñer-Getreide.	Lucerne a.
3.	Dreſch.	Dreſch.	Lucerne a.	Lucerne b.	Lucerne c.	Vor-Brache.	Winter-Getreide.	Soñer-Getreide.
4.	Vor-Brache.	Winter-Getreide	Soñer-Getreide.	Lucerne a.	Lucerne b.	Lucerne c.	Vor-Brache.	Winter-Getreide.
5.	Dreſch.	Vor-Brache.	Winter-Getreide.	Soñer-Getreide.	Lucerne a.	Lucerne b.	Lucerne c.	Vor-Brache.
6.	Dreſch.	Dreſch.	Vor-Brache	Winter-Getreide.	Soñer-Getreide.	Lucerne a.	Lucerne b.	Lucerne c.

N. B. Die kleinen lateiniſchen Buchſtaben bedeuten die Jahre der Gräſerey.

„Kurzer An- und Ueberschlag.

Nach dem in hiesiger Gegend gewöhnlichen höchsten Anschlage würden 100 Quadrat-Ruthen solchen Bodens zu 1 Rthlr. gerechnet werden können, und also der jährliche Nutzen von 3600 Quadrat-Ruthen seyn 36 Rthlr.

Das Rocken-Feld ist besäet mit 9 Scheffel, hat getragen 72 Scheffel. Hiervon die Saat abgezogen, bleiben 63 Scheffel, à 16 Ggr. machen . . . 42 Rthlr. — Ggr.

Im Gersten-Felde sind eingefallen 11 Scheffel, und sind gedroschen 86 Scheffel; hiervon die Aussaat abgezogen, bleiben 75 Scheffel, à 14 Ggr. beträgt . . . . . 43 Rthlr. 18 Ggr.

Die ersparte Weide für 12 Pferde und 12 Zug-Ochsen, zu 3 Rthlr. das Stück, macht . . . . . 72 Rthlr. — Ggr.

Summa 157 Rthlr. 18 Ggr.

Die Arbeit nach hiesiger Land-Art aufs höchste zu Gelde gerechnet, beträgt . . . . . 30 Rthlr. — Ggr.

bleiben 127 Rthlr. 18 Ggr.

Von diesen abgezogen, was die 3600 □ Ruthen nach dem höchsten Anschlage bringen sollten . . . 36 Rthlr. — Ggr.

bleibt also der reine Gewinn . . 91 Rthlr. 18 Ggr.

Auch in Astracan, in dem asiatischen Theile des russischen Reiches, wird die Lucerne gebauet, wie aus nachstehendem Auszuge eines Schreibens des Hrn. Translateur Carl Hablitl, an Hrn. C. R. Pallas, vom Jun. 1781, im 3 B. der neuen nordischen Beyträge ꝛc. (St. Petersb. und Lpz. 1782, gr. 8.) S. 396, f. zu ersehen ist.

„Theils durch die hier handelnden Bucharen, theils aber durch einen 18 Jahr in der Bucharey als Sclave verbliebenen orenburgischen Kasaken, der sich gegenwärtig allhier (in Astrachan) aufhält, habe ich endlich in Erfahrung gebracht, was das für ein Futter-Kraut sey, welches die Bucharen Bedde nennen, und welches bey ihnen in einem

kommenheit, und erhält sich selbige viele Jahre; einige behaupten 10, andere 16 Jahre, worüber Hr. Simonetti, bey einer nur sechsjährigen Erfahrung, keinen gewissen Ausspruch thun kann, es aber glaubt, weil sie wegen ihrer langen tief unter sich gehenden zähen Wurzel nicht so leicht vergehen kann, zumahl wenn sie von Zeit zu Zeit mit Dünger wieder erfrischet wird. Eine ordentliche Luzern-Wiese kann gewiß 4 Mahl, bey feuchter Witterung auch wohl 5 Mahl abgemähet, und im Herbste von Kühen oder Schafen noch eins abgehütet werden. Man kann sie sowohl grün füttern, als zu Heu auftrocknen, in beyden Fällen muß man sie nicht zu hartstängelig werden lassen. Bey der grünen Fütterung muß man sich wohl hüten, dem Viehe nicht zu viel mit Einem Mahl zu geben; man thut wohl, sie mit Stroh zu vermengen, welches auch das Futter vermehrt. Die Luzerne gibt auch ein schönes grünes Heu, wird nicht gleich so schwarz, und verliert nicht so leicht die Blätter, als der spanische Klee. Die Kühe geben nach der grünen und der getrockneten Luzerne viele und gute Milch, und bey den Pferden vertritt sie die Stelle des Habers; auch die Schweine fressen sie gern, und können damit fett gemacht werden, wenn man ihnen die Luzerne gestampft und mit Kleye gemengt gibt.

„Mit diesen Erfahrungen des Oberamtm. Simonetti stimmen diejenigen größtentheils überein, welche des Hrn. Stats-Ministers Grafen von Hertzberg Exc. auf dem Gute Britz, bey Berlin, seit mehr als 20 Jahren gemacht haben. Der Hr. Graf zieht die Luzerne der Esparsette, dem spanischen und jedem andern Klee, weit vor, und mähet sie gemeiniglich 5 Mahl, da andere Klee-Arten nur 3 Mahl gemähet werden können, auch 10 und mehrere Jahre, anderer Klee aber nur 3 Jahre dauert. Da also die so lange perennirende Lucerne mehr Nutzen, als Weitzen und jede andere Frucht, die jährlich wieder bestellet werden muß, bringt,

bringt, so hat er dazu jederzeit ein Stück seines besten schwarzen, zum Theil auch leimigen, Landes genommen, und an statt es zu pflügen, wobey noch allezeit viel schlechtes Gras hervor kommt und die Luzerne unterdrückt, das dazu bestimmte Land entweder 2 Stich tief regolen und düngen lassen, oder, welches noch leichter ist, ein Stück Landes dazu genommen, welches das Jahr vorher mit Kartoffeln, Weiß-Kohl, oder mit Toback, bestellet, und dadurch mürbe, fett und rein gemacht worden, und es alsdann sehr dick, fast wie mit Lein-Samen, bestellen lassen. Man kann sicher 12 bis 14 Pfund Lucerne auf 1 Morgen rechnen, wenn sie gut bewachsen und lange dauern soll. Man thut aber wohl, die Luzerne, wenn sie aufgegangen, noch eins gäten oder wiethen zu lassen, alsdann dämpfet sie alles Gras, und kann eine lange Reihe von Jahren hinter einander genutzet werden, zumahl wenn man den dritten oder vierten Winter etwas langen Mist darauf fahren, und solchen im Frühjahre wieder abharken läßt, wodurch die Luzerne neue Kraft bekommt. Da sie sehr lang und 2 F. hoch wächst, so reißt das Vieh sie bey der Hitze gemeiniglich aus den Krippen; daher thut man wohl, sie halb mit Stroh vermengt, einen Finger lang schneiden zu lassen, alsdann muß das Vieh sie in der Krippe lassen; es wird das Futter dadurch verdoppelt, und durch die Vermengung gesünder. Zu Britz werden auf solche Art 60 Kühe, vom Jun. bis Sept., drey Mahl des Tages mit Luzern-Hexel aus einem sehr gut bewachsenen Luzerne-Garten, der nicht über 4 Morgen groß ist, gefüttert".

Ich füge auch des Hrn. Rentmeister Beseke in Emden Schreiben über die Verbesserung der Landwirthschaft durch Anbauung der Lucerne, nebst Hrn. v. Schubart Anmerkungen darüber, aus dem 1 Stück des Leipz. Magaz. zur Naturgesch. und Oekonomie, a. d. J. 1786, hinzu.

„Im

„Im vergangenen Jahre reisete ich ins Magdeburgische, in der Absicht, mich von den landwirthschaftlichen Einrichtungen des vortrefflichen Ministers, Ihro Excell. des Hrn. Etats-Ministers von Herzberg, auf dem Gute Briz, zu informiren. Ganz voll der Wunder, so das Futter-Kraut, die Lucerne, daselbst thut, retournirte ich nach Ost-Friesland im Sept. und träumte nun von einer hierselbst zu verändernden Landwirthschaft. Beynahe war mein Plan, durch eine Gesellschaft von 6 bis 8 Personen, mit einzuführender Stall-Fütterung und einer ganz umzuschaffenden Oekonomie eines hiesigen ungefähr 2508 Schritt von Emden gelegenen, und mit 59 Grasen versehenen Bauern-Platzes, (hiesige Benennung eines Guts) einen Versuch anzustellen, zu Stande, als diese kleine Societät mitderum wankelmüthig ward, und mir so unbedeutende Schwierigkeiten in den Weg legte, daß ich sie einer Wiederlegung nicht würdig hielt, sie von der Verbindlichkeit ihrer vorläufigen Subscription zur Pachtung bemeldeten Platzes frey sprach, und mich entschloß, ganz allein mich dieser Sache zu unterziehen, und den möglich daraus folgenden Schaden allein zu tragen.

Wie wenig es meine Absicht sey, mich bey dieser Unternehmung zu bereichern, sondern wie es bloß mein Zweck sey, den Pächter dieses ihm sublocirten Platzes, so von noch fünf andern Plätzen in einer Entfernung von ungefähr 20, 30 bis 100 Schritten umgeben ist, und wovon verschiedene der Pächter, wegen zu hoher Heuer und gar zu ungünstigen Jahreszeiten verarmt sind, zur höhern Nutzung des Vieh-Standes und Bau- und Grünländer, Anleitung zu geben, davon könnte ich sie durch den geschlossenen Heuer-Contract überzeugen. Allein, jetzt nur von meiner in diesem Frühjahre, erst um die letzte Mitte des Maymonaths, weil ich den hierzu bestimmten, im vergangenen Jahre mit Kohl bepflanzten Klee-Acker, nicht früher genugsam präparirt erhalten konnte, ausgesäeten Lucerne, nur ein Par Worte. Meine vom Kaufmann Salefski aus Leipzig erhaltene und ausgesäete Lucerne ging binnen 6 Tagen herrlich auf, als in so Begleitung so vielen Unkrauts, daß des Wietens (Gätens) kaum ein Ende war. Die Kosten des Wietens zu verringern, besäete ich darauf einen andern Strich gutes, das Jahr zuvor gedüngtes Gersten-Land auf englische Manier in Reihen, ließ solche gleichfalls gäten, das zwi-

schen den Reihen sich einfindende Unkraut aber wiederhohlentlich weghacken. Beyde Arten Lucerne ließ ich 3 Wochen nach der Aussaat, um die Wurzeln zu verstärken, mähen, und wiederhohlte solches zum Theil in den ersten Tagen des Augusts, wovon ich etwas Heu bekam, und von der nicht zum zweyten Mahl geschnittenen Lucerne ward ich bereits in der Mitte des Augusts durch die violetten Blumen überzeugt, daß ich den wahren Lucerne-Samen erhalten. Welcher Bestellungs-Art ich den Vorzug einräumen soll, wird die Zukunft lehren. Die in Reihen ausgesäete würde, weil jene wahrscheinlich viel Pflanzen durch das Gäten ohne gewisse Richtung verloren, ungleich besser stehen, wofern die Reihen nicht zu weit von einander angebracht. Diesem abzuhelfen wage ich es, und bin bereits jetzt beschäftigt, jeden Zwischenraum mit 1 bis 2 Reihen besäen zu lassen. — —"

„Anmerkungen über vorstehenden Brief.

Man hat mich verschiedentlich versichert, daß die Stall-Fütterung zu Britz dergestalt geschähe, daß das Vieh auch auf die Weide getrieben werde. Hiervon möchte ich völlige Gewißheit haben; denn in diesem Falle könnte ich es keine ganze Stall-Fütterung nennen, sondern nur eine halbe, wodurch die Viehzucht erst auf dem halben Flecke wäre.

„Es ist Schade, daß sich die kleine Gesellschaft, welche die Stall-Fütterung anfangen wollen, wieder zerschlagen hat. Desto mehr Lob verdient der Muth des Hrn. Rent-Meisters, und in wenig Jahren, wenn er nur erst auf 1 oder 2 Jahre Futter-Vorrath aufgefeimet hat, wird er Nachfolger genug finden; nur rathe ich, ohne Vorrath auf ein volles Jahr wenigstens, sie nicht anzufangen, weil dies ein Fehler der meisten Oekonomen ist, indem leicht ein Jahr Mißwachs im Futter kommen kann, und dann wieder zur Weide geschritten werden muß.

„In Absicht der Lucerne-Aussaat habe ich mich in meinen Schriften mehrmahlen ausführlich erkläret, daß mir dessen Ausführung am allerbesten mit Erbsen gelungen, welche, indem sie zu blühen anfangen, abgemähet werden, wodurch alles Gäten ersparet worden, wenn anders der Acker nicht gar zu ausserordentlich voller Unkraut ist, und 1 Mahl im Herbste oder 2 Mahl, und dann im Frühjahre

1 oder

1 oder 2 Mahl gut und klar umgepflüget und sorgfältig geeget worden ist. (hält Probe)

„Das reihenweise säen auf Tullsche Art ist nicht zu verwerfen; es hat nur das einzige Unangenehme; daß, wenn ein Stock eingehet, oder von den Mäusen abgebissen wird, gar zu große kahle Flecken entstehen.

„Das öftere Abhauen der Lucerne ist recht, weil sich die Wurzeln dadurch verstärken, besonders wenn er noch jung ist. Bis zur Blüthe muß man aber dieselbe nie kommen lassen, weil das Futter sonst schlecht ist.

„Den besten Samen liefert ohne Zweifel Herr Spitzbach in Leipzig.

„Wenn die Reihen einmahl stehen, und jeder Stock 24 Zoll Raum in □ hat, rathe ich zu keiner Zwischenpflanzung oder Düngung; künftiges Jahr, noch mehr aber im dritten Jahre werden die Büsche ganz erstaunlich groß".

Im Oct. 1784.

Schubart.

Etwas gutes und auch nachtheiliges vom Lucerne-Bau, wird in No. 3 des leipz. Int. Bl. v. J. 1784. S. 21. f. in folgender Nachricht gemeldet.

„I. Im Voigtlande.

Der Lucernen-Klee wird, wenn das Land wie Gartenland zugerichtet worden, sodann wie anderer Klee, theils im Frühjahre, theils auch gegen Barthol., in geringen oder etwas lehmigen Boden, und weil er sich stark bestockt, dünn gesäet. Wenn Unkraut hervor kommt, damit dieses den Klee nicht überwachse und ersticke, so wird gegätet. Im geringen und lehmigen Boden ist das Gäten selten nöthig. Gegen Martini oder auch Advent, oder gegen Ende Febr. lasse ich das besäete Kleestück, wenn er auf ungedüngtes Land gesäet worden, mit klarem Miste besprengen, welcher, nähmlich der grobe, 8 bis 10 Tage vor Ausgang oder auch zu Ende März, wieder abgeharket wird. Im Monath Apr. und May, wächst er mit Gewalt, und wird d. 24, 25 n. May, 1 auch 1½ E. hoch, ihn nach und nach abzuschneiden angefangen, und dem Viehe anfänglich halb mit Heu, weiterhin aber mit magerm Grase, bey jeder Fütterung halb ver-

vermengt, vorgeleget, und so alle Monathe damit fortgefahren. In 4 Wochen ist er wieder so groß, als zuerst. Im Sept. wird er selten über 4 E. lang.

„Die Nutzung bey melken Kühen ist beträchtlich, und die Fütterung bey geltem Vieh ist dem Haber gleich.

„Kann die Monathe über der erste oder zweyte Wuchs, wegen der Menge, nicht aufgefüttert werden, so macht man das Uebrig bleibende zu Ende Jun. zu Heu, damit der kommende Julii-Wuchs Platz erhalte. Das Heu wird im Winter zu Häcksel geschnitten, und unter das Stroh-Häcksel halb melirt, welches zu Ausgang des Winters nach Lichtmesse ein vortreffliches Futter ist.

„Ob ich gleich meine auf wildes Land angelegte Lucern- und Esparcette-Stücke den Amts- und andern vielen Unterthanen im schönsten Flor zeige, und ihnen allen Unterricht zum Anbau gebe, so bewundern sie solches zwar, aber mehr thun sie nicht. Nur ein einziger hat mit gutem Erfolge ein ganzes Stück Land besäet, und mich versichert, daß, wo vorher nichts recht fortkommen wollen, jetzt der vortrefflichste Lucern-Klee wachse.

„II. Aus Erfurt.

Mit dem Stotternheimer Klee, eine Stunde von hier, will es nicht recht mehr gehen. Hier zu Lande bauet man ihn wenig. Die Stotternheimer Bauern benutzen mehr den Samen davon zum Verkauf, als den Klee. Ich bin ihm nicht so günstig, als andern Futter-Kräutern, und ich wundre mich, daß man an andern Orten so viel daraus macht. Ich empfehle ihn daher aus vielen Ursachen gar nicht. Denn 1. muß er gepfleget, gedünget, gewartet werden, auf einen guten Acker kommen ꝛc. welche Umstände alle andere Futter-Kräuter nicht verlangen. 2. Verliere ich den Mist, der auf Frucht-Aecker hätte können gebraucht werden. Will man mir einwenden: im Frühjahre wird er wieder zusammen geharkt und weiter gebracht, so sage ich: ein guter Landwirth weiß schon, daß ein solcher Mist verwittert ist, und keine Kraft mehr hat. 3. Zehrt der Klee die Aecker bis auf den Tod aus, so daß sie in etlichen Jahren nicht wieder in Ordnung kommen und tragbar werden. 4. Verwildert er in Unkraut, und dann ist es mit dem Klee zu Ende.

„Ein Unkraut hat den Stotternheimern ihren Klee ganz ruinirt; es iſt Alsine aquatica minor, die ſich ganz mit ihren Wurzeln um die Klee-Wurzeln windet, und ihnen alle Kraft benimmt. Er wächſt daher jetzt ſo ſchlecht, daß er kaum des Jahrs 2 Mahl abgemähet werden kann, da er ſonſt es wohl 5 Mahl litte. Viele Landwirthe bauen ihn jetzt hier zu Lande nicht mehr. In den Gärten hat er böſe Händel an den Obſt-Bäumen angerichtet. Sie ſind auf den Klee-Flecken wie verbrannt und abgeſtorben, weil er ihnen bis in die Tiefe alle Nahrung benommen hat".

Neueſte Anzeige von dem Lucernen-Baue, aus der Gegend von Stotternheim, v. 3 Febr. 1784, aus No. 9 des leipz. Int. Bl. v. J. 1784, S. 71.

„In unſrer Gegend findet der ſo genannte Stotternheimer Klee noch immer vielen und mehrern Beyfall, als der ſpaniſche. Dieſer wurde vor 6 bis 8 Jahren häufig gebauet; aber in den bisherigen trocknern Jahren iſt er entweder gar nicht aufgegangen, oder hat doch ſeine Stelle nicht bezahlt, weswegen ihn viele, und ich ſelbſt, habe abgehen laſſen. Jener aber geht eher auf, und hält ſich, weil er tief wurzelt, auch bey der Dürre weit beſſer, wenn er gut Land hat, und wird deswegen ziemlich häufig angebauet".

Nachricht von dem Futter-Kraute, die Luzerne genannt, aus dem Engl. überſetzt: ſ. im 1 St. der Oecon. Nachrichten ꝛc. Lpz. 1749, 8. S. 45 — 48.

Bedenken über den Anbau des in England ſo ſehr berühmten Futter-Krautes der Luzerne, ſ. eb. daſ. S. 49 — 51.

Ueberſetzung der Beſchreibung der Luſerne; aus dem Dictionn. oeconomique de *Chomel*, ed. de Commercy 1741. ſ. im 10 St. derſ. 1750, 8. S. 781 — 797; ſ. auch das 78 St. derſ. 1754, 8. S. 392 — 396.

Nachricht von der Säung, Nutzen und Wirkung der Luzerne, ſ. im 18 St. der nützl. Beytr. zu den Streitz. Anzeig. v. 30 Apr. 1766, und im 19 St. der Hamb. unp. gemeinnütz. Nachr. a. d. R. d. Wiſſ. u. d. K. v. J. 1768, S. 83, f.

Schreiben des Hrn. Amtm. Herzog, worin derſelbe einige Nachricht von der Luſerne und derſelben Gleichheit mit dem Schnecken-Klee ertheilt, d. d. Hundisburg, d. 29 März 1750, ſ. im 14 St. der Oecon. Nachr. Lpz. 1750, 8. S. 128 — 132.

Schreiben eines adelichen Landwirths aus der Pfalz, eine gründliche Nachricht von der durch den Anbau der Luzerne bewirkten Verbeſſerung des Viehſtandes, enthaltend, ſ. im 37 St. der Oecon. Nachr. Lpz. 1752, 8. S. 60 — 70, und im 68 St. derſ. 1754, 8. S. 483 — 500.

Ausführliche und umſtändliche Nachricht von der Eigenſchaft, Säung und Nutzen des herrlichen Futterkrauts, Lucerne genannt, ſ. im

ſ. im 1 St. der Schleſ. Beym. Samml. Breſl. 1784, 8. S. 87 — 89. und 1 Jahr der Verſuche zu nützen und zu gefallen, Stralſ. 1763, 8. S. 90 — 92, und im 3 St. der Wiener Realzeit. p. J. 1774, S. 35 — 38.

Leeph. Switzer, ſ. oben, S. 681. Anm.

Eines Anonymi eingeſendete Anmerkungen von Eſparette, oder ſo genannten Türkiſchen Klee, wie auch Lucerner-Klee, auf dem Mödiſchen oder Sichel-Klee genannt, ſ. im 137 St. der Leipz. Samml. 1756, 8. S. 404 — 411.

Inſtruction, wie mit dem Lucernebau zu verfahren ſey, ſ. in No. 6 der wöchentl. hall. Anzeig. v. J. 1757.

Eines Gliedes der ökonomiſchen Landgeſellſchaft pro Memoria an einen vornehmen Herrn wegen der Lucerne und anderer Futter-Kräuter, ſ. im 163 St. deſſ. 1759, 8. S. 628 — 638.

Chr. ſt. Reichards Abhandlung von dem Spargel- oder Lucernen-Klee, ſ. in Deſſen gemiſchten Schriften, Erf. 1762, 8. S. 62 — 93.

Unterricht über den Lucerne-Bau, ſ. im 1 B. der Verſuche zu nützen und zu gefallen, Stralſ. 1763, 8. S. 129 — 136.

Von den Vortheilen, Lucerne zu bauen. Ein Schreiben an Hrn. Rod. Davies, d. d. Felſtow Cottage, d. 20 Nov. 1763, ſ. im 2 B. des aus dem Engl. überſ. Museum rust. & commerc. Lpz. 1765, 8. S. 106 — 115.

A method of laying down land with Burnet grass, or Lucern, so as to produce 7 or 8 loads an acre, ſ. im *Gentlem. Magaz.* for Jan. 1764, S. 24.

Von dem ewigen Klee, ſ. Kurzer Bericht vor den Landmann von den vornehmſten Futterkräutern, Zürich, 1764, 8. S. 5 — 8.

Von dem Anbauen der Lucerne. Ein Schreiben von einem, der des Hrn. Tull's Methode des Feldbaues ausübet, d. d. Irland d. 24 Apr. 1764, ſ. im 4 B. des Museum rust. & commerc. Lpz. 1766, 8. S. 158 — 171.

Vom Weitenmachen und Anbaue der Lucerne, d. h. Brachfeld, bey Burny, d. 6 Oct. 1764, ſ. im 5 B. deſſ. S. 343 — 347.

Lettre de Londres sur la Luzerne et la Pimprenelle, ſ. im *Journ. oecon.* Mars 1765, S. 142.

Von der Nutzbarkeit der Lucerne, nach einer neuen Art, dieſelbe fortzupflanzen. Ein Auszug aus dem Eſſay of Husbandry; aus dem London Magaz. Vol. XXXIII, 1764, Dec. S. 605, und Append. S. 686, desgl. Jan. 1765, S. 32, überſ. von Jo. Tob. Köhler, ſ. im 64, 65 und 66 St. des Hannov. Magaz. v. J. 1765, und im Stuttg. allgem. Magaz. v. J. 1767, S. 65 — 75, S. 89 — 104, und S. 113 — 116.

Fragen, die wegen des Lucernen-ſamens nach Frankreich geſchickt worden, aus Hartlibs Geſandſchaft gezogen, und Hrn. Roques von dem ehrwürdigen Hrn. Lambe zugeſandt, ſ. im 8 B. des Mus. rust. et commerc. 1767, 8. S. 22 — 31.

Von Verpflanzung der Lucerne; ein Schreiben des Hrn. Combes, v. 23 Febr. 1765, ſ. eb. daſ. S. 212 — 219.

Vergleichende Betrachtungen über die verschiedenen Methoden, Lucerne zu bauen, von Tho. Comber, st. im 10 B. dess. 1769, 8. S. 270 — 278, und S. 287 — 291.

Fragen, Versuche und Anmerkungen, die Lucerne, wälsche Biberelle und andere Artikel der Feldwirthschaft betreffend; in einem Briefe von Jac. Crokatt, und in drey andern von Hrn. Lewis, st. eb. das. S. 143 — 157.

Practical observations on the culture of Luzerne, Turnips, Burnet, Timothygrass and fowlmeadons Grass. Lond. 1766, 8.

Ernst Wilh. v. Winzingerode Versuche mit der Lucerne, st. in der brschw. lüneb. Landwirthschaftsgesellsch. Nachrichten ꝛc. 2 B. 2 Samml. Zelle, 1769, 8. S. 189 — 197.

J. Bergers erweiterte Wiederhohlung über des unbenannten Hrn. Verfassers Vortheil des Anbaues von Lucerne gegen Klee, st. im 21 St. der gel. Beytr. zu den braunschw. Anz. v. J. 1786.

6. Gestreckter Schnecken-Klee mit nierenförmiger vielsamiger Hülse, gelber Sichel-Klee, wilder Sichel-Klee, Acker-Klee, grosser Stein-Klee, wildes heiliges Heu, schwedisches Heu, gelbe Lucerne, schwedische oder deutsche Lucerne, schwedischer Heu-Same, Medica sylvestris floribus cruceis *J. B.* Trifolium sylvestre luteum, siliqua cornuta, vel Medica frutescens *C. B.* Medica flore luteo *Clus.* Lens maior repens *Tab.* Falcata *Riv.* Medica caule procumbente, siliqua semel inflexa floribus racemosis *Hall.* Medicago falcata, pedunculis racemosis, leguminibus lunatis, caule prostrato *L.* Engl. yellow Medick, wächst in ganz Europa, auf magern, trocknen und der Sonne ausgesetzten Feldern, um die Wiesen, Wälder, und auf Hügeln, wild, und blühet den Sommer über häufig. Die starke und zähe Wurzel geht tief in die Erde, und dauert mehrere Jahre. Auch die ausgestreckten, in viele Zweige verbreiteten, holzigen Stängel dauern den Winter über, und schlagen, wenigstens am untern Theile wieder aus. Sie sind gemeiniglich 2 Schuh lang; wenn sie sich aber an andern Gewächsen anhalten können, oder unterstützet werden, erreichen sie wohl 4 Sch. Länge. Die drey Blättchen sind lang, schmahl, abgestumpft, fein ausge-

gezähnt und nervig; der mittelste Nerv verlängert sich in eine kleine vorragende Spitze. Die Blatt-Ansätze sind lanzenförmig, ausgezackt, und sitzen noch an dem Stängel und den Zweigen, wenn sie gleich schon dürre sind. Die Blumen erscheinen im Jun. und Jul., und stehen trauben- oder ährenförmig. Die obern Zähne des Kelches sind gegen einander gekehrt, und der unterste ist der längste. Die Blumenblätter sind zuweilen ganz gelb, zuweilen auch violet; gemeiniglich verändern sie die Farbe, je mehr sie dem Abfallen nahe sind, und die gelbe Farbe wird grünlich, und endlich bläulich. Das Fähnchen ist ausgeschnitten, und dessen Seiten-Theile sind ausgebreitet; die Flügel haben lange Wiederhaken. Die Frucht ist breit, halbmondförmig, und enthält gemeiniglich 4 Samen. Hr. v. Haller hat im Walliserlande die Schote den ganzen Kreis vollenden, auch einen Theil des zweyten anfangen gesehen. Die Schweden, als: Linné (*), und noch neuerlich Gädd (**), schlagen ihn als ein gutes Futter-Kraut vor; und er kann allerdings auf sandigem und andern unfruchtbaren Boden, in welchem kein anderes Gewächs gedeihet, wenn er nur trocken ist, mit Nutzen gepflanzet werden; auf einem guten Boden aber lohnt er die Mühe nicht. Er füttert zwar gut, so lange er noch jung ist; wird aber, wenn er stark, hart und grobstielig geworden ist, von dem Viehe nicht sonderlich geachtet. Da er auch auf der Erde aufliegt, ist das Abmähen beschwerlich. Indessen kann man ihn, wie gesagt, auf unfruchtbaren Plätzen, und sandigen Feldern, wo sonst nichts wach-

(*) Im 4 B. der Abh. der Kön. schwed. Akad. d. Wiss. a. d. J. 1742. (nach der deutsch. Uebersetz. Hamb. 1750, gr. 8.) S. 220, fgg.

(**) In seinem Försök til en systematisk indelning i Swenska

sen will, anbauen. Man sammelt den Samen, wenn er reif ist, (in der Mitte des Sept.) trocknet ihn mit den Hülsen gelinde, hebt ihn den Winter über an einem trocknen und gemäßigt warmen Orte auf, und säet ihn im Frühlinge, mit oder ohne Hülsen, wie andern Klee. Um ihn mehr gerade stehend, und zum Abmähen bequemer zu haben, kann man ihn mit andern Futter-Kräutern und Gräsern, die ihn in die Höhe halten, so im Gemenge aussäen, daß von seinem Samen gegen die andern nur der dritte Theil genommen werde. Nach der verschiedenen Güte des Landes kann man ihn in dem ersten Jahre schon ein oder zwey, im zweyten aber drey Mahl hauen; hernach aber muß man alle 2 oder 3 Jahr die Pflanzen reifen, und den Samen ausfallen lassen. Dieser Klee soll besonders den Pferden angenehm seyn. Die Blumen geben vielen Stoff zu Honig, und sind, ihrem Baue nach, den Bienen, zur Sammlung desselben bequemer, als viele andere Blumen, in welchen der Kiel allzu fest verschlossen ist.

Rammelt hat diesen Klee in den Werdern an der Saale wild wachsend, und noch im Dec. 1766, ungeachtet der Schnee darauf lag, grün angetroffen. Schrebers neue Cameralschr. 8 Th. Lpz. 1767, 8. S. 251.

M. Beantwortung der Aufgabe: Ob der im 4 Th. der Abhandl. der kön. schwed. Akad. d. Wiss. S. 220, angepriesene schwedische Heusame auch bey uns wachse, und welchen deutschen Nahmen er führe? st. im 75 St. der Hannov. gel. Anz. v. J. 1753.

De la Luzerne jaune, s. *Journ. oecon.* Juin 1762.

7. Gestreckter Schnecken-Klee mit nierenförmiger einsamiger Hülse, Hopfen-Schnecken-Klee, Hopfen-Lucerne, Trifolium pratense luteum capitulo breviore *C. B.* Melilotus minima *Riv.* Medicago lupulina, spicis ovalibus, leguminibus reniformibus monospermis, caulibus procumbentibus *L.* Engl. Melilot Trefoil. Man findet ihn in ganz Europa auf Wiesen. Seine zweyjährige Wurzel treibt zahlreiche ästige Stängel, welche auf der Erde liegen, und

und oft nur 1 Sch. lang werden. Der Blattstiel ist lang, und die drey Blättchen sind weich, etwas haarig, am Rande fein gezahnt. Die Blüth-Aehren stehen am Blatt-Winkel, zeigen sich im May, und bestehen aus kleinen gelben Blumen. Bey dem Kelche ist der oberste Zahn der kürzeste, und der unterste der längste. Die Flügelblätter haben keinen Wieder-Haken. Die Hülse ist gestreift, runzelig, einiger Maßen borstig, nierenförmig, und enthält nur Einen länglich runden Samen. Es ist diese Art von dem oben beschriebenen aufrecht stehenden gelben Hopfen-Klee gänzlich unterschieden, obgleich beyde einander ganz ähnlich sind. Man kann diese Pflanze, die nur sehr niedrig und klein wächst, eben nicht als ein Futter-Kraut, ob sie gleich von den Engländern, als ein solches, eigens ausgesäet wird, empfehlen. Aber dazu ist es sehr gut, daß die Vieh-Weiden damit begamet werden, nachdem die unzuchtigen oder minder guten Gräser und Kräuter durch schickliche Cultur fortgeschaffet worden sind; denn hier wird es auf der Trift für allerley Arten von Vieh, besonders aber für Kälber und Fohlen, ein sehr dienliches Futter zum Abweiden.

8. Gestreckter weißwolliger Schnecken-Klee, Meerstrands-Schneckenklee, See-Schnecken-Klee, Medica marina *Lobel.* Medica cochleata πολυακανθος, capsula spinosa minore, perennis, incana, maritima *Moris.* Medica lutea gnaphalitea marina nostras e littore veneto *Donati.* Medicago marina, pedunculis racemosis, leguminibus cochleatis, spinosis, caule procumbente tomentoso *L.* Engl. Sea-Medick, wächst an dem mittelländischen Meere, ist in allen Theilen mit einer dichten, weißen Wolle bekleidet, und dauert in allen Theilen den Winter über und mehrere Jahre aus. Die Stängel liegen auf der

Erde, und verbreiten ſich in Zweige. Am Blattſtiele ſtehen lanzenförmige, völlig ganze Blatt-Anſätze, und die drey Blättchen ſind verkehrt eyförmig, und gleichfalls völlig ganz. Aus dem Blattwinkel treiben entweder Zweige, oder Blütſtiele. Die Blumen kommen im Jun. und Jul. zum Vorſchein, ſtellen ein Köpfchen vor, und ſind gelb; die meiſten fallen bey uns ab, andere laſſen eine kleine, gemeiniglich dreyfach gewundene, auch wollige, und mit kleinen Stacheln beſetzte Hülſe zurück. Dieſe Pflanze wird aus dem Samen gezogen, und denſelben muß man im Sommer in eine warme Rabatte, auf einen trocknen Boden ſäen, wo die Pflanzen nachgehends bleiben können. Wenn die Pflanzen aufgegangen ſind, kann man 2 oder 3 in kleine Töpfe ſetzen, um ſie im Winter unter Obdach bringen zu können, weil diejenigen, welche im freyen Felde ſtehen, bey einfallender ſtarken Froſte insgemein zu Grunde gehen, ungeachtet ſie die Kälte unſerer ordentlichen Winter gar wohl vertragen können, wenn ſie nur in einem trocknen Boden und an einem bedeckten Orte ſtehen. Diejenigen Pflanzen, welche in dem Felde ſtehen bleiben, erfordern weiter keine Cultur, als daß man ſie verdünne, wenn ſie zu dicht beyſammen ſtehen, und daß man ſie fleißig vom Unkraute reinige. Man kann dieſe Sorte auch durch die abgeſchnittenen Zweige fortpflanzen. Dieſe ſetzt man im Jun. oder Jul. in eine ſchattige Rabatte, und bedeckt ſie dicht mit einem Glaſe, um die äuſſere Luft davon abzuhalten. Dieſelben werden beyläufig in 6 Wochen Wurzeln bekommen; alsdann kann man ſie entweder in eine warme Rabatte, oder in Töpfe ſetzen, und ſie wie die aus dem Samen gezogenen Pflanzen behandeln.

9. Jähriger geſtreckter Schnecken-Klee mit vielfach gewundener Hülſe, wahrer Schnecken-Klee, Medica ſcutellata *J. B.* Medicago polymorpha.

pha, leguminibus cochleatis, ſtipulis dentatis, caule diffuſo *L.* Engl. polymorphous Trefoil. Unter dieſem Nahmen vereinigt Linné viele Sorten, welche in der Geſtalt und übrigen Beſchaffenheit der ſchneckenförmig gewundenen Hülſe ſich zwar merklich, auch, wie die Unterhaltung derſelben in dem Garten zeigt, unveränderlich von einander unterſcheiden, jedoch in Anſehung der Gränzen unter einander nicht füglich beſtimmt und abgeſondert werden können. Die Herren Sauvages und Gerard haben von einigen die Unterſcheidungs-Zeichen angegeben, und Linné hat dieſe Unter-Arten durch Beynahmen von einander abgeſondert, ob ſie gleich nicht hinreichend und deutlich genug ſind. Alle ſind jährige Pflanzen mit geſtreckten Stängeln und Zweigen, ſägeartig gezahnten Blättchen und dergleichen Blatt-Anſätzen. Sie wachſen in den ſüdlichen Ländern Europens. Die vorzüglichſten ſind folgende.

a) Tellerförmiger, kreisrunder oder platterunder Schnecken-Klee, Schnecken-Klee mit kreisförmigen Hülſen, Medicago orbicularis, leguminibus ſolitariis cochleatis depreſſis planis, ſtipulis ciliatis, caule diffuſo *L.* Seine Blatt-Anſätze ſind gefranſet. Der Blumen-Stiel endigt ſich mit einer Granne, und trägt nur Eine Blüthe. Die Frucht iſt linſenförmig, oder rundlich, platt, und an den Windungen ohne Stacheln, doch runzelig.

b) Schildförmiger Schnecken-Klee, Schild-Klee, Medica platycarpos *Camerar.* Medica ſylveſtris prior *Dalech.* Medicago ſcutellata maior dicarpos, capſula rotunda globoſa ſcutellata *L.* Engl. Common Snail Medicago. Die Blatt-Anſätze ſind gezahnt. Die Blumen-Stiele endigen ſich in Grannen. Die Früchte ſtehen einzeln, haben die Geſtalt einer halben Kugel, und die Windungen ſind ohne

Stacheln und vertieft. Nach Gerard ſtehen mehrere Blümchen auf Einem Stiele.

c) Gedrehter Schnecken-Klee, Schnecken-Klee mit gedrehteten oder gewundenen Hülſen, Medicago tornata, leguminibus cochleatis nudis cylindricis, apice baſique planiuſculis *L.* Die Blatt-Anſätze ſind gezahnt. Die Früchte, deren mehrere beyſammen ſtehen, haben beynahe die Geſtalt einer Walze, und ihre Windungen ſind ohne Stacheln und flach.

d) Kräuſel-Wirbel, oder Wirtel-Klee, birnförmiger Schnecken-Klee, Medicago turbinata, leguminibus cochleatis inermibus ſubcylindricis, extremitatibus complanatis *L.* Engl. Turbinated Medick. Die Hülſe iſt länglich, an beyden Enden breit gedrückt, von ziemlicher Größe, ohne Stacheln, gleicht der Geſtalt nach faſt einer Birn.

e) Durchflochtener Schnecken-Klee, Dornen-Krone, Horn-Igel, Igel-Klee, Medica magno fructu, aculeis ſurſum et deorſum tendentibus *Tourn.* Medicago intertexta, pedunculis vnifloris, leguminibus cochleatis ſphaericis, ſpinis longioribus divaricatis recurvis *L.* Engl. Hedgehog-Medicago. Die Blatt-Anſätze ſind gezahnt. Jeder Blüth-Stiel trägt 2, auch 3 Früchte; nach Gerard ſtehen ſie nur einzeln. Dieſe ſind ey- oder mehr kugelförmig, und ihre Windungen ober- und unterwärts mit ſteifen und zurück gebogenen Stacheln beſetzt.

f) Arabiſcher Schnecken-Klee, Medicago arabica *L.* Die Blättchen ſind herzförmig, und zuweilen mit einem braunen oder röthlichen Flecke bezeichnet. Die Blatt-Anſätze ſind gefranſet. Der Blüth-Stiel trägt 2, auch mehrere Früchte; dieſe ſind unten flach, oben aber etwas ſchmähler. Die Windungen ſind flach, und mit hervor ſtehenden, an der Spitze gekrümmten Stacheln beſetzt.

g) Gekrönter Schnecken-Klee, Medicago coronata *L.* Medicago fructu minimo, coronulam utrinque dentatam referente *Sauv.* Die Frucht ist sehr klein, platt gedrückt, und stellt eine auf beyden Seiten ausgezackte, oder mit kleinen Stacheln besetzte Krone vor. Nach Gouan's Wahrnehmung sind die Blatt-Ansätze pfriemenartig und völlig ganz. Der Blüth-Stiel trägt mehr als Eine Blume.

h) Gefranseter Schnecken-Klee, Medicago ciliaris, pedunculis multifloris, leguminibus congestis globosis hispidis, stipulis ciliatis *Linn.* Engl. Clustered-fruited Medick. Die Blatt-Ansätze sind gefranset. Die Früchte stehen in mehrerer Zahl bey einander, sind ey- oder kugelförmig, und ihre Windungen mit ziemlich geraden und rauchen Stacheln besetzt.

i) Rauher oder zottiger Schnecken-Klee, Medicago hirsuta, pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis, spinulis hamatis, stipulis integris *Linn.* Engl. hairy Medick. Die Blatt-Ansätze sind sägenartig gezahnt. Die Früchte stehen einzeln, sind kugelrund, und mit kurzen Stacheln besetzt. Nach Gerard sind die Blatt-Ansätze ganz, und es stehen mehrere Blumen bey einander.

k) Steifer Schnecken-Klee, Medicago rigidula *Linn.* Die untern Blättchen sind keilförmig, die obern rundlich; die Früchte breit gedrückt, und haben steife Stacheln.

l) Ganz kleiner Schnecken-Klee, Medicago minima *L.* Die Blatt-Ansätze sind ganz. Die Früchte stehen in mehrerer Zahl bey einander, sind sehr klein, und die Windungen mit seitwärts gekrümmten Stacheln besetzt. Diese Art wächst, wie Gleditsch angibt, in der Mark Brandenburg auf Höhen, welche gegen Mittag gelegen sind, und wo der Sand mit etwas Lehm vermischt ist. Wenn die Pflanze noch

glatt, auf der andern aber knotig und faſt ſichelförmig ſind. Man findet dieſen Klee zuweilen in Gärten. Man kann ihn aus dem Samen ziehen, welcher aber insgemein ein Jahr über in der Erde liegt, ehe er aufkeimet. Man muß ihn daher in Töpfe ſäen, die mit leichter Erde angefüllt ſind, und dieſe Töpfe in ein Miſt- oder Lob-Beet eingraben. Wenn die Pflanzen im Anfange des Jun. nicht zum Vorſchein kommen, muß man die Töpfe aus dem Miſtbeete nehmen, und an ſolche Oerter ſtellen, wo ſie nur die Morgen-Sonne haben. Auch muß man ſie vom Unkraute rein halten. Im Herbſte muß man ſie in ein altes Lob-Beet unter ein Glas-Gerähme ſetzen, wo ſie im Winter vor Regen und Froſt verwahrt ſind. Setzt man ſie hernach im Frühlinge wieder in ein friſches Miſtbeet, ſo werden die Pflanzen endlich aufgehen. Wenn die Pflanzen zum Verſetzen tauglich und ſtark genug ſind, ſetzt man ſie einzeln in kleine Töpfe, die mit leichter Erde angefüllt ſind. Dieſe Töpfe müſſen in ein ſehr temperirtes Miſtbeet gegraben, und im Schatten erhalten werden, bis ſie wieder aufs neue eingewurzelt ſind. Alsdann muß man ſie allmählich abwarten, und an die freye Luft gewöhnen; in dieſe müſſen ſie im Jun. und zwar an einen ſolchen Ort gebracht werden, wo ſie bedeckt ſtehen. Im Herbſte ſtellt man ſie in ein altes Lohbeet unter ein Glas-Gerähme, wo man ihnen bey gelindem Wetter friſche Luft geben, und ſie vor dem Froſte verwahren kann. Miller hat dieſe Pflanze im freyen Felde in einer ſehr warmen Rabatte wachſen geſehen, wo ſie, indem man ſie bey kaltem Wetter bedeckte, zwey Winter ausgedauert hat; doch iſt ſie im dritten Winter durch die eingefallene ſehr ſtrenge Kälte zu Grunde gerichtet worden.

In Perſien ſchwitzt, bey ſtarker Sommer-Hitze, aus den Blättern ein fetter und ſchmieriger Saft, von einer Honig-Conſiſtenz, welcher zur kühlen Nachtzeit ver-

verdickt wird, und eine Gestalt von Körnern bekommt, welche Alhagi-Manna genannt werden, und wie Koriander-Körner aussehen. Man sammelt sie, und macht ziemlich dicke Brode, von dunkelgelber Farbe daraus. Dieses Manna, (welches aber nicht so gut wie das calabrische ist) und die Art, dasselbe zu sammeln, hat Fothergill (*) beschrieben.

Diese Spezerey-Ware wird hauptsächlich um Tauris, einer Stadt in Persien, gefunden, wo dieses Stauden-Gewächs in Menge anzutreffen ist. Sir Georg Wheeler fand sie in Tinos, und glaubte, daß dasselbe noch nie sey beschrieben worden. Tournefort traf es auf den Ebenen in Armenien und Georgien in Menge an, und machte eine besondere Gattung daraus, die er Alhagi nannte.

2. Süß-Klee mit Hasenöhrlein-Blättern, mit unbewehrtem Stängel, und einfachen, lanzenförmigen und spitzigen Blättern; Hedysarum bupleurifolium foliis simplicibus lanceolatis acutis, caule inermi *Linn.* Er ist in Ost-Indien zu Hause. Seine Blatt-Ansätze sind sprenartig, und so lang als die Blatt-Stiele; seine Hülsen aber knotig.

3. Süß-Klee mit Wiesengeld-Blättern, mit einfachen und keilförmigen Blättern; Hedysarum nummularifolium, foliis simplicibus cuneiformibus *L.* Er hat mit der vorhergehenden und den zwey folgenden Arten einerley Vaterland.

4. Nierenförmiger Süß-Klee, mit einfachen und nierenförmigen Blättern; Hedysarum reniforme, foliis simplicibus reniformibus *L.* Seine Stängel sind fadenförmig; die Blätter haben die Gestalt der Haselwurz-Blätter, aber längere Stiele, und sind klein, oft zugestumpft und nacket. Seine Blatt-Ansätze sind sehr klein. Zwey seiner Blumen stehen an dem

(*) Observations on the Manna Persicum. In 7 Vol. Med. Obs. & Inq. p. 1[illegible] im 5 Th. der Phys. Oekon. Bibl. 4 B. 3 St. 8 Apr. [illegible] S. 36 — 39.

dem Gipfel des Stängels, und eins bis zwey in den Winkeln der obersten Blätter.

5. Gefleckter Süß-Klee, mit einfachen eyrunden und stumpfen Blättern; Hedysarum humile, capparidis folio maculato *Hiller.* Hedysarum maculatum, foliis simplicibus ovatis obtusis *L.* Engl. spotted Indian Hedysarum. Seine Wurzel ist zähezig. Sein Stängel zart, und fast 1 Sch. hoch. Die Blätter sind klein, und stehen auf zarten Stielen. Die röthlich gelben kleinen Blumen, parweise über einander an dem Gipfel des Stängels. Man kann ihn aus dem Samen ziehen, den man im Frühlinge auf ein Mistbeet säet. Wenn die Pflanzen stark genug sind, setzt man sie einzeln in kleine Töpfe, die mit leichter Erde angefüllt sind, und in ein Mistbeet gegraben werden, erhält sie, bis sie eingewurzelt sind, im Schatten, behandelt sie, wie andere zarte Pflanzen aus warmen Ländern, und erhält sie beständig in dem Glas-Hause, oder in der Glas-Casse.

6. Süß-Klee mit Styrax-Blättern, mit einfachen herz- oder tellerförmigen, zugestumpften und auf der Oberfläche glatten Blättern; Hedysarum styracifolium, foliis simplicibus cordato-orbiculatis retusis supra glabris *Linn.* Asien ist das Vaterland dieser Pflanze, welche ganz rauch ist. Ihr Stängel ist staudig, und ihre Blatt-Ansätze lanzenförmig.

7. Brownischer Süß-Klee, mit einfachen und eyrunden Blättern, deren untere Fläche seidenartig, und deren Stiele ohne Stacheln sind, Spartium scandens, citri foliis, floribus albis ad nodos consertim nascentibus *Plum.* Hedysarum echastaphyllum, foliis simplicibus ovatis subtus sericeis, petiolis muricis *Linn.* ist in dem südlichen Amerika zu Hause. Seine Wurzel ist bleibend. Sein Stängel windet sich bis 12 Sch. hoch an den benachbarten Körpern hinauf, und treibt zur Seite einige kleine Aeste. Seine weiße Blumen

men ſtehen in dichten Büſchein an den Seiten der Stängel. Er iſt zart, und kann aus dem Samen gezogen werden, den man bald im Frühlinge auf ein Miſtbeet ſäet. Wenn die Pflanzen aufgegangen und ſtark genug ſind, theilt man ſie ab, und ſetzt ſie einzeln in kleine Töpfe, die man in ein friſches Miſtbeet gräbt, und, bis ſie eingewurzelt ſind, im Schatten erhält.

8. Süß-Klee vom Ganges, deſſen Blätter einfach, eyrund und ſpitzig ſind, und Anſätze haben; Hedyſarum indicum, folio ſingulari acuminato *Tourn.* Hedyſ. monophyllum latifolium, ſiliculis plurimis ſpica longa digeſtis *Burm.* Hedyſ. foliis ſimplicibus ovatis acuminatis, ſpicis longiſſimis nudis terminalibus *Mill.* Hedyſ. gangeticum, foliis ſimplicibus ovatis acutis ſtipulatis *Linn.* Er kommt, wie die 3 folgenden Arten, aus Oſt-Indien, iſt jährig, und wird ungefähr 3 Sch. hoch. Sein Stängel iſt zart, ſtrauchig, nach dem Boden zugebogen und äſtig. Die Blätter ſind eine Hand breit, länglich eyrund, und ſitzen auf ganz kurzen Stielen. Die matt purpurrothen Blumen ſtehen einzeln an den Gelenken der Aeſte. Die Hülſen ſind gegliedert und ſägenartig gezahnt. Man kann ihn, wie die vorhergehende Art, fortpflanzen, und muß ihn eben ſo behandeln, aber im Herbſte in das Loh-Glashaus bringen.

9. Süß-Klee mit Scheiden, deſſen Blätter einfach und herz- oder lanzenförmig ſind, auf einfachen Stielen ſtehen, und ſcheidenartige Anſätze haben; Hedyſarum vaginale, foliis ſimplicibus cordato-lanceolatis, petiolis ſimplicibus, ſtipulis vaginalibus *L.* Die Wurzel iſt jährig; der Stängel kriechend; die Blätter flach, ſpitzig, und etwas dick.

10. Dreyſeitiger Süß-Klee, mit dreyſeitigen Aeſten und einfachen länglichen Blättern, welche auf geflügelten Stielen ſtehen; Onobrychis zeylanica auranti folio *Pet.* Hedyſarum triquetrum, foliis ſimplici-

plicibus oblongis, petiolis alaris, ramis trigonis *L.* wächst in Indien wild. Die Blätter sind den Pomeranzen-Blättern dermaßen ähnlich, daß man sie kaum von ihnen unterscheiden kann, so lange sie noch jung sind.

12. Zapfentragender Süß-Klee, dessen Blätter einfach, und die Blattdecken an den Zapfen aufgeblasen, herzförmig und stumpf sind: Hedysarum strobiliferum, foliis simplicibus, bracteis strobilorum inflatis cordatis obtusis *L.* Die Blätter stehen wechselweise.

13. Zweyblätteriger Süß-Klee, dessen Blätter zu zwey auf eigenen Stielen, und die Blattdecken doppelt stehen, eyrund und spitzig sind, und fest aufsitzen; kleiner zweyblätteriger spanischer Klee mit gelber Blume; Hedys. minus diphyllum flore luteo *Sloan.* & *Raj.* Hedys. herbaceum procumbens, foliis geminatis spicis foliatis terminalibus *Brown.* Hedys. diphyllum, foliis binatis petiolatis, bracteis geminis ovatis acutis sessilibus *L.* Engl. Two-leaved Cock's head of Madrals, wächst in beyden Indien, und hat eine jährige Wurzel, welche tief in die Erde geht und einen niedrigen Stängel treibt. Zwey Blättchen stehen auf einem gemeinschaftlichen Stiele, welcher mit doppelten, eyförmig zugespitzten Blatt-Ansätzen versehen ist. Die Blumen stehen einzeln, sind klein und gelb, und mit Deck-Blättern umgeben, unter welchen die Frucht sich verbirgt. Diese Sorte ist zart, und kann, wie No 5, aus dem Samen gezogen werden.

13. Schöner Süß-Klee, mit dreyfachen Blättern, und doppelten, geparten, tellerrunden und gestielten Blattdecken; Hedys. trifoliatum, frutescens, flore ecaudato inter duo folia abscondito *Burm.* Hedys. pulchellum, foliis ternatis, bracteis geminis conjugatis orbicularis lineatis *L.* Er ist, wie die 5 folgenden,

in

in Oſt-Indien zu Hauſe. Seine kleine Hülſen bilden eine lange Aehre; ſein Stängel iſt holzig.

14. Binſenartiger Süß-Klee, deſſen Blätter dreyfach und lanzenförmig, deſſen Hülſen rautenförmig ſind, und nur Ein Gelenk haben, und deſſen Blumen-Stiele zur Seite ſtehen, und eine Art von Dolde bilden; Hedyſ. ſunceum, foliis ternatis lanceolatis, leguminibus uniarticulatis, rhombeis, pedunculis ſubumbellatis lateralibus *Linn.* Er hat viel Aehnlichkeit mit dem violetten. Seine Dolden ſind kürzer, als die Blätter. Die Hülſen enthalten nur 1 Samen.

15. Doldenförmiger Süß-Klee, mit ſtaudigem Stängel, dreyfachen Blättern, und doldentragenden Blumenſtielen; Hedyſ. trifoliatum arborescens, floribus ex alis foliorum, ſiliquis copioſis glabris *Burm.* Hedyſ. vmbellatum, foliis ternatis, pedunculis vmbelliferis, caule fruticoſo *L.* Der Stängel iſt holzig. Die Blumen entſpringen aus den Winkeln der Blätter. Die Hülſen ſind glatt.

16. Süß-Klee mit zwey Gelenken, mit ſtrauchigem Stängel, dreyfachen Blättern, und Hülſen mit zwey Gelenken; Hedyſ. triphyllum, ſiliquis glabris peltatis geminis inarticulatis *Burm.* Hedyſ. biarticulatum, foliis ternatis, caule fruticoſo, leguminibus biarticulatis *L.* Er perennirt; hat glatte, ſchildförmige und doppelte Hülſen.

17. Süß-Klee mit unterſchiedenen Früchten, deſſen Blätter dreyfach ſind und borſtenartige Anſätze haben, deſſen Blumen Aehren bilden, und deſſen Hülſen Gelenke, und die unterſte nur 1 Samen hat; Hedyſ. trifoliatum, ſiliculis inferioribus ſolitariis, ſuperioribus articulatis *Burm.* Hedyſ. heterocarpon, foliis ternatis, floribus ſpicatis, leguminibus articulatis, infimo monoſpermo, ſtipulis ſetaceis *L.*

18. Kleberiger Süß-Klee, deſſen Stängel und Aeſte mit Borſten beſetzt, deſſen Blätter dreyfach, und

deſſen Hülſen häutig, glatt und unzertheilt ſind; Hedyſ. viscidum, foliis ternatis, leguminibus membranaceis laevibus integris, caule ramisque hispidis *L.* Die Hülſen ſind an keiner Naht ausgehöhlt, ſondern haben einen ganz glatten Rand.

19. Geſtrichelter Süß-Klee, mit dreyfachen, länglichen, geſtrichelten Blättern, in deren Winkeln die unter ſich hängenden Blumentrauben ſtehen; Hedyſ. lineatum, foliis ternatis oblongis lineatis, racemis axillaribus pendulis *L.* Sein Vaterland iſt Ceylon. Der Stängel iſt gerade und holzig. Die Blätter haben auf ihrer obern Fläche Striche nach der Länge der Nerven. Die Blumentrauben ſind ziemlich unzertheilt, und ſo lang, als die Blätter. Die Blumen hängen an lockern Stielen unter ſich. Die Hülſen ſind rautenförmig, und haben nur Ein Gelenk.

20. Canadiſcher Süß-Klee, dreyblätteriger ſpaniſcher Klee aus Canada, Canadiſches Peltſchen Kraut, Hedyſ. triphyllum canadenſe *Cornut.* Hedyſ. foliis radicalibus ſimplicibus, caulinis ternatis, floribus laxe ſpicatis, leguminibus undulatis *Roy.* Hedyſ. canadenſe, foliis ſimplicibus ternatisque, floribus ſpicatis *L.* wächſt in Virginien und Canada. Die faſerige Wurzel dauert viele Jahre aus. Der Stängel erreicht bey uns im freyen Lande 3 bis 4 F. Höhe, iſt geſtreift, und etwas rauch. Die zuerſt aus der Wurzel hervor brechenden Blätter ſind einfach, am Stängel aber ſtehen 5 Blättchen auf Einem Stiele. Bey dem Stiele ſtehen 2 lanzenförmige Blatt-Anſätze; auch zwey dergleichen kleinere in dem Blattwinkel, welche auch zugegen ſind, wenn daſelbſt ein Zweig hervor bricht, da denn dieſer von denſelben umgeben wird. Die 3 Blättchen ſind unterwärts etwas rauh anzufühlen, eyförmig, völlig ganz, am Rande haarig; das mittlere iſt etwas länger, als die ſeitwärts geſtellten. Die oberſten Blätter ſind gemeiniglich wieder

nur

nur einfach. Die langen Blüth-Aehren treiben aus den Blattwinkeln hervor, auch endigen ſich damit die Zweige. Die Blüth-Stiele ſind röthlich, und die Blumenblätter purpurroth. Die Frucht-Hülſe iſt haarig, und nur an dem einen Rande wellenförmig in Gelenke abgetheilt. Die Pflanze dauert in hieſigen Gärten im freyen Lande ohne Wartung aus, blühet häufig im Jul. und Aug., und trägt reifen Samen, durch welchen, und die Theilung der Wurzel, die Vermehrung leicht geſchehen kann.

21. Grauer Süß-Klee; dreyblätteriger, ſtaudenartiger, ſpaniſcher Zwerg-Klee mit einer purpurrothen Blume; Hedyſ. americanum triphyllum canescens, floribus albis ſpicatis *Boerh.* Hedyſ. foliis ternis ſolitariisque, caule hispido fruticoſo *Royen.* Hedyſ. triphyllum fruticoſum ſupinum, flore purpureo *Sloan.* & *Raj.* Hedyſ. triphyllum maximum ſcandens, caule trigono hirto uncinis, ſpicis amplis terminalibus *Brown.* Hedyſ. canescens, foliis ternatis ſubtus ſcabris, caule hiſpido, floribus racemoſis coniugatis *Linn.* Dieſe Art wächſt in Virginien und Jamaika wild. Die Wurzel iſt bleibend. Der Stängel, ſtaudenartig, ungefähr 4 Sch. hoch, und äſtig. Die Blätter, eyrund. Ihre kleine purpurrothe Blumen formiren an dem Gipfel der Stängel lange Trauben. Man kann ſie aus dem Samen ziehen, den man auf ein Miſt-Beet ſäen, und die Pflanzen übrigens, wie den zweyblätterigen Süß-Klee, behandeln muß, nur daß man ſie, wenn ſie eine Höhe erlangt haben, in das Loh-Glashaus ſetzt, wo ſie beſtändig bleiben, und bey guter Witterung viele friſche Luft haben müſſen.

22. Barbariſcher Süß-Klee, mit dreyfachen Blättern, länglichen und ziemlich äſtigen Blumentrauben, gebogenne Hülſen, und haarigen Blumenkelchen; Hedyſarum barbarum, foliis ternatis, racemis oblon-

gis ſubramoſis, leguminibus inflexis, calycibus piloſis *L.* wächſt in Jamaika wild.

23. Marylandiſcher Süß-Klee, mit geglieder-ten glatten Früchten, Hedyſarum trifoliatum, ſiliqua breviore *Dillen.* Hedyſ. triphyllum marilandicum minus, ſiliquis compreſſis articulatis aſperis brevio-bus *Raj.* Hedyſ. marylandicum, foliis ternatis, folio-lis ſubrotundis, caule frutescente ramoſiſſimo, legumi-nibus articulatis laevibus *L.* wächſt in Carolina und Virginien. Er treibt aus der dauernden Wurzel glatte, ſteife, 2 bis 3 F. hohe Stängel, welche ſich in viele Zweige verbreiten, und durchaus mit wechſelweiſe ge-ſtellten und geſtielten Blättern beſetzt ſind. Die drey Blättchen ſind länglich, ſtumpf, unterwärts blaßgrün und mit weichen Haaren beſetzt, welche jedoch an den jungen Blättchen beſſer, als an den ältern, bemerket werden können; das mittelſte Blättchen iſt größer und breiter, als die ſeitwärts geſtellten. Bey dem Blatt-Stiele und dem mittelſten Blättchen, ingleichem den

der kommen. Seine purpurroth-gelbliche kleine Blumen formiren an dem Gipfel der Aeste kurze Aehren. Er kann aus dem Samen gezogen werden, den man im Frühlinge auf ein Miſtbeet ſäet. Wenn die Pflanzen ſtark genug ſind, verſetzt man ſie einzeln in beſondere Töpfe, welche mit leichter Erde angefüllt ſind, und in ein Miſtbeet gegraben werden, erhält ſie im Schatten, bis ſie eingewurzelt ſind, gibt ihnen bey warmem Wetter viele friſche Luft, ſetzt ſie im Sommer darein, im Herbſte unter das Glas-Gerähme, im folgenden Frühlinge aber einige davon aus den Töpfen in eine warme Rabatte, wo man ſie im Winter vor der Kälte verwahren muß.

25. Süß-Klee mit grünen Blumen, mit aufrechtem Stängel, dreyfachen und ziemlich ſpitzigen Blättern, und ſehr langen und aufrechten Blumen-Trauben; Hedyſarum virid-florum, foliis ternatis acutiusculis, caule erecto, racemis longiſſimis erectis *L.*

26. Rauher Süß-Klee, mit ſtaudenartigem Stängel, dreyfachen und ovalen Blättern, eyrunden Blumen-Trauben, und zottigen einſamigen Früchten und Blumen-Kelchen; Hedyſarum hirtum, foliis ternatis ovalibus, caule fruticoſo, racemis ovatis, calycibus fructibusque hirſutis monoſpermis *L.* Der Stängel iſt holzig. Die Aehren ſind länglich. Die Blumen ſtehen auf eigenen Stielen. Die Hülſen ſind eyrund, ſpitzig, und haben nur Ein Gelenk.

27. Violetter Süß-Klee, mit dreyfachen und eyrunden Blättern, doppelten Blumen, und nackenden, aderigen und rautenförmigen Hülſen; Hedyſarum foliis ternatis lanceolatis, leguminibus monoſpermis *Gronov.* Hedyſ. violaceum, foliis ternatis ovatis, floribus geminatis, legominibus nudis venoſis *L.* Seine Blumen ſind violenblau, und ſtehen meiſtens auf eigenen Stielen, bald in Knäueln in den Winkeln der Blätter, bald hin und her auf fadenförmigen Stielen. Die

deſſen Hülſen häutig, glatt und unzertheilt ſind; H. dyſ. viscidum, foliis ternatis, leguminibus membranaceis laevibus integris, caule ramisque hispidis L. Die Hülſen ſind an keiner Naht ausgehöhlt, ſondern haben einen ganz glatten Rand.

19. Geſtrichelter Süß-Klee, mit dreyfachen länglichen, geſtrichelten Blättern, in deren Winkel die unter ſich hängenden Blumentrauben ſtehen; H. dyſ. lineatum, foliis ternatis oblongis lineatis, racemis axillaribus pendulis *L.* Sein Vaterland iſt Ceylon. Der Stängel iſt gerade und holzig. Die Blätter haben auf ihrer obern Fläche Striche nach der Länge der Nerven. Die Blumentrauben ſind ziemlich unzertheilt, und ſo lang, als die Blätter. Die Blumen hängen an lockern Stielen unter ſich. Die Hülſen ſind nierenförmig, und haben nur Ein Gelenk.

20. Canadiſcher Süß-Klee, dreyblätteriger ſpaniſcher Klee aus Canada, Canadiſches Peliſcher Kraut, Hedyſ. triphyllum canadenſe *Corn.* H. dyſ. foliis radicalibus ſimplicibus, caulinis ternatis, floribus laxe ſpicatis, leguminibus undulatis *Roy.* Hedyſ. canadenſe, foliis ſimplicibus ternatisque, floribus ſpicatis *L.* wächſt in Virginien und Canada. Die faſerige Wurzel dauert viele Jahre aus. Der Stängel erreicht bey uns im freyen Lande 3 bis 4 F. Höhe, iſt geſtreift, und etwas rauch. Die zuerſt aus der Wurzel hervor brechenden Blätter ſind einfach, am Stängel aber ſtehen 5 Blättchen auf Einem Stiele. Bey dem Stiele ſtehen 2 lanzenförmige Blatt-Anſätze; auch zwey dergleichen kleinere in dem Blattwinkel, welche auch zugegen ſind, wenn daſelbſt ein Zweig hervor bricht, da denn dieſer von denſelben umgeben wird. Die 3 Blättchen ſind unterwärts etwas rauch anzufühlen, eyförmig, völlig ganz, am Rande haarig; das mittlere iſt etwas länger, als die ſeitwärts geſtellten. Die oberſten Blätter ſind gemeiniglich wieder

nur

Spitze hakenförmig gekrümmten Hülſen; Hedyſarum
strum, foliis ternatis nervoſis nudis, ſpicis ſeſſilibus,
uminibus diſcermis obtectis acumine uncinatis *Linn.*
wächſt in Jamaika und Ceylon wild, und iſt zottig
geſtreckt. Die Blumen ſind gelb. Die Hülſen
en 5 Streifen.

32. Dreyblumiger Süß-Klee, mit geſtreckten
ängeln, dreyfachen und umgekehrt herzförmigen
ättern, und Blumen-Stielen, welche nur Eine
ume tragen, und zu drey ſtehen; Hedyſarum trifo-
um repens, acetoſellae folio glabro, caule hirſuto
m. Hedyſ. triflorum, foliis ternatis obcordatis,
libus procumbentibus, pedunculis unifloris ternis
s. Engl. three flowered Indian Hedyſarum. wächſt
Oſt-Indien wild, und iſt jährig.

33. Haſenkleeartiger Süß-Klee, mit dreyfachen
ittern, länglichen Blumen-Trauben, gebogenen
ſen, und zottigen Blumen-Kelchen; Hedyſarum
podioides, foliis ternaris, racemis oblongis, legu-
ibus inflexis, calycibus hirſutis *Linn.* Er kommt
China, und iſt nahe mit dem barbariſchen ver-
dt, und ihm darin vorzüglich ähnlich, daß ſein Blu-
-Stielchen, wenn die Blume abgefallen iſt, ſich
et, und mit den 3 größern, haarigen und umgebo-
n Abſchnitten des Blumen-Kelches bewaffnet, eine
e Hülſe verbirgt, welche 3 bis 4 Gelenke hat.
Blättchen ſind eyrund, ſtumpf, nackend, und en-
n ſich mit einer ſehr kleinen Borſte. Die Blumen-
uben ſind eyrund, dicht und zottig. Zwiſchen den
men ſtehen eyrunde, pfriemförmige, ſcharf zuge-
e Blattdecken, welche ſo lang, als die Blumen,
; die Blumen-Stielchen ſind zottig; die Blumen-
he ſind ſehr kurz, und endigen ſich mit drey Bor-
; die Blumen-Kronen ſind klein. Die Hülſen
n nur 1 Samen.

34. Gewundener Süß-Klee, mit dreyfachen rund-länglichen Blättern, und einem sich windenden Stängel; Hedysarum trifolium scandens, folio longiore splendente *Dill.* Hedys. volubile, foliis ternis ovato-oblongis, caule volubili *Linn.* ist in der nördlichen Amerika zu Hause, und hat lange glänzende Blätter.

35. Alpen-Süßklee, mit gegliederten glatten abhangenden Hülsen; Hedysarum saxatile, siliquis laevi, floribus purpureis inodorum *Amman.* Hedys. alpinum, foliis pinnatis, leguminibus articulatis glabris pendulis, caule erecto *L.* Engl. Alpine French honeysuckle, wächst in der Schweitz, und in Sibirien, an Oertern, wo die Ströhme im Winter austreten. Die Wurzel ist groß, holzig und in Zweige vertheilt. Der Stängel ist gleichfalls mit Zweigen besetzt, aufgerichtet, und an 2 F. hoch. Die Blatt-Ansätze sind weißlich, groß, grannig. Die Blätter bestehen aus 8 oder 9 Paren eyförmigen Blättchen, und einem einzelnen am Ende. Der Blüth-Stiel kommt aus dem Blatt-Winkel, ist nackend, und endigt sich mit einer Blumen-Aehre. Die Blumen sowohl, als Früchte, hangen unterwärts. Die Blume ist bläulich-purpurfarbig; die Hülse besteht aus 4 glatten, geaderten Gelenken. Man will diese Art zum Futter-Kraut empfehlen. Haller schreibt davon: Mir mißfällt dieses Gewächs keinesweges, und der ganze Bau hat vieles ähnliches mit der Esparsette; ich glaube aber nicht, daß jemahls Versuche damit gemacht worden seyn.

36. Dunkler Süß-Klee, mit einem aufrechten und gebogenen Stängel, gefiederten Blättern, scheidenartigen Blatt-Ansätzen, und unter sich hängenden Blumen-Trauben; Hedysarum obscurum, foliis pinnatis, stipulis vaginalibus, caule erecto flexuoso, floribus racemosis pendulis *L.* Haller hält diese Art, welche

welche in der Schweiz und in Sibirien wild wächst, und perennirt, für eine Varietät der vorhergehenden.

37. Kronen-Süßklee, mit gegliederten stacheligen geraden Hülsen; Hed. alterum clypeatum *Lob.* & *Dalech.* Hed. flore rubente *Tourn.* Hedys. clypeatum, flore suaviter rubente *Bauh.* Hedys. coronarium foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis rectis, caule diffuso *Linn.* Ital. Silla, oder Sulla, Engl. common French Honeysuckle, wächst in Italien auf den Wiesen. Die perennirende Wurzel treibt viele, in gutem Boden 3 bis 4 F. lang ausgebreitete, doch nicht gestreckte, gestreifte und etwas rauche Stängel, welche mit vielen Zweigen besetzt sind. Das Blatt besteht aus 4, auch mehrern Paren großen, eyförmigen, etwas haarigen Blättchen, mit einem einzelnen am Ende. Am Blatt-Stiele stehen zwey dreyeckige, röthliche Blatt-Ansätze. Die Blüth-Zweige sind größten Theils nackend, und endigen sich mit einer kurzen dichten Aehre. An jedem Blüth-Stiele steht ein vertrocknetes Deck-Blatt. Die Kelch-Einschnitte sind sehr schmahl; die Blumen-Blätter schön glänzend roth; das Fähnchen ist mit weißlichen Adern durchzogen, schmahl, ausgekerbet, zurück gebogen; die Flügel haben lange Wiederhaken. Man zieht in den Gärten auch eine Varietät mit weißen Blumen. Die Hülsen bestehen aus vielen, runden, stacheligen Gelenken, und stehen gerade. Sie ist eine zweyjährige Pflanze, die im zweyten Jahre blühet. Bald nachher, nachdem der Same reif geworden ist, verderben die Wurzeln. Sie wird schon seit langer Zeit in den englischen Gärten zur Zierde gezogen. Sie blühet im Jun. und Jul., und der Same wird im Sept. reif. Man kann sie auf dem Mistbeete aus dem Samen erziehen, welcher auch bey uns reif wird, und die Stöcke in Töpfen unterhalten. Im Lande wachsen die Stöcke zwar weit größer, und die Blumen dauern fast den ganzen Sommer über,

Hülſen ſind 3 Mahl ſo lang, als der Blumenkelch, eyrund, zuſammen gedrückt, ſpitzig, glatt und netzförmig, und enthalten nur 1 Samen.

28. Riſpenförmiger Süß-Klee, mit dreyfachen und gleichbreit-lanzenförmigen Blättern, riſpenförmigen Blumen, und rautenförmigen Hülſen; Hedyſarum paniculatum, foliis ternatis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis, leguminibus rhombeis *L.* Die Hülſen ſind rauh und gezahnt.

29. Süß-Klee mit nackenden Blumen, mit dreyfachen Blättern, einem nackenden Blumen-Schafte, und einem blattreichen und eckigen Stängel; Hedyſarum caule nudo, longiſſimo folioſo, florifero angulato *Gronov.* Hedyſ. nudiflorum, foliis ternatis, ſcapo florifero nudo, caule folioſo angulato *Linn.*

30. Kriechender Süß-Klee, auf der Erde liegender ſpaniſcher Klee mit Blättern, die den Blättern des Erdbeer-Klees ähnlich ſind, Hedyſarum procumbens, Trifolii fragiferi folio *Dill.* Hedyſ. caulibus procumbentibus, racemis lateralibus ſolitariis, petiolis pedunculo longioribus *Gronov.* Hedyſ. repens, foliis ternatis obcordatis, caulibus procumbentibus, racemis lateralibus *Linn.* Engl. trailing French Honeyſuckle, iſt eine jährliche Pflanze, die in beyden Indien wild wächſt. Die Aeſte laufen auf der Erde fort, und werden 1 F. lang. Die Stängel ſind, wie die untere Fläche der Blätter, haarig. Die Blätter ſind etwas gezahnt; die Blatt-Stiele ſind länger als der Blumen-Stiel. Die Blumen-Trauben ſtehen einzeln und nach dem Gipfel der Aeſte zu. Die Blumen ſind purpurroth und klein, und zeigen ſich zu Ende des Julius. Er kann, wie der gefleckte, fortgepflanzet, und muß eben ſo behandelt werden.

31. Angelförmiger Süß-Klee, mit dreyfachen, nervigen und nackenden Blättern, feſt aufſitzenden Blumen-Aehren, und zweyſamigen, bedeckten, und an ihrer

rer Spitze hakenförmig gekrümmten Hülſen; Hedyſarum hamatum, foliis ternatis nervoſis nudis, ſpicis ſeſſilibus, legumini bus diſpermis obtectis acumine uncinatis *Linn.* Er wächſt in Jamaika und Ceylon wild, und iſt zottig und geſtreckt. Die Blumen ſind gelb. Die Hülſen haben 5 Streifen.

32. Dreyblumiger Süß-Klee, mit geſtreckten Stängeln, dreyfachen und umgekehrt herzförmigen Blättern, und Blumen-Stielen, welche nur Eine Blume tragen, und zu drey ſtehen; Hedyſarum trifoliatum repens, aceroſellae folio glabro, caule hirſuto *Burm.* Hedyſ. triflorum, foliis ternatis obcordatis, caulibus procumbentibus, pedunculis unifloris ternis *Linn.* Engl. three flowered Indian Hedyſarum. wächſt in Oſt-Indien wild, und iſt jährig.

33. Haſenkleeartiger Süß-Klee, mit dreyfachen Blättern, länglichen Blumen-Trauben, gebogenen Hülſen, und zottigen Blumen-Kelchen; Hedyſarum lagopodioides, foliis ternatis, racemis oblongis, leguminibus inflexis, calycibus hirſutis *Linn.* Er kommt aus China, und iſt nahe mit dem barbariſchen verwandt, und ihm darin vorzüglich ähnlich, daß ſein Blumen-Stielchen, wenn die Blume abgefallen iſt, ſich beuget, und mit den 3 größern, haarigen und umgebogenen Abſchnitten des Blumen-Kelches bewaffnet, eine glatte Hülſe verbirgt, welche 3 bis 4 Gelenke hat. Die Blättchen ſind eyrund, ſtumpf, nackend, und endigen ſich mit einer ſehr kleinen Borſte. Die Blumen-Trauben ſind eyrund, dicht und zottig. Zwiſchen den Blumen ſtehen eyrunde, pfriemförmige, ſcharf zugeſpitzte Blattdecken, welche ſo lang, als die Blumen, ſind; die Blumen-Stielchen ſind zottig; die Blumen-Kelche ſind ſehr kurz, und endigen ſich mit drey Borſten; die Blumen-Kronen ſind klein. Die Hülſen haben nur 1 Samen.

34. Gewundener Süß-Klee, mit dreyfachen rund-länglichen Blättern, und einem sich windenden Stängel; Hedysarum trifolium scandens, folio longiore splendente *Dill.* Hedys. volubile, foliis ternatis ovato-oblongis, caule volubili *Linn.* ist in den nördlichen Amerika zu Hause, und hat lange glänzende Blätter.

35. Alpen-Süßklee, mit gegliederten glatten abhangenden Hülsen; Hedysarum saxatile, siliqua laevi, floribus purpureis inodorum *Amman.* Hedys. alpinum, foliis pinnatis, leguminibus articularis glabris pendulis, caule erecto *L.* Engl. Alpine French Honeysuckle, wächst in der Schweitz, und in Sibirien, an Oertern, wo die Ströhme im Winter austreten. Die Wurzel ist groß, holzig und in Zweige vertheilt. Der Stängel ist gleichfalls mit Zweigen besetzt, aufgerichtet, und an 2 F. hoch. Die Blatt-Ansätze sind weißlich, groß, grannig. Die Blätter bestehen aus 8 oder 9 Paren eyförmigen Blättchen, und einem einzelnen am Ende. Der Blüth-Stiel kommt aus dem Blatt-Winkel, ist nackend, und endigt sich mit einer Blumen-Aehre. Die Blumen sowohl, als Früchte, hangen unterwärts. Die Blume ist bläulich-purpurfarbig; die Hülse besteht aus 4 glatten, geaderten Gelenken. Man will diese Art zum Futter-Kraut empfehlen. Haller schreibt davon: Mir mißfällt dieses Gewächs keinesweges, und der ganze Bau hat viel ähnliches mit der Esparsette; ich glaube aber nicht, daß jemahls Versuche damit gemacht worden seyn.

36. Dunkler Süß-Klee, mit einem aufrechten und gebogenen Stängel, gefiederten Blättern, scheidenartigen Blatt-Ansätzen, und unter sich hängenden Blumen-Trauben; Hedysarum obscurum, foliis pinnatis, stipulis vaginalibus, caule erecto flexuoso, floribus racemosis pendulis *L.* Haller hält diese Art, welche

welche in der Schweiz und in Sibirien wild wächst, und perennirt, für eine Varietät der vorhergehenden.

37. Kronen-Süßklee, mit gegliederten stacheligen geraden Hülsen; Hed. alterum clypeatum *Lob.* & *Dalech.* Hed. flore rubente *Tourn.* Hedys. clypeatum, flore suaviter rubente *Bauh.* Hedys. coronarium foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis rectis, caule diffuso *Linn.* Ital. Silla, oder Sulla, Engl. common French Honeysuckle, wächst in Italien auf den Wiesen. Die perennirende Wurzel treibt viele, in gutem Boden 3 bis 4 F. lang ausgebreitete, doch nicht gestreckte, gestreifte und etwas rauche Stängel, welche mit vielen Zweigen besetzt sind. Das Blatt besteht aus 4, auch mehrern Paren großen, eyförmigen, etwas haarigen Blättchen, mit einem einzelnen am Ende. Am Blatt-Stiele stehen zwey dreyeckige, röthliche Blatt-Aufsätze. Die Blüth-Zweige sind größten Theils nackend, und endigen sich mit einer kurzen dichten Aehre. An jedem Blüth-Stiele steht ein vertrocknetes Deck-Blatt. Die Kelch-Einschnitte sind sehr schmahl; die Blumen-Blätter schön glänzend roth; das Fähnchen ist mit weißlichen Adern durchzogen, schmahl, ausgekerbet, zurück gebogen; die Flügel haben lange Wiederhaken. Man zieht in den Gärten auch eine Varietät mit weißen Blumen. Die Hülsen bestehen aus vielen, runden, stacheligen Gelenken, und stehen gerade. Sie ist eine zweyjährige Pflanze, die im zweyten Jahre blühet. Bald nachher, nachdem der Same reif geworden ist, verderben die Wurzeln. Sie wird schon seit langer Zeit in den englischen Gärten zur Zierde gezogen. Sie blühet im Jun. und Jul., und der Same wird im Sept. reif. Man kann sie auf dem Mistbeete aus dem Samen erziehen, welcher auch bey uns reif wird, und die Stöcke in Töpfen unterhalten. Im Lande wachsen die Stöcke zwar weit größer, und die Blumen dauern fast den ganzen Sommer über,

Herbst ruhen; alsdann wird sie nach der gewöhnlichen Weise zum Getreidebau gepflüget, und die Aernde ist nach dem Verhältnisse ihrer Größe allemahl reicher, wo vorher die Sulla gestanden hat.

Nach dieser Aernde hat man anders nichts zu thun, als die Stoppeln abermahl anzuzünden; so wird den folgenden Nov. die Sulla aufs neue das Feld bedecken, nachdem sie das ganze Jahr über des Getreidebaues in dem Schooße der Erde verborgen gelegen, ohne letzterm im geringsten zu schaden, und ohne sich auf dem Boden merken zu lassen, bis im Nov. des Ruhe- oder Brach-Jahres, da die Sulla mit gleicher Kraft wieder aufgrünet, wie im ersten Jahre, da sie ausgesäet worden. Also gibt ein Acker, der mit Sulla einmahl angesäet worden, 40 Jahr lang und mehr, wechselweise in jeden zwey Jahren einen reichen Raub von Sulla und von Getreide, ohne daß zu Beybehaltung einer so seltsamen Wiese eine andere Sorgfalt erfordert werde, als das erste Jahre den Samen auf angezeigte Weise auszusäen.

„Die wenige Mühe bey der Aussäung der Sulla, die Vortrefflichkeit dieses Futters, die Eigenschaft dieser Pflanze, die Erde zum Getreidebau geschickter zu machen, ihre lange Dauer in dem festesten Boden, den sie aus eigener Kraft durchdringt und öffnet; diese seltsame Umstände alle sollen zureichen, die Nützlichkeit dieser Pflanze den Liebhabern des Landbaues zu empfehlen.

„Ob man gleich nach der Erfahrung der Landleute von Seminara nicht zweifeln darf, daß eine Pflanze, die so tief einwurzelt und sich so mächtig ausbreitet, einen vorzüglich guten Boden erfordere: so ist doch nicht glaublich, daß solche nur in weißer und kreidichter Erde gedeihe, sondern es ist zu vermuthen, sie werde in allen leimichten Aeckern, die zu Klee und Luzerne tüchtig sind, gut gerathen.

zugleich, daß man ſich nach der Getreide-Aernde mit dem Beaſchern des Ackers vermittelſt des Brennens der Stoppeln nicht begnüget, ſondern denſelben ſehr leicht oben über bepflüget, um die Wurzeln des Krautes, die wieder ausſchlagen ſollen, nicht zu verletzen. Er meldet auch, daß nach der Verſchiedenheit des Bodens, oder der Gewohnheit, einige Verſchiedenheit in dem Anbaue der Sulla beobachtet wird, ſo, daß in einigen Gegenden dieſes Kraut, wie oben gemeldet iſt, in Abwechſelung mit dem Getreide gebauet und geärndet wird, da anderswo nach drey Aernden von Getreide, die Sulla geſäet und drey Jahre auf einander geſchnitten wird.

Hr. v. Haller beſchließt die Nachricht, die er in ſeiner Abh. über die Futter-Kräuter, von der Sulla ertheilt, mit dieſen Worten: „Allein, es iſt „nicht zu hoffen, daß in unſern ſo kältern Ländern der „Anbau dieſer Pflanze mit gleich glücklichem Erfolge [illegible]

Gipfel der Stängel. Die Hülsen bestehen öfters aus zwey kreisrunden, und gleich stacheligen Gelenken. Man kann ihn aus dem Samen ziehen, den man zu Anfange des Aprils dahin säet, wo die Pflanzen bleiben sollen. Wenn diese aufgegangen sind, werden sie gehörig verdünnet, und fleißig vom Unkraute gereinigt.

39. Gebogener Süß-Klee, mit weitschweifigem Stängel, gefiederten Blättern, und gegliederten, stacheligen und gebogenen Hülsen; jährlicher spanischer Klee, mit einer rauhen, wellenförmigen, gedrehten Hülse; Hedysarum annuum, liliqua alpera vndulata intorta *Tourn.* Hedys. flexuosum, foliis pinnatis, leguminibus articulatis, aculeatis, flexuosis, caule diffuso *L.* Engl. flexuose-podded French Honeysuckle. Er kommt aus Asien, ist jährlich, und hat einige Aehnlichkeit mit dem Kronen-Süßklee. Seine Stängel werden fast 1 F. hoch. Die Lappen seiner Blätter sind eyrund. Seine blaßrothe und etwas in das Blaue spielende Blumen-Aehren zeigen sich im Jul. an dem Gipfel der Stängel. Auf die Blumen folgen knotige Schoten, die auf beyden Seiten wellenförmig sind, und an jedem Gelenke einen zugestumpften Winkel formiren. Der Same wird im Herbste reif. Man kann sie, wie die vorhergehende Sorte, ziehen.

40. Niedriger Süß-Klee, dessen Stängel niedergedrückt, die Blätter gefiedert, die Blumen-Aehren zottig, die Flügel an den Blumen-Aehren kaum merklich, und die Hülsen gegliedert und rauch sind; Hedysarum humile, foliis pinnatis, leguminibus articulatis asperis, corollae alis obsoleris, spicis hirsutis, caulibus depressis *L.* Engl. dwarf French Honeysuckle. Er ist in Languedoc und Spanien zu Hause. Die Wurzel ist jährlich. Die Lappen der Blätter sind umgekehrt eyrund, länglich, und auf der untern Seite

den, daß die Sulla nur in festem, kreidichtem, weißen Boden gedeihe, der zugleich bey einem guten Anbau der tüchtigste ist, das schönste Getreide hervor zu bringen. In Feldern dieser Art allein wird die Sulla gesäet, und zwar nach einer Weise, die wiedersinnig scheint, sintemahl der Same sogleich nach der Aernde, die im Julio vor sich geht, über die Stoppeln, die man hierauf mit Feuer ansteckt, ohne weitere Besorgung hingeworfen wird. Dieser Same, von der wenigen Asche des gebrannten Halmes bedeckt und gedüngt, dringt von selbst in den Boden, und fängt im Nov. an zugrünen, im vierten Monathe nachdem er ausgesäet worden. Jede Pflanze erhebt sich in verschiedene Zweige, deren Wachsthum den Winter über nur langsam von Statten geht; allein bey der Wiederkehr des Frühlinges befindet sich der Boden mit der dichtesten und angenehmsten Wiese bedeckt; und wenn es im April öfters ein wenig regnet, so steigen die Pflanzen bis zur Manns-Höhe auf. Man könnte durch das Eintauchen des Samens in reines oder in zubereitetes Wasser den Wachsthum befördern; denn der Same ist hartschalig, und dieses mag die Ursache seyn, daß er so spät aufkeimet.

„Die Pflanze hat wenige Aehnlichkeit mit den bekannten Wiesen-Kräutern; ihre hochrothe Blume hat einige Gleichheit mit der Blüthe vom Ginst. Man kann die Sulla das erste Mahl im May, in ihrer Blüthe abschneiden, um sie den Pferden und Maulthieren vorzulegen, die davon purgiret, und in wenigen Tagen fett gemacht werden. Dieses vortreffliche Futter wird so sehr geschätzet, daß man es nicht zu dörren pflegt; ausgenommen etwas weniges von Zeit zu Zeit, um sich Samen zu verschaffen; derselbe ist klein, und hat, so wie die Blume, eine Gleichheit mit der Esper (Esparcet.)

„Nachdem die Sulla eingeärndet ist, welches bis in den Jun. dauert, lässet man die Erde bis in den

Herbst

Herbst ruhen; alsdann wird sie nach der gewöhnlichen Weise zum Getreidebau gepflüget, und die Aernde ist nach dem Verhältnisse ihrer Größe allemahl reicher, wo vorher die Sulla gestanden hat.

Nach dieser Aernde hat man anders nichts zu thun, als die Stoppeln abermahl anzuzünden; so wird den folgenden Nov. die Sulla aufs neue das Feld bedecken, nachdem sie das ganze Jahr über des Getreidebaues in dem Schooße der Erde verborgen gelegen, ohne letzterm im geringsten zu schaden, und ohne sich auf dem Boden merken zu lassen, bis im Nov. des Ruhe- oder Brach-Jahres, da die Sulla mit gleicher Kraft wieder aufgrünet, wie im ersten Jahre, da sie ausgesäet worden. Also gibt ein Acker, der mit Sulla einmahl angesäet worden, 40 Jahr lang und mehr, wechselweise in jeden zwey Jahren einen reichen Raub von Sulla und von Getreide, ohne daß zu Beybehaltung einer so seltsamen Wiese eine andere Sorgfalt erfordert werde, als das erste Jahre den Samen auf angezeigte Weise auszusäen.

„Die wenige Mühe bey der Aussäung der Sulla, die Vortrefflichkeit dieses Futters, die Eigenschaft dieser Pflanze, die Erde zum Getreidebau geschickter zu machen, ihre lange Dauer in dem festesten Boden, den sie aus eigener Kraft durchdringt und öffnet; diese seltsame Umstände alle sollen zureichen, die Nützlichkeit dieser Pflanze den Liebhabern des Landbaues zu empfehlen.

„Ob man gleich nach der Erfahrung der Landleute von Seminara nicht zweifeln darf, daß eine Pflanze, die so tief einwurzelt und sich so mächtig ausbreitet, einen vorzüglich guten Boden erfordere: so ist doch nicht glaublich, daß solche nur in weißer und kreidichter Erde gedeihe, sondern es ist zu vermuthen, sie werde in allen leimichten Aeckern, die zu Klee und Lucerne tüchtig sind, gut gerathen.

„Hr.

„Hr. Marcheſe Grimaldi wird von dem Erfolg ſeiner hierüber angeſtellten Verſuche, derjenigen Geſellſchaft zu ſeiner Zeit Nachricht geben, an welche ſeine Abhandlung geſtellt iſt. Er ſchlägt einen dreyfachen Verſuch vor: 1. ſich genau nach der Uebung der Landleute von Seminara zu richten; 2. die Sulla gleich andern künſtlichen Wieſen zu bauen; 3. ſolche gleich nach dem Regen im Sept. auf die Aecker, welche Klee oder Lucerne getragen haben, zu ſäen.“

Obige Anzeige iſt auch in Parma, auf Befehl der Regierung, mit nachſtehendem Anhange bekannt gemacht worden.

„Auf der Inſel Malta, wo keine Wieſen anzutreffen ſind und folglich kein Futter wächſt, wird dieſem Mangel durch künſtliche Wieſen obiger Pflanze, die ſie Silla heißen, geſteuert. Die Malteſer halten dafür, man müſſe den Samen der Silla von 2 Jahren alt, und von dem Producte eines guten Bodens, wählen. Der beſte nach ihrer Meinung kommt von der kleinen Inſel Gozo; der von Malta ſoll nicht gut ſeyn. Der gute Same kann 10 Jahre aufbehalten werden, dafern er trocken eingeſammelt und faſt nicht bewegt wird.

„Die Silla liebt zwar feſten und feuchten Boden; doch kommt ſie auch in geringern fort. Der Same davon wird wenige Tage vor der Aernde über das Getreide hingeworfen; 5 Scheffel (die wenig koſten) bedecken ein Stück Feldes von 1 Scheffel Getreide. Man ſäet die Silla gern nur 1 oder 2 Tage vor der Aernde, damit er nicht beregnet werde, ehe ihn die Schnitter, die Aufleſer, und das Vieh untergetreten haben. Dieſes iſt zureichend. Man darf ſich keine Mühe geben, ſolchen tiefer unterzubringen, denn er würde nicht aufkeimen. Es iſt nicht zu beſorgen, daß die Ameiſen oder die Vögel ſolchen zerſtören, oder daß er von der Luft verdorben werde. Nach dem erſten Regen keimt

er

er auf; und es ist sodann nöthig, das Vieh von dem Felde abzuhalten.

„In den Jahren, da unter der Silla wilde Kräuter in gewisser Menge sprießen, welches selten geschieht, müssen solche von bloßer Hand ausgerissen werden, denn man könnte sie nicht ohne Schaden auch nur obenhin gäten.

Uebrigens erheischt die Silla keine Besorgung. Ihre Stängel wachsen gern bis zur Höhe von 5 Schuhen. Man schneidet sie, so bald man einige Blüthen wahrnimmt, ehe sich der Same bildet. Sie lässet sich sehr gut dörren, in Büschel binden, und also aufbewahren.

„Es ist die Silla ein vortreffliches Futter für Pferde und Maulthiere, die zu starker Arbeit gebraucht werden; diejenigen, welche wenig arbeiten, werden davon zu sehr erhitzt und zu fett. Die Kühe und das kleine Vieh, so damit gefüttert wird, geben Milch die Menge.

Nachdem die Silla, die das Land keineswegs erschöpft, also genutzet worden, kann der Acker wieder gepflüget und zur Getreide-Saat auf den Herbst zubereitet werden. Man hat es auf der Insel Malta versucht, selbige auf das zweyte Jahr stehen zu lassen; sie ist aber selten aufgewachsen. Alle Ackerleute sind einig in der Versicherung, daß solche die dritte Aernde niemahls gibt. Es muß dem ungeachtet diese Pflanze, wo sie, wie in Malta, gut gedeihet, von dem größten Nutzen seyn.

„So viele Abänderungen und besondere Einschränkungen die Verschiedenheit des Klima und des Bodens immer erfordert, so lehrt uns doch die Erfahrung, daß diejenigen Pflanzen, welche die hartnäckigsten geschienen, sich an ein anderes Klima gewöhnen lassen. Man darf versichern, daß desswegen bey der Silla nichts zu besorgen ist.

„Man

„Man wiederhohlt, daß der Same der Sü
Jahre alt seyn muß, daß man solchen in der gr
Sommer-Hitze aussäen, und dabey in Obacht ne
muß, solchen nicht zu tief unterzubringen; und
aus folgenden Gründen. Der Same dieser Pf
ist in einer stacheligen Hülse verschlossen, die ihn
Boden befestigt. Nun muß die Hülse in diesem
stande den Einfluß der Luft in einem starken Grad
pfahen können, um sich zu entwickeln. Dieses
durch die Wärme der Sonnen-Strahlen bew
Die Erfahrung lehrt, daß die Hitze der Monate J
und Aug. nicht zureichend ist, dieses zu thun, w
Same nicht wenigstens 1 Jahr alt ist; also erh
daß solcher lange Zeit der Sonne bloßgestellt seyn m
um aufzukeimen. Man darf sich also nicht verw
dern, wenn diese Pflanze nicht sogleich in dem er
Jahre aufgeht; man darf nur das Feld unbepflüget
sen, so wird sie im zweyten folgenden Herbste bey d
ersten Regen hervor keimen.

„Wächst die Silla noch vor dem Winter zu fri
so mag man sie durch das Vieh abweiden lassen. M
hat dabey den Vortheil, daß sie nicht so grobe und h
ichte Stängel treibt, die das Vieh nicht leicht zerm
men könnte".

„Anmerkungen der berner Gesellschaft. Unterde
daß einige Versuche entscheiden, ob die Sulla oder S
die herbe Kälte unsers Winters ertragen kann, und ob
uns eine eitle Hoffnung machen, mit derselben einstens
sern Feldbau zu bereichern, wäre es sehr voreilig, hierü
vorläufige Betrachtungen anzustellen. Doch können
verschiedene Bemerkungen über vorstehende Anzeige von
Anpflanzung der Sulla nicht mit Stillschweigen übergeh

„Einer der merkwürdigsten Umstände von der Frue
barkeit dieser Pflanze im Neapolitanischen, ist, daß dies
eine fast unglaubliche Zeit fort dauert, nachdem sie einm
ausgesäet worden, so, daß sie zuweilen das zweyte Ja
nachdem in der Zwischenzeit Getreide gepflanzet worde
von freyen Stücken wieder aufgrünt. Dieser seltene U

stand scheint durch dasjenige widersprochen zu werden, was in der Anzeige von Malta auf das deutlichste gemeldet wird, daß die Sulla nicht in das dritte Jahr fort dauert; es müßte sich denn erweisen, daß die Natur dieser Pflanze nothwendig erfordere, selbige ein Jahr, oder wohl noch länger, vermittelst eines abwechselnden Anbaues in dem Boden ruhen zu lassen.

„Wo es durch die Erfahrung bestätiget wird, daß die Sulla ein ganzes Jahr unter der Erde schlafen kann, um hernach mit neuem Leben hervor zu treiben, so wäre das ein Grund zu hoffen, sie werde auch unsere lange Winter unter der Erde überleben. Es scheint aber hierbey, daß diese Pflanze ordentlich den Winter über zu wachsen pflege, welches wegen der großen Hitze des Sommers in jenen Ländern vielleicht auch bey andern Pflanzen eintrifft.

„Was in der Nachricht aus Malta von der Härte des Samens, und der Nothwendigkeit einer ausserordentlichen Sonnen-Hitze zu dessen Aufkeimung gesagt wird, dürfte wohl ein Irrthum und Vorurtheil seyn. Die Ursache, warum die Sulla eher nicht, als im Nov., aufgrünt, muß in dem Mangel der Feuchtigkeit des Bodens vor dieser Jahrszeit gesuchet werden. Diese Vermuthung wird dadurch bestärkt, daß zu dieser Cultur ein fester, lettmartiger Boden erfordert wird, und man uns meldet, daß, wo der Same im ersten Jahre nicht aufkeimet, solcher unfehlbar im Nov. des zweyten Jahres aufgrünen werde.

„Vermuthlich wird diese Pflanze hierlandes auf eine andere Weise behandelt werden müssen; es ist aber nicht nothwendig, zu schließen, daß, wo die Sulla nicht nach der Weise der heißen Länder gebauet werden kann, derselben keine andere Methode angemessen seyn könne. Wir haben die Erfahrung bereits von dem Espareet und der Lucerne, die auch aus einem viel heißern Striche zu uns herüber gebracht worden, und mit größtem Vortheile gebauet werden."

In einem neuern, an die berner Gesellschaft abgelassenen Schreiben, bezeuget Hr. Marchese Grimaldi aufs neue, daß die Sulla, wo solche einmahl angelegt worden ist, vermittelst eines abwechselnden Getreide-Baues von 2 zu 2 Jahren, nicht nur 30 Jahre, sondern wohl ein Jahrhundert, fort daure. Er bemerkt



Gipfel der Stängel. Die Hülſen beſtehen öfters aus zwey kreisrunden, und gleich ſtacheligen Gelenken. Man kann ihn aus dem Samen ziehen, den man zu Anfange des Aprils dahin ſäet, wo die Pflanzen bleiben ſollen. Wenn dieſe aufgegangen ſind, werden ſie gehörig verdünnet, und fleißig vom Unkraute gereinigt.

39. Gebogener Süß-Klee, mit weitſchweifigem Stängel, gefiederten Blättern, und gegliederten, ſtacheligen und gebogenen Hülſen; jährlicher ſpaniſcher Klee, mit einer rauhen, wellenförmigen, gedrehten Hülſe; Hedyſarum annuum, ſiliqua alpera vndulata intorta *Tourn.* Hedyſ. flexuoſum, foliis pinnatis, leguminibus articulatis, aculeatis, flexuoſis, caule diffuſo *L.* Engl. flexuoſe-podded French Honeyſuckle. Er kommt aus Aſien, iſt jährlich, und hat einige Aehnlichkeit mit dem Kronen-Süßklee. Seine Stängel werden faſt 1 F. hoch. Die Lappen ſeiner Blätter ſind eyrund. Seine blaßrothe und etwas in das Blaue ſpielende Blumen-Aehren zeigen ſich im Jul. an dem Gipfel der Stängel. Auf die Blumen folgen knotige Schoten, die auf beyden Seiten wellenförmig ſind, und an jedem Gelenke einen zugeſtumpften Winkel formiren. Der Same wird im Herbſte reif. Man kann ſie, wie die vorhergehende Sorte, ziehen.

40. Niedriger Süß-Klee, deſſen Stängel niedergedrückt, die Blätter gefiedert, die Blumen-Aehren zottig, die Flügel an den Blumen-Aehren kaum merklich, und die Hülſen gegliedert und rauch ſind; Hedyſarum humile, foliis pinnatis, leguminibus articulatis aſperis, corollae alis obſoletis, ſpicis hirſutis, caulibus depreſſis *L.* Engl. dwarf French Honeyſuckle. Er iſt in Languedoc und Spanien zu Hauſe. Die Wurzel iſt jährlich. Die Lappen der Blätter ſind umgekehrt eyrund, länglich, und auf der untern Seite

rauch. Die Stängel ſind ungefähr ½ F. hoch, haben nur Ein Blatt und Einen Aſt. Die Blu Aehre iſt eyrund. Die Blumen-Kronen ſind wi dem Kronen-Süßklee, aber kleiner, und haben einige Spuren von Flügel-Blättchen. Die H haben oft 2 Gelenke.

41. Virginiſcher Süß-Klee, mit ſtaudenart Stängel, geſiederten Blättern, und gegliederten, ten, geſtielten und aufrechten Hülſen; Hedy virginicum, foliis pinnatis, caule fruticoſo, leg bus articulatis glabris pedunculatis erectis *Linn.*

42. Türkiſcher Klee, Hahnenkamm-S Schweitzer-Klee, Wicken-Klee; Hedy Onobrychis *L.*; ſ. Eſparſette, im XI Th 562, fgg.

43. Stein-Süßklee, deſſen Blätter geſiedert deſſen Blumen-Schäfte meiſtens aus der Wurz ſpringen, deſſen Blumen-Kronen ſehr kurze F Blättchen haben, und deſſen Hülſen einſamig, furcht und unbewehrt ſind; Hedyſarum ſaxatile, pinnatis, leguminibus monoſpermis ſulcatis mu corollarum alis breuiſſimis, ſcapis ſubradicatis *L* Engl. Rock St. Foin. Er kommt aus der Prov Die Wurzel iſt perennirend. Die Stängel ſind dem Boden holzig, über demſelben aber unge kurz. Die Aehre iſt wie bey dem türkiſchen S aber weißlich.

44. Niedriger oder Zwerg-Süßklee, d Stängel ſtrauchartig, die Blätter geſiedert, die gel-Blättchen an der Blumen-Krone kürzer, als Fähnchen, und dieſes kürzer als das Schiffchen und deſſen Hülſen nur 1 Samen enthalten; He rum pumilum, foliis pinnatis, caule ſuffruticoſo, rollarum alis vexillo, vexilloque carina brevior leguminibus monoſpermis *L.* Engl. Low Spa Hedyſarum. Spanien iſt ſein Vaterland.

und stehen auf eigenen Stielen. Seine Blumen-Köpfchen stehen in den Winkeln der Blätter. Seine Hülsen stehen auf eigenen Stielen gleichsam in Büscheln beysammen, sind gerade, und haben oft 5, etwas haarige und ziemlich große Gelenke.

50. Zurück gebogener Süß-Klee, dessen Blätter dreyfach und gestrichelt, dessen Blumen-Trauben aufrecht sind, und dessen Hülsen unter sich hängen und aus vielen Gelenken bestehen; Hedysarum retroflexum, foliis ternatis lineatis, racemis erectis, leguminibus pendulis multi-articularis *L.* Der Stängel ist staudenartig; die Blätter eyrund, und auf der untern Fläche filzig oder seidenartig; die Blumen-Trauben stehen zur Seite und an dem Gipfel der Stängel und Aeste; die Blumen-Stiele sind fadenförmig; die Hülsen zusammen gedrückt, und an dem andern Rande ausgeschweift, und bestehen aus 4 bis 7 Gelenken.

Von dem **Süß-Klee mit empfindsamen Blättern**, Hedysarum gyratum, werde ich im Art. **Sinn-Pflanze** handeln.

* * *

Der **nordamerikanische Stauden-Klee**, oder **carolinische Klee-Baum**, (bey Planer'n Gewürz-Staude, oder Leder-Blume,) ist eine Gattung Stauden mit 4 Staubfäden und 1 Staubwege oder Griffel, und gehört nach Linné in die erste Abtheilung seiner 4ten Classe. Linné hat 2 Arten.

1. Ptelea mit dreyblätterigen Blättern, **nordamerikanischer Stauden Klee**, carolinischer Klee-Baum, Frutex Virginianus trifolius, ulmi seminibus *Pluken.* Ptelea trifoliata foliis ternatis *L.*; Fr. Ptelea à fruit d'orme et à trois feuilles; Engl. the Carolina Shrub-Trefoil, three-leaved shrubby Trefoil, Ptelea from South-Carolina. Diese buschartige Pflanze wächst in Pensylvanien, bis zum 40sten Grad

beyden Ende
bis an 4 Z. Läng
davon ist in der M
einander über be
nem Klee-Blatt
Flächen sind glatt
einer starken erhab
nere Neben-Aeste
Stiel des Blattes
grüner Farbe, und
igt. Die Zweige
füllt, und geben,
starken Geruch von
Geschlechtes (*).

(*) Hr. Reg. Rath Me
sondern vielmehr m
Stämmen beobachte
he einen kleinen Fru
kleine Staubwege, de
Fäden und unansehn
Frucht-Keim, längere
bogene Staubwege wa
wirklich getheilt, und
seyn, will Dr

und ſtehen auf eigenen Stielen. Seine Blumen-Köpfchen ſtehen in den Winkeln der Blätter. Seine Hülſen ſtehen auf eigenen Stielen gleichſam in Büſcheln beyſammen, ſind gerade, und haben oft 5, etwas haarige und ziemlich große Gelenke.

50. Zurück gebogener Süß-Klee, deſſen Blätter dreyfach und geſtrichelt, deſſen Blumen-Trauben aufrecht ſind, und deſſen Hülſen unter ſich hängen und aus vielen Gelenken beſtehen; Hedyſarum retroflexum, foliis ternatis lineatis, racemis erectis, leguminibus pendulis multi-articularis *L.* Der Stängel iſt ſtaudenartig; die Blätter eyrund, und auf der untern Fläche filzig oder ſeidenartig; die Blumen-Trauben ſtehen zur Seite und an dem Gipfel der Stängel und Aeſte; die Blumen-Stiele ſind fadenförmig; die Hülſen zuſammen gedrückt, und an dem andern Rande ausgeſchweift, und beſtehen aus 4 bis 7 Gelenken.

Von dem **Süß-Klee mit empfindſamen Blättern**, Hedyſarum gyratum, werde ich im Art. **Sinn-Pflanze** handeln.

* * *

Der **nordamerikaniſche Stauden-Klee, oder caroliniſche Klee-Baum**, (bey Planer'n Gewürz-Staude, oder Leder-Blume,) iſt eine Gattung Stauden mit 4 Staubfäden und 1 Staubwege oder Griffel, und gehört nach Linné in die erſte Abtheilung ſeiner 4ten Claſſe. Linné hat 2 Arten.

1. Ptelea mit dreyblätterigen Blättern, nordamerikaniſcher Stauden Klee, caroliniſcher Klee-Baum, Frutex Virginianus trifolius, ulmi ſeminibus *Pluken.* Ptelea trifoliata foliis ternatis *L.*; Fr. Ptelea à fruit d'orme et à trois feuilles; Engl. the Carolina Shrub-Trefoil, three-leaved ſhrubby Trefoil, Ptelea from South-Carolina. Dieſe buſchartige Pflanze wächſt in Penſylvanien, bis zum 40ſten Grad

tum, foliis pinnatis, racemis
inflexis, caule fruticoso L.
genden, in Indien zu Hause,
fruchtungs-Theilen sehr viele
barbarischen und hasenkleeartig
aufrechten, staudigen und beyn
gel, und gefiederte Blätter,
Blättchen bestehen.

48. Gestreckter Süß-
Blättern, walzenförmigen, un
igen Hülsen, und gestreckten S
ten die Blumen-Köpfe fest
prostratum, foliis pinnatis,
indivisis dispermis, capitulis s
libus prostratis L. Die
Die Stängel eine Handbreit h
dergedrückt, ästig und rundlich
sind häutig und gespalten, und
und den Aesten ab. Die Bl
stehen aus 5 bis 7 keilförmi
Blättchen, welche auf der obe
untern aber mit filzigen oder gr
die wie Dach-Ziegel auf einan
men-Köpfe sitzen in den Winke
ter mit dem Stängel. Die
zenförmig, glatt und gleich,
steife Spitze, welche zuvor der

49. Armbandförmiger S
chen und kreisrunden Blättern,
Hülsen, deren Gelenke kugelru
moniliferum, foliis simplicibus
bus moniliformibus, articulis
wie die folgende Art, perennir
sind spannenlang und gestreckt.
sind gespalten, gestreift, spitzig
net. Seine Blätter sind kle

und ſtehen auf eigenen Stielen. Seine Blumen-Köpfchen ſtehen in den Winkeln der Blätter. Seine Hülſen ſtehen auf eigenen Stielen gleichſam in Büſcheln beyſammen, ſind gerade, und haben oft 5, etwas haarige und ziemlich große Gelenke.

50. Zurück gebogener Süß-Klee, deſſen Blätter dreyfach und geſtrichelt, deſſen Blumen-Trauben aufrecht ſind, und deſſen Hülſen unter ſich hängen und aus vielen Gelenken beſtehen; Hedyſarum retroflexum, foliis ternatis lineatis, racemis erectis, leguminibus pendulis multi-articularis *L.* Der Stängel iſt ſtaudenartig; die Blätter eyrund, und auf der untern Fläche filzig oder ſeidenartig; die Blumen-Trauben ſtehen zur Seite und an dem Gipfel der Stängel und Aeſte; die Blumen-Stiele ſind fadenförmig; die Hülſen zuſammen gedrückt, und an dem andern Rande ausgeſchweift, und beſtehen aus 4 bis 7 Gelenken.

Von dem **Süß-Klee mit empfindſamen Blättern**, Hedyſarum gyratum, werde ich im Art. **Sinn-Pflanze** handeln.

* * *

Der **nordamerikaniſche Stauden-Klee, oder caroliniſche Klee-Baum**, (bey Planer'n Gewürz-Staude, oder Leder-Blume,) iſt eine Gattung Stauden mit 4 Staubfäden und 1 Staubwege oder Griffel, und gehört nach Linné in die erſte Abtheilung ſeiner 4ten Claſſe. Linné hat 2 Arten.

1. Ptelea mit dreyblätterigen Blättern, **nordamerikaniſcher Stauden Klee, caroliniſcher Klee-Baum**, Frutex Virginianus trifolius, ulmi ſeminibus *Pluken.* Ptelea trifoliata foliis ternatis *L.*; Fr. Ptelea à fruit d'orme et à trois feuilles; Engl. the Carolina Shrub-Trefoil, three leaved ſhrubby Trefoil, Ptelea from South-Carolina. Dieſe buſchartige Pflanze wächſt in Penſylvanien, bis zum 40ſten Grad

runde Samen-Kapsel, die im Oct. reif wird, und einen frischen Hopfen-Geruch hat. Sie ist weißgelblich, mit einem erhabenen Ader-Gewebe durchzogen, 1 Z. lang, und ½ Z. breit. In der Mitte hat sie 2 halbrunde Höhlen, die neben einander einen Zirkel vorstellen, und in deren jeder eigentlich ein Samen-Korn liegen sollte; gemeiniglich aber trifft man nur in einer, einen vollständigen länglichen, auf einer Seite runden, und auf der andern Seite platten, weißen Kern an, welcher mit einer dünnen bräunlichen Haut umzogen, und im Geschmacke süß ist. Die Samen-Kapseln finden sich oft mit 3 Ecken, welches daher entsteht, wenn, wie bereits Linné angemerkt hat, die Anzahl der Einschnitte der Blumen-Decke, der Blumen-Blätter und Staubfäden, auf 5 Stück steigt.

Eine Abart davon, welche **Fabricius**, in seiner Enum. meth. plant. horti Helmst. S. 416, zuerst angezeigt hat, ist die fünfblätterige Ptelea, Ptelea pentaphylla foliis quinatis, floribus cymosis. Sie unterscheidet sich bloß dadurch, daß 5 Blätter ein einziges Blatt ausmachen, welche aber schmähler, und nur in dem mittleren, als dem größten, etwas über 1 Z., und in den kleinsten kaum über ½ Z. breit ausfallen. Der Blumenblätter ist eine fünffache Anzahl, und der Staubfäden sind 5, 6 bis 8. Der Knopf ist rauch, oval, dreyeckig, und die Stigmate finden sich zu 3, bisweilen auch zu 4 Stück. Es sind daher die meisten Samen-Kapseln dreyseitig. Uebrigens ist diese Varietät mit der dreyblätterigen in allen Eigenschaften gleich.

Die Rinde ist glatt und aschgrau; die Zweige sind biegsam; das Holz hat eine weiße Farbe und ziemliche Festigkeit. Die Höhe des Strauches wird nicht über 12 F., und die Dicke ebenfalls nicht ansehnlich. Das frische Ansehen und die angenehm riechenden Blumen-Büschel verstatten ihm einen Platz in Gärten und Pflanzungen. Man kann ihn entweder aus Samen, oder durch Absenker, oder auch durch abgeschnittene Zweige, ziehen und vermehren.

a) Aus

a) **Aus Samen.** Weil dieser nur bisweilen ein Mahl in einem warmen Sommer bey uns zur Reife kommt, so muß man dazu fast allgemein ausländischen Samen nehmen. Man säe denselben im Frühlinge auf eine warme Rabatte, in gemeine, doch fein zubereitete Garten-Erde, etwa ½ Z. tief. Wenn der Same noch gut gewesen ist, pflegt er zu Ende des Mayes aufzugehen. Wenn nun die Pflänzchen hervor zu kommen anfangen, beschatte man sie, begieße sie einen Abend um den andern, und halte sie nachher den ganzen Sommer über von Unkraute beständig rein. Gegen den Eintritt des Winters umstecke man das Samen-Beet rings umher mit Zweigen von Scorpion-Kraut (Ulex europæus *L.*), um dadurch die schneidende Kälte des Frostes zu brechen. Im folgenden Frühlinge nehme man die Pflanzen auf, und setze sie, 1 F. weit von einander entfernt, in die Pflanzschule, in welcher sie binnen 2 bis 3 Jahren die zur förmlichen Verpflanzung nöthige Größe und Stärke zu erlangen pflegen.

Oder: um das Aufkeimen des Samens geschwinder zu befördern, säe man denselben etwa im März, oder im Anfange des Apr., in leichte Erde in Töpfe, und senke solche, doch nur so lange, in ein Mist-Beet ein, bis die Pflänzchen 1 bis 2 Z. groß sind, begieße sie den ganzen Sommer über, so oft es nöthig ist, schütze sie im folgenden Winter gegen starken Frost, und pflanze sie im folgenden Frühlinge aus den Töpfen in die Pflanzschule.

b) **Durch Absenker.** Man pflanze, zu diesem Zwecke, eine Anzahl Sträuche besonders, und schneide diese, wenn sie 1 bis 2 Jahr gestanden haben, nahe über der Erde ab. Sie treiben dann im Sommer junge Schüsse, welche 5 bis 6 F. lang, und noch wohl länger, zu werden pflegen; und im Oct., welches die beste Zeit dazu ist, senke man dieselben, nach folgender

Ver-

Korn liegen sollte; gemeiniglich aber tri
einer, einen vollständigen länglichen, a
runden, und auf der andern Seite pl
Kern an, welcher mit einer dünnen brä
umzogen, und im Geschmacke süß ist.
Kapseln finden sich oft mit 3 Ecken, wel
steht, wenn, wie bereits Linné angemerk
zahl der Einschnitte der Blumen-Decke,
Blätter und Staubfäden, auf 5 Stück
Eine Abart davon, welche Fabrici
Enum. meth. plant. horti Helmst. S. 416, z
hat, ist die fünfblätterige Ptelea, Ptelea p
liis quinaris, floribus cymosis. Sie unterse
dadurch, daß 5 Blätter ein einziges Blatt au
che aber schmähler, und nur in dem mitt
größten, etwas über 1 Z., und in den klein
½ Z. breit ausfallen. Der Blumenblätter
che Anzahl, und der Staubfäden sind 5, 6
Knopf ist rauch, oval, dreyeckig, und die S
sich zu 3, bisweilen auch zu 4 Stück. Es
meisten Samen-Kapseln dreyseitig. Uebr
Varietät mit der dreyblätterigen in allen
gleich.

Die Rinde ist glatt und aschgrau; die
biegsam; das Holz hat eine weiße Farbe
Festigkeit. Die Höhe des Strauches wir

Samen aufgegangenen Bäumchen hat schon ein weiblicher voriges Jahr, also in dem dritten Jahre seines Alters geblühet. Dieses Jahr kamen drey von ihnen zur Blüthe.

„Da also die Ptelea trifoliata, wenn sie auf ihrem gesäeten Stand-Orte stehen bleibt, so früh zu blühen anfängt: so ist es wahrscheinlich, daß ihr Lebens-Alter von kurzer Dauer, und der im 13ten Jahre sich befindliche weibliche Baum seinem Lebens-Ende nahe sey, und wegen dieser seiner abnehmenden Kräfte im Winter 1784 bis 1785 mehr Noth gelitten, als in dem vorhergehenden Winter, welche beyde die jungen Bäume so gut überstanden haben."

Noch schätzbarer würde uns dieses Bäumchen seyn, wenn die Blätter auch bey uns denjenigen Nutzen leisteten, welchen die Amerikaner davon erhalten sollen. Es geben solche, gerieben, einen unangenehmen Geruch von sich, und sollen, als Thee getrunken, eine wurmtreibende Kraft äussern, auch zur Heilung äusserlicher Wunden gebraucht werden.

2. Ptelea mit einzelnen Blättern, Hopfen-Baum, falscher Thee, Ptelea viscosa, foliis simplicibus *L.* Carpinus viscosa, salicis folio integro, oblongo *Burm.* Staphylodendron americanum, foliis lauri angustis *Plum.* wächst in beyden Indien auf Sand-Boden wild. Sie ist kleberig, und hat einen wiederigen Geruch. Ihr Stängel ist staudenartig, wächst aufrecht, und von 5 bis zu 20 Sch. hoch, und treibt viele aufrechte Aeste, welche, wenn sie noch jung sind, Ecke haben. Ihre Blätter sind hellgrün, länglich, und, so lange die Pflanze noch jung ist, ausgeschweift, oder sägenartig gezahnt, sonst aber haben sie einen ganz glatten Rand, und stehen ohne merkliche Stiele wechselweise an den Aesten. Ihre grünliche Blumen stehen in Trauben-Kämmen beysammen, und haben 8, selten 7 oder 6 Staubfäden, und keine Krone; ihr Kelch besteht meistens aus 4, zuweilen aus 3 oder 5 Blättchen.

Man

Man kann dieſe Pflanze aus dem Samen ziehen. Kann man ihn aus der Fremde friſch haben, ſo wird er auf einem Miſtbeete gern aufgehen. Wenn die Pflanzen zum Verſetzen taugen, müſſen ſie einzeln in beſondere kleine, mit leichter lehmiger Erde angefüllte Töpfe geſetzet, die Töpfe ſelbſt aber in ein Miſtbeet von Gärber-Lohe gegraben werden, wo man ſie im Schatten erhalten muß, bis ſie friſch eingewurzelt ſind. Hernach muß man ihnen, nach Beſchaffenheit der Wärme der Witterung, alle Tage friſche Luft geben; denn man muß ſie nicht ſchwach ziehen, und ſie auch nicht zu ſtark begießen. Im Herbſte müſſen die Pflanzen in ein Glas-Haus gebracht werden, wo man ſie den Winter über in einer gemäßigten Wärme halten muß. Doch wollen ſie dieſe Zeit über, wenig begoſſen ſeyn; denn die Näſſe würde ihnen eben ſo ſchädlich ſeyn, als die überflüſſige Wärme. Wenn die Pflanzen ſtärker

Klee, (Berg-) ährentragender mit den schmählsten Blättern, s. oben, S. 538.
— (—) großer brauner, s. oben, S. 536.
— (—) weißer wohlriechender, s. oben, S. 547.
— (Berggras-) großer, s. oben, S. 421.
— (Biber-) } s. Fieber-Klee, im XIII. Th. S. 333.
— (Bitter-) }
— (Blasen-) s. oben, S. 545.
— (blauer) s. oben, S. 592.
— (brabanter) s. oben, S. 422.
— (Cherleriſcher) s. oben, S. 420.
— (einblumiger) s. oben, S. 544.
— (Erdbeer-) s. oben, S. 545.
— (Erdfrucht-) s. oben, s. 419.
— (ewiger) s. oben, S. 592.
— (Faden-) s. oben, S. 550.
— (Feld-) gelber, s. oben, S. 549.
— (—) weißer, s. oben, S. 415.
— (Fieber-) s. im XIII Th. S. 333.
— (filziger) s. oben, S. 545.
— (fünfblätteriger) s. oben, S. 412.
— (Geiß-) s. oben, S. 552, 589.
— (Gelb-) Anthyllis vulneraria *Linn.*; s. Wund-Kraut.
— (geſtreifter) s. oben, S. 543.
— (goldener) s. oben, S. 405, und 573.
— (griechiſcher) s. Griechiſch Heu, im XXIII Th. S. 269.
— (Guckgucks-) s. Acetoſella, im I Th. S. 266.

Klee, (Hahnenkamm-) ſ. Eſparſette, im XI Th. S. 562.

— (Harz-) ſ. oben, S. 560, fgg.

— (Haſen-) gelber, Anthyllis vulneraria *L.*; ſiehe Wund-Kraut.

— (—) niedriger wollichter, ſ. oben, S. 538.

— (Herz-) ſ. oben S. 423, Anm.

— (Hirſch-) Eupatorium *L.* ſiehe Kunigunden-Kraut.

— (holländiſcher) rother, ſ. oben, S. 422.

— (—) weißer, ſ. oben, S. 415.

— (Honig-) ſ. oben, S. 575.

— (Hopfen-) ſ. oben, S. 547, fgg.

— (Hopfen-Schnecken-) ſ. oben, S. 692.

— (Horn-) ſ. oben, S. 573.

— (Hufeiſen-) ſ. Hufeiſen-Kraut, ſ. im XXV Th.

Klee, (Lotus-) gelber, ſ. oben, S. 564, 599.
— (—) rother ſ. oben, S. 566.
— (Lucern-) ſ. oben, S. 592.
— (Lungen-) ſ. Fieber-Klee, im XIII Th. S. 333.
— (Lupinen-) ſibiriſcher fünfblätteriger, ſ. oben, S. 412.
— (Magen-) ſ. Fieber-Klee, im XIII Th. S. 333.
— (Manna-) ſ. oben S. 699.
— (mediſcher) ſ. oben, S. 592.
— (Meliloten-) ſ. oben, S. 402, 405, und 412.
— (Mond-) ſ. oben, S. 578.
— (niederländiſcher) ſ. oben, S. 422.
— (pannoniſcher) ſ. oben, S. 551.
— (Pferde-) ſiehe oben, S. 402, und 593, Anm.
— (pyrenäiſcher) ſ. oben, S. 418, und 541, Anm.
— (rauher) ſ. oben, S. 541.
— (Raupen-) Scorpiurus; ſiehe Krebs-Blume, Raupen-Kraut.
— (röthlicher) ſ. oben, S. 421.
— (rücklings liegender) ſ. oben, S. 544.
— (Sauer-) ſ. Acetoſella, im I Th. S. 266.
— (Scharbocks-) ſ. Fieber-Klee, im XIII Th. S. 333.
— (ſchaumiger) ſ. oben, S. 544.
— (Schild-) ſ. oben, S. 695 und 698.
— (ſchildförmiger) ſ. oben, S. 541.
— (ſchmahlblätteriger) ſ. oben, S. 538.
— (Schnecken-) ſ. oben, S. 578.

Klee, (Schnecken-) Hopfen-) ſ. oben, S. 692.
— (—) See-) ſ. oben, S. 693
— (—) wahrer, ſ. oben, S. 592 und
— (Schoten-) ſ. oben, S. 564.
— (Schweitzer-) ſ. Eſparſette, im XI Th
562.
— (See-Schnecken-) ſ. oben, S. 693.
— (ſenkrechter) ſ. oben, S. 413.
— (Sichel-) ſ. oben, S. 578.
— (ſpaniſcher) ſ. Eſparſette, und oben, S.
und 536.
— (Spargel-) ſ. oben, S. 592.
— (Spitz-) ſ. oben, S. 548, und Spitzk
im Art. Klette.
— (Stauden-) nordamerikaniſcher, ſ. oben S.
— (ſtaudiger) ſ. oben, S. 543.
— (Stein-) cretiſcher, ſ. oben, S. 411.
— (—) deutſcher, } ſ. oben, S. 4
— (—) gemeiner gelber, }
— (—) italiäniſcher, ſ. oben, S. 411.
— (—) oſtindiſcher, } ſ. oben, S. 404.
— (—) polniſcher, }
— (—) rother, ſ. oben, S. 566.
— (—) vogelfußartiger, ſ. oben, S. 412
— (—) wilder, ſ. oben, S. 402, und 573
— (Stern-) ſ. oben, S. 540.
— (Stotternheimer) ſ. oben, S. 592.
— (Sumpf-) ſ. Fieber-Klee, im XIII Th.
— (Süß-) ſ. oben, S. 698.

ee, (türkischer) großer, s. Esparsette, im XI Th. S. 562.
- (umgebogener) s. oben, S. 413.
- (unächter) s. oben, S. 414.
- (unterirdischer) s. oben, S. 419.
- (Wasser-) s. Fieber-Klee, im XIII Th. S. 333.
- (weißer holländischer) s. oben, S. 415.
- (Wicken-) s. Esparsette, im XI Th. S. 562.
- (Wiesen-) brauner gemeiner, oder großer rother, s. oben, S. 421, fgg.
- (—) fleischrother nackender, s. oben, S. 537.
- (—) gelber, s. oben, S. 547.
- (—) langstieliger, s. oben, S. 545.
- (—) weißer, s. oben, S. 415.
- (Wirbel- oder Wirtel-) s. oben, S. 696.
- (wohlriechender) s. oben, S. 402.
- (Wund-) s. Wund-Kraut.
- (zweyblumiger) s. oben, S. 550.

ee-Baum, Celtis *Tourn.* & *L.*; s. Lotus-Baum.
— (caroliniſcher) Prelea trifoliata; s. oben, S. 727.

ee-Blatt, das drey Mahl gespaltene Blatt des Klees.

In der Minier-Kunst, werden die Minen von drey Kammern also genannt, weil sie der Gestalt eines Klee-Blattes ähnlich sind.

In der Wapen-Kunst, wird das Klee-Blatt an einer Kroue, Fr. Fleuron, genannt.

Vom Kleeblatt-Kreutze in der Wapen-Kunst siehe Kreutz.

In der französischen Spiel-Karte, hat eine in schwarzen Farben, die ein Klee-Blatt vorstellt, diesen Nahmen, Trefle oder Kleberu.

Figürlich, in einigen Fällen, eine Zahl von dreyen. Ein Kleeblatt böser Buben. Ein Kleeblatt wahrer Freunde.

Kleeblatt-Zug, s. Klee-Zug.

Klee-Busch, s. Strech-Palme.

Klee-Häckſel, s. oben, S. 478, fgg.

Klee-Heu, s. oben, S. 496, fgg.

Klee-Kamp, } s. oben, s. 425.
Klee-Koppel, }

Klee-roth, der bläulichen und zugleich schmutzig rothen Farbe der Blumen-Köpfchen des Futter-Klees gleich.

Besonders wird dieses Wort im Weinbaue gebraucht, wo der Kleerothe, oder nach der niedersächsischen Aussprache der Kleberrothe, eine Art Weinstock ist, dessen Trauben einen guten süßen Geschmack haben, und einen rothen Wein geben, welcher in das bläuliche fällt. Er wird auch der kleine Braune, und im Böhmischen Brunat, genannt.

Klee-Staude, s. Stauden-Klee, oben S. 579.

Klee-Strauch, eine Benennung der Medicago arborea *L.*; s. oben, S. 579.

Klee-Zug, ein Zug, welcher einem Klee-Blatte gleicht. Besonders nennt man Klee-Züge, oder Kleeblatt-Züge, Fr. Arceaux, in den bildenden Künsten, Auszierungen oder Zierrathen von durchschlungenen Zügen, in

in Gestalt des Klees. Sie werden vornehmlich in das halb erhobene und halb ausgehöhlte Glied der Karnieße, in der korinthischen und in der zusammengesetzten Ordnung angebracht. Man hat **Klee-Züge mit Palmen-Stängeln**, Fr. Trefles à palmettes, und **Klee-Züge mit Blumen**, Fr. Trefles à fleuron; s. im XIX Th. S. 64, und die dazu gehörige 1 und 2, in Fig. 1000.

Kleen, (der) im Schleßwigischen, eine Torf- oder Mohr-Erde, welche unter dem Kleye liegt, woraus Salz bereitet wird.

Vielleicht mit Kley, aus einer und eben derselben Quelle.

Kleffen, s. **Kläffen**, oben S. 305.

Kleiben, kommt in doppelter Gestalt vor.

1. Als ein Neutrum, mit dem Hülfsworte seyn, für das Neutrum kleben, in welchem Verstande es schon bey dem Ottfried kliban lautet, ob sich gleich auch das gewöhnliche kleban, bey ihm befindet. In dieser Gestalt kommt es im Hochdeutschen nur noch zuweilen in **bekleiben** vor, kleben bleiben, doch nur in verschiedenen figürlichen Bedeutungen. 1) Anwurzeln, fortkommen, von Pflanzen und Gewächsen. **Eine Pflanze, so oft versetzet wird, bekleibet nicht. Der Zweig ist recht schön bekleibet.** 2) Fortdauern. 3) Die verlangte Wirkung hervor bringen. **Weil nie dein Wort an ihnen kann bekleiben**, Opitz Ps. 119, 79. 4) Stärke, innere Kraft erreichen.

2. Als ein Activum, wo es die thätige Gattung von kleben ist, kleben machen.

1) Vermittelst einer kleberigen Feuchtigkeit befestigen, hangen machen, Fr. coller. **Ein Bild an die**

Wand kleiben. Zwey Blätter Papier zusa
kleiben. Es wird in diesem Verstande nur noch
nigen wenigen Fällen des gemeinen Lebens gebr
indem in den meisten besondere Ausdrücke üblich
So braucht man für kleiben leimen, kleistern,
pappen, wenn das kleberige Verbindungs-Mittel
Kleister, oder ein Mehl-Brey, ist. Aber auch
wo das allgemeinere kleiben noch gebraucht w
kann, z. B. wenn der Kleber ein Gummi ist, d
man im Hochdeutschen gemeiniglich kleben, so
es auch ist, das Neutrum mit seinem Activo
wechseln, wenn beyde bequem unterschieden w
können.

2) Eine Wand kleiben, oder nur schlechthin
ben, Fr. boulller, murer avec du torchis, das
Werk einer hölzernen Wand mit naß gemachtem
ausfüllen; eine bey der Bau-Art auf dem Land
in kleinen Städten sehr übliche Verrichtung, wo
Wort niemahls kleben, sondern allezeit kleiben,
im Niederf. auch kleimen lautet.

Daher ankleiben, mit einer zähen Feuchtigk
etwas befestigen, ankleben machen. Einen Zettel
kleiben. Ein Papier an die Wand ankleiben.

Aufkleiben, aufkleben, auf etwas kleben,
einem Kleber auf etwas befestigen. Einen Zettel
kleiben, nähmlich auf das Buch, oder eine a
Sache. Einen Bogen Papier auf kleiben.

Bekleiben, vermittelst einer klebenden Sach
etwas überziehen. Mit Papier, mit Leinwand
kleiben. Eine Wand bekleiben, d. i. mit L
überziehen.

Schon bey dem Ottfried in der thätigen Form klei-an, kleipan, der es aber auch in weiterer Bedeutung für eften, anheften, braucht. Die Nieder-Sachsen unter-cheiden kleben und kleiben gleichfalls, kehren sie aber um. Das Neutrum heißt bey ihnen kliven, das Activum aber leven. Indessen verwechseln sie dieselben eben so gern, als die Hoch- und Ober-Deutschen.

eiber. 1. In einigen Gegenden, eine Benennung es im XIX Th. S. 793, beschriebenen Grau-Spech-es, Sitta europaea *L.*

2. **Der Kleiber**, Fämin. **die Kleiberinn**, eine Person, welche kleibet, besonders in der zweyten Be-deutung des Activi, wo **Kleiber** und **Kleiberinnen** diejenigen Personen sind, welche die hölzernen Wände mit Lehme ausfüllen, oder solche kleiben; Fr. Bousilleur. In einigen Gegenden werden sie Dreck-Kleiber, Leim-Klecker, Leim-Klicker oder vielmehr Lehm-Klicker genannt. Siehe **Lehm-Wand.**

eiber-Lehm, Fr. Torchis, derjenige Lehm, welcher zum Kleiben gebraucht wird, oder gebraucht werden kann; zum Unterschiede von dem **Töpfer-Lehm.** Siehe **Lehm-Wand.**

leibe-Werk. 1. In der Chemie, die zum Ueberzie-hen der gläsernen und irdenen Gefäße gebräuchlichen Kitte; **Klebewerk**; s. oben, S. 270, fgg.

2. **Kleibewerk, Kleiber-Arbeit, Kleckwerk,** die Arbeit, die Verrichtung des Kleibens, d. i. der Aus-füllung eines Raumes mit angefeuchteten und durchge-kneteten Lehme, und ein auf diese Art verfertigtes Werk; Fr. Rousillage, Torchis. Dahin gehören die Lehm-Wände, die Back-Oefen auf dem Lande, besonders aber

Nachricht für den Buchbinder.

Die Kupfer werden, nach der Ordnung der oben auf Platte zur rechten Hand befindlichen Zahlen, hinte das Buch, an ein Blatt Papier, damit ſie bequem aus geſchlagen werden können, angekleiſtert.






Stanford University Libraries
3 6105 014 898 758
AE
2
R8
V.3
Stanford University Libraries
Stanford, California
Return this book on or before date due.